QE
1
N48
1890-94
NH

S. I. LIBRARY

QE
N48
1890-94
v.I
NH

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie,

Geologie und Palaeontologie,

für die

Jahrgänge 1890—1894 und die Beilage-Bände VII—VIII.

Ein Personen-, Sach- und Orts-Verzeichniss

für die darin enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

STUTTGART.
E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).
1896.

SMITHSONIAN
JUL 10 1969
LIBRARIES

SMITHSONIAN
LIBRARY

K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger) in Stuttgart.

SMITHSONIAN
JUL 10 1963
LIBRARIES

Inhalt.

Seite

Personenverzeichniss 1
Verschiedenes 197
Nekrologe 198
Zeitschriften 199
Sachverzeichniss 205
Nachträge und Berichtigungen 384

Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind cursiv, die der Referate gewöhnlich gedruckt. Im Personenverzeichniss sind ausserdem die Abhandlungen und Briefe durch cursive Schrift hervorgehoben.

I. Personen-Verzeichniss.

A. bedeutet Abhandlung. — B. Briefliche Mittheilung. — BB. Beilageband. — R. Referat.
Die Abhandlungen und brieflichen Mittheilungen sind durch *cursive* Schrift hervorgehoben.

A.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Abbe, E.: Ueber die Verwendung des Fluorits für optische Zwecke. R.	1891	I	235
Abich, H.: Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. I. Theil: Eine Bergkalkfauna aus der Araxesenge bei Djoulfa in Armenien. II. Theil: Geologie des Armenischen Hochlandes. 1. Westhälfte. 2. Osthälfte. R.	91	I	276
Abt, A.: Ueber das magnetische Verhalten des Moraviczaer Magnetits im Vergleich zu Stahl. R.	93	II	457
D'Achiardi, A.: Le rocce del Verrucano nelle valli di Asciano e di Agnano nei monti pisani. R.	94	II	443
Adams, Fr. D.: On the Microscopical Character of the Ore of the Treadwell Mine, Alaska. R.	90	I	428
— Notes on the Lithological Character of some of the Rocks collected in the Yukon District and adjacent Northern Portion of British Columbia. R.	90	I	432
— Notes to accompany a Tabulation of the Igneous Rocks based on the System of Prof. H. Rosenbusch. R. .	93	I	69
— On Melilite-bearing Rock (Alnoite) from Ste. Anne de Bellevue, near Montreal, Canada. R.	93	I	291
— On some Granites from British Columbia and the adjacent Parts of Alaska and the Yucon District. R. .	93	I	291
— On the Geology of the St. Clair Tunnel. R.	94	I	110
— On the Typical Laurentian Area of Canada. R. . . .	94	II	267
— *Ueber das Norian oder Ober-Laurentian von Canada. Mit Taf. XIX, XX und 8 Holzschnitten. A.* . .	*BB*	*VIII*	*419*
Adams, Fr. D. and A. C. Lawson: On some Canadian Rocks containing Scapolite, with a Few Notes on some Rocks associated with the Apatite-Deposits. R. . .	90	I	431
Agafonow, V.: Boracit als optisch anomaler Krystall (r.). R.	93	I	28

	Jahrg.	Bd.	Seite
Agafonow, V.: Notiz über den Gyps vom District Konstantinograd, Gouv. Poltawa. R.	1894	I	51
Agassiz, Alexander: Ueber einen neuen Tiefsee-Crinoiden aus des Familie der Apiocriniden. B.	*90*	*I*	*94*
— On the Rate of Growth of Corals. R.	91	II	195
— The Coral Reefs of the Hawaiian Islands. R.	92	I	592
— Calamocrinus Diomedae, a new stalked Crinoid, with Notes on the Apical System and the Homologies of Echinoderms. R.	93	I	562
Agostini, A. de e O. Marinelli: La communicazione sotterranea fra il canale d'Arni e la Pollaccia nelle Alpi Apuane, dimostrata mediante l'uranina. R.	94	II	417
Aguirre, E.: La Sierra de la Ventana. R.	92	II	294
Aigner, A.: Analogien der alpinen Salzlagerstätten. R.	90	I	59
Alberts, C.: Geologische und bergbauliche Skizzen aus Rumänien. R.	90	II	75
Alexeeff, W.: Ueber eine neue Art mineralischen Wachses aus dem Gouvernement Kaluga. R.	94	II	231
Alling, A. N.: On the Topas from the Thomas Range, Utah. R.	91	I	36
Amalitzky, W.: Zur Frage über das Alter der Unionidae. R.	94	I	196
— Die russischen Anthracosiden. R.	94	I	196
— Ueber die Anthracosiden der Permformation Russlands. R.	94	I	196
Ambronn, H.: Notiz über die Doppelbrechung in zähflüssigem Gummi. R.	91	II	7
— Ueber eine neue Methode zur Bestimmung der Brechungsexponenten anisotroper mikroskopischer Objecte. R.	94	II	210
Ameghino, J.: Contribucion al conocimiento de los Mamiferos fósiles de la Republica Argentina R.	92	I	564
Ami, H. A.: Discovery of a Cirriped in Canadian Palaeozoic Rocks. R.	90	I	152
— On the Geology of Quebec and Environs. R.	92	II	97
— On a Species of Goniograptus from the Levis Formation, Levis, Quebec. R.	92	II	173
— Additional Notes on Goniograptus Thureani Mc Coy, from the Levis Formation, Canada. R.	92	II	173
Amicis, G. A. de: Contribuzione alla conoscenza dei foraminiferi pliocenici. I foraminiferi del Pliocene inferiore di Trinité-Victor. R.	94	II	477
Ammon, L. von: Die permischen Amphibien der Rheinpfalz R.	93	II	407
Anderson, W.: On the Mineral Spring at Rock Flat Creek, near Cooma, Monara District. R.	92	I	317
— Notes on the Tertiary Deep Lead at Tumbarumba. R.	94	I	162
— Notes on Occurrence of Opal in New South Wales. R.	94	II	221
— siehe David, F. W. Edgeworth.			
Andersson, J. G.: Ueber das Alter der Isochilina-canaliculata-Fauna. R.	94	I	383
— Note on the Occurrence of the Paradoxides oelandicus zone in Nerike. R.	94	II	97
Andreae, A.: Weitere Beiträge zur Kenntniss des Oligocäns im Elsass. R.	91	II	328
— Normalprofil des Buntsandsteins bei Heidelberg. R.	92	II	85
— Das Rothliegende der Umgegend von Heidelberg. R.	92	II	86
— Ueber einen neuen Listriodon-Fundpunkt. R.	92	II	332

	Jahrg.	Bd.	Seite
Andreae, A.: Bemerkungen über die Porphyrbreccien von Dossenheim und das Rothliegende bei Heidelberg. R.	1892	II	433
— *Ueber die künstliche Nachahmung des Geysirphänomens. (Mit Taf. I und 1 Zinkographie.) A.*	*93*	*II*	*1*
— *Intermittirende Springquellen ohne Dampf oder Gasgeysire. (Mit Taf. II.) A.*	*93*	*II*	*19*
— Ueber die Nachahmung verschiedener Geysirtypen und über Gasgeysire. R.	93	II	354
— Vorläufige Mittheilung über die Ganoiden (Lepidosteus und Amia) des Mainzer Beckens. R.	93	II	546
— Ueber Hornblendekersantit und den Quarzmelaphyr von Albersweiler, Rheinpfalz. R.	94	I	288
— Das fossile Vorkommen der Foraminiferengattung Bathysiphon M. Sars. R.	94	I	394
Andreae, A. und A. Osann: Beiträge zur Geologie des Blattes Heidelberg. R.	92	II	85
— — Die Porphyrbreccie von Dossenheim. R.	92	II	87
— — Tiefencontacte an den intrusiven Diabasen von New Jersey. R.	93	I	505
— — Löss und Lösslehm bei Heidelberg, ihre Höhenlage und die darin vorkommenden Mineralien. R.	94	II	419
Andrews, W. R., siehe Jukes-Browne, J.			
Andrussow, N.: Skizze der Geschichte des Kaspischen Meeres und seiner Fauna. R.	90	II	116
— Die Schichten vom Cap Tschauda. R.	90	II	119
— Der Kalkstein von Kertsch und seine Fauna. R.	90	II	120
— siehe Wrangel, F.			
Angelis, G. de: Introduzione allo studio degli Antozoi fossili. R.	94	II	474
Antipoff, J.: Ueber einige Mineralien aus den blei- und silberhaltigen Lagerstätten der Gegend von Semipalatinsk. R.	94	II	234
Antonelli, G.: Il pliocene nei dintorni di Osimo e i suoi fossili caratteristici. R.	92	II	314
Anutschin, D.: Ovibos fossilis Rüt. R.	94	I	178
Armaschewsky, P.: Das Auffinden der Paludina diluviana in den posttertiären Bildungen Süd-Russlands. R.	91	I	315
Arnaud, H.: Sur la limite tracée par Coquand entre le Santonien et le Campanien. R.	93	I	362
Artini, Ettore: Epidot von Elba. R.	90	I	207
— Studio cristallografico della Cerussite di Sardegna. R.	90	II	209
— Quarzo di Val Malenco. R.	90	II	212
— Sulla natrolite di Bombiana nel Bolognese. R.	91	I	10
— Contribuzioni alla Mineralogia dei vulcani Cimini. R.	91	I	11
— Sulla Leadhillite di Sardegna. R.	91	II	29
— Studii petrografici su alcune rocce del Veneto I. R.	91	II	423
— Intorno alla composizione mineralogica delle sabbie del Ticino. R.	92	I	515
— Contribuzioni alla conoscenza delle forme cristalline della Stefanite del Sarrabus. R.	92	II	13
— Antwort auf einige Bemerkungen des Professor Dr. A. Cathrein bezüglich meiner Arbeit über den „Quarz von Val Malenco". R.	93	I	25
— Alcune ulteriori osservazioni sulle zeoliti di Montecchio Maggiore. R.	93	II	27
— Sopra alcune rocce dei dintorni del lago d'Orta. R.	93	II	57

	Jahrg.	Bd.	Seite
Artini, Ettore: Appunti petrografici sopra alcune rocce italiane. R.	1893	II	490
Arzruni, A.: Vergleichende Beobachtungen an künstlichen und natürlichen Mineralien. R.	92	I	225
— Vergleichende Untersuchung der Smaragde von Alexandrien, vom Gebel Sabara und vom Ural. R.	93	II	248
— Physikalische Chemie der Krystalle. R.	94	I	425
Arzruni, A. und A. Frenzel: Ueber den Ferronatrit. R.	93	I	42
Aubert: Sur quelques points de la géologie de la Tunisie. R.	91	II	298
— Note sur la géologie de l'extrême Sud de la Tunisie. R. 1893 I 317.	93	II	512
— Sur l'Eocène Tunisien. R.	93	II	532
Auerbach, F.: Absolute Härtemessung	93	II	2
— Ueber Härtemessung, insbesondere an plastischen Körpern. R.	93	II	2
— Plasticität und Sprödigkeit. R.	93	II	2
Auinger, M., siehe Hörnes, R.			
Aurivillius, C. W. S.: Ueber einige obersilurische Cirripeden aus Gotland. R.	93	II	196
Ayres, Edward F.: Notes of Crystallisation of Trona (Urao). R.	92	I	508
— Mineralogical Notes. Thenarditkrystalle vom Borax-See, San Bernardino Co. R.	92	II	33

B.

Babanek, Franz: Die uranhaltigen Skapolith-Glimmerschiefer von Joachimsthal. R.	91	II	295
Badoureau, A.: Preuves et cause du mouvement lent actuel de la Scandinavie. R.	94	II	244
Bäckström, H.: Om „kvartskakelagren" vid Guda, Norge. R.	91	I	95
— Ueber fremde Gesteinseinschlüsse in einigen skandinavischen Diabasen. R.	92	I	74
— Ueber angeschemmte Bimssteine und Schlacken der nordeuropäischen Küsten. R.	92	I	74
— Beitrag zur Frage nach der Stellung des Långbanit im Mineralsystem. R.	93	I	473
— Ueber die Stellung des Långbanit im Mineralsysteme. R.	93	I	474
— Beiträge zur Kenntniss der isländischen Liparite. R.	93	I	498
— Kemisk undersökning af några mineral från trakten af Langesund. R.	94	II	234
Baeff, siehe Duparc, L.			
Baichère: Sur le passage du calcaire de Ventenac à la formation à lignite du Languedoc. R.	90	II	113
Bailey, E. H. S.: On Halotrichite or Feather Alum, from Pitkin County, Colorado. R	94	I	52
Bailey, Geo. siehe H. W. Burrows.			
Bailey, L. W. and Wm. McInnes: Report on Explorations and Surveys in Portions of northern New Brunswick, and adjacent Areas in Quebec, and in Maine, U. S. R.	91	II	92
Ballore, Montessus de: Sur les recherches des conditions géographiques et géologiques caractérisant les régions à tremblements de terre. R.	93	I	57
Baltzer, A.: Lössähnliche Bildungen im Canton Bern. R.	91	II	139
— *Die Etna-Eruption von 1892. A.*	*93*	*I*	*75*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Baltzer, A.: Beiträge zur Kenntniss des tunisischen Atlas. (Mit Taf. III.) A.	*1893*	*II*	*26*
Baltzer, A. und Ed. Fischer: Fossile Pflanzen vom Comer-See. R.	92	II	467
Bamberger, Eug.: Ueber den Fichtelit. R.	92	II	241
Baratta, M.: Sull' eruzione eccentrica dell' Etna. R.	93	I	491
— Fenomeni elettrici e magnetici dei terremoti. R.	93	II	46
— Appunti storici sulle teorie sismochimiche. R.	93	II	46
— Il terremoto laziale del 22 Gennaio 1892. R.	93	II	47
— Sul terremoto Lucano. R.	94	I	281
— Della influenza lunare sui terremoti. R.	94	II	248
Barbot de N. Marny (Sohn) und Simonowitsch, S.: Geologische Untersuchung des Binagadi-Naphtha-Gebiets auf der Halbinsel Apscheron. R.	94	I	325
Barbour, E. H. and J. Torrey jr.: Notes on the Microscopic Structure of Oolite, with Analyses. R.	92	I	321
Baret, Ch.: Gypse des marais salants de Batz (Loire-Inférieur). R.	90	I	34
— siehe Lacroix, A.			
Barlow, A. E.: On the Relations of the Laurentian and Huronian on the North Side of Lake Huron. R.	94	II	95
Barrande, Joachim: Système Silurien du Centre de la Bohême. 1ère Partie. Recherches paléontologiques. Vol. VII. Classe des Échinodermes. Ordre des Cystidées. Continuations éditée par le Musée Bohème. R.	90	I	363
Barrois, Ch.: Faune du calcaire d'Erbray. Contribution à l'étude du terrain dévonien de l'ouest de la France. R.	90	I	286
— Sur les modifications endomorphes des massifs granulitiques du Morbihan. R.	90	II	81
— Modifications et transformations des granulites du Morbihan (granites à 2 micas). R.	90	II	86
— Note sur l'existence du terrain dévonien supérieur à Rostellec (Finistère). R.	90	II	106
— Sur le terrain dévonien de la Navarre. R.	90	II	106
— Mémoire sur les éruptions diabasiques siluriennes du Menez-Hom (Finistère). R.	90	II	397
— Sur le terrain dévonien de la Navarre. R.	92	I	117
— Le bassin houiller de Valenciennes d'après les travaux de MM. A. Olry et R. Zeiler. R.	92	I	347
— Observations sur le terrain Silurien des environs de Barcelone. R.	94	I	121
— Sur le terrain Dévonien de la Catalogne. R.	94	I	124
— Mémoire sur la faune du Grès Armoricain. R.	94	I	174
— Mémoire sur la distribution des graptolites en France. R.	94	I	205
— Sur le Rouvillograptus Richardsoni Hall sp. de Cabrières. R.	94	I	392
Barrow, G.: On certain Gneisses with round-grained Oligoclase and their Relation to Pegmatites. R.	93	I	287
— On an Intrusion of Muscovite-Biotite-Gneiss in the South-eastern Highlands of Scotland and its accompanying Metamorphism. R.	94	II	256
Bartalini, G. e G. Grattarola: Modificazioni apportate ad alcuni strumenti e apparecchi da laboratorio. R.	92	I	14
Barus, C.: A Report on the Thermo-Electrical Measurement of High Temperatures. R.	91	I	250
— The Compressibility of Hot Water, and its Solvent Action on Glass. R.	94	I	97

	Jahrg.	Bd.	Seite
Barus, C.: The Contraction of Molten Rock. R. . . .	1894	I	97
— The Relation of Melting Point to Pressure, in case of Igneous Fusion. R.	94	I	97
Barvíř, Heinrich: Quarzin von Herman Mestec. R. . . .	94	I	253
— Ueber eine Umwandlung von Granat in diopsidartigen Pyroxen, gemeine Hornblende und basischen Plagioklas in einem Granat-Amphibolit. R.	94	I	461
— O nekterych serpentinech západni Moravy a horninách amfibolitických je provázejících. (Ueber einige Serpentine des westlichen Mährens und die sie begleitenden Hornblendegesteine.) R.	94	II	420
— Bemerkungen über die mikroskopische Beschaffenheit des Granulits von dem Iglawaflusse in Mähren. R. . .	94	II	421
Bassani, F.: Sui fossili e sull' età degli shisti bituminosi di Monte Pettine presso Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. R.	94	II	107
— Marmi e calcare litografico di Pietraroia. R.	94	II	122
— Fossili nella dolomia triasica dei dintorni di Mercato S. Severino in provincia di Salerno. R.	94	II	312
Bather, A. W.: Precambrian Cephalopods, an Essay of Reconstructive Paleontology. R.	90	I	152
Bather, F. A.: The Basals of Eugeniacrinidae. R. . . .	91	I	438
— Trigonocrinus, a new Genus of Crinoidea, from the „Weisser Jura" of Bavaria, with the Description of a new Species, T. liratus. — Appendix. Sudden Deviations from Normal Symmetry in Neocrinoidea. R. .	91	I	439
— Note on Marsupites testudinarius v. Schloth. sp. R. .	92	I	449
— British Fossil Crinoids. Part I. Historical Introduction. Part II The Classification of the Inadunata fistula. R.	92	II	165
— British Fossil Crinoids. V. Botyocrinus, Wenlock Limestone. R.	93	II	558
Bauer, H. und H. Vogel: Mittheilungen über die Untersuchungen von Wassern und Grundproben aus dem Bodensee. R.	94	II	273
*Bauer, M.: Beiträge zur Mineralogie. VI. Reihe. 11. Ueber einen Turmalinzwilling. 12. Ueber eine Pseudomorphose von Aragonit nach Kalkspath. 13. Ueber den Liëvrit von Herbornseelbach in Nassau. (Mit 26 Holzschnitten.) A.	*90*	*I*	*10*
— *Beiträge zur Mineralogie. VII. Reihe. 14. Ueber die Pseudomorphosen von Rutil nach Brookit von Magnet Cove, Arkansas. 15. Ueber die Pseudomorphosen von Rutil nach Anatas. 16. Ueber den Schwerspath von Perkins' Mill, Templeton, Canada, sog. Michel-Lévyt. (Mit Taf. V und 2 Holzschn.) A. . . .*	*91*	*I*	*217*
— *Der Basalt vom Stempel bei Marburg und einige Einschlüsse desselben. (Mit Taf. IV.) A. . . .*	*1891*	*II*	*156, 231*
Bauermann, H., F. W. Rudler, J. J. H. Teall and H. J. Johnston-Lavis: Report of the Committee appointed for the Investigation of the Volcanic Phenomena of Vesuvius and its Neighbourhood. R. . . .	92	II	45
Baumgarten, O.: Studien über die Absorptionsfähigkeit der Bodenarten. R.	90	I	262
Baumhauer, H.: Ueber die Abhängigkeit der Aetzfiguren des Apatit von der Natur und Concentration des Aetzmittels. 2. Mittheilung. R.	91	II	32

	Jahrg.	Bd.	Seite
Baumhauer, H.: Ueber die Winkelverhältnisse des Apatit von verschiedenen Fundorten. R.	1891	II	33
— Ueber die Aetzerscheinungen des Strychninsulfates. R.	92	II	3
— Ueber Zwillinge des Kryolith. R.	92	II	401
— Ueber die Krystallisation des Nephelin. R.	93	I	29
— Ueber sehr flächenreiche, wahrscheinlich dem Jordanit angehörige Krystalle aus dem Binnenthal. R.	93	I	467
— Ueber das Krystallsystem des Jordanit. R.	93	I	470
— Ueber einen Zwillingskrystall von Jordanit. R.	94	II	19
— Deutlich hemiëdrische Binnitkrystalle. R.	94	II	19
— Gelber Diopsid von Graubünden. R.	94	II	23
Baur, G.: Palaeohatteria Credner and the Proganosauria. R.	90	I	144
— On the Characters and Systematic Position of the Large Sea-Lizards, Mosasauridae. R.	92	I	576
— Das Variiren der Eidechsen-Gattung Tropidurus auf den Galapagos-Inseln und Bemerkungen über den Ursprung der Inselgruppe. R.	93	I	165
— On the Lower Jaw of Sphenodon. R.	93	I	166
— Remarks on the Reptiles generally called Dinosauria. R.	93	I	545
— Kadaliosaurus priscus Credner, a new Reptile from the Lower Permian of Saxony. R.	93	I	549
— On Intercalation of Vertebrae. R.	93	II	189
— On the Pelvis of the Testudinata, with Notes on the Evolution of the Pelvis in General. R.	93	II	404
Bayberger, E.: Der Chiemsee. I. Topographische, Tiefen- und Zu- und Abflussverhältnisse des Sees. II. Physikalische und geologische Verhältnisse. R.	90	II	312
Bayley, W. S.: On some peculiarly spotted Rocks from Pigeon Point, Minnesota. R.	90	I	272
— Notes of Microscopical Examinations of Rocks from the Thunder-Bay Silver-District. R.	91	I	103
— A Quartz-Keratophyre from Pigeon Point and Irving's Augite-Syenites. R	91	I	106
— The Origin of the Soda-Granite and Quartz-Keratophyre of Pigeon Point. R.	91	I	106
— A Summary of Progress in Mineralogy and Petrography in 1889. R.	91	II	237
in 1890. R.	92	I	1
— Elaeolith-Syenite of Litchfield, Maine, and Hawes' Hornblende-Syenite from Red Hill, New Hampshire. R.	93	I	502
— A Fibrous Intergrowth of Augite and Plagioklase, resembling a Reaction Rim, in a Minnesota Gabbro. R. 1893 I 504	94	I	78
— Notes on the Petrography and Geology of the Akeley Lake Region, in Northeastern Minnesota. R.	93	I	504
— A Summary of Progress in Mineralogy and Petrography in 1891 and 1892. R.	93	II	1
— Striated Garnet from Buckfield, Maine. R.	94	II	225
— Actinolite-Magnetite Schists from the Mesabé Iron Range in Northeastern Minnesota. R.	94	II	262
— A Summary of Progress in Mineralogy and Petrography in 1893. R.	94	II	393
Bayley, W. S. and F. P. King: Catalogue of the Maine Geological Collection with a brief Outline History of the two Surveys of the State. R.	91	II	103

	Jahrg.	Bd.	Seite
Beaugey, M.: Formation du quartz par la source de Manhourat à Cauterets. R.	1891	I	212
— Calcaires à cristaux de quartz de Ville franque et de Biarritz. R.	91	I	379
— Inclusion d'anhydrite dans les quartz bipyramidés des argiles salifères pyrénéennes. R.	91	I	379
— Calcaire albitifère de Bedous (Basses-Pyrénées). R.	91	I	380
— Sur une porphyrite augitique de la Selva de Sallent, Pyrénées Espagnoles. R.	91	II	287
— Observations sur la partie occidentale de la feuille de Luz. R.	94	I	100
— siehe Seunes.			
Beecher, C. E.: Notice of a new Lower Oriskany-Fauna in Columbia Co., New York. R.	93	II	520
Beck, R.: Section Berggiesshübel. Blatt 102. R.	91	II	270
— Section Nassau. Blatt 118. R.	91	II	274
— Ueber Amphibolitisirung von Diabasgesteinen im Contactbereich von Graniten. R.	92	I	283
— Die Grundmoräne des nordischen Binneneises bei Dresden. R.	92	I	146
— *Ueber Brookit als Contactmineral. B.*	*92*	*I*	*159*
— Ueber gequetschte Granite. R.	92	II	250
— Das Rothliegende des Plauenschen Grundes oder des Döhlener Beckens im Lichte neuester Untersuchungen. R.	93	I	339
— Die Contacthöfe der Granite und Syenite im Schiefergebiete des Elbthalgebirges. R.	94	I	70
— Section Pirna. Blatt 83. R.	94	II	284
— siehe Sauer, A.			
Beck, R. und W. Luzi: Ueber die Bildung von Graphit bei der Contactmetamorphose. (Mit 1 Holzschnitt.) A.	*91*	*II*	*28*
Beck, W.: Technisches deutsch-russisches Wörterbuch für Bergwesen und Hilfsgegenstände. R.	92	II	74
Becke, F.: Die Krystallform des Traubenzuckers und optisch activer Substanzen im Allgemeinen. R.	91	I	236
— Ueber Quarzfremdlinge in Lamprophyren. R.	91	II	71
— Ueber Dolomit und Magnesit und über die Ursache der Tetartoëdrie des ersteren. R.	91	II	409
— Orientirung des Dolomit von Gebroulaz. R.	91	II	410
— Aetzversuche am Fluorit. R.	92	I	217
— Titanit von Zöptau. R.	93	I	29
— Krystallform und optische Orientirung des Keramohalit von Teneriffa. R.	93	I	41
— Krystallform optisch activer Substanzen. R.	93	II	5
— Vorläufiger Bericht über den geologischen Bau und die krystallinischen Schiefer des Hohen Gesenkes (Altvatergebirge). R.	93	II	124
— Bemerkungen zu Herrn Fock's Aufsatz: „Beiträge zur Kenntniss der Beziehungen zwischen Krystallform und chemischer Zusammensetzung." R.	93	II	459
— Ueber Chiastolith. R.	94	II	27
— Ueber die Bestimmbarkeit der Gesteinsgemengtheile, besonders der Plagioklase auf Grund ihres Lichtbrechungsvermögens. R.	94	II	49
Beckenkamp, J.: Strontianit und Cölestin vom Kaiserstuhl. R.	90	II	41
— Die Mineralien der Aragonitgruppe. R.	90	II	41

	Jahrg.	Bd.	Seite
Beckenkamp, J.: Die Anomalien der Krystalle. R. .	1890	II	42
— Zur Symmetrie der Krystalle. R. . . . 1891 I 370	94	I	258
— Ausgleichungsmethoden der geometrischen Krystallographie. R.	94	I	430
Becker, A.: Zwei Glimmeranalysen. R.	92	I	41
— siehe Sachse, R.			
Becker, G. F.: The Washoe Rocks. R.	90	I	428
— Geology of the Quicksilver Deposits of the Pacific Slope. R. 1891 I 33	92	I	86
— An Elementary Proof of the Earth's Rigidity. R. . .	91	I	387
— Antiquities from under Tuolumne Table Mountain in California. R.	92	I	392
— Notes on the Early Cretaceous of California and Oregon. R.	92	I	550
— Summary of the Geology of Quicksilver Deposits of the Pacific Slope. R.	92	I	85
— The Structure of a Portion of the Sierra Nevada of California. R.	93	I	100
Becker, H., siehe Förster, B.			
Béclard, F.: Sur deux fossiles infracouviniens. R. . . .	90	I	437
— Sur la Rhynchonella Pengelliana Davids. R.	92	I	182
— Fossiles nouveaux du dévonien inférieur de la Belgique. R.	93	I	408
Becquerel, Henri: Sur les lois de l'absorption de la lumière dans les cristaux. R.	90	II	187
— Recherches sur les variations des spectres d'absorption dans les cristaux. R.	92	II	1
— Recherches sur les variations des spectres d'absorption dans des composés du didyme. R.	92	II	1
Beecher, Ch. E.: Koninckina and Related Genera. R. .	91	II	465
— North American Species of Strophalosia. R.	91	II	465
— On Leptaenisca, a new Genus of Brachiopod from the Lower Helderberg Group. R.	91	II	465
— *Ueber die Entwickelung der Brachiopoden. (Mit Taf. VI.) A.*	*92*	*I*	*178*
— Brachiospongidae: a Memoir on a Group of Silurian Sponges. R.	92	II	371
— Symmetrical Cell Development in the Favositidae. R.	93	I	416
— The Development of a Palaeozoic Poriferous Coral. R.	93	I	418
— Development of Bilobites. R.	94	I	389
Beecher, Ch. E. and J. Clarke: The Development of some Silurian Brachiopoda. R.	91	II	184
Beecher, Ch. E. and Ch. Schuchert: Development of the Brachial Supports in Dielasma and Zygospira, and of the shell of Zygospira recurvirostra Hall. R. .	94	II	175
Behrendsen, O.: Zur Geologie des Ostabhanges der argentinischen Cordillere. R.	93	I	124
— *Bemerkung zu der Abhandlung des Herrn Möricke: „Versteinerungen des Lias und Unteroolithe von Chile.“ B.*	*94*	*II*	*91*
Behrens, H.: Sur la détermination de la dureté des matières rocheuses. R.	93	I	81
— Sur les cratères-lacs (Maare) de l'Eifel. R.	93	I	82
— Das mikroskopische Gefüge der Metalle und Legirungen. R.	94	II	277
— *Reactionen für mikrochemische Mineralanalysen. A.*	*BB.*	*VII*	*435*
Beissel, J.: Die Foraminiferen der Aachener Kreide. Herausgegeben von E. Holzapfel. R.	92	II	174

	Jahrg.	Bd.	Seite
Belár, A.: Ueber Aurichalcit und künstliches Zinkcarbonat ($ZnCO_3 + H_2O$). R.	1892	II	211
Bell, Dugald: On a Glacial Mound in Glen Fruin. R.	92	II	317
Bell, F. Jeffrey: On the Arrangement and Inter-relations of the Classes of the Echinodermata. R.	93	I	409
Bell, Robert: The Nickel and Copper Deposits of Sudbury District, Canada; with an Appendice. R.	93	II	73
Bellardi, L.: I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. Parte VI. R.	91	I	432
Belowsky, M.: Ueber die Aenderungen, welche die optischen Verhältnisse der gemeinen Hornblende beim Glühen erfahren. B.	*91*	*I*	*291*
— Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere vom Tulcan bis zu den Escaleras-Bergen. R.	94	I	465
Bene, G. v.: Ueber die geologischen Verhältnisse der Liaskohlengruben von Resicza-Domán und ihrer Umgebung. R.	92	I	357
Benecke, E. W. und L. van Werveke: Ueber das Rothliegende der Vogesen. R.	92	I	118
Bennie, J.: On the Prevalence of Eurypterid Remains in the Carboniferous Shales of Scotland. R.	90	II	146
Benoist, Nummulites de l'étage Tongrien aux environs de Bordeaux. R.	92	I	461
— Sur l'existence du Nummulites planulata dans les couches éocènes du Sud-Ouest. R. 1892 I 461	94	II	366
— Sur les espèces de Nummulites recueillies dans le forage du puits artésien, aux Château-Mauvezin, commune de Moulis. R. 1892 I 461	94	II	366
— Tableau synchronique des formations tertiaires du Sud-Ouest de la France, du bassin de Mayence et du Vincentin. R.	94	II	324
— Les Nummulites de l'étage Tongrien aux environs de Bordeaux. R.	94	II	365
— Les couches à Nummulites du Sud-Ouest de la France. R.	94	II	366
— Calcaire à Astéries de Sarcignan aux Pont-de-la-Maye. R.	94	II	455
— Description de Céphalopodes, Ptéropodes et Gastropodes, Opistobranches des Terr. tert. moyens du Sud-Ouest de la France. R.	94	II	472
Benoist et Billiot: Sur la position stratigraphique des couches à Echinides de la faune de Saint-Palais. R.	94	II	325
— — Coupe géologique des Terrains tertiaires sur la rive droite de la Gironde et de la Dordogne. R.	94	II	453
Bentivoglio, T.: Ricerche sulla Dolomite. R.	94	II	406
Ben-Saude, Alfred: Note sur l'Azorite de S. Miguel. R.	90	I	33
Berendt, G.: Die südliche baltische Endmoräne in der Gegend von Joachimsthal. R.	90	I	317
— Die beiderseitige Fortsetzung der südlichen baltischen Endmoräne. R.	90	I	318
— Åsarbildungen in Norddeutschland. R.	90	I	320
— Erbohrung jurassischer Schichten unter dem Tertiär in Hermsdorf bei Berlin. R.	93	I	344
— Ueber die Glacialschrammung auf der Magdeburger Grauwacke. R.	93	II	390
— Noch einmal die Lagerungsverhältnisse in den Kreidefelsen auf Rügen. R.	94	I	496
— Die Soolbohrungen im Weichbilde der Stadt Berlin. R.	94	II	125

	Jahrg.	Bd.	Seite
Berendt, G.: Spuren einer Vergletscherung des Riesengebirges. R.	1894	II	132
Berendt, G. und F. Wahnschaffe: Ergebnisse eines geologischen Ausfluges durch die Uckermark und Mecklenburg-Strelitz. R.	90	I	318
Bergeat, A.: Zur Geologie der massigen Gesteine der Insel Cypern. R.	93	II	58
Bergeron, J.: Sur le Cambrien et sur l'allure des dépôts paléozoiques de la Montagne-Noire. R. . 1890 I 96	90	I	285
— Sur la constitution géologique de la Montagne-Noire. R.	90	I	96
— Etude paléontologique et stratigraphique des terrains anciens de la Montagne-Noire. R.	90	I	96
— Réponse au Dr. Frech de Halle. R.	90	I	96
— Sur la présence de la faune primordiale dans le Hérault. Etude stratigraphique. R.	90	I	284
— Note sur les bassins houillers de Graissessac et de Decazeville. R.	91	II	120
— Sur les roches éruptives de la Montagne Noire. R.	91	II	285
— Sur une forme nouvelle de Trilobite de la famille des Calymenidae (Genre Calymenella). R.	91	II	459
— Sur la présence, dans le Languedoc, de certaines espèces de l'étage E, du Silurien supérieur de Bohême. R.	92	I	344
— Note sur une nouvelle espèce d'Arethusina etc. R.	92	I	344
— Contributions à l'étude géologique du Rouergue et de la Montagne Noire. R.	94	I	315
Bergeron, J. et Munier-Chalmas: Sur la présence de la faune primordiale (Paradoxidien) dans les environs de Ferrals-les-Montagnes (Hérault). R.	90	I	96
Berghell, H.: Beskrifning till Kartbladen No. 23 och 24: Jurmo och Mörskär. R.	93	II	96
— Beobachtungen über den Bau und die Configuration der Randmoränen im östlichen Finland. R.	94	II	458
— siehe Ramsay, W.			
Bergt, Walther: Beitrag zur Petrographie der Sierra Nevada de Santa Marta und der Sierra de Perijá in der Republik Colombia in Südamerika. R.	91	II	96
— Ueber einen Kieseloolith aus Pennsylvanien. R.	94	I	464
Bernard, F.: Eléments de Paléontologie. I. R.	94	I	369
Berthelot et Friedel: Sur le fer météorique de Magura, Arva (Hongrie). R.	91	I	384
Bertkau: Fund von Höhlenbären. R.	90	I	460
Bertrand et Zurcher: Sur un témoin d'un nouveau pli couché près de Toulon. R.	92	II	276
Bertrand, C. Eg. et B. Renault: Remarques sur le Poroxylon stephanense. R.	90	II	350
Bertrand, L.: Note sur trois espèces du genre Scalpellum du Calcaire grossier des environs de Paris. R.	92	I	423
Bertrand, M.: Sur les rélations des phénomènes éruptifs avec la formation des montagnes et sur les lois de leur distribution. R.	90	I	252
— Les plis couchés et les renversements des environs de St. Zacharie, Provence. R.	90	II	82
— Ilot triasique du Beausset (Var). Analogie avec le bassin houiller franco-belge et avec les Alpes du Glaris. R.	90	II	82
— Sur l'allure générale des plissements des couches de la Provence. R.	90	II	84

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bertrand, M.: Sur les plis couchés de la région de Draguignan. R. 1890	II 84 1891	II	286
— Un nouveau problème de la géologie provençale. R. .	90	II	84
— Sur la distribution des roches en Europe. R.	91	II	263
— Sur les bassins houillers du Plateau central de la France. R.	91	II	313
— Sur la continuité du phénomène de plissement dans le bassin de Paris. R.	94	I	315
— Le Massif d'Allauch. R.	94	II	290
— Sur le raccordement des bassins houillers du nord de la France et du sud de l'Angleterre. R.	94	II	431
Bertrand, M. et Kilian: Etudes sur les terrains secondaires et tertiaires dans les provinces de Grenade et de Malaga. R.	91	I	125
Bertsch: Einiges zur Geologie des Muschelkalkes und der Lettenkohle. R.	91	II	317
Berwerth, Fritz: Dritter Nephritfund in Steiermark. R.	90	II	28
— Vesuvian-Pyroxen-Fels vom Piz Longhin. R.	91	II	236
Beushausen: Ueber einige Lamellibranchiaten des Rheinischen Unterdevon. R.	91	II	183
— Ueber Hypostome von Homalonoten. R.	94	II	351
— Amnigenia rhenana n. sp., ein Anodonta-ähnlicher Zweischaler aus dem rheinischen Mitteldevon. R. . . .	94	II	473
Beuther, Fritz: Mittheilungen über Bergbau in Spanien. R.	93	II	61
Beyer, O.: Der Basalt des Grossdehsaer Berges und seine Einschlüsse, sowie ähnliche Vorkommnisse aus der Oberlausitz. R.	90	II	68
— Weitere Mittheilungen über granitische Einschlüsse in Basalten der Ober-Lausitz. R.	94	I	70
Beyschlag, Franz: Die Erzlagerstätten der Umgebung von Kamsdorf in Thüringen. R.	91	II	264
Bézier: Sur la présence de trilobites dans le schistes rouges-lie-de-vin des environs de Renne. R.	92	I	114
Bigot, A.: Le Précambrien et le Cambrien dans le Pays de Galles et leur équivalents dans le massif Breton. R.	90	I	95
— L'archéen et le cambrien dans le nord du massif Breton et leurs équivalents dans le Pays de Galles. R. . .	91	I	284
— Note sur les Homalonotus des grès siluriens de Normandie. R.	91	II	459
Billiot siehe Benoist.			
Billows, E.: Su d'un vistoso cristallo de vesuvianite. R.	94	I	443
Bischof, C.: Das Schieferthonvorkommen in den Steinkohlenschichten Böhmens, seine historische Entwicklung und technische, sowie wissenschaftliche Bedeutung. R. . .	91	II	296
Bishop, S. E.: Kilauea im April 1892. R.	94	I	68
Bittner, A.: Geologische Mittheilungen aus dem Werfener Schiefer- und Tertiär-Gebiete von Konjica und Jablanica a. d. Narenta. R.	90	I	63
— Ueber ein Vorkommen von Brachiopoden des salzburgischen Hochkorallenkalkes an der Tonionalpe südöstlich von Gusswerk Mariazell und über einen Fundort von Hallstätter Petrefacten an den Neun Kögerln der Tonion. R.	90	I	100
— Ein neuer Fundort von Monotis salinaria in Niederösterreich und seine Beziehungen zu den Mürzthaler Monotis-Kalken. R.	90	I	101
— Aufnahmsbericht von Turnau bei Aflenz. R.	90	I	101

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bittner, A.: Ueber das Auftreten von Terebrateln aus der Subfamilie der Centronellinen in der alpinen Trias. R.	1890	II	333
— Ueber das Auftreten von Arten der Gattung Thecospira in der alpinen Trias. R.	90	II	333
— Revision der Brachiopoden von St. Cassian. R.	90	II	333
— Ein neuer Fundort von Brachiopoden des Hallstätter Kalkes auf dem Nassköhr bei Neuburg an der Mürz und die Hallstätter Brachiopoden von Mühlthal bei Piesting. R.	91	II	318
— Die Trias von Eberstein und Pölling in Kärnten. R.	91	II	319
— Aus dem Gebiete des Hochschwab und der nördlich angrenzenden Gebirgsketten. R.	91	II	439
— Eine triadische Conularia. R.	91	II	463
— Die Brachiopoden der alpinen Trias. R.	92	I	437
— Zur Geologie des Kaisergebirges. R.	92	I	356
— Zur Altersbestimmung des Miocäns von Tüffer in Südsteiermark. R.	92	I	139
— Die sarmatischen und vorsarmatischen Ablagerungen der Tertiärbucht von Tüffer-Sagor. R.	92	II	114
— Neue Daten über den Charakter und die Herkunft der sarmatischen Fauna. R.	92	II	115
— Zwei neue Fundorte von Monotis in Niederösterreich. R.	92	II	299
— Zur Geologie des Erlafgebietes. R.	92	II	300
— Aus dem Miesenbachthale. R.	92	II	434
— Triasbrachiopoden von der Raxalpe und vom Wildangergebirge bei Hall in Tirol. R.	92	II	463
— Zur Kenntniss der Bellerophonkalke Südtirols. R.	93	I	120
— Aus den Umgebungen von Opponitz, Ybbsitz und Gresten. R.	93	I	517
— Aus der Umgebung von Pernitz und Gutenstein im Piestingthale. Aus der Umgebung von Lackenhof und Göstling im Ybbsthal. R.	93	I	517
— Ueber zwei für die Nummulitenkalke von Stockerau neue Arten. R.	93	I	554
— Triaspetrefacten von Balia in Klein-Asien. R.	93	II	134
— Neue Arten aus der Trias von Balia in Klein-Asien. R.	93	II	134
— Ein Vorkommen petrefactenführender Partnachschichten im Ennsthal in Ober-Oesterreich. R.	93	II	138
— Brachiopoden der alpinen Trias. Nachtrag I. R.	93	II	418
— Ueber die Gattung Oncophora. R.	93	II	555
— Ueber Parabrissus und einige andere alttertiäre Echiniden-Gattungen. R.	94	I	203
— Ueber Echiniden des Tertiärs von Australien. R.	94	I	391
— Was ist norisch? R.	94	II	104
— Geologische Mittheilungen aus dem Gebiete des Blattes Gaming-Mariazell. R.	94	II	105
— Aus den Umgebungen von Nasswald und Rohr im Gebirge. R.	94	II	106
— Ein neuer Fundort von Brachiopoden bei Serajevo. R.	94	II	107
— Petrefacten des marinen Neogens von Dolnja Tuzla in Bosnien. R.	94	II	126
— Ueber die Nothwendigkeit, den Terminus „norisch“ für die Hallstätter Kalke aufrecht zu erhalten. R.	94	II	310
— Partnachschichten mit Koninckina Leonhardi im Thale von Kaltenleutgeben nächst Wien. R.	94	II	311
— Aus der Umgebung von Schwarzau im Gebirge. R.	94	II	444

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bittner, A.: Aus dem Schwarzau- und Hallbachthale. R.	1894	II	445
Björlykke: Graptolithförende Skifere i. V. Gausdal. R.	92	I	343
Bizet, P.: Notice à l'appui du profil géologique d'Alençon à Nogent-le-Rotrou et à Beaumont-les-Autels. R.	93	II	380
— Considérations géologiques et paléontologiques sur les terrains des environs de Bellême et de Mamers. R.	93	II	381
Blaas, J.: Die Höttinger Breccie und ihre Beziehung zur Frage nach einer wiederholten Vergletscherung der Alpen. R.	91	I	132
— Erläuterungen zur geologischen Karte der diluvialen Ablagerungen in der Umgebung von Innsbruck. R.	91	I	133
— Ueber sogenannte interglaciale Profile. R.	91	I	134
— Bericht über den am 9. Juli 1892 bei Langen am Arlberg niedergegangenen Bergsturz. R.	94	I	285
Blake, J. F.: On a New Specimen of Solaster Murchisoni from the Yorkshire Lias. R.	90	II	333
— The Genus Ascoceras. R.	91	II	357
— On the Monian and Basal Cambrian Rocks of Shropshire. R.	91	II	430
— On the Base of the Sedimentary Series in England and Wales. R.	93	I	115
— On the Rocks mapped as Cambrian in Caernarvonshire. R.	93	I	115
— On some recent Contributions to Precambrian Geology. R.	93	I	330
— Annals of British Geology for 1892. Introductory Review. R.	94	II	34
Blake, W. P.: The Rainbow Lode, Butte City, Montana. R.	91	I	100
— Mineralogical Notes. R.	93	II	36
— Columbite of the Black Hills, South Dakota. R.	93	II	482
Blanchard: Preuves de communications terrestres entre l'Asie et l'Amérique pendant l'âge moderne de la terre. R.	93	I	58
Blanford, W. T.: Note on the Age and Ancient Glaciers of the Himalayas. R.	92	II	281
— On the Age of the Himalayas. R.	93	I	318. 319
Blanckenhorn, M.: Beiträge zur Geologie Syriens: Die Entwickelung des Kreidesystems in Mittel- und Nord-Syrien mit besonderer Berücksichtigung der palaeontologischen Verhältnisse nebst einem Anhang über den jurassischen Glandarienkalk. R.	91	II	127
— Das Eocän in Syrien, mit besonderer Berücksichtigung Nordsyriens. R.	91	II	331
— Pteropodenreste aus der oberen Kreide Nordsyriens und aus dem hessischen Oligocän. R.	92	I	181
— Das marine Miocän in Syrien. R.	92	II	118. 120
— Grundzüge der Geologie und physikalischen Geographie von Nord-Syrien. R.	94	II	293
— Die Structurlinien Syriens und des Rothen Meeres. R.	94	II	293
Blasius, E.: Das Gesetz von Christiansen und die optischen Beobachtungen am Tabaschir. R.	91	II	1
— Ueber die Beziehungen zwischen den Theorien der Krystallstructur und über die systematische Eintheilung der Krystalle. R.	93	I	1
— Beitrag zur geometrischen Krystallographie. R.	93	I	227
Blasius, W.: Neue Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland. R.	92	I	152
Bleicher: Recherches lithologiques sur la formation à bois silicifiés de Tunisie. R.	90	II	96

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bleicher: Sur la nature des phosphates du Dekma. R.	1891	I	268
— Sur la structure microscopique des roches phosphatés du Dekma, Constantine. R.	92	I	526
— Sur la découverte de coquilles terrestres tertiaires dans le tuf volcanique du Limbourg (Kaiserstuhl, grand-duché de Bade). R.	92	II	462
— Sur la structure microscopique des oolithes du Bathonien et du Bajocien du Lorraine. R.	93	I	276
— Sur la structure microscopique du minerai de fer oolithique de Lorraine. R.	93	II	71
— Sur le gisement et la structure des nodules phosphatés du lias de Lorraine. R.	94	I	485
— siehe Mieg, M.			
Blömeke, C.: Ueber das Vorkommen und die Production von Silber auf der Erde. R.	91	II	293
— Ueber das Vorkommen und die Production von Blei in der Welt. R.	91	II	293
— Ueber das Vorkommen und die Production von Zink auf der Erde. R.	91	II	293
— Ueber das Vorkommen und die Production von Kupfer auf der Erde. R.	92	I	83
— Ueber das Vorkommen und die Production von Zinn, Nickel, Platin und Quecksilber auf der Erde. R.	92	I	83
Blomstrand, C. W.: Der Monazit vom Ural. R.	92	I	44
— Ueber einige schwedische Monazite. R.	92	I	45
Blow, A. A.: The Geology and Ore-Deposits of Iron Hill, Leadville, Colorado. R.	92	II	75
Blumrich, J.: Calcitkrystalle aus Vorarlberg. R.	93	I	28
— Ueber die sogenannte Sanduhrform der Augite. R.	94	II	23
Blytt, A.: The Probable Cause of the Displacement of Beach-lines, an Attempt to compute Geological Epochs. R.	90	I	245
— Addional Note and second Additional Note. R.	90	I	245
— Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung. R.	91	I	388
— Om den sandsynlige Aarsag til Strand liniernes Forskyvning, et Forsög paa en geologisk Tidsregning. R.	91	II	262
— On the Probable Cause of the Displacement of Shore-lines, an Attempt at a Geological Chronology. R.	91	II	262
Boas: Ueber den Metatarsus der Wiederkäuer. R.	93	I	541
— Ein Fall von vollständiger Ausbildung des 2. und 5. Metacarpale beim Rind. R.	93	I	542
Boccard, G. di: Su di un ossido di manganese idrato degli Euganei. R.	91	II	15
Bodenbender, G.: La Cuenca del Valle del Rio 1° en Córdoba. R.	92	I	393
— Vorläufige Mittheilungen über eine Reise nach dem Ostabfalle der Anden zwischen Rio Diamante und Rio Negro. R.	93	I	104
— Apuntes sobre Rocas Eruptivas de la Pendiente Oriental de los Andes entre Rio Diamante y Rio Negro. R.	93	I	104
Bodewig, C.: Notes on Epidote and Hanksite. R.	93	I	260
Bodländer, G.: Entstehung von Melilith beim Brennen von Portland-Cement B.	*92*	*I*	*53*
— *Ueber kobalthaltigen Eisenspath von der Grube Ende im Harteborn thal bei Neunkirchen, Kreis Siegen. B.*	*92*	*II*	*236*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bodländer, G.: Die Zusammensetzung des Meliliths. A.	*1893*	*I*	*15*
— Versuche über Suspensionen. I. A.	*93*	*II*	*147*
Boecker, J.: Krystallographische Beobachtungen am Idokras. R.	93	I	251
Böckh, Johann: Daten zur geologischen Kenntniss des nordwestlich von Bozovics sich erhebenden Gebirges. R.	90	I	302
— Das Auftreten von Triasablagerungen bei Száskabánya. R.	91	II	440
Böhm, August Edler v. Böhmersheim: Eintheilung der Ostalpen. R.	90	I	57
— Ueber die Genauigkeit der Bestimmung von Gebirgsvolumen und mittlerer Massenerhebung. R.	91	I	56
— Bodengestaltende Wirkungen der Eiszeit. R.	93	I	484
— Steiner Alpen. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Gebirgsgruppennamen. R.	94	II	82
Böhm, Georg: Ueber die Fauna der Schichten mit Durga im Departement der Sarthe. R.	90	I	117
— Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Ophiuren. R.	90	I	473
— Ueber Lithiotis problematica. R.	92	II	364
— Megalodon, Pachyerisma und Diceras. R.	93	I	555
— Ueber Cornucaprina. B.	*93*	*II*	*129*
— Briefliche Mittheilung über Lithiotis problematica Gümb. R.	93	II	200
— Ueber die Zugehörigkeit von Rothpletzia zu Hipponyx. R.	93	II	554
— Ein Beitrag zur Kenntniss der Kreide in den Venetianer Alpen. R.	93	II	555
Böhm, Joh.: Die Kreidebildungen des Fürberges und Salzberges bei Siegsdorf in Oberbayern. R.	92	II	108
— Ueber Capulus rugosus Sow. sp. (Mit 3 Holzschnitten.) B.	*94*	*I*	*200*
Bömer, A.: Beiträge zur Kenntniss des Quarzes. (Mit Taf. VIII und 7 Holzschn.) A.	*BB*	*VII*	*516*
Bömer, Max: Ueber Lössbildungen und deren Bedeutung für die Pflanzencultur R.	90	I	261
Boeris, Giovanni: Note di mineralogia italiana. — Pirite di alcune nuove località. R.	91	I	22
Böse, Emil: Ein neues Vorkommen von oberem Lias und unterem Dogger in den bayerischen Alpen. B.	*92*	*II*	*86*
— Die Fauna der liasischen Brachiopoden-Schichten bei Hindelang. R.	93	II	379
Böse, E. und H. Finkelstein: Die mitteljurassischen Brachiopodenschichten bei Castel Tesino im östlichen Südtirol. R.	94	I	485
Böttger, August: Beiträge zur Kenntniss der Granite des Fichtelgebirges und ihrer Umwandlungsproducte. R.	90	I	261
Böttger, O.: Drei neue mitteloligocäne Mollusken aus dem deutschen Rupelthon. R.	92	II	362
Bogdanowitsch, K. J.: Oro-geologische Beobachtungen in den Gebirgen von Transkaspien und Nord-Persien. R.	90	II	286
— Beschreibung einiger sedimentären Bildungen in Transkaspien und Nord-Persien. R.	90	II	286
— Note préliminaire sur les observations géologiques faites dans l'Asie centrale. R.	93	I	319
	94	I	102
— Die Nephrit-Lagerstätten des Kuenlungebirges. R.	94	II	24
Boistel, A.: Note sur les travertins tertiaires à végétaux de Douvres. R.	91	I	122
Boistel, M.: La faune de Pikermi à Ambérieu (Ain). R.	94	II	325
Bolton, H.: Catalogue of the Types of Figures Specimens in the Geological Department. R.	94	I	172

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bolton, H.: On the Occurrence of a Trilobite in the Skiddaw Slates of the Isle of Man. R.	1894	II	99
Bolton, W.: Die Prüfung klastischer Gesteine auf ihre Verwitterbarkeit. R.	94	II	52
Bonaparte, R.: Mesures des variations de longueur des glaciers du massif de Pelvoux. R.	93	I	60
— Les variations périodiques des glaciers français. R.	93	I	376
Bonarelli, G.: Osservazioni sul Toarciano el' Aleniano dell' Appennino centrale. Contribuzione alla conoscenza della geologia Marchigiana. R.	94	I	346
— Hecticoceras, novum genus Ammonidarum. R.	94	II	471
Bonney, T. G.: On the Cristalline Schists and their Relation to the Mesozoic Rocks in the Lepontine Alps. R.	90	II	391
— On the Occurrence of a Variety of Picrite on Sark. R.	91	I	89
— Notes on the Huronian Series in the Neighbourhood of Sudbury (Canada). R.	91	I	101
— Mr. Mellard Reade's Interpretation of the Lower Trias Physiography. R.	91	II	317
— On a Contact-structure in Syenite of Bradgate Park. R.	92	I	295
— On the Effect of Pressure upon Serpentine. R.	92	I	78
— On the so-called Gneiss of Carboniferous Age at Guttannen. R.	94	I	297
— On the Nufenenstock (Lepontine Alps). R.	94	II	425
— On some Schistose „Greenstones" and allied Hornblende-Schists from the Pennine Alps, as illustrative of the Effects of Pressure Metamorphism. R.	94	II	425
— On a Secondary Development of Biotite and of Hornblende in Cristalline Schists from the Binnenthal. R.	94	II	426
— On some Quartz-Schists from the Alps. R.	94	II	426
— siehe Hill, E.			
Bonney, T. G. and Mac Mahon: On the Crystalline Rocks of the Lizard District. R.	92	II	264
Bonney, T. G. and Miss C. A. Raisin: On Rock-Specimens from the Kimberley Diamond-mines. R.	92	II	268
— — On the so-called „Spilites" of Jersey. R.	94	II	258
Bonsdorff, A.: Die säculare Hebung der Küste bei Kronstadt in den Jahren 1841—1886. R.	94	II	336
Borne, Georg von dem: Der Jura am Ostufer des Urmiah-Sees. R.	92	II	434
Bornemann, J. G.: Ueber Schlackenkegel und Laven. Ein Beitrag zur Lehre des Vulcanismus. R.	90	I	417
— Ueber den Muschelkalk. R.	90	II	408
— Beiträge zur Geologie und Palaeontologie. 1. Heft. Ueber den Buntsandstein in Deutschland und seine Bedeutung für die Trias, nebst Untersuchungen über Sand- und Sandsteinbildungen im Allgemeinen. R.	91	I	292
— Die Versteinerungen des cambrischen Schichtensystems der Insel Sardinien, nebst vergleichenden Untersuchungen über analoge Vorkommnisse aus anderen Ländern. Abth. II. R.	93	II	126
Bose, P. N.: The Darjiling Coal between the Lisu and the Ramthi Rivers, explored during season 1889/90. R.	94	I	494
Bosniaski, Sigismondo de: Flora fossile del Verrucano nel Monte Pisano. R.	93	I	574
Botti, U.: La grotta ossifera di Cardamone in Terra d'Otranto. R.	93	II	182

	Jahrg.	Bd.	Seite
Botto-Micca, L.: Fossili degli „Strati a Lioceras opalinum Rein. e Ludwigia Murchisonae della Croce di Valpore“ (M. Grapa). R.	1894	I	505
Boucher: Deux mots sur la craie de Chateaudun. R.	94	II	449
Boulay: La flore fossile de Berac, près de Saint-Saturnin. R.	94	I	232
Boule, Marcellin: Le Canis megamastoides du Pliocène moyen de Perrier. R.	90	I	341
— Constitution géologique des environs de Puy. R.	90	II	309
— Géologie des environs du Puy, Haute Loire. R.	91	II	287
— Succession des éruptions volcaniques dans le Vélay. R.	91	II	288
— Les grands Animaux fossiles de l'Amérique. R.	92	I	558
— Sur les éruptions basaltiques de la Vallée de l'Allier. R.	92	I	68
— Sur les Gneiss amphiboliques et les Serpentines de la haute vallée de l'Allier. R.	93	II	101
— Description géologique du Vélay. R.	93	II	101
— Découverte d'un squelette d'Elephas meridionalis dans les cendres basaltiques du volcan de Senèze, Haute-Loire. R.	94	I	179
— siehe Gaudry, A.			
Boulenger, G. A.: On British Remains of Homoeosaurus, with Remarks on the Classification of the Rhynchocephalia. R.	92	I	575
— On some Chelonian Remains preserved in the Museum of the Royal College of Surgeons. R.	92	II	149
— On the Occurrence of Discoglossus in the Lower Miocene of Germany. R.	92	II	455
— On a Stegosaurian Dinosaur from the Trias of Lombardy. R.	93	I	164
Boulenger, G. A. and Lydekker: A Wooden Dinosaur. R.	90	II	169
Bourgeat: Sur la structure de quelques dépôts ferrugineuses des terrains secondaires. R.	91	I	117
— Observations sommaires sur les principales formations géologiques du Jura méridionale. R.	91	II	322
— Première contribution à l'étude du calcaire coralligène de Belledalle dans le Boulonnais. R.	91	II	440
— Quelques observations nouvelles sur le Jura méridional. R.	92	II	107
Bourgeois, Léon: Sur la préparation du nitrate basique du cuivre crystallisé et sur identification avec la gerhardtite. R.	92	I	19
Boursault, H.: Compositions de quelques roches du Nord de la France. R.	91	I	264
— Nouvelles empreintes problématiques des couches boloniennes du Postel (Pas-de-Calais). R.	91	II	374
Boury, E. de: Revision des Scalidae miocènes et pliocènes de l'Italie. R.	92	I	181
— Obervations sur quelques Scalidae du bassin de Paris et description d'une espèce nouvelle. R.	94	I	194
Bowman, Amos: Report on the Geology of the Mining District of Cariboo, British Columbia. R.	91	II	89
Boys, C. V.: Quartz as an Insolator. R.	92	I	502
Bozzi, L.: Sopra una specie pliocenica di pino trovata a Castelsardo in Sardegna. R.	92	I	469
— La flora carbonifera del monte Pizzul. R.	94	II	192
Brackett, R. N., siehe Branner, J. C.			
Brady, H. B.: Note on a new Type of Foraminifera of the Family Chilostomellidae. R.	93	I	203

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brainard, E.: The Chazy Formation in the Champlain Valley. R.	1892	II	96
Brainard, E. and H. Seeley: The Calciferous Formation in the Champlain Valley. R.	92	I	542
Branco, W.: Ein neuer Tertiär-Vulcan nahe bei Stuttgart, zugleich ein Beweis, dass sich die Alb einst bis zur Landeshauptstadt hin ausdehnte. R.	93	I	70
— Neue Beobachtungen über die Natur der vulcanischen Tuffgänge in der schwäbischen Alb und ihrem nördlichen Vorlande. R.	93	I	71
Brand, A.: Zusammensetzung und Krystallform einiger Producte aus dem Bleihüttenbetriebe. R.	91	II	36
Branner, J. C.: The geology of Fernando de Noronha. Part I. Part II, Petrography von G. H. Williams. R.	90	I	85
— The Aeolian Sandstones of Fernando de Noronha. R.	92	I	320
— The Cretaceous and Tertiary Geology of the Sergipe-Alagôas Basin of Brazil. R.	92	I	134
Branner, J. C. and R. N. Brackett: The Peridotite of Pike County, Arkansas. R.	93	I	500
Braubach, M.: Der Schwefelkiesbergbau bei Meggen an der Lenne. R.	90	I	258
Brauer, Fr., J. Redtenbacher und L. Gangelbauer: Fossile Insecten aus der Juraformation Ost-Sibiriens. R.	91	II	357
Braun, F.: Bemerkungen über den Zusammenhang der Compressibilität einer Lösung mit derjenigen der Bestandtheile. R.	91	I	1
— Berichtigung, die Compressibilität des Steinsalzes betreffend. R.	91	I	1
Braun, F. und K. Waitz: Beobachtungen über die Zunahme der Erdtemperatur, angestellt im Bohrloch zu Sulz am Neckar. R.	92	II	39
Brauns, D.: Ein Beitrag zu der Stammesgeschichte der Sauropsiden. R.	92	I	572
Brauns, Reinhard: Ueber die Entstehung der sog. Rutschflächen im bunten Sandstein der Umgebung von Marburg. B. 1890 I 97	*90*	*II*	*190*
— Mineralien und Gesteine aus dem hessischen Hinterland. II. R.	90	II	247
— *Noch einmal über die „Spiegel" im Buntsandstein der Gegend von Marburg. B.*	*91*	*I*	*268*
— *Krystallographisch-optische Beobachtungen an Chlor- und Bromzimmtaldehyd. (Mit 2 Holzschnitten) A.*	*91*	*II*	*12*
— *Die optischen Anomalien der Krystalle. B. 92 I 198.* R.	93	I	223
— *Eine Bemerkung zur Abhandlung von E. Mallard: Sur le grenat Pyrénéite. B.*	*92*	*I*	*217*
— *Albit, Analcim, Natrolith, Prehnit und Kalkspath, Verwitterungsproducte eines Diabases von Friedensdorf bei Marburg. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*92*	*II*	*1*
— *Ueber das Verhalten der Titansäure gegen Phosphorsalz vor dem Löthrohr. B.*	*92*	*II*	*237*
— *Berichtigung. B.*	*93*	*I*	*89*
— Hauyn in den Bimsteinsanden der Umgegend von Marburg. R.	93	I	270
— *Betrachtungen über die chemische Zusammensetzung der Mineralien der Serpentin-, Chlorit- und Glimmergruppe. A.*	*94*	*I*	*205*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brauns, Reinhard: Mineralogie. R.	1894	I	243
— *Ueber Nachbildung von Anhydrit. A.*	*94*	*II*	*257*
— siehe Graeff, F.			
— siehe Retgers, J. W.			
Breidenbach, Th.: Die Antimonerzlagerstätten Portugals. R.	94	II	61
— Die Zinnerzlagerstätten Portugals. R.	94	II	429
Brendel, R.: Ueber den Wiluit. R.	90	II	19
Breton, Ludw.: Etude sur l'étage carbonifère du Bas-Boulonnais. R.	93	II	83
Brezina, A.: Darstellung von Meteoriten auf antiken Münzen. R.	90	I	413
— Cliftonit aus dem Meteoreisen von Magura, Arvaer Comitat. R.	90	II	59
— Untersuchungen der Herren Berthelot und Friedel in Paris über das Meteoreisen von Magura. R. . . .	91	I	384
— Ueber die Krystallform des Uranothallit. R.	93	I	474
Briart, A.: Note sur une faune marine Landenienne dans l'entre Sambre-et-Meuse. R.	91	II	130
Briart, A. et Cornet: Description des fossiles du Calcaire grossier de Mons. 4e partie. R.	90	I	357
Brigham, W. T.: On the Recent Eruption of Kilauea. R.	94	I	68
Britton, N. L.: On an Archaean Plant from the White Crystalline Limestone of Sussex County, N. J. R. .	91	I	350
Brodie, P. B.: A Sandpit at Hill Morton, near Rugby. R.	94	II	336
Broeck, E. van den: Note sur un nouveau gisement de Terebratula grandis avec une carte de l'extension primitive des dépôts pliocènes marins en Belgique. R. .	90	II	114
— Découverte d'un fruit de Conifère recueilli par M. Cerfontaine dans les grès bruxelliens des environs de Bruxelles. R.	92	I	468
— Matériaux pour la connaissance des dépôts pliocènes supérieurs rencontrés dans les derniers traveaux de creusement des bassins maritimes d'Anvers, bassin d'Africa et bassin America. R.	93	II	534
— Etude préliminaire sur le dimorphisme des foraminifères et des Nummulites en particulier. R.	94	I	211
— Etude sur le dimorphisme des foraminifères et des Nummulites en particulier. R.	94	I	211
— siehe Rutot, A.			
Brögger, W. C.: Geologisk kart over öerne ved Kristiania. R.	90	I	75
— Ueber ein norwegisches Vorkommen von Pseudobrookit in grossen Krystallen. R.	90	II	54
— Ueber das Alter der Olenellus-Zone in Nordamerika. R.	91	II	108
— Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Allgemeiner Theil. Die geologischen Verhältnisse der Pegmatitgänge des Christianiagebietes. R.	92	I	296
— Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Specieller Theil. R.	92	I	238
— Ueber die morphotropischen Beziehungen des Pinakiolith und des Trimerit zu verwandten Mineralien. R. . .	92	I	21
— Om udsigterne for fund af dridvardige apatitforekomster i Norrbottens gabbromassiver. R.	93	II	64
— Ueber die Aussichten auf Funde bauwürdiger Apatitvorkommen im Gabbro von Norbotten. R.	93	II	270

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brögger, W. C.: Sundtit, ein neues Mineral von Oruro in Bolivia. R. . . . . 1894 I 271	1894	II	20
Brögger, W. C. und Helge Bäckström: Ueber den Dahllit, ein neues Mineral von Ödegården, Bamle, Norwegen. R.	90	II	223
— Die Mineralien der Granatgruppe. R.	92	I	25
Brongniart, Charles: Etudes sur le terrain houiller de Commentry. Livre troisième. Faunes ichthyologique et entomologique par M. Charles Brongniart et M. Emile Sauvage. Faune ichthyologique. 1ère partie. R. . .	91	II	161
Brough, Bennett H.: Outbursts of Gas in Metalliferous Mines. R.	91	II	96
Brown, Amos P.: On the Young of Baculites compressus Say. R.	94	I	194
— The Development of the Shell in the Coiled Stage of Baculites compressus Say. R.	94	I	194
Brown, R. T.: The Permian Rocks of the Leicestershire Coalfield. R.	92	I	350
Brown, W. G.: Crystallographic Notes. R.	90	I	230
— siehe Campbell, H. D.			
Browne, Jukes: The Date of the High Elevation of America. R.	92	II	320
Browne, Jukes and W. Hill: On the Lower Part of the Upper Cretaceous Series in West Suffolk and Norfolk. R.	90	I	306
Browne, Montagu: The Vertebrate Animals of Leicestershire and Rutland. R.	90	II	427
— On a Fossil Fish (Chondrosteus) from Barrow-on-Soar, hitherto recorded only from Lyme Regis. R. . . .	91	I	152
Browning, P. E.: Analysis of Rhodochrosite from Franklin Furnace, New Jersey. R.	94	I	23
Bruder, G.: Livistona macrophylla, eine neue fossile Palme aus dem tertiären Süsswasserkalke von Tuchorschitz. R. . . . . 1892 II 377	94	I	230
Brückner, Ed.: Eiszeitstudien in den südöstlichen Alpen. R.	92	I	150
— Ueber die angebliche Aenderung der Entfernung zwischen Jura und Alpen R.	94	II	43
— Ueber Schwankungen der Seen und Meere R.	94	II	43
— Das Klima der Eiszeit. R.	94	II	48
Brünnée, R.: Neuer Erhitzungsapparat für mineralogische Untersuchungen. (Mit 3 Holzschnitten.) B. . . .	*90*	*II*	*87*
Brugnatelli, Luigi: Ueber flächenreiche Magnetitkrystalle aus den Alpen. R.	90	I	232
— Beiträge zur Kenntniss des Epidot. R.	91	I	31
— Studio petrografico di due porfirite dioritiche dei dintorni di Rabbi (Trentino). R.	92	I	521
Bruhns, W.: Ueber doppelbrechenden Hauyn. R. . . .	92	I	32
— Die Auswürflinge des Laacher Sees in ihren petrographischen und genetischen Beziehungen. R.	92	II	416
— siehe Laspeyres, H.			
Bruhns, W. und K. Busz: Sach- und Ortsverzeichniss zu den mineralogischen und geologischen Schriften von Gerhard vom Rath. R.	94	I	2
Brunlechner, August: Sphärenerze von Miess in Kärnten. R.	90	I	216
— Der Baryt des Hüttenberger Erzberges. R.	93	I	38
— Descloizit und Pseudomorphosen von Descloizit nach Vanadinit, ein neues Mineralvorkommen vom Obir. R.	93	II	254

	Jahrg.	Bd.	Seite
Brush, G. J. and E. S. Dana: On the Mineral Locality of Branchville, Connecticut. Fifth Paper. With analyses of several manganesian phosphates by Horace L. Wells. R.	1893	II	29
Brusina, S.: Fauna fossile terziaria di Markuševec in Croazia. Con un elenco delle Dreissensidae della Dalmazia, Croazia e Slavonia. R.	93	II	417
— Saccoia, nuovo genere di gasteropodi terziari Italo-Francesi. R.	94	I	387
— Congeria ungula caprae (Münst.), C. simulans Brus. n. sp. und Dreissenia Münsteri Brus. n. sp. R.	94	I	388
— Papyrotheca a new genus of gastropoda from the pontic steppes of Servia. R.	94	II	358
Bucca, Lorenzo: L'età del granito di Monte Capanne. R.	93	I	278
— Primo rapporto sulla eruzione dell' Etna scoppiata il 9 Luglio 1892. R.	93	I	491
— Contribuzione allo studio geologico dell' Abissinia. R.	93	II	55
— Ancora dell' età del granito di Monte Capanne (isola d'Elba). R.	93	II	489
— Studio petrografico sulle trachiti del Lago di Bolsena. R.	93	II	490
— Studio petrografico sulle trachiti leucitiche del Lago di Bolsena. R.	93	II	490
— Riproduzione artificiale della pirite magnetica. R.	94	I	13
— Sopra una nuova località di Ferro oligisto dell' Etna. R.	94	I	434
Buchrucker, L.: Die Mineralien der Erzlagerstätten von Leogang in Salzburg. R.	93	I	13
— Beitrag zur Kenntniss des künstlichen Babingtonit. R.	93	I	263
Buckman, J. and J. F. Walker: On the Spinose Rhynchonellae (Genus Acanthothyris d'Orbigny) found in England. R.	91	I	162
Buckman, S. S.: On the Cotteswold, Midford and Yeovil Sands and the Divisions between Lias and Oolite. R.	90	I	118
— A Monograph on the Inferior Oolite Ammonites of the British Islands. Part 2 u. 3. R.	90	I	470
— The Morphology of „Stephanoceras" zigzag. R.	93	I	552
— The reported Occurrence of Ammonites jurensis in the Northampton Sands. R.	94	I	139
— A Monograph of the Inferior Oolite Ammonites of the British Islands. Part VIII. R.	94	II	470
Bücking, H.: Glaserit, Blödit, Kainit und Boracit von Douglashall bei Westeregeln. R.	90	I	29
— Das Grundgebirge des Spessarts. R.	91	I	251
— Das Rothliegende des Breuschthales. R.	92	II	102
— Der Nordwestliche Spessart. R.	94	I	307
— siehe Steinmann, G.			
Büttgenbach, F.: Ein neues Gebiet für Steinkohlengewinnung. R.	93	II	82
Bukowski, Geiza von: Reisebericht aus der Gegend von Römerstadt. R.	92	II	271
— Geologische Aufnahmen in dem krystallinischen Gebiete von Mährisch-Schonberg. R.	92	II	271
— Geologische Forschungen im westlichen Kleinasien. R.	93	II	364
— Reiseberichte aus Nordmähren. — Die Umgebung von Müglitz und Hohenstadt und das Gebiet von Schönberg. R.	94	II	79
— Ueber den Bau der südlichen Sudetenausläufer östlich von der March. R.	94	II	79

	Jahrg.	Bd.	Seite
Bukowski, Geiza von: Kurzer Vorbericht über die Ergebnisse der in den Jahren 1890 und 1891 im südwestlichen Kleinasien durchgeführten geologischen Untersuchungen. R.	1894	II	86
— Einige Bemerkungen über die pliocänen Ablagerungen der Insel Rodus. R.	94	II	128
Bulman, G. W.: On the Sands and Gravels intercalated in the Boulder-Clay. R.	93	I	59
— Was the Boulder-Clay formed beneath the Ice? R.	94	I	364
— Underclays, a preliminary study. R.	94	I	480
Burckhardt, R.: Das Gehirn von Triceratops flabellatus Marsh. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*92*	*II*	*71*
Bureau, Ed.: Etudes sur la flore fossile du calcaire grossier parisien. R.	91	I	174
Burghardt, Charles A.: On a Rapid Method for the Accurate Recognition of Sulphides, Arsenides, Antimonides, and Double Compounds of these Bodies with Metals. R.	92	II	210
Burmeister, G.: Ein vollständiger Schädel des Megatherium. R.	91	II	341
— Adiciones al „Exámen critico di los Mamileros y Reptiles fósiles denominados p. A. Bravard". R.	93	II	185
— Continuacion á las adiciones al examen critico de los mamíferos fósiles terciarios. R.	93	II	185
— Suplementos á las diferentes disertaciones publicadas anteriormente. R.	93	II	186
Burrows, H. W., siehe Harris, G. F.			
Burrows, H. W., C. D. Sherborn and the Rev. Geo. Bailey: The Foraminifera of the Red Chalk of Yorkshire, Norfolk and Lincolnshire. R.	93	II	561
Busatti, Luigi: Sulla Lherzolithe di Rocca di Silano (Monte Castelli) e Rosignano (Monti Livornesi). R.	92	I	288
— Studio chimico e mineralogico di una roccia calcarea dell' Isola di Giannutri (Arcipelago Toscano). R.	92	II	422
— Sopra un aspetto nuovo del berillo elbano. R. 1893 I 32	93	II	26
Busz, K.: Ueber das Verhältniss einiger Tuffe des Laacher See-Gebietes zu den in Verbindung mit denselben auftretenden Gesteinen. R.	90	II	247
— Mittheilungen aus dem mineralogischen Museum der Universität Bonn. I. Theil. 1. Schwefel von Bleierzgängen. 2. Künstliches Zinkoxyd. 3. Korund von Ceylon. 4. Zinnstein von Zinnwalde und Cornwall. 5. Manganit von Grettenich, Saarbrücken. 6. Atelestit von der Grube Neuhilfe bei Schneeberg in Sachsen. R.	90	II	385
— Die Leucitphonolithe und deren Tuffe im Gebiete des Laacher Sees. R.	92	II	414
— siehe Bruhns, W.			
— siehe Laspeyres, H.			
Butler, G. W., siehe Cole, G. A. J.			

C.

Calderon, A.: Sur l'origine des ophites de l'Andalousie. R.	91	II	286
— Sur les modifications des roches ophitiques de Moron, Séville. R.	92	I	69

	Jahrg.	Bd.	Seite
Calderon, Salvador: Sur la concomitance du sel gemme et de la matière organique dans les mêmes gisements. R.	1893	I	269
Calker, F. J. P. van: Vorkommen cambrischer und untersilurischer Geschiebe bei Groningen. R.	92	II	321
— Ueber ein Vorkommen von Kantengeschieben und von Hyolithus- und Scolithus-Sandstein in Holland. R.	93	I	376
Callaway, Ch.: On the Production of Secondary Minerals at Shearzones in the Crystalline Rocks of the Malvern Hills. R. 1890 II 91	91	I	94
— The Present State of the Archean Controversy. R.	91	I	90
— On the Unconformities between the Rocks of the Basal Group of Shropshire. R.	92	II	292
— Notes on the Process of Schist-making in the Malvern Hills. R.	94	I	299
— On the Origin of the Crystalline Schists of the Malvern Hills. R.	94	II	257
— On the Conversion of Chlorite into Biotite in Rock-Metamorphism. R.	94	II	257
Calogeras, J. P.: Le fer nickelé de Sainte-Catherine. R.	93	I	480
Camerlander, Carl Frhr. v.: Der am 5. und 6. Februar in Schlesien, Mähren und Ungarn mit Schnee niedergefallene Staub. R.	90	I	66
— Von dem inneren Aufbau und der äusseren Gestaltung der mährisch-schlesischen Sudeten. R.	90	II	257
— Reisebericht aus dem Gebiete des mährischen Hohe Heide-Hirschkammzuges. R.	92	II	271
— Die Zone krystallinischer Schiefer längs der March- und Bord-Tiefenlinie. R.	92	II	271
— Das Gneissgebiet des nordwestlichen Mährens. R.	92	II	271
— Geologische Aufnahmen im Gebiete des Spieglitzer Schneeberges. R.	93	I	113
— Aufnahmebericht über das westliche Gebiet des Kartenblattes Polička Neustadtl. R.	93	I	114
Campana, G. D.: Cenni paleontologici sul Pliocene antico di Borzoli. R.	94	II	128
Campbell, H. D. and W. G. Brown: Composition of certain Mesozoic Igneous Rocks of Virginia. R.	92	II	427
Camuset: Sur une porphyrite à pyroxène. R.	91	II	288
Canavari, M.: Contribuzione alla fauna del Lias Inferiore di Spezzia. R.	90	II	295
Notizie paleontologiche. R.	92	I	426
— Note di malacologia fossile. II. Spirulirostrina Lovisatoi n. g. et sp. di Cefalopoda raccolto nel terziario di Sardegna, spettante al gruppo Phragmophora Fischer. R.	92	II	361
— Insetti del Carbonifero di S. Lorenzo nel Monte Pisano. R.	92	II	460
— Il Lias superiore nella Valle di Bolognola in quel di Camerino. R.	93	I	346
— Un nuovo esempio di discordanza tra il Titoniano e il Lias osservato nell' Appennino centrale. R.	93	I	346
— Nuove corrispondence paleontologiche tra il Lias inferiore di Sicilia e quello dell' Appennino centrale. R.	93	II	527
— Conglomerati, arenarie e quarziti liasiche di Puntadura in provincia di Cosenza. R.	93	II	528
Cappelle, H. van: Het Diluvium van West-Drenthe. R.	94	II	334

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cappelle, H. van: Sur les rapports du Diluvium entremêlé avec le diluvium scandinave de Staring. R. . .	1894	II	456
— Bijdrage tot de Kennis van Frieslands Bodem. IV. Eenige Mededel. ov. de Diluviale Huerds in de Gemeente Hemelumer-Oldephaert en Noord wolde. R.	94	II	456
Capellini, G.: Delfinorinco fossile dei dintorni di Sassari. R.	90	I	342
— Sulla scoperta di una caverna ossifera a monte Cucco. R.	90	I	460
— Sui resti di Mastodon Arvernensis, recentemente scoperti a Spoleto, Pontremoli e Castrocaro. R.	90	II	138
— Sul coccodrillo gavialoide (Tomistoma calaritanus) scoperto nella Collina di Cagliari nel 1868. R. . . .	91	II	452
— Ichthyosaurus campylodon e tronchi di Cicadee nelle argille scagliose dell' Emilia. R.	92	I	164
— Un Delfinide miocenico, ossia il supposto uomo fossile di Acquabona presso Arcevia nelle Marche. R. . .	94	II	462
— Sul primo uovo di Aepyornis maximus arrivato in Italia. R.	94	II	464
Cappa, U.: L'eruzione dell' Etna del Luglio 1892. R. .	93	II	483
Capus: Sur le loess de Turkestan. R.	93	I	137
Caralp, J.: Etudes géologiques sur les hauts massifs des Pyrénées centrales (Ariège, Haute-Garonne, vallée d'Aran). R.	91	I	260
— Sur un Kersanton pyrénéen. R.	91	I	266
— Sur le marbre de Saint-Béat, son âge et ses rélations stratigraphiques. R.	93	I	122
— Sur l'attribution au Carbonifère des schistes à Oldhamia du Pays de Luchon. R.	93	II	523
Carazzi, Dav.: La breccia ossifera del Monte Rocchetta. R.	92	I	152
— La perforazione delle rocce calcare per opera dei Datteri (Lithodomus dactylus). R.	94	II	359
Card, W.: On the Flexibility of Rocks, with special reference to the flexible Limestone of Durham. R.	93	I	288
Carez, L.: Note sur le terrain crétacée de la vallée du Rhône, et spécialement des environs de Martigues. R.	90	II	413
— Note sur l'existence de phénomènes de recouvrement dans les Pyrénées de l'Aude. R.	91	II	281
— Note sur le crétacé inférieur des environs de Mouriès. R.	91	II	326
— Note sur les couches dites Triasiques des environs de Sougraigne (Aude). R.	92	I	549
— Sur l'âge des couches qui entourent la source de Sals. R.	93	I	343
— Sur quelques points de la géologie des Corbières. R. .	93	I	343
— Composition et structure des Corbières et de la région adjacente des Pyrénées. R.	94	II	121
— siehe Vasseur, G.			
Carlsson, C. Jul., siehe Sjögren, Ant.			
Carnot, A.: Sur la composition des ossements fossiles et la variation de leur teneur en fluor dans les différents étages géologiques. R.	93	I	539
Carrière, Dm.: Etudes et observations sur la nature, les caractères et la constitution minéralogique des roches des Vosges. R.	92	I	64
Carson, A.: The Rise and Fall of Lake Tanganyika. R.	94	I	287
Carter, H. J.: On Fossil Isopods, with a Description of a New Species. R.	90	II	146
— On two new Genera allied to Loftusia from the Karakoram Pass and the Cambridge Greensand respectively. R.	90	II	340

	Jahrg.	Bd.	Seite
Carter, H. J.: On the Organic and Anorganic Changes of Parkeria, together with further Observations on the Nature of the opaque Scarlet Spherules in Foraminifera. R.	1890	II	340
— Sketch of the History of known Fossil Sponges in Relation to those of the Present Day. R.	91	II	196
— Ramulina parasitica, a new Species of Fossil Foraminifera infesting Orbitolites Mantelli, var. Theobaldi, with Comparative Observations on the Process of Reproduction in the Mycetozoa, Freshwater Rhizopoda, and Foraminifera. R.	92	I	190
Cary, A.: Geological Facts, noted on Grand River, Labrador. R. 1894 I 330	94	II	436
Casella, G.: Diabase uralizzata od epidiorite della Fosse del Romito nei Monti Livornesi. R.	94	II	427
Casoria, E.: Sopra due varietà di calcari magnesiferi del Monte Somma. R.	92	II	254
— Composizione chimica di alcuni calcari magnesiferi del Mte. Somma. R.	92	II	254
— Mutamenti chimici che avvengono nelle lave vesuviane per effetto degli agenti esterni e della vegetazione. R.	92	II	258
Caspary, R.: Einige neue Pflanzenreste aus dem samländischen Bernstein. R.	92	II	378
— Einige fossile Hölzer Preussens. R.	93	II	427
Castro, D. M. F. de: Mapa geológico de España. R.	94	II	69
Cathrein, A.: Chloritoidphyllit von Gerlos. R.	90	I	60
— Ueber Calciostrontianit (Emmonit) von Brixlegg. R.	90	I	412
— *Zur Dünnschliffsammlung der Tyroler Eruptivgesteine. B.*	*90*	*I*	*71*
— Krystallformen des Baryts von Valsugana. R.	90	II	26
— Petrographische Notizen aus den Salzburger und Tiroler Alpen. R.	90	II	259
— Beiträge zur Mineralogie Tyrols. R. 1891	I	212,	215
— Neue Flächen am Quarz. R.	91	I	217
— Neue Krystallformen am Pinzgauer Pyroxen. R.	91	I	374
— Ueber den sogenannten Augitporphyr von Ehrwald. R.	92	I	285
Catlett, Ch., siehe Clarke, F. W.			
Cavara, Fridiano: Sulla flora fossile di Mongardino. R.	91	I	444
Cayeux, L.: Sur la composition de quelques craies du nord de la France. R.	91	I	264
— Note sur le Crêtacé de Chercy près Tournay. R.	92	I	365
— La Faune du Tun; extension en épaisseur de la zone à Micraster breviporus. R.	92	I	366
— De l'existence de Diatomées dans le Landénien inférieur du Nord de la France et de la Belgique. R.	93	II	436
— Étude micrographique du tuffeau à Cyprina planata du Nord de la France et de la Belgique. Du rôle des Diatomées dans la formation de ce tuffeau. R. 1893 II 436	94	I	356
— De l'existence de Diatomées dans l'Yprésien du Nord. R. 1893 II 437	94	I	356
— De l'existence de nombreux Radiolaires dans le Jurassique et dans l'Eocène du Nord de la France. R.	93	II	437
— Sur la présence de nombreuses Diatomées dans les Gaizes jurassiques et crétacées du Bassin de Paris. De l'existence de Radiolaires dans les Gaizes crétacées du même Bassin. R.	93	II	437
— Notes sur la glauconie. R.	94	I	36

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cayeux, L.: Mémoire sur la „Craie grise“ du Nord de la France. R. 1894	I	147	1894 II 115
— Structure de la bande du Calcaire carbonifère de Taisnières-sur-Helpe. R.	94	II	101
— Ondulations de la craie de la feuille de Cambrai et Rapports de la structure ondulée avec le système hydrographique de cette carte. R.	94	II	116
— Etude micrographique de la craie de Lille. — Dièves à Inoceramus labiatus. R.	94	II	117
— Observations sur la nature des minéraux signalés par M. Henry Lasne dans la craie sénonienne des environs de Doullens. R.	94	II	117
— La craie du Nord de la France et la boue à Globigérines. R.	94	II	117
— Diffusion des trois formes distinctes de l'Oxyde de Titane dans le crétacé du Nord de la France. R.	94	II	117
— Sur le caractère terrigène de la craie. R.	94	II	117
— La craie du Nord est bien un dépôt terrigène. Observations sur la lettre de M. de Lapparent à M. Gosselet. R.	94	II	117
Caziot, M.: Etude sur la formation tertiaire de la région Théziers-Vaquières. R.	91	I	120
— Etude sur le bassin pliocène de Théziers-Roquemaure. R.	91	II	445
Cecconi: Sphodrus Capellinii, nuova specie di coleottero fossile dei tripoli di Montaino. R.	94	II	469
Cederström, A.: Pseudobrookit in grossen Krystallen von Havredal, Bamle, Norwegen. R.	92	I	42
Cesaro, G.: Su di una dimostrazione dell' equazione del piano. R.	90	I	394
— Calcul des deux vitesses de propagation r' et r'', qui correspondent à une même direction, en fonction des élasticités maxima et minima a^2 et c^2 et des angles Θ et Θ' que la direction considérée fait avec les axes optiques. R.	90	II	40
— Sur le prisme octogonal de l'apophyllite. R.	90	II	40
— Sur les plans qui peuvent, dans les cristaux uniaxes, donner deux rayons réfractés en coincidence. R. . .	91	I	4
— Production mécanique des faces e^1 et d^1 dans le spath d'Islande. R.	91	I	379
— Reproduction de quelques phosphates de fer naturels par l'action de l'oxygène de l'air sur une solution ferreuse acide. Hierbei: Messungen am Vivianit von Cornwall. R.	91	I	383
— La Barytine de Rumelange. Relation entre les dimensions du solide primitif dans la Barytine, le Quartz, la Calcite et quelques autres minéraux. R.	91	II	7
— Sur les figures inverses de dureté de quelques corps cristallisant dans le système cubique et de la calcite. R.	91	II	9
— Dimostrazione elementare delle relazione fra gli indici di 4 facce in una stessa zona e gli angoli di queste. R.	91	II	16
— Sur une face de la topaze de Saxe. R.	91	II	28
— Relation entre la vitesse d'attaque du spath par les acides et l'élasticité optique estimée suivant la direction normale au plan d'attaque. R.	92	I	221
— Sur la vitesse d'attaque du marbre et du Spath d'Islande par quelques acides. R.	92	I	222
— Eine neue Form des Galenit. R.	93	II	14

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cesaro, G.: Démonstration élémentaire de la rélation qui existe entre les caractéristiques de quatre faces appartenant à la même zone et les angles que ces faces font entre elles. R.	1893	II	240
— Sur les cas dans lesquels deux formes hémiédriques conjuguées ne sont pas superposables. Conditions nécessaires et sufficiantes pour qu'un polyèdre soit superposable à son image vue dans un miroir plan. Symétrie directe et inverse. R.	94	I	244
— L'Anatase de Nil-St.-Vincent. R.	94	II	404
— L'Albite de Challes. R.	94	II	406
— Note sur quelques minéraux. R.	94	II	415
Chalmers, R.: Report on the Surface Geology of north-eastern New Brunswick to accompany quarter-sheet maps 2 NE. and 6 SW. R.	91	II	92
Chamberlin, T. C.: The Rock-Scorings of the Great Ice Invasions. R.	92	I	388
— Some Additional Evidences bearing on the Interval between the Glacial Epochs. R.	93	I	372
— The Nature of the Englacial Drift of the Mississippi Basin. R.	93	II	280
Chamberlin, T. C. and R. D. Salisbury: Preliminary Paper on the Drift-less Area of the Upper Mississippi Valley. R.	90	I	277
Champernowne: On the Ashpringston Volcanic Series of South Devon. R.	91	I	93
Chaper, M.: Observations a propos d'une note de M. Daubrée. R.	93	I	84
— Fossilisation du test des mollusques après séjour dans le tube digestif. R.	94	II	138
Chapman, F.: On a Method of Producing Perlitic and Pumiceous Structures in Canadabalsam. R.	90	II	390
— The Foraminifera of the Gault of Folkestone. I. R.	93	I	566
— Microzoa from the Phosphatic Chalk of Taplow. R. 1893 II 559	94	I	393
— Some new Forms of Hyaline Foraminifera from the Gault. R.	94	I	525
— siehe Sherborn, C. Davies.			
Chapman, F. and C. D. Sherborn: Foraminifera from the London Clay of Sheppey. R.	92	I	462
— — On the Ostracoda of the Gault at Folkestone. R.	94	II	164
Charpentier, P. G.: Goniomètre de Wollaston pour les petits cristaux. R.	90	I	35
Chatard, T. M.: The Gneiss-Dunyte Contacts of Corundum Hill, North Carolina, in Relation to the Origin of Corundum. R.	90	I	36
— Lucasite, a new Variety of Vermiculite. R.	90	I	225
— On Urao. R.	92	I	507
— Salt-Making Processes in the United States. R.	92	I	87
Le Chatelier, H.: Sur des essais de reproduction des roches acides. R.	92	II	271
— Sur la fusion du carbonate de chaux. R.	94	I	305
Chelius, C.: Granit und Minette an der Hirschburg bei Leutershausen südlich Weinheim an der Bergstrasse. R.	90	II	61
— Notizen aus den Aufnahmegebieten des Sommers 1888. R.	90	II	61
— Zur Benutzung des Methylenjodids. R.	92	I	61

	Jahrg.	Bd.	Seite
Chelius, C.: Frittung von Rothliegendem Sandstein in einem Bohrloch. R.	1892	I	93
— Die Umgegend von Heppenheim an der Bergstrasse. R.	92	I	104
— *Flugsand auf Rheinalluvium und zur Jetztzeit. B.*	*92*	*I*	*224*
— Analysen aus dem chemischen Laboratorium der geologischen Landesanstalt in Darmstadt. R.	92	II	251
— Neue Basaltvorkommen im Odenwald. R.	92	II	252
— Das Granitmassiv des Melibocus und seine Ganggesteine. R.	94	I	251
— Betrachtungen über die Entstehung des Odenwalds. R.	94	I	306
— Das Pliocän im Kessel von Michelstadt im Odenwald. R.	94	I	358
— Ist eine Conchylienfauna des echten Löss bekannt? R.	94	II	134
— Mechanische Analysen von Bodenarten des Blattes Rossdorf. R.	94	II	134
— Zusammenstellung von Analysen der geologischen Landesanstalt zu Darmstadt. R.	94	II	418
Chelius, C. und C. Vogel: Zur Gliederung des Löss. B.	*91*	*I*	*104*
Chelussi, Italo: I porfidi quarziferi del colle di Buccione e del monte Mesma sul lago d'Orta. R.	91	II	427
— Studio petrografico sopra alcune roccie della valle di Chialamberto in Piemonte. 1. Theil. R.	92	I	519
— Studio microscopico di alcune roccie della valle di Chialamberto in Piemonte. 2. Theil. R.	92	II	421
— Alcune rocce dell' isola di Samos. R.	93	II	495
Chester, Albert H.: Mineralogical Notes from the Laboratory of Hamilton College. R.	90	II	44
— A Mangano-Magnesian Magnetite. R.	90	II	219
Chester, Albert H. and F. J. Cairns: Crocidolite from Cumberland, R. J., with a Discussion of the Composition of this and Allied Minerals, and a Method for the Determination of Ferrous Oxide in Insoluble Silicates. R.	91	I	37
Chester, Fr. D.: The Gabbros and Associated Rocks in Delaware. R.	92	I	79
Chevalier: Sur un tremblement de terre à Chang-Haï. R.	91	I	262
Choffat, P.: Note sur le crétacique des environs de Torres-Vedras, de Peniche et de Cercal. R. . 1893 II 159	94	I	352
— Sur les niveaux ammonitiques du Malm inférieur dans la contrée du Montejunto (Portugal). Phases peu connues du développement de Mollusques. R.	94	I	141
Chree, C.: On Aeolotropic Elastic Solids. R.	91	II	402
— Some Applications of Physics and Mathematics to Geology. R.	92	II	40
Chrustschoff, K. v.: Beiträge zur Petrographie Volhyniens und Russlands. I. Theil. Ueber die sogenannten Labradorite Volhyniens. R.	90	I	81
— *Ueber künstliche Hornblende. B.*	*91*	*II*	*86*
— *Ueber ein palaeozoisches Leucitgestein. B.*	*91*	*II*	*224*
— Sur la théorie des feldspath de M. Tschermak. R.	92	II	22
— *Ueber künstliche Darstellung des Zirkons auf nassem Wege. (Mit 1 Holzschnitt.) B.*	*92*	*II*	*232*
— Reproduction artificielle de l'amphibole. R.	93	I	265
— Ueber das Gestein der Insel Walamo im Ladogasee. R.	93	I	498
— Ueber die Auffindung des Germaniums in den natürlichen Niobaten und Tantalaten. R.	94	II	229
— Ueber eine Gruppe eigenthümlicher Gesteine vom Taimyr-Lande aus der Middendorff'schen Sammlung. R.	94	II	261

	Jahrg.	Bd.	Seite
Church, A. H.: Note on Colorado Hydrophane. R. . .	1891	I	231
Clark, William B.: Discovery of Fossil-bearing Cretaceous Strata in Anne Arundel and Prince George Counties, Maryland. R.	90	I	120
— A new Ammonite which throws Additional Light upon the Geological Position of the Alpine Rhaetic. R. .	90	I	155
— On the Tertiary Deposits of the Cape Fear River Region. R.	91	I	129
— Third Annual Geological Expedition into S. Maryland and Virginia. R.	91	I	129
— Correlation Papers; Eocene. R.	93	I	367
— A Revision of the Cretaceous Echinoidea of North America. R.	93	II	209
— siehe Williams, G. H.			
Clarke, F. W.: Researches on the Lithia Micas. R. . .	90	I	225
— Studies in the Mica Group. R.	91	I	39
— The Meteorite Collection in the U. S. National Museum: a Catalogue of Meteorites represented Nov. 1, 1886. R.	91	I	49
— Some Nickel Ores from Oregon. R.	91	I	382
— A new Occurrence of Gyrolite. R.	93	I	247
— A Theory of the Mica Group. R.	93	I	475
— Note on the Constitution of Ptilolite and Mordenite. R.	94	II	224
Clarke, F. W. and Charles Catlett: A Platiniferous Nickel Ore from Canada. R. . . . . 1892 II 410	93	II	15
Clarke, F. W. and J. S. Diller: Turquois from New Mexico. R.	90	I	222
Clarke, F. W. and G. P. Merrill: On Nephrite and Jadeite. R.	90	II	103
Clarke, F. W. und E. A. Schneider: Ueber die chemische Constitution des Talks. R.	91	I	23
— — Experiments upon the Constitution of the Natural Silicates. R.	94	I	25
— — On the Constitution of certain Micas, Vermiculites and Chlorites. R.	94	I	32
— — Experiments upon the Constitution of certain Micas and Chlorites. R.	94	I	439
Clarke, John M.: Die Fauna mit Goniatites intumescens im westlichen New York. A.	*91*	*I*	*161*
— As Trilobitas do grez de Ereré e Maecurú, estado do Pará, Brazil. R.	92	I	171
— Observations on the Terataspis grandis Hall, the largest Known Trilobite. R.	92	I	580
— The Fauna with Goniatites intumescens in Western New York. R.	92	II	98
— Note on the genus Acidaspis. R.	92	II	151
— Note on Coronura aspectans Conrad, the Asaphus diurus Green. R.	92	II	151
— The Hercynian Question. A Brief Review of its Developement and Present Status, with a few Remarks upon its Relation to the Current Classification of American Palaeozoic Faunas. R.	93	I	117
— The Discovery of Clymenia in the Fauna of the Intumescenz-zone of Western New York. R.	93	I	120
Clarke, J., siehe Beecher, Ch. E.			
— siehe Hall.			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Claypole, E.W.: On the Structure of the American Pteraspidian, Palaeaspis (Claypole) with Remarks on the Family. R.	1894	II	466
Clements, J. M.: Die Gesteine des Duppauer Gebirges in Nordböhmen. R.	93	II	330
Clerici, E.: Sopra alcune specie di felini della Caverna al Monte delle Gioie presso Roma. R.	92	I	157
— La Vitis vinifera fossile nei dintorni di Roma. R.	92	I	469
— La pietra di Subiaco in provincia di Roma e suo confronto col travertino. R.	92	II	73
— Sulla Corbicula fluminalis dei dintorni di Roma e sui fossili che l'accompagnano. R.	93	I	183
— siehe Silvestri.			
Cohen, E.: Ueber den Granat der südafrikanischen Diamantfelder und über den Chromgehalt der Pyrope. R.	90	I	393
— Zusammenstellung petrographischer Untersuchungsmethoden nebst Angabe der Litteratur. R.	91	I	60
— *Die Goldproduction Transvals im Jahre 1889. B.*	*91*	*I*	*215*
— Meteoreisenstudien II. R.	93	I	478
Cohen, E. und W. Deecke: Ueber das krystalline Grundgebirge der Insel Bornholm. R.	90	II	92
— — Ueber Geschiebe aus Neu-Vorpommern und Rügen. R.	93	I	142
Cohen, E. und E. Weinschenk: Meteoreisen-Studien. R.	91	II	244
Cole, Grenville A. J.: On some Additional Occurrences of Tachylyte. R.	90	I	74
— On Simple Apparatus for Use in the Observation of Flame-Reactions. R.	91	I	58
— On Occurrences of Riebeckite in Britain. R.	92	II	216
— Devitrification of cracked and brecciated Obsidian. R.	93	II	494
— The Rocks of the Volcano of Rhobell Fawr. R.	94	II	258
Cole, Grenville A. J. and G. W. Butler: On the Lithophyses in the Obsidian of the Rocche Rosse, Lipari. R.	94	I	293
Cole, Grenville A. J. and Gregory: On the Variolitic Rocks of Mount Genevre. R.	90	II	391
Coleman, A. P.: Microscopic Petrography of the Drift of Central Ontario. R.	90	I	430
— Geography and Geology of the „Big-Bend" of the Columbia. R.	91	II	93
— Drift of Central Ontario. R.	92	I	523
Collie, Norman: On some Leadhills Minerals. R.	92	II	16
Collin: Tremblements de terre à Madagascar. R.	92	I	57
Collins, Henry F.: Mineralogische Notizen von Torreon, Staat Chihuahua. R.	93	II	278
Collins, J. H.: Pinit von Breage in Cornwall. R.	94	I	37
Collot: Description du Terrain crétacé dans une partie de la Basse-Provence. R.	91	II	442
— Constitution de la série d'eau douce d'Oregon. R.	92	II	113
— Description du terrain crétacé dans une partie de la Basse-Provence. R.	93	I	361
Comstock, Theo. B.: Preliminary Report on the Geology of the Central Mineral Region of Texas. R.	92	II	17
Le Conte, Joseph: Tertiary and Post-tertiary Changes of the Atlantic and Pacific Coasts, with a Note on the Mutual Relations of Land-elevation and Ice-accumulation during the Quaternary Period. R.	93	I	57
— On the Origin of Normal Faults and of the Structure of the Basis Region. R.	93	I	482

	Jahrg.	Bd.	Seite
Contejean: Sur des érosions éoliennes. R.	1890	II	94
— Sur les cailloux impressionés. R.	91	I	262
Conwentz, H.: Die phytopalaeontologische Abtheilung des naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm. R. .	91	I	168
— *Ueber fossile Harze aus Nordamerika. B.*	*91*	*I*	*208*
– Monographie der baltischen Bernsteinbäume. Vergleichende Untersuchungen über die Vegetationsorgane und Blüthen, sowie über das Harz und die Krankheiten der baltischen Bernsteinbäume. R.	92	II	178
— Ueber die verschiedene Bildungsweise einiger Handelssorten des baltischen Bernsteins. R.	93	I	211
— Ueber die Verbreitung des Succinits, besonders in Schweden und Dänemark. R.	94	II	195
Cooke, J. H.: On the Occurrence of a Black Limestone in the Strata of the Maltese Islands. R.	94	II	325
— The Marls and Clays of the Maltese Islands. R. . .	94	II	325
Cope, E. D.: Topinard on the Latest Steps in the Genealogy of Man. R.	90	I	332
— Synopsis of the Vertebrate Fauna of the Puerco Series. R.	90	I	333
— The Perissodactyla. R.	90	II	315
— On the Dicotylinae of the John Day Miocene of North America. R.	90	II	322
— The Horned Dinosauria of the Laramie. R.	90	II	435
— The Proboscidia. R.	91	II	150
— On Vertebrata from the Tertiary and Cretaceous Rocks of the North West Territory. 1. The Species from the Oligocene or Lower Miocene Beds of the Cypress Hills. R.	92	I	395
— The Mechanical Causes of the Developement of the Hard-parts of the Mammalia. R.	92	I	398
— The Cetacea. R.	92	II	144
— On the Skull of the Dinosaurian Laelaps incrassatus Cope. R	93	I	165
— A Contribution to the Vertebrate Paleontology of Texas. R.	93	I	378
— On the Homologies of the Posterior Cranial Arches in the Reptilia. R.	93	I	392
— On some New Fishes from South Dakota. R.	93	II	546
— Report on Paleontology of the Vertebrata. R. . . .	94	I	177
— Fourth Note on the Dinosauria of the Laramie. R. .	94	I	182
— On a New Genus from the Laramie Formation. R. .	94	I	375
Corneliussen, O. A.: Bidrag till Kundskaben om Nordlands amts geologi. R.	93	II	111
Cornet, L.: Die Glimmerdiabase von Steinach am Brenner Joch. R.	90	I	63
Cortell, H. E. P.: Earth Slips and Subsidences. R. . .	94	II	40
Cortese, E.: Le acque sorgive nelle alte vallate dei fiumi Sele, Calore e Sabato. R.	93	I	98
— siehe Stefano, G. di.			
Corti, B.: Breve nota sul quaternario e i terreni recenti della Vallassina e alta Brianza. R.	93	I	532
Cossmann, M.: Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris, faisant suite aux travaux paléontologiques de G. T. Deshayes. 3. 4. fascicule. R.	90	II	151, 152
— Révision sommaire de la faune du terrain Oligocène marin I. R.	92	I	437

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cossmann, M.: Révision sommaire de la faune du terrain Oligocène marin aux environs d'Etampes. Suite. R.	1893	II	554
— Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris. V. Fascicule et Supplément. R.	94	II	139
Coste, E.: Report on the Mining and Mineral Statistics of Canada. R. . . . . 1890 II 384	91	II	92
Cotteau, G.: Echinides nouveaux ou peu connus. R. 1890 I 170. Fasc. 8. R. 1892 I 446. Fasc. 9. R. 1892 I 184. Fasc. 10. R. 1893 I 561. 11. article. R.	94	I	520
— Sur les Echinides crétacés du Mexique. R.	91	I	162
— Echinides crétacés de Madagascar. R.	91	I	434
— Note sur un exemplaire des Coraster Vilanovae provenant de Tersaktan (Turkestan). R.	91	II	367
— Echinides recueillis dans la province d'Aragon (Espagne) par M. Maurice Gourdon. R.	91	II	368
— Note sur le genre Echinolampas. R.	92	II	464
— Les Echinides éocènes de la Loire-inférieure et de la Vendée. R.	93	I	414
— Notice sur l'Hemipneustes oculatus (Drapiez) Cotteau de la Craie de Ciply et les autres espèces du genre Hemipneustes. R.	93	I	415
— Sur un genre nouveau d'Echinide crétacé, Dipneustes aturicus Arnaud. R.	94	I	392
Cotteau, Peron et Gauthier: Echinides fossiles de l'Algérie. Description des espèces déjà recueillies dans ce pays et considérations sur leur position stratigraphique. R. .	93	I	184
Cotter, J. C. Berkeley: Noticia de alguns fosseis terciarios do archipelago da Madeira. — Noticia de alguns fosseis terciarios da ilha de Santa Maria (Açores). R.	94	II	461
Couharévitch, J.: La Russie industrielle. Région ouest. R.	93	II	60
Couturieaux, J. siehe Vincent, G.			
Cragin, F. W.: A Contribution to the Invertebrate Paleontology of the Texas Cretaceous. R.	94	I	371
Cramer, Fr.: On a Recent Rock Flexure. R.	92	II	42
Credner, H.: Die Stegocephalen und Saurier aus dem Rothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden.			
VII. Theil. Palaeohatteria longicaudata Cred. R.	90	I	144
VIII. Theil. Kadaliosaurus priscus Cred. R. . .	90	II	436
IX. Theil. R.	91	II	454
— Ueber die Genesis der archaeischen Gneissformation. R.	91	II	263
— Die Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegenden. R.	93	I	171
— Die geologischen Verhältnisse der Stadt Leipzig. R. .	93	II	95
Credner, H., E. Geinitz und F. Wahnschaffe: Ueber das Alter des Torflagers von Lauenburg a. d. Elbe. B.	*93*	*I*	*33*
Crick, G. C., siehe Foord, A. H.			
Crick, W. D., siehe Wilson, E.			
Crié, Louis: Sur les affinités des flores jurassiques et triasiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. R. . . .	91	I	444
— Recherches sur la flore pliocène de Java. R.	91	II	208
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora einiger Inseln des Südpacifischen und Indischen Oceans. R. . . .	94	I	532
Croll, James: Stellar Evolution and its Relations to Geological Time. R.	91	II	263
Crook, A. R.: Ueber einige fossile Knochenfische aus der mittleren Kreide von Kansas. R.	94	I	380

	Jahrg.	Bd.	Seite
Cross, Whitman: On some Eruptive Rocks from Custer County, Colorado. R.	1890	I	83
— The Denver Tertiary formation. R.	90	I	127
— Note on Phonolithe from Colorado. R.	90	I	427
— Geology of the Rosita Hills, Custer Co., Colorado. R.	93	I	294
— Constitution and Origin of Spherulithes in Acid Eruptive Rocks. R.	93	I	294
— Note on some Secondary Minerals of the Amphibole and Pyroxene groups. R.	93	II	22
— Post-Laramie Deposits of Colorado. R. 1893 II 172 1894 I 495	94	II	331
— On Alunite and Diaspore from the Rosita Hills, Colorado. R.	93	II	466
Cross, Whitman and L. G. Eakins: A new Occurrence of Ptilolite. R.	94	II	223
Cross, R. T.: Notes on Aquamarine from Mount Antero, Colorado. R.	91	I	36
Cseh, L.: Ueber das geologische Profil des Schemnitzer Kaiser Francisci Erbstollens. R.	92	II	71
Cuénot, L., siehe Janet, Ch.			
Culver, G. E.: Notes on a little known Region in North western Montana. R.	94	I	110
Culver, G. E. and H. Hobbs: On a new Occurrence of Olivine-Diabase in Minnesota County, South-Dakota. R.	93	II	498
Cumenge, E. siehe Mallard, Er.			
Cummins, W. F.: Aragonit und Cölestin im südlichen Rand des Centralkohlenfeldes in Texas. R.	92	II	22
— Gyps im Perm von Texas und den darüber liegenden Schichten. R.	92	II	33
— Report on the Geography, Topography and Geology of the Llano Estacado or Staked Plains with Notes on the Geology of the Country west of the Plains. R.	94	I	115
Cundall, T. J.: On Zinc Oxyde from a Blast-furnace. R.	91	II	416
Curie, J. et G. Flamand: Etude succincte sur les roches éruptives de l'Algérie. R.	90	II	402
Curran, J. Milne: Carboniferous and Silurian Fossils from Central New South Wales. R.	90	I	437
Cushing, H. P. und E. Weinschenk: Zur genauen Kenntniss der Phonolithe des Hegaus. R.	93	II	487
Cvijič, Johann: Eine Besteigung des Sar-Dagh. R.	92	I	150
Czapski, S.: Krystallrefractometer vereinfachter Form. B.	*92*	*I*	*209*
— Ueber Einrichtungen behufs schnellen Ueberganges vom parallelen zum convergenten Lichte und die Beobachtung der Axenbilder von sehr kleinen Krystallen in Polarisations-Mikroskopen. R.	94	II	214
— Ein neues Krystallgoniometer. Vorläufige Mittheilung. R.	94	II	215
— *Krystallrefractometer nach Abbe. (Mit Tafel III und 3 Holzschnitten.) A.*	*BB*	*VII*	*175*
— *Mikroskope der optischen Werkstätte von Carl Zeiss in Jena für krystallographische und petrographische Untersuchungen. (Mit 3 Holzschnitten.) A.*	*BB*	*VII*	*497*
— *Die dioptrischen Bedingungen der Messung von Axenwinkeln mittelst des Polarisationsmikroskops. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*BB*	*VII*	*506*
Czermak, P.: Ueber das elektrische Verhalten des Quarzes. R.	91	I	368

	Jahrg.	Bd.	Seite
Czersky, J.: Geologische Erforschung der grossen Sibirischen Poststrasse vom Baikal bis zum Ostabhange des Ural nebst den Wegen zur Padun-Stromschnelle an der Angara und zur Stadt Minussinsk am Jenissei. R.	1890	I	123
— Posttertiäre Bildungen Sibiriens. R.	90	I	123
— Fossile Säugethierfauna der Nishnij-Udinsk. R.	90	I	123

D.

Dahll, T.: Om fjeldbygningen i Finmarken og guldets forekomst sammesteds. R.	93	II	109
— Kulforekomsten paa Andöen. R.	93	II	110
Dahms, Paul: Ueber einige Eruptivgesteine aus Transvaal in Süd-Afrika. A.	*BB*	*VII*	*90*
Dakyns and Teall: On the Plutonic Rocks of Garabal Hill and Meall Breac. R.	93	I	286
Dall, W. H.: Contributions to the Tertiary Fauna of Florida with special Reference to the Miocene Silex-beds of Tampa and to the Pliocene Beds of the Caloosahatchie river. I. R.	92	I	180
— On the Age of the Peace Creek beds, Florida. R.	93	I	134
Dalland siehe William.			
Dalmer, K.: Section Tanneberg. Blatt 64 nebst H. Müller: Die Erzlagerstätten. R.	91	I	75
— Section Collmnitz. Blatt 17. R.	91	I	85
— Section Altenberg-Zinnwald. Blatt 119. R.	93	I	91
— Section Lommatzsch-Leuben. R.	93	II	500
— *Ueber das Alter der Granit- und Porphyrgesteine der Insel Elba. B.*	*94*	*I*	*99*
Dalmer, K. und E. Dathe: Section Rosswein-Nossen. Blatt 63. R.	91	I	72
Dambergis, A. K.: Die silberhaltigen Mineralien auf der grichischen Insel Melos. R.	92	I	84
Dames, W.: Ueber die Grenze zwischen Emscher-Mergel und typischem Untersenon am Nordrande des Harzes. B.	*90*	*I*	*176*
— Ueber Vogelreste aus dem Saltholmskalk von Limhamn bei Malmö. R.	91	I	331
— Anarosaurus pumilio n. g. n. sp. R.	91	I	332
— *Orthoceratites vaginatus Schloth. B.*	*91*	*I*	*210*
— Schädelfragment von Cervus euryceros = Megaceros hibernicus Owen aus dem Interglacialsande von Rixdorf bei Berlin. R.	91	II	341
— Ueber die Schichtenfolge der Silurbildungen Gotlands und ihre Beziehungen zu obersilurischen Geschieben Norddeutschlands. R.	92	I	344
— Ueber einen mit hyperostotischen Bildungen versehenen Schädel eines subfossilen Pagrus von Melbourne. R.	93	II	194
Damian, Josef: Gletscher-Spuren im Tierser Thale. R.	91	II	139
Damour, A.: Sur l'emploi des jodures alcalins dans l'analyse de quelques matières minérales. R.	94	I	251
Damsky, A.: Naphta von Sachalin. R.	91	II	14
Dana, Edward S.: On the Brookite from Magnet Cove, Arkansas. R.	90	I	224
— On the Crystallization of Native Copper. R.	90	I	228
— Ueber den Columbit. R.	90	I	407

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dana, Edward S.: Mineralogical Notes. R.	1890	I	407
— An Account of the Progress in Mineralogy in the Year 1886. R.	91	I	33
— On the Barium Sulphate from Perkins' Mill, Templeton, Province of Quebec. R.	91	I	381
— Preliminary notice of Beryllonite, a New Mineral. R.	91	II	44
— Contributions to the Petrography of the Sandwich Islands. R.	92	I	319
— Descriptive Mineralogy. R.	93	I	453
— Wulfenite from Sing Sing, N. Y. R.	93	II	33
— siehe Brush, G. J.			
— siehe Hillebrand, W. F.			
Dana, Edward S. and Horace L. Wells: Description of the New Mineral Beryllonite. R.	91	II	44
— — Beryllonit, ein neues Berylliumphosphat. R.	91	II	44
— — On some Selenium and Tellurium minerals from Honduras. R.	93	II	467
Dana, James D.: History of the Changes in the Mt. Loa Craters on Hawaii. Pt. I: Kilauea. Pt. II: Mokuaweoweo. R.	90	I	423
— Relations of Kilauea to Mt. Loa. R.	90	I	423
— Points in the Geological History of the Islands Maui and Oahu. R.	90	I	423
— On the Origin of the Deep Trought of the Oceanic-Depression: Are any of Volcanic Origin? R.	90	I	423
— A Brief History of Taconic Ideas. R.	91	II	113
— Long Island Sound in the Quarternary Era, with Observations on the Submarine Hudson River Channel. R.	92	II	67
— Rocky-Mountain Protaxis and the Post-Cretaceous Mountain-Making along its Course. R.	92	II	282
— On Subdivisions in Archean History. R.	93	I	330
— Some of the Features of non-volcanic Igneous Ejections, as illustrated in the four „Rocks" of the New Haven region: West Rock, Pine Rock, Mill Rock and East Rock. R.	94	I	77
Dangdon jr., Daniel W.: Some Florida Miocene. R.	90	I	316
Dannenberg, A.: Cerussit, Anglesit und Calcit von der Grube Diepenlinchen bei Stolberg. R.	92	I	507
— Der Leilenkopf, ein Aschenvulcan des Laacher See-Gebietes. R.	93	I	488
Danzig, E.: Nachträgliche Bemerkungen zu der Abhandlung: Weitere Mittheilungen über die Granite und Gneisse der Oberlausitz und des angrenzenden Böhmens. R.	92	I	284
Darapsky, L.: Ueber einige Mineralien aus Atacama (Mit Taf. I.) A.	*90*	*I*	*49*
— Las Aguas Minerales de Chile. R.	92	II	76
Darton, Nelson H.: On the Occurrence of Basalt Dikes in the Upper Paleozoic Series in Central Appalachian Virginia. With Notes on the Petrography by J. S. Diller. R.	91	I	113
— On the Great Lava Flows and Intrusive Trap Sheets of the Newark System in New Jersey. R.	91	II	302
— Physiography of the Region and Geology of the Sedimentary Rocks of Baltimore. R.	92	II	285
— Record of North American Geology for 1887 to 1889 inclusive. R.	93	I	47
— The Relations of the Traps of the Newark System in the New Jersey Region. R.	93	II	337

	Jahrg.	Bd.	Seite
Darton, Nelson H.: Fossils in the „Archaean" Rocks of Central Piedmont, Virginia. R.	1894	I	123
— Record of a Deep Well at Lake Worth, Southern Florida. R.	94	I	161
— Notes on the Geology of the Florida Phosphate Deposits. R.	94	I	161
Darwin, G. H.: On the Mechanical Conditions of a Swarm of Meteorites, and on Theories of Cosmogeny. R.	90	I	43
— Note on Mr. Davison's Paper on the Straining of the Earth's Crust in Cooling. R.	90	I	49
Dathe, E.: Olivinfels, Amphibolit und Biotitgneiss von Habendorf in Schlesien R.	90	II	243
— Ueber die Strahlsteinschiefer in der Gneissformation des Eulengebirges. R.	93	II	325
— Die Strahlsteinschiefer des Eulengebirges. R.	93	II	325
— Uebersicht über die geologischen Verhältnisse von Niederschlesien. R.	93	II	355
— Geologische Beschreibung der Umgegend von Salzbrunn. R.	94	II	74
— siehe Dalmer, K.			
Daubrée, A.: Météorite holosidère découverte à l'intérieur du sol en Algérie, à Haniet-el-Beguel. R.	90	I	42
— Sur l'itinéraire de J. Martin, des bords de la Lena au fleuve Amour. R.	90	II	99
— Météorite diamantifère tombé le 10/22 septembre 1886, en Russie, à Nowa-Urei, gouvernement de Penza. R.	91	I	45
— Analogies de gisement du diamant, d'une part, dans les gîtes de l'Afrique australe; d'autre part, dans les météorites. R.	91	I	45
— Note accompagnant la présentation d'un Catalogue descriptif des météorites du Mexique, rédigé par Antonio del Castillo. R.	91	I	49
— Sur les déformations, que subit l'enveloppe solide d'un sphéroide fluide, soumis à des effets de contraction. R.	91	I	61
— Expériences sur les déformations que subit une enveloppe sphéroidale soumise à des efforts de pression. R.	91	I	61
— Expériences sur les actions mécaniques exercées sur les roches par des gaz douées de très fortes pressions et de mouvements très rapidées. R.	91	II	421
— Expériences sur les actions mécaniques des gaz à hautes températures, douées de très fortes pressions. III. R.	92	II	269
— Recherches expérimentales sur le rôle probable des gaz à hautes températures, douées de très fortes pressions et animés d'un mouvement fort rapide dans divers phénomènes géologiques. V. Transport et écoulement de roches sous l'influence des gaz agissant à des fortes pressions. R.	92	II	270
— Recherches expérimentales sur le rôle possible des gaz à hautes températures, douées de très fortes pressions et animés d'un mouvement fort rapide dans divers phénomènes géologique. R.	92	II	270
— Observations sur les conditions qui paraissent avoir présidé à la formation des météorites. R.	94	I	448
— Sur les couches à pétrole des environs de Pechelbronn (Basse-Alsace); températures exceptionellement élevées, qui s'y manifestent. R.	94	II	245
Daubrée, A. et St. Meunier: Examen d'échantillons de fer natif d'origine terrestre, découverts dans les lavages d'or des environs de Berezowsk. R.	92	II	266

	Jahrg.	Bd.	Seite
David, T. W. Edgeworth: Proposed Petrological Classification of the Rocks of New South Wales. R. .	1892	I	315
David, T. W. Edgeworth and W. Anderson: The Leucite-Basalts of New South Wales. R.	92	I	316
Davidon, J. M.: Analyses of Kamacite, Taenite and Plessite from the Welland Meteoric Iron. R.	92	I	269
Davis, J. W.: Note on a Species of Scymuns from the Upper Tertiary Formation of New Zealand. R.	90	I	147
— On the Dentition of Pleuroplax (Pleurodus) A. S. Woodward. R.	93	I	397
— On the Fossil Fish of the Cretaceous Formations of Scandinavia. R.	94	II	348
Davis, W. M.: Geographic Methods in Geological Investigation. R.	90	II	236
— Mechanical Origin of the Triassic Monoclinal in the Connecticut Valley. R.	90	II	240
— The Structure of the Triassic Formation of the Connecticut Valley. R.	90	II	240
— Topographic Developement of the Triassic Formation of the Connecticut Valley. R.	90	II	240
— The Faults in the Triassic Formation near Meriden, Connecticut. R. . . . . 1890 II 240	91	I	295
— The Ash Bed at Meriden and its Structural Relations. R.	90	II	240
— The Rivers and Valleys of Pennsylvania. R.	90	II	241
— Structure and origin of glacial sand plains. R. . . .	91	I	136
Davis, W. M. and Ch. L. Whittle: The Intrusive and Extrusive Triassic Trap Sheets of the Connecticut Valley. R.	91	I	402
Davison, Charles: On the Distribution of Strain in the Earth's Crust resulting from Secular Cooling; with special Reference to the Growth of Continents and the Formation of Mountain Chains. R.	90	I	49
— On the Secular Straining of the Earth. R.	90	II	389
— On the Mean Rate of Subaerial Denudation. R. . . .	91	I	91
— On the Amount of Sand, brought up by Lobworms to the Surface. R.	92	II	266
— On the Inverness Earthquake of Nov. 15 to Dec. 14, 1890. R.	93	I	56
— On the British Earthquakes of 1889. R.	93	I	56
— On the British Earthquakes of 1890. R.	93	I	56
— On the Nature and Origin of Earthquake-Sounds. R. .	93	I	56
— On the British Earthquakes of 1891. R.	94	I	281
— Note on the Growth of Lake Geneva. R.	94	II	244
— On the British Earthquakes of 1892. R.	94	II	247
— Note on the Quetta Earthquake of Dec. 20, 1892. R.	94	II	248
Davy, J.: Découverte de fossiles du Miocène supérieur dans les sables rouges de la forêt du Gâvre. R.	91	I	309
Dawkins, W. Boyd: The Discovery of Coal Measures near Dover. R.	92	I	349
Dawson, J. W.: Note on New Facts relating to Eozoon canadense. R.	90	II	343
— On the Eozoic and Palaeozoic Rocks of the Atlantic Coast of Canada in Comparison with those of Western Europe and of the Interior of America. R.	91	II	310
— Note on Balanus Hameri in the Pleistocene at Rivière Beaudette, and on the Occurrence of Peculiar Varieties			

	Jahrg.	Bd.	Seite
of Mya arenaria and M. truncata in the Modern Sea and in the Pleistocene. R.	1891	II	461
Dawson, J. W.: New Species of Fossil Sponges from the Siluro-Cambrian at Little Metis, on the Lower St. Lawrence. R.	92	I	458
— On Burrows and Tracks of Invertebrate Animals in Palaeozoic Rocks and other Markings. R.	92	I	601
— Ueber einige devonische Pflanzen. R.	93	II	213
— On New Specimens of Dendrerpeton Acadianum, with Remarks on other carboniferous Amphibians. R. . .	94	I	379
— On a Hylonomus Lyelli, with Photographic Reproduction of Skeleton. R.	94	I	380
— The Quebec Group of Logan. R.	94	II	302
Dawson, J. W. and D. P. Penhallow: On the Pleistocene Flora of Canada. R.	93	I	434
Dawson, George M.: Notes on the Ore-Deposit of the Treadwell Mine, Alaska. R.	90	I	428
— The Mineral Wealth of British Columbia. R.	90	II	384
— Report on an Exploration in the Yukon District N. W. T., and adjacent Northern Portion of British Columbia. R.	91	II	89
— The Mineral Wealth of British Columbia with an annotated list of localities of minerals of economic value. R.	91	II	92
— Note on the geological structure of the Selkirk Range. R.	92	II	96
Day, D. T.: Mineral Resources of the United States. R. 1890 I 36	91	II	237
Deecke, W.: Ueber ein Geschiebe mit Aegoceras capricornu Schloth. von Ueckermünde. R.	90	I	325
— Die Foraminiferenfauna im Aptien von Carniol (Basses-Alpes). R.	90	II	166
— Glacialerscheinungen im Dollerthale. R. . 1890 II 127	91	II	138
— *Vorkommen von „Jüngerer Kreide" bei Ystad in Schonen. B.*	*91*	*I*	*209*
— *Zur Geologie von Unteritalien. A. . . 1891 II 39*	*91*	*II*	*286*
(Mit Taf. III.) A.	*92*	*II*	*108*
(Mit Taf. V und 2 Holzschnitten.) A.	*93*	*I*	*51*
— Ueber zwei Fische aus den Angulatus-Kalken des Unter-Elsass. R.	92	I	420
— Foraminiferen aus den bei Greifswald und auf Wollin erbohrten Kreideschichten. R.	92	II	465
— Der Granitstock des Elsässer Belchen in den Südvogesen. R.	93	I	488
— Ueber den Sarno in Unteritalien. R.	94	I	316
— Der Appenin an der Irpinischen Wasserscheide nach seiner physischen Beschaffenheit und ökonomischen Bedeutung. R.	94	I	316
— Der obere Dogger vom Karziger Ufer auf der Insel Wollin. R.	94	II	315
— *Der Monte Vulture in der Basilicata (Unteritalien). (Mit Taf. IX, X und 1 Holzschnitt.) A.* . . .	*BB*	*VII*	*556*
— siehe Cohen, E.			
Deeks, W.: The Lower Helderberg Formation of St. Helens Island. R.	94	II	440
Degrange-Touzin, A.: Étude sur la faune terrestre, lacustre et fluviatile de l'Oligocène supérieur et du Miocène dans le Sud-Ouest de la France et principalement dans la Gironde. Affinités de cette faune avec celles des dépôts lacustres du bassin de Mayence. R.	94	II	356

	Jahrg.	Bd.	Seite
Degrange-Touzin, A.: Notes géologiques sur les environs de Bazas et sur une coupe relevée à Cazats. R. .	1894	II	453
— Molasse de Saint-Symphorien. R.	94	II	453
Delafond, M.: Note sur les terrains d'alluvions des environs de Lyon. R.	91	II	140
— I. Nouvelle subdivision dans les terrains bressans. II. Bassin de Blanzy et du Creusot. R.	93	I	302
Delage siehe Rouville, de.			
Delebècque, A.: Sondages du lac Léman. R.	92	II	65
— siehe Vallot, J.			
Delebècque, A. et L. Duparc: Sur les changements survenus du glacier de la Tête Rousse, depuis la catastrophe du 12 juillet 1892. R.	94	II	418
Delgado, J. F. N.: Fauna silurica de Portugal. Descripção de uma fórma nova de trilobite Lichas (Uralichas) Ribeiroi. R.	94	I	188
— Contributions à l'étude des terrains anciens du Portugal. R.	94	I	475
Delvaux, E.: Note sur quelques crustacés nouveaux recueillis par nous, in situ, dans l'argile yprésienne. R. . .	91	II	458
— Étude stratigraphique et paléontologique du soussol de la Campine. R.	92	I	368
— Position stratigraphique du système silurien et des assises crétacées, établier à l'aire d'une forage exécuté par M. le baron VAN ERTBORN, dans les établissements de M. M. VERLINDEN, frères, à Renaix. R.	92	II	437
— Description stratigraphique et paléontologique d'une assise de sables inférieurs à l'argile yprésienne représentant en Belgique les Oldhaven beds du bassin de Londres. R.	93	I	523
Demontzey, P.: Sur la lave du 12 Juillet 1892 dans les torrents de Bionnassay et du Bon Nant (catastrophe de St. Gervais). R.	94	I	285
Denkmann, A.: Ueber zwei Tiefseefacies in der oberen Kreide von Hannover und Peine und eine zwischen ihnen bestehende Transgression. R.	90	II	409
— Der Bau des Kieles dorsocavater Falciferen. R. . . .	91	II	360
— *Nochmals die Wealdenbildungen von Sehnde. B.* . .	*91*	*II*	*105*
Dennison siehe William.			
Denti, V.: Il filone di Berthierite nella Val Cresta in Comune di Viconaga. R.	94	II	18
Denza: Sur les tremblements de terre du 30 Mai 1889. R.	90	II	79
Depéret, Ch.: Note sur l'âge miocène supérieur des limons à Hipparion du Mont Lébéron. R.	91	I	122
— Note sur le Pliocène et sur la position stratigraphique des couches à Congérie de Théziers. R.	91	I	308
— Les animaux fossiles du Roussillon. R.	92	I	562
— Sur le Dolichopithecus ruscinensis, nouveau singe fossile du pliocène du Roussillon. R.	92	I	567
— Sur l'existence d'une petite faune de Vertébrés miocènes dans les fentes de rochers de la vallée de la Saône à Gray et au mont d'Or lyonnais. R.	93	I	539
— Sur la découverte de silex taillés dans les alluvions quaternaires à Rhinoceros Mercki de la vallée de la Saône à Villefranche. R.	94	I	178
— Sur la classification et les parallèlismes du Système miocène. R.	94	I	491

	Jahrg.	Bd.	Seite
Depéret, Ch.: Sur les terrains miocènes de l'Armagnac et sur le niveau des faunes de Sansan et de Simorre. R.	1894	I	492
– La faune de mammifères miocènes de la Grive-Saint-Alban et de quelques autres localités du Bassin du Rhône. R.	94	II	343
— Sur la faune d'Oiseaux pliocènes du Roussillon. R.	94	II	345
Depéret, Ch. et Donnezan: Sur la Testudo perpiniana Depéret. R.	90	I	347
Depéret, Ch. et Leenhardt: Note sur la découverte de l'horizon de Montaiguet à Bulimus Hopei dans le bassin d'Apt. R.	91	I	308
Derby, O. A.: Notas sobre meteoritos brasileiros. R.	91	I	243
— Os picos altos do Brazil. R.	91	II	304
— On Nepheline Rocks in Brazil. R.	92	I	522
— On the Separation and Study of the Heavy Accessories of Rocks. R.	93	II	324
— On the Occurrence of Xenotime as an Accessory Element in Rocks. R.	94	I	79
— On the Magnetite Ore Districts of Jacupiranga and Ipanema, São Paulo, Brazil. R.	94	I	90
Dervieux, E.: Il Genere Cristellaria Lamarck studiato nelle sue specie. R.	93	II	212
— La „Cristellaria galea" Fichtel e Moll. R.	94	II	185
— Le frondicularie terziarie del Piemonte. R.	94	II	476
DesCloizeaux, A.: Note sur les propriétés optiques de la pharmacolite naturelle et sur leur comparaison avec celle des cristaux artificiels de M. Dufet. R.	90	I	215
— Note sur les caractères optiques de la Haidingérite. R.	90	I	216
— Note sur le Mazapilite de König. R.	91	II	27
— Note sur les cristaux remarquables de Chalcopyrite de l'île de Cuba. R.	92	I	513
— siehe Hidden, W. E.			
DesCloizeaux, A. et A. Lacroix: Sur la phénacite de Saint-Cristophe en Oisans. R.	94	II	225
Destinez, P.: Sur quelques fossiles marins de l'étage houiller des environs de Liège. R.	91	II	463
Détienne, E.: Gisements et genèse du mercure. Ejections contemporaines de mercure, d'or et d'autres métaux. R.	93	II	76
Deutecom: Vortrag über neuere Untersuchungen über den Heizwerth der Kohle. R.	93	II	82
Dewalque, G.: Sur quelques dépôts tertiaires des environs de Spa. R.	91	II	130
Dewey, Fr. P.: A Preliminary Descriptive Catalogue of the Systematic Collections in Economic Geology and Metallurgy in the U. S. National Museum (Smithsonian Institution). R.	93	II	281
Dick, Allan: A new Form of Microscope. R.	90	II	383
Diener, C.: Ueber einige Cephalopoden aus der Kreide von Jerusalem. R.	90	I	356
— Der Gebirgsbau der Westalpen. R.	93	II	366
Dietze, August: Einige neue chilenische Mineralien. R.	93	I	262
Diller, J. S.: The Lastest Volcanic Eruption in Northern California and its Peculiar Lava. R.	90	I	430
— Geology of the Lassen Peak District. R.	91	I	107
— Sandstone Dikes. R.	91	I	109
— Supplementary Note on the Peridotite of Elliot Co., Ky. R.	91	I	113

	Jahrg.	Bd.	Seite
Diller, J. S. Mineralogical Notes. R.	1892	II	27
— Native Gold in Calcite. R.	93	II	13
— A Late Volcanic Eruption in Northern California and its Peculiar Lava. R.	93	II	338
— Note on the Cretaceous Rocks of Northern California. R.	93	II	387
— Mica-Peridotite from Kentucky. R.	94	I	78
— Geology of the Taylorville Region of California. R.	94	I	110
— siehe Clarke, F. W.			
Dinnik, N.: Die heutigen und die alten Gletscher des Kaukasus. R.	92	II	62
Dodge, W. W.: Some Lower Silurian Graptolites from Northern Maine. R.	91	I	439
Dodge, F. S.: Kilauea in August 1892. R.	94	II	416
Döderlein, L.: Das Skelet von Pleuracanthus. R.	91	II	163
— Nachtrag zur diluvialen Säugethierfauna von Vöklinshofen im Ober-Elsass. R.	92	I	152
— siehe Steinmann, G.			
Döll, E.: Der Meteorfall im Jeliza-Gebirge in Serbien am 1. December 1889. R.	91	I	48
— 1. Der Serpentin von St. Lorenzen bei Trieben im Paltenthale in Steiermark. 2. Quarz nach Epidot, eine neue Pseudomorphose. 3. Gold in Breunnerit von Pregratten. R.	94	I	438
Doelter, C.: Ueber die künstliche Darstellung und die chemische Constitution einiger Zeolithe. A.	*90*	*I*	*118*
— Ueber Glimmerbildung durch Zusammenschmelzen verschiedener Silicate mit Fluormetallen, sowie über einige weitere Silicatsynthesen. R.	90	II	34
— Allgemeine chemische Mineralogie. R.	91	II	225
— Neuere Arbeiten über Mineral-Synthese. R.	91	II	237
— Einige Versuche über die Löslichkeit der Mineralien. R.	92	I	503
— Edelsteinkunde. Bestimmung und Unterscheidung der Edelsteine und Schmucksteine. Die künstliche Darstellung der Edelsteine. R.	93	II	233
— Bericht über die geologische Durchforschung des Bacher Gebirges. R.	94	I	462
— *Ueber das chemische Verhalten einiger dimorpher Mineralien. A.*	*94*	*II*	*265*
Dokutschew, B.: Die Methoden zur Lösung der Frage, ob Südrussland jemals bewaldet war. R.	91	I	316
Dollfus, G.: Coquilles nouvelles ou mal connues du terrain tertiaire du Sud-Ouest. R.	90	I	157
— Recherches sur les ondulations des couches tertiaires dans le bassin de Paris. R.	91	I	307
— Relation stratigraphique de l'argile à silex. R.	93	I	132
— siehe Ramond, G.			
Dollfus, G. et G. Ramond: Le chemin de fer des Moulineaux. R.	91	II	328
Dollo, L.: Sur la signification du „Trochanter pendant“ des Dinosauriens. R.	90	I	345
— Encore un mot sur l'Aachenosaurus multidens G. Smets. R.	90	II	169
— Première note sur les Siréniens de Boom; résumé. R.	91	I	330
— De la necessité de rayer le Mosasaurus gracilis de la faune du Mastrichtien. R.	91	I	439
— Première Note sur les Mosasauriens de Mesvin. R.	91	II	157
— Sur la présence du Champsosaure dans le Heersien d'Orple-Gran. R.	91	II	347

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dollo, L., Première Note sur les Téléostéens du Bruxellien (Eocène moyen) de la Belgique. R.	1892	I	167
— Première Note sur les Mosasauriens de Maestricht. R.	92	I	414
— Sur le Lepidosteus suessoniensis. R.	93	II	194
— Nouvelle note sur le Champsosaure, Rhynchocéphalien adapté à la vie fluviatile. R.	94	I	184
— Sur l'origine de la nageoire caudale des Ichthyosaures. R.	94	I	185
— Sur la morphologie de la colonne vertébrale. R.	94	I	374
— Sur la morphologie des côtes. R.	94	I	501
Donnezan: Découverte du Mastodon Borsoni en Roussillon. R.	94	I	180
— siehe Depéret, Ch.			
Doss, Br.: Ein als erratischer Block am „Heller" bei Dresden gefundener Cordieritgneiss. R.	90	II	243
— Die Lamprophyre und Melaphyre des Plauen'schen Grundes bei Dresden. R.	91	II	62
— *Ueber den Meteoriten von Misshof in Kurland und die Ursachen der Schallphänomene bei Meteoritenfällen im Allgemeinen. (Mit Taf. II, III und 8 Holzschnitten.) A.*	*92*	*I*	*71*
— Note sur la matière colorante des calcaires noirs des Pyrénées. R.	93	II	245
— Ueber eine zufällige Bildung von Pseudobrookit, Hämatit und Anhydrit als Sublimationsproducte, und über die systematische Stellung des ersteren. R.	93	II	263
— *Künstliche Darstellung von Anatas und Rutil mittelst der Phosphorsalzperle. (Mit Taf. II.) A.*	*94*	*II*	*147*
Douvillé, H.: Etude sur les Caprines. R.	91	I	159
— Fossiles du Jurassique supérieur de Tunisie. R.	91	II	441
— Sur l'âge des couches traversées par le canal de Panama. R.	91	II	446
— Observations sur l'Hippurites striata et H. sulcata Defrance. R.	91	II	464
— Communication sur les Hippurites. R.	91	II	465
— Sur la classification des Ceratites de la Craie. R.	92	I	425
— Sur l'âge des couches traversées par le canal de Panama. R.	92	II	122
— Faune coralligène supérieure de l'Urgonien. R.	93	I	407
— Sur quelques Rudistes du terrain crétacé inférieur des Pyrénées. R.	93	I	407
— Quelques considérations sur la classification des Bélemnites. R.	93	II	413
— Sur la Tissotia Tissoti. R.	93	II	415
Drake, N. F.: Stratigraphy of the Triassic Formation in the Northwestern Texas. R.	94	I	139
Dreger, J.: Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens. R.	90	II	154
— Die Gastropoden von Häring bei Kirchbichl in Tirol. R.	92	II	461
— Ueber einige Versteinerungen der Kreide- und Tertiär-Formation von Corcha in Albanien. R.	94	II	123
Dreyer, F.: Beiträge zur Kenntniss der Foraminiferen des mittleren Lias vom grossen Seeberg bei Gotha. R.	92	I	463
Drude, P.: Ueber die Gesetze der Reflexion und Brechung des Lichtes an der Grenze absorbirender Krystalle. R.	90	I	2
— Beobachtungen über die Reflexion des Lichtes am Antimonglanz. R.	90	I	2
— Ueber die Absorption des Lichtes in monoklinen Krystallen. R.	90	I	2
— Ueber das Verhältniss der Cauchy'schen Theorie der Metallreflexion zu der Voigt'schen. R.	90	I	2

	Jahrg.	Bd.	Seite
Drude, P.: Ueber Oberflächenschichten. I. II. R. . .	1890	I	2
— Ueber die Reflexion des Lichtes an Kalkspath. R. . .	90	I	2
— Das Verhalten der Absorptionscoëfficienten von Krystallen. R.	92	II	208
— Bestimmung der optischen Constanten der Metalle. R.	92	II	391
— In wieweit genügen die bisherigen Lichttheorieen den Anforderungen der praktischen Physik? R.	93	II	458
— siehe Voigt, W.			
Drygalski, E. v.: Ueber Bewegungen der Continente zur Eiszeit und ihren Zusammenhang mit den Wärmeschwankungen in der Erdrinde. R.	90	II	235
— Ein typisches Fjordthal. R.	94	II	42
Duboin, A.: Sur la réproduction de la leucite. R. . . .	93	I	266
— Réproduction de la nephéline purement potassique. R.	94	II	13
Dubois, Eug.: De Klimaten der Voorwereld en de Geschiedenis der Zon. R.	92	I	57
— Voorloopig bericht omtrent het onderzoek naar de pleistocene en tertiaire vertebraten-fauna van Sumatra en Java, gedurende het jaar 1890. R.	93	I	377
— Die Klimate der Geologischen Vergangenheit und ihre Beziehung zur Entwicklungsgeschichte der Sonne. R.	94	II	49
Dudley, W. L.: A Curious Occurrence of Vivianite. R. .	94	I	48
Dufet, H.: Sur la variation de forme cristalline dans les mélanges isomorphes. R.	90	II	39
— Mesures comparatives de l'indice de différents Quartz. R.	91	I	211
— Sur la détermination de l'orientation optique et de la dispersion des axes dans les cristaux tricliniques. Application au bichromate de potasse. R.	92	I	12
— Mesures comparatives d'indices par le prisme et la réflexion totale. R.	93	I	8
Dumble, E. T.: Second Annual Report on the Geological Survey of Texas R.	92	II	283
— Notes on the Geology of the Valley of the Middle Rio Grande. R.	94	I	355
Dun, W. S.: Notes on the Teeth known as Sceparnodon Ramsayi Owen (Phascolonus gigas Lydekker). R. .	93	I	540
Duncan, P. M.: A Description of some New Species of Syringosphaeridae, with Remarks upon their Structures etc. R.	92	I	597
— A Revision of the Genera and great Groups of the Echinoidea. R.	92	II	156
Duncan, P. M. and W. Percey Sladen: Objections to the genera Pseudopygaulus Coquand, Trachyaster Pomel, and Ditremaster Munier-Chalmas: their species restored to Eolampas Dunc. & Sladen, and Hemiaster Desor. R.	90	I	362
— — On the Anatomy of the Perignathic Girdle and of other Parts of the Test of Discoidea cylindrica. R. .	92	I	447
— — A Note upon the Anatomy of the Perignathic Girdle of Discoidea cylindrica Lmk. sp. and of a species of Echinoconus. R.	92	I	447
Duncop, A.: On the Jersey Brick clay. R.	92	I	375
Dunn, E. J.: Notes on the Geological Formation of the Country east and west of Mitchellriver, Gippsland. R.	91	II	100
— Report on the Bendigo Gold-Field. Department of Mines. Victoria. Special Reports issued by A. W. Howitt. R.	94	I	81

	Jahrg.	Bd.	Seite
Dunn, E. J.: Notes on the Glacial Conglomerete, Wild Duck Creek. R.	1894	I	337
Duparc, L.: Recherches sur la nature des eaux et des vases du lac d'Annecy. R.	93	I	484
— siehe Delebecque, A.			
Duparc, L. et Baeff: Sur l'érosion et le transport dans les rivières torrentielles, ayant des affluents glaciaires. R.	93	I	60
Duparc, L. et L. Mrazec: Recherches sur la protogine du Mont-Blanc et sur quelques granulites filoniennes qui la traversent. R.	93	I	496
— — Sur quelques bombes volcaniques de l'Etna. R.	93	II	492
— — Note sur les roches amphiboliques du Mont-Blanc. R.	94	I	463
— — Sur un schiste à chloritoïde des Carpathes R.	94	II	256
— — Sur les eclogites du Mont Blanc. R.	94	II	424
— — Sur l'extrémité nord-est du massif du Mont Blanc. R.	94	II	425
Duparc, L. et E. Ritter: Les massifs cristallins de Beaufort et Cevins. R.	94	I	463
Dupont: Le gisement des Iguanodons de Bernissart. R.	94	II	449
Durègne: Sur la distinction de deux âges dans la formation des Dunes de Gascogne. R.	91	II	333
Düsing, C.: Das Ikositetraëder (112) als herrschende Form beim Pyrit. R.	90	I	17
— Ueber Baryte verschiedener Fundorte. R.	90	I	399
Dutton, Col. Edw.: Mount Taylor and the Zuni Plateau. R.	90	I	275
— The Charleston Earthquake of August 31, 1886. R.	92	II	54
— siehe Newcomb, S.			

E.

Eakins, L. G.: A New Stone Meteorite. R.	91	I	46
— Meteoric Iron from North Carolina. R.	91	I	242
— Two Sulphantimonites from Colorado. R.	91	II	50
— Stony Meteorite from Texas. R.	92	II	242
— Warrenite. R.	93	II	16
— New Analyses of Astrophyllite and Tscheffkinite. R.	94	I	56
— siehe Cross, Wh.			
Earle, Ch.: On a new Species of Palaeosyops. R.	92	II	141
— Preliminary Observations upon Palaeosyops and allied Genera. R.	92	II	141
Ebert, H.: Ein Vorlesungsversuch aus dem Gebiete der physikalischen Geographie (Bildung der Schlammvulcane und der Mondringgebirge). R.	91	II	54
Ebert, Th.: Ueber die Art des Vorkommens und die Verbreitung von Gervillia Murchisoni Geinitz im mittleren Buntsandstein. R.	90	II	407
— Die Echiniden des Nord- und Mitteldeutschen Oligocäns. R.	91	I	434
— Ueber ein neues Vorkommen mariner Versteinerungen in der Steinkohlenformation Oberschlesiens. R.	91	II	462
— Ueber Reste von Chitonen aus der Steinkohlenformation Oberschlesiens. R.	91	II	462
— Ueber einen neuen Aufschluss in der Steinkohlenformation Oberschlesiens. R.	91	II	462
— Prestwichia (Euproops) Scheeleana n. sp. R.	92	II	359
Ebner, V. v.: Ueber den feineren Bau der Skelettheile der Kalkschwämme nebst Bemerkungen über Kalkskelette überhaupt. R.	90	I	370

	Jahrg.	Bd.	Seite
Eck, H.: Ein monströser Sphaerocrinus. R.	1890	I	171
— Bericht über die Einsetzung der Erdbebencommission. R.	90	I	253
— Uebersicht über die in Württemberg und Hohenzollern in der Zeit vom 1. Januar 1867 bis zum 28. Februar 1887 wahrgenommenen Erderschütterungen. R. . .	90	I	253
— *Zur Gliederung des unteren Muschelkalks am Odenwalde. B.*	*90*	*I*	*102*
— Ueber die Verbreitung der Crinoidenschichten im Muschelkalk Vorarlbergs. R.	91	I	117
— *Mastodon aff. longirostris Kaup von Lahr. B.* . . .	*92*	*I*	*151*
— Bemerkungen über geognostische Profile längs württembergischer Eisenbahnen. R.	92	II	85
— Verzeichniss der mineralogischen, geognostischen, urgeschichtlichen und balneographischen Literatur von Baden, Württemberg, Hohenzollern und einigen angrenzenden Gegenden. R.	93	I	267
— Bemerkungen über v. Sandberger's Abhandlung „Ueber Steinkohlenformation und Rothliegendes im Schwarzwald und deren Floren". R.	93	II	132
— Notiz über das Bohrloch bei Sulz. R.	93	II	522
— Das Bohrloch bei Sulz betreffend. R.	93	II	522
— Schwerspath mit Zwillingslamellen von Schenkenzell im Schwarzwald. R.	94	I	50
— Zur Literatur über Rüdersdorf und Umgegend. R. . .	94	I	480
— Das Erdbeben in der Gegend zwischen Strassburg, Forbach, Haslach, Kenzingen, Erstein und Westhofen am 11. Juni 1887. R.	94	II	247
Eck, H. und E. Hammer: Beitrag zur Kenntniss des Erdbebens vom 28. Nov. 1886 abends etwa um 11 Uhr. R.	90	I	253
Eckert, H.: Physiognomisch und geologisch interessante Landschaftsbilder aus Böhmen. R.	94	II	34
Eckerth, W.: Der Monte Cristallo. R.	90	II	392
Eckstein, K.: Thierische Haareinschlüsse im baltischen Bernstein. R.	91	II	340
Egger, J. G.: Foraminiferen aus Meeresgrundproben, gelothet von 1874—1876 von S. M. Sch. „Gazelle". R.	94	II	367
Egleston, T.: Catalogue of Minerals and Synonyms alphabetically arranged for the use of Museums. R. . .	91	II	41
Ehemann: Das Mammuth und die Fluth. R.	94	II	339
Ehrenberg, A.: Das Erzvorkommen von Rudnik in Serbien. R.	90	II	74
Eichhorn: Die Zinkerzlager bei Iserlohn. R.	90	I	257
Eichleiter, F.: Ueber die chemische Zusammensetzung einiger Gesteine von der Halbinsel Kola. R. . . .	94	I	464
Eichstädt: Bemerkungen über die jüngsten obersilurischen Ablagerungen Schonens. R.	91	II	311
Eigel, Fr.: Ueber einige Eruptivgesteine der Capverden. R.	91	I	401
Elich, E.: Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere von Atacatzo bis zum Iliniza. R.	94	I	465
Ells, R. W.: Second Report on the Geology of a Portion of the Province of Quebec. R. . . . 1890 II 383	91	II	91
— Report on the Mineral Resources of the Province of Quebec. R.	93	I	261
— The Stratigraphy of the „Quebec Group". R. 1892 II 97	93	I	333
Elster, J. und H. Geitel: Ueber die durch Sonnenlicht bewirkte elektrische Zerstreuung von mineralischen Oberflächen. R.	93	II	6

	Jahrg.	Bd.	Seite
Elterlein, A. von: Ein neues Tiroler Kalkspath-Vorkommen. R.	1892	I	235
Emerson, B. K.: On the Triassic of Massachusetts. R.	93	II	527
— A Description of the Bernardston Series of Metamorphic Upper Devonian rocks. R.	94	I	124
Emery, O.: Le formiche dell' Ambra siciliana nel Museo Mineralogico dell' Università di Bologna. R.	94	II	469
Emmons, Hamilton: Hebung der Insel Palmarola. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*92*	*II*	*83*
— The Petrography of the Island of Capraja. R.	94	II	428
Emmons, S. F.: Notes on the Geology of Butte, Montana. R.	91	I	100
— Geology and Mining Industry of Leadville, Colorado. R.	92	I	87
— Orographic Movements in the Rocky Mountains. R.	93	II	483
Endriss, K.: Geologie des Randecker Maars und des Schopflocher Riedes. R.	90	II	255
Engel: Palaeontologische Funde aus dem Lias δ des Filsbetts bei Eislingen. R.	91	I	297
— Bemerkungen zu etlichen Typen aus Quenstedt's „Ammoniten des schwäbischen Jura". R.	93	I	536
— Ueber die Lagerungsverhältnisse des Oberen Weissen Jura (Weiss-Jura ε und ζ) in Württemberg. R.	94	II	316
Engel, R.: Sur deux nouveaux états du soufre. R.	92	II	9
Engelhardt, H.: Ueber Tertiärpflanzen von Grünberg in Schlesien aus dem Provinzialmuseum zu Königsberg in Preussen. R.	92	II	376
— Ueber Kreidepflanzen von Niederschöna. R.	93	I	575
— Fossile Pflanzen aus tertiären Tuffen Niederböhmens. R.	93	II	430
— Ueber die Flora der über den Braunkohlen befindlichen Tertiärschichten von Dux. Ein neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Pflanzen Nordböhmens. R.	93	II	431
— Ueber Tertiärpflanzen von Chile. R.	93	II	433
English, Geo. L. & Co.: Catalogue of minerals for sale by Geo. L. English & Co. 15. Aufl. R.	91	II	229
Erba, Luigi dell': Sulla sanidinite sodalito-piroxenica di Sant' Elmo. R.	92	I	72
— Considerazioni sulla genesi del Piperno. R.	93	II	51
Erdmann, E.: Några uppgifter om meteorer sedda i Sverige åren 1846—1869. R.	90	I	43
Ernst, A.: Die mineralogischen Bodenschätze des Donetzgebietes in Südrussland. R. 1894 I 469	94	II	414
Etheridge jr., R.: On Additional Evidence of the Occurrence of Plesiosaurus in the Mesozoic Rocks of Queensland. R.	90	II	326
— On Additional Evidence of the Genus Ichthyosaurus in the Mesozoic Rocks („Rolling Down's Formation") of North-eastern Australia. R.	90	II	326
— On some Australian Species of the Family Archaeocyathinae. R.	91	II	200
— On the Occurrence of the Genus Meiolania in the Pliocene Deep Leap, near Gulgong. R.	92	I	162
— On the Occurrence of the Genus Turrilepas H Woodw., and Annelid Jaws in the Upper Silurian (? Wenlock) Rocks of New South Wales. R.	92	I	176
— Our Present Knowledge of the Palaeontology of New Guinea. R.	92	I	177

	Jahrg.	Bd.	Seite
Etheridge jr., R.: On the Occurrence of the Genus Tryplasma Lonsd. (Pholidophyllum Lindstr.) and another Coral apparently referable to Diphyphyllum Lonsd. in the Upper Silurian and Devonian Rocks respectively of N. S. Wales. R.	1892	I	186
— Fossils of the British Islands, stratigraphically and zoologically arranged. R.	92	I	557
— Remarks on Fossils of Permo-Carboniferous Age, from North-Western Australia, in the Macleay Museum. R.	93	II	129
— Hymenocaris Salteri M'Coy. R.	93	II	196
— Notes made at the Kybean Caves, Parish of Throsby, County of Beresford etc. R.	93	II	498
— The Caves at Goodravale, Goodrabigbu River. R.	93	II	499
— Description of two undescribed Univalves from the Carboniferous Rocks of New South Wales. R.	94	I	516
— On the Occurrence of a Coral intermediate in Structure between the genera Lonsdaleia and Spongophyllum in the Upper (?) Palaeozoic Rocks of New South Wales. R.	94	II	184
— Note on the Occurrence of Fish-remains in the Rocks of the Drummond Range, Central Queensland. R.	94	II	309
— Description of four Madreporaria species of the genera Phillipsastrea, Heliophyllum und Cyathophyllum. R.	94	II	364
— The Pentameridae of New South Wales. R.	94	II	440
Etheridge jr., R. and A. S. Oliff: The Mesozoic and Tertiary Insects of New South Wales. R.	91	II	356
Etheridge jr., R. and H. Willet: On the Dentition of Lepidotus maximus Wagner, as illustrated by Specimens from the Kimmeridge Clay of Shotover Hill, near Oxford. R.	92	I	420
Etheridge jr., R., Woodward and Jones: Eighth Report of the Committee on the Fossil Phyllopoda of the Palaeozoic Rocks. R.	92	I	422
Ettingshausen, C. von: Die fossile Flora von Schönegg bei Wies in Steiermark. II. Theil, enthaltend die Gamopetalen. R.	93	I	431
I. Theil, enthaltend die Kryptogamen, Gymnospermen, Monokotyledonen und Apetalen. R.	94	I	530
— Ueber fossile Banksia-Arten und ihre Beziehungen zu den lebenden. R.	93	I	436
— Ueber tertiäre Fagus-Arten der südlichen Hemisphäre. R.	93	II	435
— Contributions to the Tertiary Flora of Australia. Part. I, II. R.	94	I	231
Ettingshausen, C. von, und Standfast: Ueber Myrica lignitum Ung. und ihre Beziehungen zu den lebenden Myrica-Arten. R.	92	II	377
Evans, J. W.: The Geology of the North-East of Caithness. R.	93	I	511

F.

Fabre, G.: Le Permien dans l'Aveyron, La Lozère, le Gard et l'Ardêche. R.	91	II	439
Fabrini, E.: I Machairodus del Valdarno Superiore. R.	91	I	423
— Su alcuni felini del plioceno italiano. R.	93	I	540
Fack, M. W.: Das Brodtener Ufer. R.	92	II	317

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fairbanks, H. W.: Notes on the Occurrence of Rubellite and Lepidolithe in Southern California. R. . . .	1894	I	43
Fallot, E.: Limite entre le Miocène et l'Oligocène dans la Gironde. R.	90	I	121
— Esquisse géologique du département de la Gironde. R.	90	I	456
— Note sur l'Aquitanien dans la vallée du Gua-Mort, aux environs du Saint-Morillon et de Cabanac. R. 1891 I 122	94	II	455
— Note sur la constitution du terrain crétacé aux environs de Crest. R.	91	II	441
— Sur la classification du Néogène inférieur. R. . . .	94	I	357
— Quelques observations sur la crétacé supérieur dans l'intérieur du bassin de l'Aquitaine, et ses relations avec les terrains tertiaires. R.	94	I	490
— Quelques remarques à propos d'une note de Potier et Vasseur sur les sables du Périgort. R.	94	II	452
Fallot et L. Reyt: Observations sur le Crétacé de Roquefort et ses relations avec quelques assises tertiaires affleurant dans cette localité. R.	92	I	551
Farrington, O. C.: On Crystallized Azurite from Arizona. R.	94	I	23
— The Chemical Composition of Jolite (Cordierit). R. . .	94	I	435
Faussek, W.: Materialien zur Frage über das Zurücktreten des Ufers des Weissen Meeres. R.	94	I	64
Favre, E. et H. Schardt: Revue géologique suisse pour l'année 1888. R. . . . . 1890 II 76	91	II	57
année 1889. R.	91	II	57
année 1890. R.	93	I	47
année 1892. R.	94	I	452
Faye: Note sur la période glaciaire. R.	91	I	130
— Sur l'hypothèse du sphériode et sur la formation de la croûte terrestre. R.	92	II	40
Fayol: Théorie des deltas et histoire de la formation du bassin houiller de Commentry. R.	91	II	284
Fedorow, E. v.: Gonoëdrische demonstrative Apparate in Anwendung auf die Krystallographie. (Mit Taf. II.) A.	*90*	*I*	*234*
— Essai d'exprimer brèvement les symboles de toutes les directions égales d'une certaine section du système de symétrie. R.	90	I	16
— Studien über analytische Krystallographie. 4. Studie. System der krystallographischen Rechnung, auf die projectivischen Eigenschaften der Krystalle gegründet. R.	90	I	17
— Neue geologische Beobachtungen am Nord-Ural. R. .	91	I	316
— *Ueber seine beiden Werke: 1. Die Symmetrie der endlichen Figuren. 2. Die Symmetrie der regelmässigen Systeme der Figuren. B.*	*91*	*I*	*113*
— *Ueber eine merkwürdige Eigenschaft des Anorthit. B.*	*92*	*II*	*68*
— *Mikroskopische Beobachtungen bei paralleler Lage der Nicols. B.*	*92*	*II*	*69*
— Ueber den Fortschritt der theoretischen Krystallographie im Lauf der letzten 10 Jahre. R.	93	I	7
— Ueber ein neues von ihm erfundenes Goniometer. R. .	93	I	7
— Ueber die Theorie der mechanischen Deformationen der Krystalle. R.	93	I	7
— *Ueber Universalgoniometer. B.*	*93*	*II*	*69*
— Handbuch der Krystallographie. I. Theil. R.	93	II	235
— Erster Versuch, um die Anordnung der Partikel in gewissen Mineralien zu bestimmen. R.	93	II	235

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fedorow, E. v.: Ueber einen Versuch, die Anordnung der Partikel in gewissen Mineralien zu bestimmen. R.	1893	II	235
— Zusammenstellung der krystallographischen Resultate des Herrn Schönflies und der meinigen. R.	93	II	236
— Auflösung einiger Aufgaben der stereographischen Projection. R.	93	II	239
— *Noch ein Wort über den Satz, nach welchem Symmetrieaxen immer mögliche Krystallkanten sein sollen. B.*	*94*	*I*	*199*
— *Minimumproblem in der Lehre von der Symmetrie. (Mit 4 Holzschnitten.) A.*	*94*	*I*	*56*
— *Erwiderung auf die Bemerkungen zu E. v. Fedorow's Elementen der Gestaltenlehre von Edmund Hess. B.*	*94*	*II*	*86*
— Symmetrie in einer Ebene. R.	94	II	209
— Symmetrie der regulären Systeme der Figuren. R.	94	II	209
— Universal- (Theodolith-) Methode in der Mineralogie und Petrographie. I. Universalgeometrische Untersuchungen. R.	94	II	215
Feistmantel, O.: Ueber die geologischen und palaeontologischen Verhältnisse des Gondwána-Systems in Tasmanien und Vergleichung mit andern Ländern, nebst einem systematischen Verzeichniss der im australischen Gondwána-System vorkommenden Arten. R.	90	I	177
— Einige Zusätze und Correcturen zu meinem Aufsatze „Ueber die geologischen und palaeontologischen Verhältnisse des Gondwána-Systems in Tasmanien". R.	90	I	178
— Ueber die bis jetzt geologisch ältesten Dikotyledonen. R.	90	I	178
Feit, W.: Ueber Kaliborit, ein neues Borsäuremineral. R.	91	I	237
Felgentraeger, W.: Die längste nachweisbare säculare Periode der erdmagnetischen Elemente. Theil 1: Declination. R.	93	I	68
Felix, J.: Beiträge zur Kenntniss der Gattung Protosphyraena Leidy. R.	93	II	193
Felix, J. und H. Lenk: Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Republik Mexico. I. Theil. R.	90	II	272
III. Theil. R.	92	II	107
— — Ueber die tektonischen Verhältnisse der Republik Mexico. R.	93	II	348
Fellner, A.: Die Welser Gasbrunnen. R.	93	II	352
Ferrier, W. F.: On Harmotome from the Vicinity of Port Arthur, Ontario. R.	94	I	47
Fesca, M.: Abhandlungen und Erläuterungen zur agronomischen Karte der Provinz Kai. R.	90	I	132
Ficheur, E.: Crétacé moyen et supérieur de la région d'Aïn-Bessem. R.	91	II	327
— Note sur les Nummulites de l'Algérie. 1. Num. de l'éocène inférieur. 2. Num. de l'éocène moyen et supérieur. R.	91	II	372
— Note sur l'extension des atterrissements miocènes de Bordj-Bouïra (Alger). R.	92	II	439
— Sur la situation des couches à Terebratula diphya dans l'Oxfordien supérieur, à l'Ouarsensis. R.	94	I	142
— Sur les terrains crétacés du massif du Bou-Thaleb. R.	94	I	489
Fiedler, C.: Ueber Verwitterungsvorgänge bei krystallinischen und Sedimentärgesteinen. R.	91	II	305
Filhol: Observations concernant la structure de la tête de l'Anthracotherium minimum Cuv. R.	92	II	332

	Jahrg.	Bd.	Seite
Filhol: Observations relatives à la tubérosité qu'on observe sur certains maxillaires d'Anthracotherium magnum Cuv. R.	1892	II	332
— Études sur les mammifères fossiles de Sansan. R.	93	II	182
Finkelstein, H.: Ueber ein Vorkommen der Opalinus- (und Murchisonae?-) Zone im westlichen Südtirol. R.	91	II	321
— siehe Böse, E.			
Firket, Ad.: Minéraux artificiels pyrogènes: Fayalite. R. 1891 II 8	94	II	409
— Limon fossilifère quaternaire dans la vallée de la Meuse. R.	91	II	447
Firtsch, Georg: Rumpfit, ein neues Mineral. R.	92	I	31
Fischer, Ed., siehe Baltzer, A.			
Fischer, P.: Sur deux espèces de Lepas fossiles du Miocène des environs de Bordeaux. R.	90	II	330
— Communication sur le genre Ammonoceras. R.	91	II	360
Fischer-Benzon, R. v.: Die Moore der Provinz Schleswig-Holstein. R.	92	II	130
Fisher, Osmond: On the Mean Height of the Surface-Elevations, and other Quantitative Results of the Contraction of a Solid Globe through Cooling; regard being paid to the existence of a level of no strain, as lately announced by Mr. T. Mellard Reade and Mr. C. Davison. R.	90	I	251
— On Secular Straining of the Earth. R.	90	II	390
— Physics of the Earth's Crust. 2. Edit. R.	91	II	419
— Rigidity not to be relied on in estimating the Earth' Age. R.	94	II	241
Flach, K.: Ueber zwei fossile Silphiden (Coleoptera) aus den Phosphoriten von Caylux. R.	92	I	176
Flamand, G., siehe Curie, J.			
Fleischl, E. v. Marxow: Ueber die zweckmässige Herstellung monochromatischen Lichtes. R.	91	I	199
Fletcher, L.: On the Meteorites which have been found in the Desert of Atacama and its neighbourhood. R.	90	II	230
— On the supposed Fall of a Meteoric Stone at Chartres, Eure-et-Loire, France, in September 1810. R.	90	II	59
— On Crystals of Percylite, Caracolite and an Oxychloride of Lead (Daviesite), from Mina Beatriz, Sierra Gorda, Atacama, South America. R.	91	I	229
— The Meteoric Iron of Tucson. R.	91	I	242
— On the Mexican Meteorites, with especial Regard to the supposed Occurrence of wide-spread Meteoritic Showers. R.	91	II	239
Fliche: Sur les bois silicifiés de la Tunisie. R.	90	II	96
— siehe Mieg, M.			
Flink, Gust.: Mineralogische Notizen (Neue Serie). R.	90	I	22
— Ueber Pinakiolith und Trimerit, zwei neue Mineralien aus den Mangangruben Schwedens. R.	92	I	23
— Manganophyll von Långban. R.	92	II	232
— Ueber die Krystallform und Zwillingsbildung des Skolezit von Island. R.	94	II	226
Flink, Gust. und Axel Hamberg: Ueber krystallisirten Sarkinit (Polvarsenit) von der Harstigsgrube bei Paisberg. R.	90	I	410
Flot: Description de deux oiseaux nouveaux du gyps parisien. R.	92	II	148
Flower, W. H. and R. Lydekker: An Introduction to the Study of Mammals, living and extinct. R.	92	II	449
Floyer, E. A.: Notes on the Geology of the Northern Etbai. R.	94	I	328

	Jahrg.	Bd.	Seite
Flug, K.: Chemische Untersuchung der neuen Varietät des Aluminit. R.	1890	I	18
Flutcher, W.: On Vulcano and Stromboli. R.	92	I	57
Fock, A.: Beiträge zur Kenntniss der Beziehungen zwischen Krystallform und chemischer Zusammensetzung. R.	93	II	459
Foerste, A. W.: On the Clinton Oolitic Iron-Ores. R.	94	I	90
— siehe Shaler, N. S.			
Förster, B.: Vorläufige Mittheilung über die Insecten des plattigen Steinmergels von Brunnstatt. R.	91	II	356
— Geologischer Führer für die Umgebung von Mülhausen im Elsass. R.	93	I	364
— Die Insecten des plattigen Steinmergels von Brunnstatt. R.	93	II	412
— Uebersicht über die Gliederung der Geröll- und Lössablagerungen des Sundgaus. R.	94	I	312
Förster, B. und H. Becker: Ueber Schildkrötenreste aus dem Unteroligocän des Sundgaues. R. 1890 I 141	93	II	545
Förstner, H.: Ueber die Feldspäthe von Pantelleria. R.	93	II	21
— Das Gestein der 1891 bei Pantelleria entstandenen Vulcaninsel und seine Beziehungen zu den jüngsten Eruptivgesteinen der Nachbarschaft. R.	93	II	58
Folin, de: Sur la formation des roches nummulitiques. R.	90	II	306
Follmann, O.: Ueber die unterdevonischen Schichten von Coblenz. R.	92	I	114
Fontaine, W. M. and F. H. Knowlton: Notes on Triassic Plants from New Mexico. R.	93	II	218
Foord, Arthur H.: Catalogue of the Fossil Cephalopoda in the British Museum.			
Part I. Containing part of the Suborder Nautiloidea, consisting of the Families Orthoceratidae, Endoceratidae, Actinoceratidae, Gomphoceratidae, Ascoceratidae, Poterioceratidae, Cyrtoceratidae and Supplement. R.	90	I	354
Part II. Containing the Remainder of the Suborder Nautiloidea, consisting of the Families Lituitidae, Trochoceratidae and Nautilidae, with a Supplement. R.	92	I	427
— Note on the Deciduous Septa of Ascoceras Murchisoni Barrande. R.	91	II	357
Foord, Arthur H. and G. C. Crick: On the Muscular Impressions of some Species of Carboniferous and Jurassic Nautiloids compared with those of the recent Nautilus. R.	91	I	336
— — On the Muscular Impressions of Coelonautilus cariniferus J. de Sowerby sp., compared with those of the recent Nautilus. R.	92	II	152
— — On some new and imperfectly-defined Species of Jurassic, Cretaceous, and Tertiary Nautili contained in the British Museum. R.	92	II	152
— — A Revision of the Group of Nautilus elegans J. Sow. R.	93	I	401
— — Note on the Identity of Nautilus neocomiensis Sharpe (non d'Orbigny) with Nautilus Deslongchampsianus d'Orb. R.	93	I	552
— — On a New Species of Discites (Discites hibernicus) from the Lower Carboniferous Limestone of Ireland. R.	94	II	167
Foote, A. E.: A New Locality for Meteoric Iron with a Preliminary Notice of the Discovery of Diamonds in the Iron. R.	92	I	513

	Jahrg.	Bd.	Seite
Foote, A. E.: A New Meteoric Iron from Garrett Co., Maryland. R.	1892	II	244
— Preliminary Notice of a Meteoric Stone seen to fall at Bath, South Dakota. R.	94	I	274
Forchheimer, Ph.: Versuche über Gleitflächenbildung und Schichtenfaltung. (Mit Taf. VIII.) B.	93	I	137
Ford, S. W.: Notes on Fossils from Quebec. R.	91	II	438
Forel, F. A.: Les variations périodiques des glaciers des Alpes. R.	93	I	376
— L'avalanche du glacier des Têtes Rousses. Catastrophe de St. Gervais les Bains. R.	94	I	285
Foresti, L.: Del genere Pyxis Meneghini e di una varietà di Pyxis pyxidata Br. R.	90	II	152
— Sepia Bertii For. R.	91	II	360
Forir, H.: Contribution à l'étude du Système crétacé de la Belgique. IV. Troisième note sur des Poissons et Crustacés nouveaux ou peu connus. R.	91	I	153
— Relations entre l'étage Landenien Belge, et les couches inférieures du système Eocène du bassin de Paris d'après M. Gosselet et von Koenen. R.	92	II	111
— Sur l'existence du sable blanc, tongrien inférieur (?) des argiles à silex et du sable hervien à Beaufays. R.	92	II	112
— Note sur un gisement de bois fossile à Beaumont. R.	92	II	112
— Sur une facies remarquable de l'assise de Herve au S. au S.—W. et à l'E. de Henri Chapelle. R.	93	I	128
— Sur une facies remarquable de l'assise de Herve (Sénonien moyen d'Orb.) au S., au SW., et à l'E. de Henri Chapelle. R.	94	I	146
— Quelques particularités remarquables de la planchette de Herve. Roches crétacées, argiles à silex, phosphate de chaux, sable et argiles tertiaires. R.	94	I	146
— Sur des cristaux d'albite de Revin. R.	94	II	407
Fornasini, C.: Tavola palaeo-protistographica. R.	92	I	600
— Il Nautilus obliquatus di Batsch. R.	92	I	600
— Di alcune Textularie plioceniche del Senese. R.	93	I	203
— Contributo alla conoscenza della Microfauna terziaria Italiana. I—III. R.	1894	II	184. 185
— Contributo alla conoscenza della microfauna terziaria italiana. Foraminiferi delle marne messinesi, coll. G. Seguenza. R.	94	II	477
— Contributo alla conoscenza della microfauna terziaria italiana. Foraminiferi delle marne messinesi, collezioni O. G. Costa e G. Seguenza. R.	94	II	478
Foshay, P. M. and R. R. Hice: Glacial Grooves at the Southern Margin of the Drift. R.	93	I	141
Foullon, H. von: Ueber korundführenden Quarzporphyr von Teplitz. R.	90	I	61
— Ueber Granititeinschlüsse im Basalt vom Rollberge bei Niemes in Böhmen. R.	90	I	65
— Ueber Quarzglimmerdioritporphyrite aus dem östlichen Kärnten. R.	90	II	258
— Ueber den Prehnit aus dem Floitenthale. R.	90	II	379
— Ueber Antimonit und Schwefel von Allehar. R.	92	I	510
— Ueber krystallinische Gesteine aus dem Baba-Dagh im nordöstlichen Karien in Klein-Asien. R.	92	II	292
— Ueber Goldgewinnungsstätten der Alten in Bosnien. R.	93	II	349

	Jahrg.	Bd.	Seite
Foullon, H. von: Ueber Gesteine und Minerale von der Insel Rhodus. R.	1894	I	73
— Mineralogische Notizen. R.	94	II	32
— Ueber einige Nickelerzvorkommen. R.	94	II	62
Fouqué, F.: Etude d'une météorite de la chute de Beuste. R.	90	I	42
— Sur le bleu égyptien ou vestorien. R.	90	II	40
— Sur une coulée de verre fondu provenant de la perforation accidentelle d'un fourneau de verrerie. R. 1890 II 381	91	I	62
— Revision de quelques minéraux de Santorin. R.	91	II	414
— Sur un mica foncé à axes écartés du Mont-Dore: modifications qu'il éprouve sous l'action de l'acide chlorhydrique bouillant. R.	94	II	26
Fouqué, F. et A. Michel-Levy: Reproduction artificielle d'un trachyte micacé. R.	92	II	270
Fox, Howard: On the Occurrence of an Aluminous Serpentine (Pseudophyte) with Flintlike Appearance near Kynance Cove. R.	94	I	37
Fox, H. and J. J. H. Teall: On a Radiolarian Chert from Mullion Island. With a note on the Radiolaria by G. J. Hinde. R.	94	II	186
— — On some Coast Sections at the Lizard. R.	94	II	260
Fox-Strangways, C.: The Jurassic Rocks of Britain. Vol. I. II. R.	94	II	108
Fournier, G.: Note préliminaire sur l'existence de la Faune de Waulsort dans les étages viséen et tournaisien du calcaire carbonifère. R.	94	I	478
Fraas, E.: Loliginites (Geotheutis) Zitteli Eb. Fraas. Ein vollständig erhaltener Dibranchiate aus den Laibsteinen des Lias ε. R.	90	I	469
— Ueber die Finne von Ichthyosaurus. R.	90	I	348
— Kopfstacheln von Hybodus und Acrodus, sog. Ceratodus heteromorphus Ag. R.	90	II	144
— Die Labyrinthodonten der schwäbischen Trias. R.	91	II	158
— Das Wendelsteingebiet. R.	92	II	90
— *Ueber einen neuen Fund von Ichthyosaurus in Württemberg. (Mit 2 Holzschnitten.) B.*	*92*	*II*	*87*
— Die Ichthyosaurier der süddeutschen Trias- und Jura-Ablagerungen. R.	93	I	166
— Ichthyosaurus numismalis E. Fraas. R.	93	I	170
— Das Bohrloch von Sulz am Neckar. R.	93	II	133
— Scenerie der Alpen. R.	93	II	506
— Die Irpfelhöhle im Brenzthale (Württemberg). R.	94	I	504
Fraas, O.: Ueber Grenzlinien in der Trias. R.	91	II	317
— Ueber den Basalt des Eisenrüttels. R.	92	II	250
— Riesenammoniten. R.	93	I	401
Fraipont, J.: Une lingule nouvelle du calcaire carbonifère de Visé. R.	92	I	590
— Une nouvelle Discine du calcaire carbonifère inférieur. R.	92	I	590
— Sur les affinités des genres Favosites, Emmonsia, Pleurodictyum et Michelinia. R.	93	I	415
Franchi, S.: Anomalie della declinazione magnetica in rapporto con grandi masse serpentinose. R.	92	II	44
— Il Giuraliasico ed il Cretaceo nei dintorni di Tenda, Briga Marittima e Triora nelle Alpi Marittime. R.	92	II	301
Franck, A.: Notice cristallographique sur la monazite de Nil-Saint-Vincent. R.	92	II	403

	Jahrg.	Bd.	Seite
Francke, Hugo: Zur Literatur über das Muttergestein des Datoliths von Theiss in Tirol. B.	*1891*	*I*	*102*
Franco, P.: Quale fu la causa che demoli la parte meridionale del Cratere del Somma. R.	92	II	48
— Sull' analcime del monte Somma. R.	94	I	45
Frantzen, W.: Ueber die Gliederung des unteren Muschelkalkes in einem Theile von Thüringen und Hessen und über die Natur der Oolithkörner in diesen Gebirgsschichten. R.	90	I	297
— Ueber Gervillia Goldfussi v. Stromb. R.	90	I	360
— Beiträge zur Kenntniss der Schichten des Buntsandsteins und der tertiären Ablagerungen am Nordrand des Spessarts. R.	90	II	407
— Untersuchungen über die Gliederung des unteren Muschelkalkes im nordöstlichen Westfalen und im südwestlichen Hannover. R.	91	I	116
— Bemerkungen über die Schichten des oberen Muschelkalkes und des unteren Keupers in dem Bereich der Messtischblätter Eisenach, Creuzburg und Berka. R.	94	I	480
Frantzen, W. und A. v. Koenen: Ueber die Gliederung des Wellenkalks im mittleren und nordwestlichen Deutschland. R.	91	I	116
Franzenau, A.: Pleiona n. gen. unter den Foraminiferen und über Chilostomella eximia n. sp. R.	90	II	343
— Die Foraminiferenfauna des Mergels neben dem Buda-Eörser-Weg. R.	91	I	165
— Die fossilen Foraminiferen Bujturs. R.	92	I	189
— Der Tegel von Romhány. R.	93	I	527
— Ueber den grossen Freigoldfund aus der Umgebung von Brád. R.	94	I	252
— Semseya, eine neue Gattung aus der Ordnung der Foraminiferen. R.	94	II	475
— Fossile Foraminiferen von Markuševec aus der Umgebung Agrams. R.	94	II	476
— Fossile Foraminiferen von Markuševec in Kroatien. R.	94	II	476
Fraser, P.: Archean Characters of the Rocks of the Nucleal Ranges of the Antilles. R.	91	I	103
Frech, Fr.: Ueber das rheinische Unterdevon und die Stellung des „Hercyn". R.	90	I	433
— Das französische Centralplateau, eine Skizze seiner geologischen Entwicklung. R.	90	II	77
— Ueber das Devon der Ostalpen. II. R.	92	II	297
— Die Korallenfauna der Trias, monographisch bearbeitet. I. Die Korallen der juvavischen Triasprovinz (Zlambachschichten, Hallstätter Kalke, Rhät). R.	93	I	191
— Die devonischen Aviculiden Deutschlands. Ein Beitrag zur Systematik und Stammesgeschichte der Zweischaler. R.	93	I	402
— Aus den karnischen Alpen. R.	94	II	81
Freda, Giovanni: Chemische Zusammensetzung der Salzsublimationen vom Vesuv. R.	90	II	374
— Sulle masse trachitiche rinvenute nei recenti trafori delle colline di Napoli. R.	92	II	254
Fredholm, K. A.: Bergarter och malmer i Luossavaara och Kierunavaara. R.	93	II	64
— Gesteine und Erze in Luossavaara und Kierunavaara. R.	93	II	270

	Jahrg.	Bd.	Seite
Fredholm, K. A.: Nya bidrag till kännedomen om de glaciala företeelserna i Norrbotten. R.	1893	II	536
Frémy, E.: Synthèse du rubis. R.	94	I	11
Frenzel, A.: Whewellit von Zwickau. R.	90	II	221
— Mineralogisches: 13. Sideronatrit. 14. Hohmannit. 15. Quetenit. 16. Gordait. 17. Sonstige Vorkommnisse. R.	91	II	19
— *Ueber den Kylindrit. A.*	*93*	*II*	*125*
— siehe Arzruni, A.			
Freshfield, Douglas W.: A Note on the Conservative Action of Glaciers. R.	90	I	128
Friedel, Ch.: Sur la forme cristalline et sur les propriétés optiques de la nouvelle variété cristallisée de soufre de M. Engel. R.	92	II	9
— Sur la nesquehonite. R.	92	II	403
— Sur une pyrite épigène renfermant du soufre. R.	93	II	246
— Sur le fer météorique de Cañon Diablo. R.	94	1	447
— Sur des cristaux de soufre contenus dans une pyrite épigène. R.	94	I	251
Friedel, Ch. et G. Friedel: Actions des alcalis et des silicates alcalins sur le mica: production de la néphéline, de l'amphigène et de l'orthose. R.	91	I	240
Friedel, G.: Sur la Mélanophlogite. R.	91	I	201
— Sur une serpentine du Brewster (New York). R.	92	II	217
— Sur la Mélanophlogite. R.	93	I	26
— Sur une nouvelle publication relative à la Mélanophlogite. R.	93	I	27
— Production du corindon et du diaspore par voie humide et alcaline. R.	94	I	12
— Production artificielle de la brucite. R.	94	I	13
— Sur un procédé de mesure des biréfringences. R.	94	II	211
Fritsch, Ant.: Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens.			
Bd. II. Heft 3. Die Lurchfische, Dipnoi. R.	90	I	349
Bd. II. Selachii. R.	91	II	166
Bd. III. Heft 1. Selachii (Pleuracanthus, Xenacanthus). R.	91	II	168
— Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. IV. Die Teplitzer Schichten. R.	91	I	301
— Ueber die Brustflosse von Xenacanthus Decheni Goldf. R.	91	II	163
Fritsch, K. v.: Allgemeine Geologie. R.	90	I	415
— Das Saalthal zwischen Wettin und Cönnern. R.	91	I	287
— Erläuterungen zu dem gemauerten geologischen Profil im Garten des landwirthschaftlichen Instituts der Universität Halle. R.	92	II	247
Fromm, Otto: Petrographische Untersuchungen von Basalten aus der Gegend von Cassel. R.	92	I	277
Fromme, Joh.: Eukairit aus Argentinien. R.	91	I	24
Frossard, Ch. L.: Dipyre de la Serre de Pouzac. R.	90	I	214
— Sur les roches éruptives de Pouzac, Hautes-Pyrénées. R.	90	II	80
— Sur les roches métamorphiques de Pouzac. R.	91	I	265
— Sur le dipyre et la couséranite des Pyrénées. R.	91	II	29
— Sur les terrains éruptifs de Pouzac, Hautes-Pyrénées. R.	91	II	287
— Gisements de dipyre dans les Pyrénées françaises. R.	92	I	513
Frosterus, B.: Några iakttagelser angående skiktade moräner samt rullstens-åsar. R.	92	I	378
— Beskrifning till Kartbladet No. 21: Mariehamn. R.	93	II	96

	Jahrg.	Bd.	Seite
Frosterus, B.: Ueber ein neues Vorkommniss von Kugelgranit unfern Wirvik bei Borgå in Finland nebst Bemerkungen über ähnliche Bildungen. R.	1894	I	75
Früh, J.: Der gegenwärtige Standpunkt der Torfforschung. R.	93	II	537
Fuchs, C. W. C.: Anleitung zum Bestimmen der Mineralien. 3. Aufl. Neu bearbeitet, vermehrt und erweitert von A. Streng. R.	90	II	33
Fuchs, Theodor: Geologische Studien in den jüngeren Tertiärbildungen Rumäniens. A.	*94*	*I*	*111*
— *Einige berichtigende Worte über die Stellung des Schliers. A.*	*94*	*II*	*291*
Fucini, A.: Il Pliocene dei dintorni di Cerreto-Guid e di Limite ed i suoi molluschi fossili. R.	93	I	133
— Fossili della Oolite inferiore del Monte Grappa nel Trevisano. R.	94	I	505
— Molluschi e Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco. R.	94	II	312
— A proposito di due specie di Pecten del Lias inferiore di Longobucco. R.	94	II	315
— Notizie intorno al terreno liassico in Cabria. R. . . .	94	II	315
Fürbringer, M.: Ueber die systematische Stellung der Hesperornithidae. R.	92	II	452
Fuess, R.: Ein neuer Erhitzungsapparat für das Reflexionsgoniometer. (Mit 1 Holzschnitt.) B. . . .	*90*	*I*	*161*
— *Demonstrations-Mikroskop für den mineralogisch-petrographischen Unterricht. (Mit 1 Holzschnitt.) B.* .	*94*	*II*	*94*
— *Ueber Mikroskope für krystallographische und petrographische Untersuchungen. (Mit 13 Holzschnitten.) A.*	*BB*	*VII*	*55*
— *Ueber neue Erhitzungsapparate für krystallographisch-optische Studien. (Mit 4 Holzschnitten.) A.*	*BB*	*VII*	*406*
Fulcher, W.: On the Composition and Structure of the Hirnant Limestone. R.	93	I	287
Futterer, Karl: Die Tertiärschichten von Grosssachsen. R.	91	I	118
— Die „Ganggranite“ von Grosssachsen und die Quarzporphyre von Thal im Thüringer Wald. R. . . .	91	II	280
— Die Ammoniten des mittleren Lias von Oestringen. R.	92	II	153
— Die Entstehung der Lapisinischen Seen. R.	93	I	483
— Die oberen Kreidebildungen der Umgebung des Lago di Santa Croce in den Venetianer Alpen. R.	94	I	148
— Ueber Hippuriten von Nabresina. R.	94	II	473

G.

Gabriel siehe Gorret.			
Gagel, C.: Die Brachiopoden der cambrischen und silurischen Geschiebe im Diluvium der Provinzen Ost- und Westpreussen. R.	92	I	182
Gangelbauer, L., siehe Brauer, Fr.			
Gante, G.: Die Entwickelung des Strontianit-Bergbaues im Centrum des westfälischen Kreidebeckens während des letzten Jahrzehnts. R.	90	I	258
— Ueber das Vorkommen des oberen Jura in der Nähe von Kirchdornberg im Teutoburger Walde. R.	91	II	324
Gardinale, L.: Sulla presenza del Quarzo nel Basalto amigdaloide di Montecchio Maggiore nel Vicentino. R.	91	II	429
Gardiner, Miss: Contact-Alteration near New Galloway. R.	91	II	431
Gardner, J. St.: A Correction. Mesozoic Monocotyledon. R.	94	I	231

	Jahrg.	Bd.	Seite
Garwood: On the Origin and Mode of Formation of the Concretions in the Magnesian Limestone of Durban. R.	1892	II	266
Gaudry, A.: Découverte d'une Tortue gigantesque. R.	90	I	347
— Sur une machoire de Phoque du Groenland, trouvée par M. Michel Hardy dans la grotte de Raymonden. R.	91	II	150
— Le Dryopithèque. R.	92	I	156
— Le Dryopithecus. R.	92	I	156
— Les enchaînements du monde animal dans les temps géologique. III. R.	92	I	558
— Sur la découverte d'un signe fossile par M. le Dr. Donnezan. R.	92	I	567
— Sur le fossile décrit par M. de Zigno sous le nom d'Anthracotherium Monsvialense. R.	92	I	158
— Remarques sur quelques fossils du Musée de Florence. R.	92	II	140
— Marche de l'évolution sur l'ancien et le nouveau continent. R.	93	I	377
— Similitudes dans la marche de l'évolution sur l'ancien et le nouveau continent. R.	94	II	339
— Les Pythonomorphes de France. R.	94	II	347
Gaudry, A. et M. Boule: Les oubliettes de Gargas. R.	94	II	149
Gaupillat, G., siehe Martel, E. A.			
Gautier, A.: Sur des phosphates en roche d'origine animale et sur un nouveau type de phosphorites. R.	94	II	27
— Sur quelques phosphates naturels rares ou nouveaux: brushite, minervite. R.	94	II	27
— Sur la genèse des phosphates naturels, et en particulier de ceux qui ont emprunté leur phosphore aux êtres organisés. R.	94	II	27
— Formation des phosphates naturels d'alumine et de fer. — Phénomènes de la fossilisation. R.	94	II	27
Gautier, P.: Observations géologiques sur le Creux de Souci. R.	94	I	284
Gauthier, Victor: Note sur les Echinides crétacées recueillis par M. de Grossouvre. R.	92	I	134
— Description des Echinides fossiles recueillis en 1885 et 1886 dans la Région sud des Hauts-Plateaux de la Tunisie par M. Ph. Thomas. R.	93	I	557
— siehe Cotteau, G.			
Gebauer: Notiz über die Blende und die anderen Mineralien, welche sich in den Carbonschichten der Domäne Kamenskaya finden und über die Spuren des Kupferminerals bei der Hütte Kamenskaya. R.	91	II	15
Geer, G. de: Ueber die Lage der Eisscheide während der beiden Eisbedeckungen Skandinaviens. R.	90	I	130
— Om Barnakällegrottan, en ny kritlokal i Skåne. R.	90	II	409
— Om Skandinaviens vivåförändringar under quartärperioden. R.	94	I	166
— Quarternary Changes of Level in Scandinavia. R.	94	I	168
— Kontinentala nivåförändringar, som efter istiden inträffat inom Skandinavien och Norra Amerika. R.	94	I	169
— On Pleistocene Change of Level in Eastern North America. R.	94	I	169
Gehmacher, Arthur: Morphologische Studien am Markasit. R.	90	II	204
Geigel, R.: Die Frage nach der Schwingungsrichtung des polarisirten Lichtes. R.	91	I	367

	Jahrg.	Bd.	Seite
Geiger, H. R. and Arthur Keith: The Structure of the Blue Ridge near Harper's Ferry. R.	1893	I	98
Geikie, Sir Archibald: On Volcanic Action during the Older Geologic Periods. Anniversary Address. R.	92	I	271
— Discovery of the Olenellus-zone in the North-west Highlands. R.	92	I	541
— A Sketch of the History of Volcanic Action in the British Isles. Part II: From the End of the Siluric Period to older Tertiary Time. Presidential address. R.	93	I	52
— On the Pre-cambrian Rocks of the British Isles. R.	93	II	280
— The Work of the Geological Survey. R.	94	II	68
— Annual Report of the Geological Survey and Museum of Practical Geology for the Year ending December 31, 1892. R.	94	II	68
Geikie, James: The Evolution of Climate. R.	91	I	51
Geinitz, F. E.: Beitrag zur Geologie Mecklenburgs. XI. Tertiärvorkommnisse. R.	90	I	311
XII. Der Untergrund von Schwerin. R.	90	II	422
XIII. Weitere Aufschlüsse der Flötzformation. R.	93	I	131
XIV. Mittheilungen über einige Wallberge (Åsar) in Mecklenburg. R.	94	I	164
— Ueber die südliche baltische Endmoräne. R.	90	I	319
— Das Meteor von Kröpelin. R.	91	I	49
— *Mittellias in Dobbertin in Mecklenburg. B.*	*92*	*I*	*166*
— Ueber eine Blitzröhre aus der Ribnitzer Heide. R.	94	I	257
— siehe Credner, H.			
Geinitz, H. B.: Ueber die rothen und bunten Mergel der oberen Dyas bei Manchester. R.	91	I	166
— Ueber einige Lycopodiaceen aus der Steinkohlenzeit. R.	92	I	195
— Die Graptolithen des K. Mineralogischen Museums in Dresden. R.	92	I	186
— Nachträgliche Mittheilungen über die rothen und bunten Mergel der oberen Dyas bei Manchester. R.	93	II	133
Gemmellaro, G. G.: La Fauna dei calcari con Fusulina della Valle del Fiume Sosio, nella Provincia di Palermo. Lief. I und II nebst Nachtrag zu I. R.	90	II	147
— I crostacei dei calcari con Fusulina della valle del fiume Sosio nella provincia di Palermo. R.	94	I	513
Genth, F. A.: On two Minerals from Delaware County, Pa. R.	90	I	409
— Contributions to Mineralogy, No. 44. R.	93	I	260
No. 46. R.	93	II	16
No. 48. R.	93	II	459
No. 50, with Crystallographic Notes by S. L. Penfield and L. V. Pirsson. R.	93	II	463
No. 51. R.	93	II	465
No. 52, with Crystallographic Notes by Samuel L. Penfield. R.	94	II	30
No. 54, with Crystallographic Notes by S. L. Penfield. R.	94	II	238
— The Minerals of North Carolina. R.	93	I	261
— Lansfordit, ein neues Mineral. R.	93	II	19
— Jarosite from Utah. R.	93	II	34
— On Penfieldite, a new species. R.	94	II	219
Genth, F. A. and S. L. Penfield: On Lansfordite, Nesquehonite, a new Mineral, and Pseudomorphs of Nesquehonite after Lansfordite. R.	93	II	19

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gerstendörfer, Joseph: Die Mineralien von Mies in Böhmen. R.	1893	I	10
— Etiquetten für Mineralien und Gesteine. R.	93	I	226
Gesell, Alexander: Montangeologische Aufnahmen des Nagybányer Erzdistrictes. R.	93	II	349
Getz: Graptolithenführende Schieferzonen im Throndhjemsgebiete. R.	91	II	437
Gevrey, A.: Note preliminaire sur le gisement tithonique d'Aizy-sur-Noyarey (Isère). R.	93	II	529
Geyer, Georg: Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz bei Hallstatt. R.	91	I	160
— Beiträge zur Geologie der Mürzthaler Kalkalpen und des Wiener Schneeberges. R.	92	I	124
— Bericht über die geologischen Aufnahmen im Gebiete der krystallinischen Schiefer von Judenburg, Neumarkt und Obdach in Steiermarkt. R.	92	II	291
— Bericht über die geologischen Aufnahmen im Gebiete des Specialkartenblattes Murau. R. . . . 1893 I 111	93	I	337
— Bericht über die geologischen Aufnahmen im oberen Murrthale (Phyllitmulde von Murau und Neumarkt). R. 1893 I 337	93	II	512
— Ueber die tektonische Fortsetzung der Niederen Tauern. R.	93	II	361
— Reisebericht über die geologischen Aufnahmen im Lungau. R.	94	II	92
— Vorlage des Blattes St. Michael. R.	94	II	92
— Die mittelliasische Cephalopodenfauna des Hinterschafberges in Oberösterreich. R.	94	II	353
Geyler, H. Th.: Ueber fossile Pflanzen von Labuan. R.	91	II	208
Gianotti, Giovanni: Appunti petrografici sopra alcune roccie del piano del Re (M. Viso). I. R.	93	II	54
— Cenni geologici e petrografici sul micascisto a glaucofane di colle S. Giovanni, Viù, Val di Lanza. R.	93	II	56
— Appunti geologici sulla valle di Chialamberto. R.	94	II	437
Gibson, W.: The Geology of the Gold bearing and associated Rocks of the Southern Transvaal. R.	94	I	468
Giglioli, Italo: Phosphorit vom Cap Leuca. R.	90	II	221
Gilbert, G. K.: The Moon's Face. A Study of the Origin of its Features. R.	94	II	39
— siehe William.			
Gill, A. C.: Note on some Minerals from the chrome Pits of Montgomery County, Maryland. R.	90	I	409
Gilliéron, V.: Sur le calcaire d'eau douce de Moutier attribué au purbeckien. R.	92	I	552
Gioli, G.: Briozoi neogenici dell' Isola di Pianosa nel Mar Tirreno. R.	92	I	446
Girardot, A.: Note sur les Coralligènes jurassiques supérieurs au Rauracien dans le Jura du Doubs. R.	90	II	108
Glass, N.: On Athyris laeviuscula Sow. R.	92	I	590
Glinka, K.: Ueber Waldboden. R.	91	I	316
Glinka, S.: Russische Albite. R.	91	I	218
— Silicatanalysen nach der Methode von St. Claire-Deville mit Bemerkungen von Menschutkin und Kurnakoff. R.	94	II	217
Gobantz, Alex.: Die silberhaltigen Mineralien auf der Insel Milos. R.	93	II	78
Goës, A.: On a Peculiar Type of Arenaceous Foraminifer from the American Tropical Pacific, Neusina Agassizi. R.	94	II	475

	Jahrg.	Bd.	Seite
Götting, A.: Das Strontianitvorkommen in Westfalen. R.	1891	II	297
Goiran, A.: Il terremoto veronese del 7 Giugno 1891. R.	93	II	47
Goldschmidt, Victor: Index der Krystallformen der Mineralien.			
Bd. II. Heft 6 u. 7. R.	90	II	220
Bd. III. Heft 4—6. R.	91	II	235
Bd. III. Anhang. R.	92	I	209
— Chemisch-mineralogische Betrachtungen. R.	90	II	372
— Graphische Bestimmung des Winkels zweier Zonenebenen in gnomonischer Projection. R.	91	II	23
— Projection auf eine andere als die normale Ebene. R. 1891 II 36	93	I	227
2. Mittheilung: Umdeutung der Formen auf niedere Symmetrie. R.	93	I	455
— Ueber Krystallzeichnen. R.	93	I	455
— Zur graphischen Krystallberechnung. R.	93	II	239
— Zwei Hilfsapparate zum Goniometer. R.	93	II	457
— Projection auf die Polarform und perspectivische Projection. R.	94	I	432
— Löthrohrbeschläge auf Glas. R.	94	II	9
— Phosgenit von Monteponi. R.	94	II	14
— Goniometer mit zwei Kreisen. R.	94	II	215
Golliez, H. et M. Lugeon: Note sur quelques Chéloniens nouveaux de la Molasse Langhienne de Lausanne. R.	92	I	163
Gonnard, F.: Des figures de corrosion naturelle des cristaux de barytine du Puy-de-Dôme. R.	90	I	33
— Sur un nouveau gisement de Dumortiérit, à Brignais (Rhône). R.	90	I	35
— Sur le béryl de la pegmatite de la Grand'-Côte, près de Saint-Amand-Tallende (Puy-de-Dôme). R.	90	I	35
— Sur les minéraux accidentels des gneiss de l'île Barbe et des bords de la Saône près de Lyon. R.	90	I	215
— Addition à une note sur les macles et groupements réguliers de l'Orthose du porphyre quartzifère de Four-la-Brouque, près d'Issoire. R.	90	I	216
— Sur les zéolites du mont Simiouse (Loire). R.	91	I	379
— Sur les cristallisations autour d'ossements humains provenant de Solutré, près de Mâcon. R.	91	II	28
— Sur l'offrétite, espèce minérale nouvelle. R.	92	II	29
— Sur un groupement de mâcles orthogonales de la barytine de Champeix. R.	92	II	32
— Sur l'aragonite du tunnel de Neussargues. R.	93	I	28
— Sur le groupe mésotype dans le Puy-de-Dome. R.	93	I	247
— Sur la barytine du Puy-de-Dome. R.	93	I	249
— Sur la cérusite de la Pacaudière, près Roanne. R.	93	II	247
— Sur un gisement d'épidote à Rhesmes. R.	93	II	250
— Notes pour la minéralogie du Plateau Central. R.	93	II	264
— Sur la cérusite de Roure (Pontgibaud). R.	94	I	23
— Sur la hornblende de Perrier près d'Issoire. R.	94	I	41
— Addition aux minéraux de la mine du cap Garonne (Var). R.	94	I	49
— Addition à une note sur l'aragonite du tunnel de Neussargues. R.	94	I	435
— Sur la pinite de Saint-Pardoux. R.	94	II	226
— 1. Note cristallographique sur la mésotype du Puy-de-Dôme. 2. Sur l'association de la fibrolite et de l'anda-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
lousite dans les gneiss de la Haute-Loire. 3. Sur un nouveau gisement de dumortiérite dans le Rhône. 4. Sur la zéolite du domaine de Prat, à Gergovia. 5. Sur l'existence de l'analcime dans le porphyre dioritique d'Agay (Var). R.	1894	II	233
Gonnard, F.: Sur une enclave felspathique zirconifère de la roche basaltique du Puy de Montaudau, près de Royat. R.	94	II	424
Gonzaga de Campos, L. F.: Nota sobre a localidade do ferro nativo de Santa Catharina. R.	91	I	243
Gooch, Fr. Aug. and J. Edw. Whitfield: Analyses of Waters of the Yellowstone Nationalpark, with an Account of the Methods of Analysis employed. R. . .	91	I	249
Goodchild, J. G.: The Paste of Limestones. R. . . .	91	I	88
— Note on the Weathering of Limestones. R.	92	I	78
— The Motion of Land-ice. R.	92	II	64
— Note on a Granite Junction in the Ross of Mull. R. .	94	I	301
— Notes on the Coniston Limestone. R.	94	II	99
Gordon, C. H.: On the Keokuk Beds at Keokuk, Iowa. R.	93	II	375
Gorjanović-Kramberger, C.: Die praepontischen Bildungen des Agramer Gebirges. R.	91	II	130
— Aigialosaurus, eine neue Eidechse aus den Kreideschichten der Insel Lesina mit Rücksicht auf die bereits beschriebenen Lacertiden von Comen und Lesina. R. . . .	94	I	510
Gorgeu, Alex.: Sur les oxydes de manganèse. 1re partie: Psilomélanes et wads. R.	91	I	7
— Sur les oxydes de manganèse naturels. II, III. R. . .	94	II	404
Gosselet, J.: Deux excursions dans le Hundsrück et le Taunus. R.	91	I	113
— Les Demoiselles de Lihus. R.	91	I	120
— Le Bief à silex de l'Artois. R.	91	I	120
— Relations entre les sables de l'Eocène inférieur dans le Nord de la France et dans le bassin de Paris. R. .	91	I	307
— Remarques sur la discordance du dévonien sur le cambrien dans le massif de Stavelot. R.	91	II	438
— Sur le bassin houiller du Boulonnais. R.	92	I	349
— Note sur la découverte d'une faune marine dans les sables landéniens par M. Briart. R.	92	II	307
— Observations sur la position du grès de Belleu, du grès de Molinchart et du conglomérat de Cernay. R. 1892 II 308	94	I	356
— Sur les relations du terrain dévonien et du terrain carbonifère à Visé. R.	93	I	511
Gottsche, C.: Ueber zerbrochene und wieder verkittete Geschiebe von Schobüll bei Husum. R.	90	I	324
— Kreide und Tertiär in Hemmoor in Nord-Hannover. R.	92	II	111
— Oberer Gault von Lüneburg. R.	94	II	114
Gourdon: Ueber Silur in den Centralpyrenäen. R. . . .	90	II	290
Gourret, Paul: Étude géologique du Tertiaire marin de Carry et de Sausset. R.	90	I	122
— Description de quelques espèces jurassiques de la Basse Provence. R.	91	I	159
Gourret et Gabriel: Sur la Bauxite et les étages qui la recouvrent dans le massif de Garlaban. R. . . .	90	II	85
Grablowitz siehe Silvestri.			
Graeff, Fr.: Ueber ein Gestein von der Mondhalde im Kaiserstuhl. R.	90	II	64

	Jahrg.	Bd.	Seite
Graeff, Fr.: Die Mineralien der Drusenräume in dem Buntsandstein von Waldshut in Baden. R.	1890	II	377
— Studien am Montblancmassiv. R.	91	II	281
— Granit und Gneiss im südlichen Schwarzwald. R. . .	93	II	373
— Versuch einer Gliederung des Gneiss im südlichen Schwarzwald. R.	93	II	373
— Zur Geologie des Kaiserstuhls. R.	93	II	505
— Ueber körnigen Tephrit (Theralit) aus dem Kaiserstuhl. R.	93	II	506
— siehe Steinmann, G.			
Graeff, Fr. und R. Brauns: Zur Kenntniss des Vorkommens körniger Eruptivgesteine bei Cingolina in den Euganeen bei Padua. (Mit 2 Holzschnitten.) A.	*93*	*I*	*123*
Gränzer, Josef: Krystallographische Untersuchung des Epidots aus dem Habach- und dem Krimler Achenthale in den Salzburger Tauern. R.	91	I	28
Graham: On a Peculiar Method of Sand-Transportation by Rivers. R.	92	II	67
Gramont, A. de: Production artificielle de la Boracite par voie humide. R.	91	I	240
Grand'Eury, C.: Géologie et paléontologie du bassin houiller du Gard. R.	94	I	214
Grant, U. Sh.: Note on Quartz-Bearing Gabbro in Maryland. R.	93	II	336
— The Stratigraphical Position of the Ogishke Conglomerate of Northeastern Minnesota. R.	93	II	373
— Note on an Augite Soda-Granite from Minnesota. R. .	94	II	264
Grattarola, G.: Realgar und Auripigment von der Casa Testi am Mte. Amiata. R.	92	II	10
— Realgar, Auripigment und begleitende Mineralien von Casa Testi. R.	92	II	11
— siehe Bartalini, G.			
Grebe, H.: Ueber Tertiärvorkommen zu beiden Seiten des Rheines zwischen Bingen und Lahnstein, und Weiteres über Thalbildung am Rhein, an der Saar und Mosel. R.	94	II	125
Greco, B.: Alcune nuove forme di Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco. R.	93	I	409
— Il Lias inferiore nel circondario di Rossano calabro. R.	94	II	312
Gregorio, Antonio di: On Pleurotoma turbida Sol. and Pl. colon Sow. R.	90	I	156
— Monographie de la Faune eocénique de l'Alabama et surtout de celle de Claiborne de l'étage Parisien. R.	94	I	173
Gregory, J. W.: On Zeuglopleurus, a New Genus of the Family Temnopleuridae from the Upper Cretaceous. R.	90	II	155
— Cystechinus crassus, a New Species from the Radiolarian Marls of Barbados, and the Evidence it affords as to the Age and Original of those Deposits. R. . . .	90	II	445
— On the Variolitic Diabase of the Fichtelgebirge. R. .	92	I	284
— Some Additions to the Australian Tertiary Echinoidea. R.	92	I	591
— On a New Species of the Genus Protaster (P. brisingoides) from the Upper Silurian of Victoria, Australia. R. .	92	I	449
— On Rhynchopygus Woodi Forbes sp. from the English Pliocene. R.	92	II	366
— On the British Palaeogene Bryozoa. R.	94	I	201
— Further Additions to Australian Fossil Echinoidea. R.	94	I	519
— The Maltese Fossil Echinoidea and their Evidence on the Correlation of the Maltese Rocks. R.	94	II	176

	Jahrg.	Bd.	Seite
Gregory, J. W., siehe Cole, G. A. J.			
Greim, G.: Die pleistocänen Schichten bei Raunheim in Hessen. B.	*1890*	*I*	*82*
— Der Granatgneiss (Kinzigit) und Graphitschiefer bei Gadernheim im Odenwald. R.	90	II	63
— Ueber eine theilweise versteinerte Braunkohle. R.	91	I	19
— Eine neue Limatula aus dem Oligocän des Mainzer Beckens. R. 1891 I 20	91	I	431
Greppin: Description des fossiles de la Grande Oolithe des environs de Bâle. R.	93	I	380
Griepenkerl, O.: Die Versteinerungen der senonen Kreide von Königslutter im Herzogthum Braunschweig. R.	91	I	154
Griswold, L. S.: A Basic Dike in the Connecticut Triassic. R.	94	II	263
Groom, Theo. T.: On a Tachylyte with Gabbro of Carrock-Fell in the Lake District. R.	90	II	92
Grosser, P.: Zinkitkrystalle von Franklin N. J. R.	93	I	235
— Messungen an Wollastonitkrystallen vom Vesuv. R.	93	II	22
— Die Trachyte und Andesite des Siebengebirges. R.	93	II	486
Grossouvre, A. de: Sur les directions des reliefs terrestres. R.	90	I	252
— Sur le système oolitique inférieur dans la partie occidentale du bassin de Paris. R.	90	I	300
— Etude sur l'Etage Bathonien. R.	90	II	107
— Sur la théorie des „Horst". R.	91	II	262
— Sur le Terrain cretacé dans le Sud-Ouest du bassin de Paris. R.	92	I	134
— Sur le Callovien de l'ouest de la France et sur sa faune. R.	92	II	303
— Sur les rélations du Trias du sudest du bassin de Paris. R.	93	I	122
— Etude sur la craie supérieure. La craie des Corbières. R.	93	I	361
— La craie de Chartres. R.	94	I	489
— Conséquences stratigraphiques de la communication précédente. R.	94	I	490
— Sur les conditions de dépôt de la craie blanche. R.	94	II	117
— Sur la géologie des environs de Bugarach et la craie des Corbières. R.	94	II	450
— siehe Roussel, J.			
Groth, P.: Vorkommen des Euklases in den Alpen. R.	90	I	210
— Ueber ein einfacheres Reflexionsgoniometer. R.	91	II	401
Grubenmann, U.: Zur Kenntniss der Gotthard-Granite. R.	91	I	398
Grundey siehe Langenhan.			
Gümbel, C. W. von: Ueber die Natur und Entstehungsweise der Stylolithen. R.	90	I	55
— Ueber einen Nummulitenfund bei Radstadt. R.	90	I	456
— Die geologische Stellung der Tertiärschichten von Reit im Winkel. R.	91	I	123
— Lithiotis problematica Gümb. eine Muschel. R.	91	I	433
— Algenvorkommen im Thonschiefer des Schwarz-Leogangthales bei Saalfelden. R.	91	II	436
— *Ueber die Bezeichnung Röthelschiefer. B.*	*92*	*I*	*160*
— *Ueber anstehenden Radiolarien-Jaspis in der Schweiz. B.*	*92*	*II*	*162*
— Geologische Mittheilungen über die Mineralquellen von St. Moritz im Oberengadin und ihre Nachbarschaft nebst Bemerkungen über das Gebirge bei Bergün und die Therme von Pfäfers. R.	94	I	98
Günther, A.: Die Dislocationen auf Hiddensoe. R.	92	II	122

	Jahrg.	Bd.	Seite
Günther, S.: Münchener Erdbeben- und Prodigienliteratur in älterer Zeit. R.	1891	II	262
Gürich, Georg: Geologisch-mineralogische Mittheilungen aus Südwest-Afrika. A.	*90*	*I*	*103*
— *Zur Altersbestimmung der unteren Grenze der Karooformation. B.*	*90*	*I*	*283*
— Geologische Uebersichtskarte von Schlesien 1 : 400 000 nebst Erläuterungen. R.	91	I	63
— Ditrochosaurus capensis — ein neuer Mesosaurier aus der Karooformation Südafrikas. R.	91	I	428
— *Ueber eine cambrische Fauna von Sandomir in Russisch-Polen. B.*	*92*	*I*	*69*
— Ueber die Wolga-Stufe in Polen. R.	93	I	520
Guiscardi, G.: Studii sul terremoto d'Ischia del 28 Luglio 1883. R.	92	II	46
Guppy, R. J. L.: The Tertiary Microzoic Formations of Trinitad, W.-Ind., mit Karte. R.	94	II	29
Gurley, R. B.: The Geological Age of the Graptolite Shales of Arkansas. R.	93	I	334
Gurow, A.: Geologische Beschreibung des Gouvernements Poltawa. R.	90	I	126
Guye, Ch. Eug.: Sur la polarisation rotatoire du chlorate de soude. R.	91	II	403
— siehe Soret, Ch.			
Gylling, Hjalmar: Notes on the Microscopical Structure of some Eruptive Rocks from Armenia and the Caucasus. R.	90	I	82
— Zur Geologie der cambrischen Arcosen-Ablagerung des westlichen Finnland. R.	90	I	284

H.

Haag, Fr.: Die regulären Krystallkörper. Eine geometrisch-krystallographische Studie. R.	93	I	1
— Anordnung der Massenpunkte in den Flächen regulärer Krystalle. R.	93	I	1
Haas, Hippolyt J.: Die geologische Bodenbeschaffenheit Schleswig-Holsteins mit besonderer Berücksichtigung der erratischen Bildungen in ihren Grundzügen für die Gebildeten aller Stände gemeinfasslich dargestellt. R.	90	I	323
— Ueber die Lagerungsverhältnisse der Juraformation im Gebirge von Fanis in Südtirol. R.	90	I	301
— Betrachtungen über die Art und Weise, wie die Geschiebemergel Norddeutschlands zur Ablagerung gelangt sind. R.	91	II	136
— Kritische Beiträge zur Kenntniss der jurassischen Brachiopodenfauna des schweizerischen Juragebirges und seiner angrenzenden Landesteile. R.	91	II	364
— Ueber einige seltene Fossilien aus dem Diluvium und der Kreide Schleswig-Holsteins. R.	94	I	172
— Aus der Sturm- und Drangperiode der Erde. I. R.	94	I	276
— Ueber den Zusammenhang gewisser mariner, insbesondere der tertiären Bildungen, sowie der erratischen Ablagerungen Norddeutschlands und seiner angrenzenden Gebiete mit der säcularen Verwitterung des skandinavischen Festlandes. R	94	II	331

	Jahrg.	Bd.	Seite
Haase, E.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Arachniden. R.	1892	I	176
Habenicht, Hermann: Die Todesursache diluvialer Säugethiere. R.	91	II	142
Haberfelner, J.: Ueber Erzgänge am Cinque-Valle bei Roncegno. R.	94	II	66
Haefke, Hermann: Ueber die chemische Constitution der Hornblende. R.	92	II	404
Häpke, L.: Der Meteorit von Barntrup. R.	91	I	48
Haeusler, R.: Les foraminifères des marnes pholadomyennes de Saint-Sulpice (Val-de-Travers). R.	92	I	191
— Monographie der Foraminiferen der schweizerischen Transversarius-Zone. R.	93	II	560
— Notes sur la distribution de Lituolides dans les terrains jurassiques de la Suisse. R.	94	II	364
Hagemann, H.: Ueber die chemische Zusammensetzung der obersten Keuperschichten bei Erlangen. R.	90	I	261
Hague, Arnold: Geological History of the Yellowstone-National Park. R.	91	I	101
— Notes on the Occurrence of a Leucite Rock in the Absaroka Range, Wyoming Territory. R.	91	I	104
Hahn, A.: Thomsonit von Mettweiler bei St. Wendel. R.	93	I	247
— Topas von Japan. R.	94	I	443
— Topas von Neu-Süd-Wales. R.	94	I	444
Hairs, E.: Sur la présence du mercure, du thallium et de l'indium dans les blendes belges. R.	94	II	398
Halaváts, J.: Beitrag zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse des Comitates Hont. R. 1890 I 452	91	II	73
— Die zwei artesischen Brunnen von Hód-Mező-Vásárhely. R.	90	I	453
— Beiträge zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse des Comitates Torontál. R.	93	I	368
— Der nordwestliche Theil des Aranyos-(Arinyes-)Gebirges. R.	93	II	363
— Palaeontologische Daten zur Kenntniss der Fauna der südungarischen Neogen-Ablagerungen. R.	93	II	533
Halfar, A.: Die erste Asteride aus den palaeozoischen Schichten des Harzes. R.	94	II	360
Hall, J.: Newberria, a new genus of Brachiopods. R.	92	II	155
Hall and J. Clarke: Geological survey of New York: Palaeontologie. Vol. VIII. An introduction to the study of the genera of palaeozoic brachiopoda. Part I. R.	93	II	201
Hall and Simpson: Palaeontology of New York. Vol. IV. Corals and Bryozoa from the Lower Helderberg, Upper Helderberg and Hamilton groups. R.	92	I	183
Hallock, W.: The Flow of Solids, or the Behavior of Solids under high pressure. R.	91	I	244
— The Flow of Solids. R.	91	I	244
Hamberg, Axel: Mineralogische Studien. R. 1890 II 52	90	II	224
— Ueber krystallisirtes Blei von der Harstigsgrube bei Pajsberg in Wermland. R.	90	II	376
— Mineralogische Studien. Ueber die Manganophylle von der Grube Harstigen bei Pajsberg in Wermland. — Ein manganhaltiger Chlorit von Harstigen. — Ueber Ganophyllit, ein Manganzeolith, von Harstigen. — Ueber Pyrophanit, eine mit dem Titaneisen isomorphe Verbindung der Zusammensetzung $MnTiO_3$, von Harstigen. — Bemerkungen über die Titaneisen-Eisenglanzgruppe. — Ueber die Habitusänderung der Rhodonitkrystalle			

	Jahrg.	Bd.	Seite
bei der Umwandlung in Karyopilit. — Bemerkungen über den Einfluss, welchen die Concentration des Aetzmittels auf die Umgestaltung eines Krystalls beim Aetzen ausübt. R.	1892	II	233
Hamberg, Axel: Bemerkungen zu den als neu bezeichneten Mineralien Astochit und Dahllit. R.	93	II	39
— Mineralogische Studien. 14. Ueber die Naumann'schen Zeichen für die Flächen der rhombischen, monoklinen und triklinen Krystalle und über eine Modification dieser Zeichen. — 15. Ueber den Rhodonit von der Grube Harstigen bei Pajsberg in Wermland. R. 1894 I 245	94	I	262
— siehe Flink, Gust.			
Hammer, E., siehe Eck, H.			
Hammond, P. T.: Note on the Intrusive Porphyry at Melrose. R.	93	II	498
— Notes on the Intrusive Serpentine at Gundagai. R.	93	II	498
Handmann, R.: Die Neogenablagerungen des österreichisch-ungarischen Tertiärbeckens. R.	90	I	451
— Kurze Beschreibung der häufigsten und wichtigsten Tertiärconchylien des Wiener Beckens. R.	90	II	330
— Die fossile Conchylienfauna von Leobersdorf im Tertiärbecken von Wien. R.	90	II	331
Hankó, W.: Chemische Analyse der schwefelhaltigen Mineralwässer von Kérő und des Wassers des grossen Salzteiches bei Kolosz. R.	92	I	531
Hanks, Henry G.: On the Occurrence of Hanksite in California. R.	91	II	247
Hansen, Andr. M.: Strandlinje-Studier. R.	93	I	62
Hantken, M. v.: Tinnyea Vásárhelyi non. gen. et nov. sp. R.	90	II	331
Hardman, E. T.: Note on Professor Hull's Paper. R.	91	II	200
— The Chemical Composition of Chert and the Chimistry of the Process, by which it is formed. R.	91	II	200
Harker, A.: The Bala Volcanic Series of Caernarvonshire and associated rocks. R.	90	II	261
— Physics of Metamorphism. R.	90	II	388
— On some Anglesey Dykes. R.	91	I	87
— On Local Thickening of Dykes and Beds by Folding. R.	91	I	88
— On Eyes of Pyrites in Slate. R.	91	I	91
— On Various Crystalline Rocks. R.	92	I	273
— Notes on a Collection of Rocks from the Tonga Islands. R.	92	I	273
— On Rocks from the Cross Fell Julier. R.	83	I	96
— On the Lamprophyres of the North of England. R.	93	I	289
— The Use of the Protractor in Field-Geology. R.	94	I	452
— Extinction-Angles in Cleavage-Flakes. R.	94	II	209
Harker, A. and J. E. Marr: On the Shap-Granite and the associated igneous and metamorphic rocks. R.	92	II	263
— — Supplementary Notes on the Metamorphic Rocks around the Shap Granite. R.	94	II	257
Harlé, E.: Une mandibule de singe du Repaire de Hyènes de Montsaunès, Haute-Garonne. R.	92	II	450
— Les brêches à ossements de Montousé, Hautes-Pyrénées. R.	93	I	539
— Un repaire de hyènes, près d'Eichel, aux environs de Saint-Girons. R.	93	II	394
— Le repaire de Roc-Traiicat (Ariège) et notes sur des Mégacéros, Castors, Hyènes, Saïgas et divers Rongeurs quaternaires du sud-ouest de la France. Avec obser-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
vations sur le climat de cette région à la fin du quaternaire. R. . . . . 1894 I 178	1894	I	505
Harlé, E.: Observations sur les restes d'Eléphants du sud-ouest de la France. R.	94	I	505
— La présence du Castor dans la grotte de Montfort, à Saint-Girons. R.	94	II	138
— Succession de diverses faunes, à la fin du quaternaire, dans le sud-ouest de la France. R.	94	II	138
Harper, D. N., siehe Penfield, S. L.			
Harrington, B. J.: Notes on Goethite, Serpentine, Garnet and other Canadian Minerals. R.	91	I	241
— On Canadian Spessartite and Mountain Cork. R. . .	92	II	26
— On the so-called Amber of Cedar Lake, North Saskatchewan, Canada. R.	94	I	53
Harris, George F.: Notes on the Geology of the Gironde, with especial References to the Miocene Beds. R. .	91	I	123
Harris, G. F. and H. W. Burrows: The Eocene and Oligocene Beds of the Paris Basin. R.	92	I	552
Harris, G. D.: Tertiary Geology of Calvert Cliffs Maryland. R.	93	II	534
— On the Geological Position of the Eocene Deposits of Maryland and Virginia. R.	94	II	455
Harrison, J. B., siehe Jukes-Browne, A. J.			
Hart, Th.: Notes on Volcanic Paroxysmal Explosions, and the Causes of Volcanic Action. R.	92	II	44
Hartmann, Georg: Der Einfluss des Treibeises auf die Bodengestalt der Polargebiete. R.	93	I	62
d'Harveng, J.: Notice sur le bassin houiller d'Héraclée. R.	93	II	83
Hatch, F. H.: Notes on the Petrographical Characters of some Rocks collected in Madagascar by the Rev. R. Baron. R.	90	II	96
— On the Occurrence of Soda-Felsites in Co. Wicklow. R.	91	I	88
— On the Wicklow Greenstones. R.	91	I	90
— An Introduction to the Study of Petrology: The Igneous Rocks. R.	92	I	61
— On a new British Phonolite. R.	93	I	288
Hatcher: The Ceratops Beds of Converse County, Wyoming. R.	94	II	322
Hatle, E.: Neue Beiträge zur mineralogischen Kenntniss der Steyermark. R.	90	II	16
— Beiträge zur mineralogischen Topographie der Steyermark. R.	90	II	17
Hatle, E. und H. Tauss: Neue mineralogische Beobachtungen in Steyermark. R.	90	II	17
Hauer, F. v.: Beiträge zur Kenntniss der Cephalopoden aus der Trias von Bosnien. I. Neue Funde aus dem Muschelkalk von Han Bulog bei Sarajevo. R. . . .	94	II	168
Haug, E.: Lias, bajocien et bathonien dans les chaînes subalpines entre Digne et Gap. R.	90	I	117
— Die geologischen Verhältnisse der Neocom-Ablagerungen der Puezalpe bei Corvara in Südtyrol. R.	90	I	305
— Sur la géologie des chaînes subalpines entre Gap et Digne. R.	90	II	106
— Les chaînes subalpines entre Gap et Digne. Contribution à l'histoire géologique des Alpes françaises. R. . .	92	II	92
— Note sur le péristome du Phylloceras mediterraneum. R.	92	II	460
— Sur l'étage Aalénien. R.	93	II	528

	Jahrg.	Bd.	Seite
Haug, E.: Étude sur les Ammonites des étages moyens du système jurassique. R.	1894	I	191
— Sur la formation de la vallée de l'Arve. R.	94	I	283
— Les chaînes subalpines entre Gap et Digne. R.	94	I	314
— Le Trias alpin. R.	94	II	309
Haupt, Th.: Das Vorkommen von fossilen Kohlen in Toscana. R.	92	I	87
Hawkins, J. Dawson: On Minium from Leadville. R.	93	I	474
Hawkins, J. D. and E. N. Hawkins: Plattnerite from Idaho. R.	93	I	237
Haworth, Er.: The Age et Origin of the Crystalline Rocks of Missouri. R.	93	II	336
Hay, R.: The Kiowa Co. (Kansas) Meteorites. R.	92	II	241
Hayes, C. W.: The Overthroust Faults of the Southern Appalachians. R.	93	I	57
— siehe Willis, B.			
Hazard, J.: Glacialschliffe südwestlich von Löbau in der sächsischen Lausitz. B.	*91*	*I*	*214*
— Section Olbernhau-Purschenstein. Blatt 130. R.	92	I	93
— Die Geologie in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft. R.	93	I	47
Headden, W. P.: Columbite and Tantalite from the Black Hills of South Dakota. R.	93	II	480
— On Black Rutile from the Black Hills, with a Note on the Crystals by L. V. Pirsson. R.	94	I	19
— A Phosphate new from the Black Hills of South Dakota. R.	94	I	48
Heberdey, P. Philipp: Krystallisirte Schlacken von Raibl. R.	93	II	41
Hébert: Remarques sur la découverte faite par M. Bergeron de la faune primordial en France. R.	90	II	289
— Remarques sur la zone à Belemnitella plena. R.	90	II	411
— Le terrain crétacé des Pyrénées. R.	90	II	413
Hecht, B.: Ueber die elliptische Polarisation im Quarz. R.	91	I	2
— *Bemerkungen zu dem Satze, nach welchem Symmetrieaxen immer mögliche Krystallkanten sein sollen. B. 1893 II 173*	*94*	*I*	*278*
— Anleitung zur Krystallberechnung. R.	94	I	429
— Beiträge zur geometrischen Krystallographie. R.	91	I	430
— *Berechnung der Axenelemente eines triklinen Krystalles aus den sechs Winkeln, welche von vier Flächen gebildet werden, von denen nicht drei in einer Zone liegen. A.*	*BB*	*VII*	*488*
Heddle, M. Forster: On the Zeolites of Rye Water, Ayrshire. R.	90	II	219
— The Minerals of the Treshinish Islands. R.	90	II	219
— On the Occurrence of Gyrolite in India. R.	91	I	232
— On the Crystalline Form of Gyrolite. R.	91	I	232
— On the Identity of Bruiachite and Fluor. R.	91	I	233
— On new Localities for Linarite, Caledonite and Epistilbite. R.	91	I	233
— On Dudgeonite, Hydroplumbite, Plumbonacrite and Plattnerite. R.	91	I	376
— On the Occurrence of Sapphire in Scotland. R.	94	I	18
— On the Optic Properties of Gyrolite. R.	94	I	46
Heddle, M. F. and J. St. Thomson: On the „Skin“ of Agates. R.	94	II	223
Hedinger, A.: Ueber den pliocänen Affen des Heppenlochs. (Mit Taf. IV.) A.	*91*	*I*	*169*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hedlund, T.: Meteoren den 23. November 1889. R.	1891	I	243
Hegedüs, Paul: Der Stefansgang und seine Nebenklüfte. R.	91	II	74
Heiderich, F.: Die mittleren Erhebungsverhältnisse der Erdoberfläche. R.	93	I	67
Heilprin, Angelo: On Miocene Fossils from Southern New Jersey. R.	90	I	357
— The Classification of the Post-Cretaceous Deposits. R.	90	I	447
— The Miocene Mollusca of the State of New Jersey. R.	90	II	332
— Geological Researches in Yucatan. R.	92	II	121
— The Eocene Mollusca of the State of Texas. R.	93	I	538
Heim, Albert: Die Geschichte des Zürichsee. R.	91	II	138
Hell, C.: Ueber den Fichtelit. R.	92	II	241
Helland, A.: Jordbunden i Norge. R.	94	I	61
Helmert, F. R.: Die Schwerkraft im Hochgebirge, insbesondere in den Tyroler Alpen, in geodätischer und geologischer Beziehung. R.	92	I	53
Helmhacker, R.: Ein interessantes Goldvorkommen im südlichen Ural. R.	93	II	80
— Der Goldbergbau der Umgebung von Berëzovsk am östlichen Abhange des Urals. R.	94	I	86
— Die Salzseen von SW.-Sibirien. R.	94	I	92
— Das Vorkommen der Kohlen im Kaukasus. R.	94	I	94
Hendy, B.: On a „Wash-out“ in the Pleasley and Teversall Collieries. R.	91	II	430
Henley siehe William.			
Hennig: Studier öfver Bryozoerna i Sveriges Kritsystem. I. Cheilostomata. R.	94	II	359
— Ueber Neuropora conuligera, eine neue Bryozoen-Art aus der schwedischen Kreide. R.	94	II	359
Henrich, Carl: Notes on the Geology and on some of the Mines of Aspen Mountain, Pitkin County, Colorado. R.	91	II	300
Hepworth-Collins, Walter: Analyses of Graphite from the Bagoutal Mountains. R.	90	II	375
Hergesell, W.: Ueber die Formel von G. G. Stokes zur Berechnung regionaler Abweichungen des Geoids vom Normalsphäroid. R.	91	II	259
Hergesell, H. und E. Rudolph: Die Fortschritte der Geophysik. R.	90	I	45
Hering, C. A.: Eine Eiskrystallgrotte. R.	90	II	43
— Die Kupfererzeugung der Erde und ihre Quellen. R.	94	II	61
Hermanne, L.: Leçons de minéralogie rédigées conformément au programme des écoles normales. R.	92	I	211
Hermite, H.: Géologie. — Principes. — Explication de la période quaternaire sans hypothèses. R.	92	I	57
Herrik, C. L.: The Cuyahoga Shale and the Problem of the Ohio Waverly. R.	94	II	441
Herrmann, O.: Section Pulsnitz. Blatt 52. R.	92	I	536
— Section Radeburg. Blatt 34. R.	92	I	537
— Section Bischofswerda. Blatt 53. R.	92	II	83
— Ueber die Wirkungen des Gebirgsdruckes in der westlichen Lausitz. R.	92	II	251
— *Krystallskelette von Apatit. (Mit 4 Fig.) A.*	*93*	*II*	*52*
— Pseudomorphosen von Eisenglanz nach Biotit im Granitit von Schluckenau. R.	93	II	17
— Section Kloster St. Marienstern. Blatt 37. R.	94	II	286
Herschenz, O.: Untersuchungen über Harzer Baryte. R.	90	I	400

	Jahrg.	Bd.	Seite
Herz, Richard: Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere vom Pululagua bis Guagua-Pichincha. R.	1893	I	77
— Ueber die Zonarstructur der Plagioklase. R.	94	I	69. 261
Hess, Edmund: Bemerkungen zu E. v. Fedorow's Elementen der Gestaltenlehre. B.	*94*	*I*	*197*
— Weitere Bemerkungen zu E. v. Fedorow's Elementen der Gestaltenlehre. B.	*94*	*II*	*88*
Hettner, A. und G. Linck: Beiträge zur Geologie und Petrographie der columbianischen Anden. R.	90	I	95
Heusler: Ueber ein Nickelerz von der Grube Storch und Schöneberg bei Gosenbach im Kreise Siegen. R.	90	I	206
Hibsch, J. E.: Gangförmiges Auftreten von doleritischem Nephelinit in der Umgebung des Schreckenstein im böhmischen Mittelgebirge. R.	92	I	284
— Einige Gesteine aus Paraguay. R.	93	I	506
— Kurze Uebersicht des allgemeinen geologischen Aufbaues des „böhmischen Mittelgebirges". R.	93	II	97
— Die Insel älteren Gebirges und ihre nächste Umgebung im Elbthale nördlich von Tetschen. R.	93	II	356
Hice, R. R., siehe Foshay, P. M.			
Hicks, H.: On the Effects produced by Earth-movements in Wales and Shropshire. R.	92	I	342
— The Fauna of the Olenellus-Zone in Wales. R.	92	I	541
— On Precambrian Rocks occurring as Fragments in the Cambrian Conglomerates. R.	93	I	114
— On some Recently-Exposed Sections in the Glacial Deposits at Hendon. R.	93	II	536
— Some Exemples of Folds and Faults in the Devonian Rocks at and near Ilfracombe, North Devon. R.	94	I	123
Hidden, W. E.: Contributions to Mineralogy; with Crystallographic Notes by A. Des Cloizeaux. R.	90	I	219
— On Edisonite, a fourth Form of Titanic Acid. R.	91	II	44
— Mineralogical Notes. R.	91	II	50
Hidden, W. E. and J. B. Mackintosh: On a new Thorium Mineral, Auerlite. R.	91	II	240
— — Auerlith, ein neues Thorium-Mineral. R.	91	II	240
— — On a new Sodium sulphate-chloride, Sulphohalite. R.	91	II	241
— — Sulfohalit, ein neues Natrium-Sulfatochlorid. R.	91	II	241
— — A Description of several Yttria and Thoria Minerals from Llano County, Texas. R.	93	I	256
— — On the Occurrence of Polycrase, or of an allied Species, in both North and South Carolina. R.	93	II	32
— — Supplementary Notice on the Polycrase of North and South Carolina. R.	94	I	25
Hidden, W. E. and S. L. Penfield: On Hamlinite, a new Rhombohedral Mineral from the Herderite Locality at Stoneham, Me. R.	93	II	28
Hidden, W. E. and H. S. Washington: Contributions to Mineralogy. R.	90	II	47
Hilber, V.: Die Entstehung der Thal-Ungleichseitigkeit. R.	90	II	240
— Fauna der Pereiraïa-Schichten von Barthelmä in Unter-Krain. R.	94	II	341
Hilgard, E. W.: On the Age and Origin of the Lafayette-Formation. R.	93	II	535
— Die Bildungsweise der Alkalicarbonate in der Natur. R.	94	I	10
— Die Bodenverhältnisse Californiens. R.	94	II	88

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hilger, A.: Die chemische Zusammensetzung von Gesteinen der Würzburger Trias. R.	1890	I	262
Hill, E.: The Rocks of Alderney and the Casquets. R.	90	II	91
— On the Rocks of Alderney. R.	91	I	93
— On Wells in West Suffolk Boulder Clay. R.	93	II	391
— On Rapid Elevation of Submerged Lands and the possible Results. R.	94	I	284
Hill, E. and T. G. Bonney: On the North-west Region of Charnwood Forest. R.	92	I	295
— — On the Hornblende-Schists, Gneisses and other Crystalline Rocks of Sark. R.	93	I	285
Hill, R. T.: Paleontology of the Cretaceous-Formation of Texas. Theil I. R.	90	I	360
— A Portion of the Geological History of the Colorado River of Texas. R.	90	I	437
— The Topography and Geology of the Cross Timbers and surrounding Regions in Northern Texas. R.	90	I	441
— The Texas Section of the American Cretaceous. R.	90	I	441
— The Trinity Formation of Arkansas, Indian Territory and Texas. R.	90	I	441
— The Foraminiferal Origin of certain Cretaceous Limestones and the Sequence of Sediments in North American Cretaceous. R.	90	I	446
— The Neozoic Geology of southwestern Arcansas. R.	90	II	301
— A preliminary annotated Check List of the Cretaceous Invertebrate Fossils of Texas. R.	90	II	305
— Relation of the uppermost Cretaceous Beds of the Eastern and Southern United States. R.	90	II	417
— Pilot Knob: A Marine Cretaceous Volcano. R.	91	II	435
— Contributions to the Geology of the Southwest. R.	92	I	331
— Notes on the Geology of the South West. R.	92	I	332
— The Comanche Series of the Texas-Arcansas Region. R.	93	II	163
— On the Occurrence of Artesian and other Underground Waters in Texas, New Mexico, and Indian Territory, together with the Geology and Geography of those Regions. R.	94	I	81
— Paleontology of the Cretaceous formations of Texas. — The Invertebrate Paleontology of the Trinity Division. R.	94	I	370
— The Deep Artesian Boring at Galveston, Texas. R.	94	I	495
Hill, R. T. and R. A. Penrose jr.: Relation of the Uppermost Cretaceous Beds of the Eastern and Southern United States and the Tertiary Cretaceous Parting of Arkansas. R.	90	I	445
— — Tertiary Cretaceous Parting of Arcansas and Texas. R.	90	II	417
Hillebrand, W. F.: Mineralogical Notes. R.	91	II	38
— Uraninite. R.	91	II	44
— Analyses of three Descloizites from new Localities. R.	91	II	30
— On Zinc-bearing Spring Waters from Missouri. R. 1893 I 290	94	II	11
— Note on the Composition of Uraninite. R.	93	I	478
Hillebrand, W. F. and E. S. Dana: Additional Notes on the Tyrolite from Utah. R. 1891 II 46	93	II	31
Hillebrand, W. F. and H. S. Washington: Notes on certain rare Copper Minerals from Utah. R.	91	II	46
Hills, R. C.: Etched Beryls from Mount Antero, Colorado. R.	92	II	27
Hiltermann, August: Die Verwitterungsproducte von Gesteinen der Triasformation Frankens. R.	90	I	262

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hind, Wh.: On the Affinities of Anthracoptera Salt. and Anthracomya Salt. R.	1894	II	359
Hinde, G. J.: A Monograph of the British Fossil Sponges. Part I, II. R.	90	II	163
— Note on Eophyton? explanatum Hicks, and on Hyalostelia (Pyritonema) fasciculus M'Coy sp. R.	90	II	164
— On a true Leuconid Calcisponge from the Middle Lias of Northamptonshire, and on detached Calcisponge Spicules in the Upper Chalk of Surrey. R.	90	II	165
— Note on the Spicules described by Billings in Connection with the Structure of Archaeocyathus Minganensis. R.	91	II	197
— On Archaeocyathus Billings, and on other Genera, allied to or associated with it, from the Cambrian Strata of North America, Spain, Sardinia, and Scotland. R.	91	II	197
— On the Organic Origin of the Chert in the Carboniferous Limestone Series of Ireland, and its Similarity to that in the Corresponding Strata in North Wales and Yorkshire. R.	91	II	200
— On a new Genus of Siliceous Sponges from the Lower Calcareous Grit of Yorkshire. R.	91	II	370
— On a new Genus of Siliceous Sponges from the Trenton Formation at Ottawa. R.	92	I	460
— Notes on a new Fossil Sponge from the Utica Shale Formation (Ordovician) at Ottawa, Canada. R.	92	II	465
— Note on Specimens of Cherty Siliceous Rock from South Australia. R.	93	I	422
— On Palaeosaccus Dawsoni Hinde, a new genus and species of hexactinellid Sponge from the Quebec Group (Ordovician) at Little Métis, Quebec, Canada. R.	94	I	522
— Note on a Radiolarian Rock from Fanny Bay, Port Darwin, Australia. R.	94	I	525
— siehe Jones, T. R.			
— siehe Nicholson, H. A.			
Hinde, G. J. and W. M. Holmes: On the Sponge-Remains in the Lower Tertiary Strata near Oamaru, Otago, New Zealand. R.	93	II	210
Hintze, C.: Ueber Topas aus Südwestafrika. R.	91	I	27
Hirschwald, J.: Ueber das Verhalten der Kieselsäure und ihrer Verbindungen im Phosphorsalzglase. R.	91	II	234
Hise, C. R. van: The Precambrian Rocks of the Black Hills. R.	93	I	332
— An Attempt to harmonize some apparently conflicting Views of Lake Superior-Stratigraphy. R.	93	II	516
— The Iron Ores of the Lake Superior-Region. R.	94	I	90
— siehe Pumpelly, R.			
Hitsch, J. J. E.: Der Doleritstock von Rongstock und das Vorkommen von Blei- und Silbererzen im böhmischen Mittelgebirge. R.	90	II	257
Hobbs, Wm. H.: On the Petrographical Characters of a Dyke of Diabase in the Boston Basin. R.	90	I	274
— On the Paragenesis of Allanite and Epidote as Rock-forming Minerals. R.	93	I	240
— Notes on a Trip to the Lipari Islands. R.	93	II	49
— Notes on some Pseudomorphs from the Taconic Region. R.	93	II	255
— On some Metamorphosed Eruptives in the Crystallin Rocks of Maryland. R.	93	II	496

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hobbs, Wm. H., siehe Culver, G. E.			
Hobson, B.: On the Igneous Rocks of the Isle of Man. R.	1892	II	264
— On the Basalts and Andesites of Devonshire, known as „Felspathic Traps". R.	94	I	300
— An Irish Augitite. R.	94	I	302
Hockauf, J.: Ueber die Müttrich'sche Formel. R.	93	I	229
Hocks, W.: Der Froschberg im Siebengebirge. R.	93	I	270
Höfer, H.: Das Erdöl (Petroleum) und seine Verwandten. Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Ursprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöles. R.	90	I	57
— Mineralogische Beobachtungen. R.	90	II	18
— Besondere Erscheinungen in der Verbreitung von Erdbeben. R.	91	II	56
— Pyrit vom Roetzgraben bei Trofaiach. R.	91	II	234
— Die Ergiebigkeit eines Grundwasserstromes. R.	93	II	322
— Mineralogische Beobachtungen (2. Reihe). R.	94	I	3
— Die Entstehung der Blei-, Zink- und Eisenerzlagerstätten in Oberschlesien. R.	94	I	87
Högbom, A. G.: Om relationen mellan kalcium- och magnesiumkarbonat i de quartära aflagringarna. R.	91	I	132
— Om qvartsit-sparagmitområdet mellan Storsjön i Jemtland och Riksgränsen söder om Rogen. R.	92	I	336
— Om kvartsit-sparagmitområdet i Sveriges sydliga fjelltrakter. R.	92	I	336
— *Ueber Dolomitbildung und dolomitische Kalkorganismen. A.*	*94*	*I*	*262*
Höhnel, R. von, A. Rosiwal, F. Toula und E. Suess: Beiträge zur geologischen Kenntniss des östlichen Afrika. R.	94	I	103
Hörnes, R.: Versteinerungen aus dem miocänen Tegel von Walbersdorf. R.	91	II	444
— Zur Geologie von Untersteiermark. VI. Eruptivgesteinsfragmente in den sedimentären Tertiärschichten von Rohitsch-Sauerbrunn. R.	92	II	114
VII. Das angebliche Vorkommen von Uebergangsbildungen zwischen den Tüfferer Mergeln und der sarmatischen Stufe. R.	92	II	114
VIII. Versteinerungen aus dem Mergel von St. Egydi. R.	93	I	133
IX. Zur Fossilliste der Sotzkaschichten von Wresie bei St. Marein. R.	93	I	133
X. Die Fischfauna der Cementmergel von Tüffer. R.	94	I	187
— Die Herkunft des Menschengeschlechtes. R.	92	II	138
— Schöckelkalk und Semriacher Schiefer. R.	93	I	335
— Ueber die Pleurotomen des Wiener Tertiärbeckens. R.	93	II	198
— Das Vorkommen der Gattung Surcula H. u. A. Adams in den miocänen Ablagerungen der österreichisch-ungarischen Monarchie. R.	93	II	198
— Das Vorkommen der Gattung Genota H. u. A. Adams in den Miocänablagerungen der österreichisch-ungarischen Monarchie. R.	93	II	199
— Das Vorkommen der Gattung Clavatula Lmk. in den marinen Miocänablagerungen Oesterreich-Ungarns. R.	93	II	199
— Das Vorkommen der Gattung Clinura Bell. im österreichisch-ungarischen Miocän. R.	93	II	199
— Das Vorkommen der Gattung Pseudotoma Bell. im österreichisch-ungarischen Miocän. R.	93	II	199

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hörnes, R.: Das Vorkommen der Gattungen Rouaultia Bell., Dolichotoma Bell. und Oligotoma Bell. im österreichisch-ungarischen Miocän. R.	1893	II	199
— Der Querbruch von Santa Croce und die Bildung der Schuttmassen von Cima Fataldo und der Rovine di Vedana bei Belluno. R.	93	II	321
— Zur Kenntniss der Milchbezahnung der Gattung Entelodon Aym. R.	94	I	179
— Erdbebenkunde. Die Erscheinungen und Ursachen der Erdbeben, die Methoden ihrer Beobachtung. R.	94	I	453
— Neue Schildkrötenreste aus steierischen Tertiärablagerungen. R.	94	II	159
— siehe Leonhard, G.			
Hörnes, R. und M. Auinger: Die Gastropoden der Meeresablagerungen der ersten und zweiten miocänen Mediterranstufe in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Lieferung VI. R.	91	II	181
Lieferung VII. R.	92	I	434
Hof, J.: Keramohalit von Teneriffa. R.	93	I	41
Hofer, Bruno: Ueber den Bau und die Entwickelung der Cycloid- und Ctenoidschuppen. R.	92	I	164
Hoffmann, G. Chr.: Uraninite and Monazite from Canada. R.	91	I	38
— Magnetite Crystals pseudomorph after Pyrite. R.	91	I	234
— Chemical Contributions to the Geology of Canada. R.	91	II	92
— Annotated List of the Minerals occurring in Canada. R.	93	I	261
— Ilvaite. R.	94	I	42
— Catalogue of the Section one of the Museum of the Geological Survey embrasing the Systematic Collection of Minerals and the Collections of Economic Minerals and Rocks and Specimens of Structural Geologie. R.	94	I	244
Hoffmann, L.: Ueber Abstammung des Pferdes. R.	94	I	374
Hofmann, Ad.: Crocodilus Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark. R.	90	I	347
— Neue Funde tertiärer Säugethierreste aus der Kohle des Labitschberges bei Gamlitz. R.	90	I	460
— Beiträge zur Säugethierfauna der Braunkohle des Labitschberges bei Gamlitz in Steiermark. R.	92	I	158
— Millerit und Texasit aus dem Olivinfels vom Sommergraben bei Kraubat. R.	92	I	510
— Beiträge zur miocänen Säugethierfauna der Steiermark. R.	94	II	343
Holden, E. S.: Note on Earthquake-Intensity in San Francisco. R.	91	I	273
— Earthquakes in California (1888). R.	91	II	301
Holland, Thomas H.: On the large Porphyritic Crystal of Felspar in certain Basalts of the Isle of Mull. R.	90	II	383
— On Rock-specimens from Korea. R.	92	I	311
Hollande: Etude stratigraphique des montagnes jurassiques de Sulens et des Almes, situées au milieu des Alpes calcaires de la Haute-Savoie. R.	92	I	129
— Contact du Jura méridional et de zone subalpine aux environs de Chambéry. R.	94	I	349
Hollick: The Paleontology of the Cretaceous Formation on Staten Island. R.	94	II	139
Holm, Gerhard: Ueber Vorkommen von krystallisirtem Pyrosmalit bei Dannemora. R.	90	II	54
— Ueber das Vorkommen von Caryocrinus in Schweden. R.	91	II	193

	Jahrg.	Bd.	Seite
Holm, Gerhard: Meddelande om förekomsten af Ancylus-grus på Oeland. R.	1891	II	447
— Versteinerungen aus Lappland, von Mörtsell gesammelt. R.	92	I	341
— Gotlands Graptoliter. R.	92	I	457
— Tvenne Gyroceras-formigt böjda Endoceras-Arter. R.	93	I	180
— Om mynningen hos Lituites Breyn. R.	93	II	416
Holmes, W. A.: Are there Traces of Glacial Man in the Trenton Gravels. R.	93	II	280
Holmes, W. M., siehe Hinde, G. J.			
Holst, N. O.: Ryoliten vid sjön Mien. R.	91	II	86
— Ueber eine mächtige Quarzitablagerung jünger als der Olenusschiefer. R.	91	II	311
— Bidrag till kännedomen om lagerföljden inom den kambriske sandstenen. R.	94	II	438
Holzapfel, E.: Die Mollusken der Aachener Kreide. Fortsetzung und Schluss. R.	93	I	182
— Das Rheinthal von Bingerbrück bis Lahnstein. R.	94	II	304
Hooke, R.: The Probable Law of Densities of the Planetary Bodies. R.	92	I	55
Horne siehe Peach.			
Hornung, F.: Zur Kenntniss des Gangsystems des Auerberges im Harz und der Ausfüllung desselben. R.	91	II	64
Hosius, A.: Ueber Zeuglodon-Reste aus Holland. B.	*93*	*II*	*68*
— Beiträge zur Kenntniss der Foraminiferen-Fauna des Miocäns. Th. I. R.	94	I	522
— Ueber marine Schichten im Wälderthon von Gronau (Westfalen) und die mit denselben vorkommenden Bildungen (Rhizocorallium Hohendali, sog. Dreibeine). R.	94	II	113
Hoskyns-Abrahall, J. L.: A Visit to the Calcite Quarry in Iceland. R.	92	I	222
Hosvay, L. v.: Ueber die Veränderlichkeit der chemischen Zusammensetzung der Mineralwässer. R.	92	I	529
— Die chemische Analyse der Saroltaquelle. R.	92	I	530
Hovey, E. O.: A Cordierite Gneiss from Connecticut. R.	91	I	274
— Observations on some of the Trap Ridges of the East-Haven-Branford Region. R.	93	II	336
— Ueber Gangdiabase der Gegend von Rio de Janeiro und über Salit von Sala in Schweden. R.	94	I	80
Howell, E. E.: Notice of two New Iron Meteorites from Hamilton Co., Texas, and Puquios, Chili, S. A. R.	91	II	418
— Description of New Meteorites. R.	92	II	33
— Description of the Mt. Joy Meteorite. R.	93	II	279
Howitt, A. W.: Notes on the Metamorphic Rocks of the Omeo District, Gippsland. R.	90	I	432
— Reports and Statistics of the Mining Department for the Quarter ended 31st March 1890. R.	91	II	100
— Notes on certain Plutonic and Metamorphic Rocks at Omeo. R.	91	II	101
— Notes on the Contact of the Metamorphic and Sedimentary Formations at the Upper Dargo River. R.	93	II	348
— Annual Report of the Secretary for Mines, Victoria, including Reports on the Working of Part III of Mines Act 1890, Diamond Drills etc., during the Year 1893. R.	94	I	81
— Notes on Samples of Rock collected in the 180 Mine at Bendigo. R.	94	II	271

	Jahrg.	Bd.	Seite
Howorth, H. H.: On the recent and rapid Elevation of the Ural Mountains. R. . . . . 1892 I 151	1892	I	381
— On the very recent and rapid Elevation of the Highlands of Eastern Asia. R.	92	II	280
— On the Absence of Glaciation in Western Asia and Eastern Europe. R.	93	I	318
— On the recent and rapid Elevation of the American Cordillera. R.	93	I	320
— Did the Mammuth live before, during or after the deposition of the drift? R.	94	I	365
Hull, E.: Note on Dr. G. J. Hinde's Paper „On Beds of Sponge-remains in the Lower and Upper Greensand of the South of England". R.	91	II	200
— On the Nature and Origin of the Beds of Chert in the Upper Carboniferous Limestone of Ireland. R. . . .	91	II	200
— On the Physical Geology of Tennessee and Adjoining Districts in the United States of America. R. . . .	92	II	66
— A Comparision of the Red Rocks in the South Devon Coast with those of the Midland and Western Counties. R.	94	I	131
Hume, W. F.: Notes on Russian Geology. R.	84	I	354
— Notes on Russian Geology. The Loess in Southern Russia. R.	94	I	367
— Chemical and Micro-mineralogical Researches on the upper Cretaceous Zones of the South of England. R.	94	II	117
Hundt, Chr.: Ueber Wachsthumserscheinungen der Schwefelkrystalle beim Krystallisiren aus Lösungen und aus dem Schmelzfluss. R.	94	I	14
Hunt, A. R.: On certain Affinities between the Devonian Rocks of South Devon and the Metamorphic Schists. R. 1894 I 300	94	II	100
Hunt, T. Sterry: The Iron-Ores of the United States. R.	92	II	76
Hunter, M. und H. Rosenbusch: Ueber Monchiquit, ein camptonitisches Ganggestein aus der Gefolgschaft der Eläolithsyenite. R.	92	I	321
Huntington, O. W.: A New Meteoric Iron from Stutsman Cy. R.	92	I	266
— The prehistoric and Kiowa Cy. Pallasites. R.	92	I	266
Hussak, E.: Ueber Leucit-Pseudokrystalle im Phonolith (Tinguait) der Serra de Tingua, Estado Rio de Janeiro, Brazil. B.	*90*	*I*	*166*
— I. Ueber Brazilit, ein neues Tantal- (Niob-) Mineral von der Eisenmine Jacupiranga, Süd-Sao Paolo. II. Ueber brasilianische Leucitgesteine. III. Nochmals die Leucit-„Pseudokrystall"-Frage. (Mit 7 Holzschnitten.) B.	*92*	*II*	*141*
— Ueber Brazilit. B.	*93*	*I*	*89*
— Ueber ein neues Perowskitvorkommen in Verbindung mit Magneteisenstein von Catalao, Staat Goyaz, Brasilien. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*94*	*II*	*297*
Hussak, E. und G. Woitschach: Repetitorium der Mineralogie und Petrographie für Studirende der Naturwissenschaften, Bergbaubeflissene und Ingenieure. R.	91	II	228
Hutchings, W. Maynard: Note on an Occurrence of Willemite in a Slag. R.	91	I	17
— On altered Igneous Rocks near Tintagel, Cornwallis. R.	91	I	89
— On the Occurrence of Ottrelite in Phyllites of North Cornwall. R.	91	I	89

	Jahrg.	Bd.	Seite
Hutchings, W. Maynard: On the Origin of some Slates. R.	1891	I	92
— Rutile in Fireclays. Reply to Major-General Mac Mahon. R.	92	I	272
— On the probable Origin of some Slates. R.	92	I	77
— Further Notes on Fireclays etc. R.	92	I	272
— On the altered Coniston Flags at Shap. R.	92	II	263
— Petrographical Notes on some Lakex-District Rocks. R.	92	II	265
— Notes on the Ash-slates and other Rocks of the Lake-District. R.	93	I	288
Hutton, F. W.: On a Hornblende-Biotite Rock from Dusky Sound, New Zealand. R.	90	II	90
Huyssen: Die Tiefbohrung im Dienste der Wissenschaft, insbesondere zur Ermittelung der Wärme im Innern des Erdkörpers. R.	90	II	234
— Beobachtungen über Temperaturen in tiefen Bohrlöchern. R.	90	II	234
Hyatt, Alpheus: Carboniferous Cephalopods. R.	93	I	180
— Jura and Trias at Taylorville, California. R.	94	II	110
Hyland, J. Shearson: On some Epidiorites of NW.-Irland. R.	91	I	92
— On some Spherulitic Rocks from Co. Down. R.	91	I	399
— On some Epi-Diorites of North-West Ireland. R.	91	I	399
— On some Specimens from Wady Halfa, Upper Egypt. R.	91	I	400
— On the Mesolite (Galactite) of Kenbane Head, Co. Antrim. R.	91	I	400
— Ueber die Gesteine des Kilimandscharo und dessen Umgebung. R.	91	II	87

I.

Iddings, J. P.: On the Crystallization of Igneous Rocks. R.	90	I	53
— Obsidian Cliff, Yellowstone National Park. R.	90	II	270
— The Mineral Composition and Geological Occurrence of certain Ingneous Rocks of the Yellowstone National Park. R.	91	I	104
— On the Origin of Primary Quartz in Basalt. R.	91	I	274
— On a Group of Volcanic Rocks from the Tewan Mountains, New Mexico, and on the Occurrence of primary quartz in certain basalts. R.	92	I	80
— Spherulitic Crystallization. R.	93	I	297
Iddings, J. P. and S. L. Penfield: Fayalite in the Obsidian of Lipari. R. 1892 I 321	94	I	41
— — The Minerals in hollow Spherulites of Rhyolite from Glade Creek, Wyoming. R. 1894 I 55	94	I	79
Igelström, L. J.: Mineralogische Mittheilungen aus Schweden. A.	*90*	*I*	*248*
— Mineralogische Mittheilungen. R. 1890 I 231	90	II	221
8. Gediegen Blei aus dem Sjögrubenfeld. R.	90	II	53
9. Zwei neue Minerale aus dem Sjögrubenfeld, Kirchspiel Grythyttan, Bezirk Oerebro. R.	90	II	54
15. Molybdänsäure im Scheelit von Yxsjö. R.	93	II	33
— Mittheilung über Hausmanniterze in Schweden. R.	90	I	232
— Erwiderung. R.	90	I	410
— Chloroarseniat von Jakobsberg und der Sjögrube. R.	90	I	411
— Plomb natif de la mine de manganèse de Sjögrufvan, paroisse de Grythyttan, gouvernement d'Oerebro. R.	90	II	53
— Plumboferrit, ein neues Mineral von der Manganerzgrube Jakobsberg bei Nordmarken in Wermland. R.	93	I	236

	Jahrg.	Bd.	Seite
Igelström, L. J.: Aussichten auf Apatitvorräthe in Schweden. R.	1893	I	478
— Förklyftade diabasgånger på Åland. R.	93	I	497
— Om utsigterna för apatittillgångars uppträdande i Sverige. R.	93	II	64
— Friedelit aus der Sjögrube (Hausmannit-, Braunit- und Eisenerzgrube), Grythytte. R.	93	II	249
— Neue Mineralien (Basiliit und Sjögrufvit) von Sjögrufvan, Kirchspiel Grythytte, Gouvernement Oerebro. R.	94	I	270
— Melanostibian, ein neues Mineral von der Manganerzgrube Sjögrufvan. R.	94	II	29
— Friedelit von Sjögrufvan in Wermland. R.	94	II	225
— Chondrostibian, ein neues Antimonmineral von Sjögrufvan. R.	94	II	227
Ihering, H. von: Sobre la distribucion geográfica de los Creodontes. R.	92	II	336
Illing, C.: Ueber Goldvorkommen und Bergbau in Corea. R.	91	II	294
Ingall, Elfric Drew: Report on Mines and Mining on Lake Superior. Part I. R.	91	II	91
— Division of Mineral Statistics and Mines. Annual Report for 1889. R.	93	II	277
Inkey, Béla de: Sur le progrès des recherches géologiques en Roumanie. R.	91	II	83
Inostranzeff, A.: Gisement primaire de platine dans l'Oural. R.	94	I	432
d'Invilliers, E. V.: Phosphate Deposits of the Island of Navassa. R.	93	I	501
Ippen, J. A.: Zur Kenntniss der Eklogite und Amphibolgesteine des Bacher Gebirges. R.	94	I	461
Irvine, R., siehe Murray, J.			
Irving, R. D.: „Is there a Huronian Group?“ R.	90	I	273
— On the Airolo-schists Controversy. R.	90	II	391
— On the Plateau-Gravels of East-Berkshire and West-Surrey. R.	91	II	333
— On Dynamo-Metamorphism. R.	91	II	422
— On the Classification of the Early Cambrian and Pre-Cambrian Formations. R.	92	I	109
— Physical Studies of an Ancient Estuary. R.	93	I	66
— Note on the Occurrence of Melanterite in the Upper Eocene Strata of the Thames Basin. R.	94	I	51
— On the Red Rocks of the Devon Coast-section. R.	94	I	131
— The Malvern Crystallines. R.	94	I	299
— On Post-Eocene Surface-Changes in the London Basin. R.	94	II	126
Issel, A.: Rélation du tremblement de terre, subi en 1887 en Ligurie. R.	90	II	79
— Radiolaires fossiles contenues dans les cristaux d'albite. R.	91	I	7
— Il Terremoto del 1887 in Liguria. R.	91	II	261
— Della formazione lherzolitica di Baldissero nel Canavese. R.	92	II	253
— Figure di viscosità ed impronte radiculari con parvenza di fossili. R.	93	I	488
— Impressions radiculaires et figures de viscosité ayant l'apparence de fossiles. R.	93	I	488
— Brevi Note di Geologia locale. R.	94	I	102
Iwanow, D.: Auszüge aus den Rechenschaftsberichten über die Süd-Ussuri-Expedition. R.	94	I	128

J.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jaccard, A.: Sur les animaux vertebrées fossiles de l'étage Oeningien de Locle. R.	1892	I	153
— Étude sur les Massifs du Chablais compris entre l'Arve et la Drance. R.	93	II	334
Jackson, Robert Tracy: Phylogeny of the Pelecypoda, the Aviculidae and their allies. R.	91	II	361
Jacquot, E.: Note sur la constitution géologique des Pyrénées. Le système cambrien. R.	93	I	509
Jacquot et Michel-Lévy: Sur une nouvelle carte géologique de la France. R.	90	II	77
Jäkel, O.: Ueber diluviale Bildungen im nördlichen Schlesien. R.	90	I	324
— *Ueber mikroskopische Untersuchungen im Gebiet der Palaeontologie. A.*	*91*	*I*	*178*
— Ueber das Alter des sogen. Graptolithen-Gesteins mit besonderer Berücksichtigung der in demselben enthaltenen Graptolithen. R.	92	I	452
— Ueber Phaneropleuron und Hemictenodus n. gen. R.	92	I	579
— Ueber fossile Ichthyodorulithen. R.	92	I	416
— Die Selachier aus dem oberen Muschelkalk Lothringens. R.	92	I	417
— Acanthoteuthis aus dem unteren Lias von Lyme Regis in England. R.	92	I	178
— Ueber die Kiemenstellung und die Systematik der Selachier. R.	92	I	579
— *Ueber Dichelodus Gieb. und einige Ichthyodorulithen, eine Entgegnung an Herrn A. Smith Woodward. (Mit 2 Holzschn.) B.*	*92*	*I*	*145*
— Ueber Menaspis nebst allgemeinen Bemerkungen über die systematische Stellung der Elasmobranchier. R.	92	II	150
— Gänge von Fadenpilzen (Mycelites ossifragus Roux) in Dentinbildungen. R.	92	II	188
— Ueber tertiäre Trygoniden. R.	93	II	195
— Oracanthus Bochumensis n. sp. ein Trachyacanthide des deutschen Kohlengebirges. R.	93	II	196
— Die Ruderorgane der Placodermen. R.	94	II	163
— Ueber Holopocriniden mit besonderer Berücksichtigung der Stramberger Formen. R.	94	II	181
— Ueber Plicatocriniden, Hyocrinus und Saccocoma. R.	94	II	360
Jahn, J.: Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Priesener Schichten der böhmischen Kreideformation. R.	92	II	306
— Ueber die in den nordböhmischen Pyropensanden vorkommenden Versteinerungen der Teplitzer und Priesener Schichten. R.	93	I	129
— Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik der mittelböhmischen Silurformation. R.	93	II	517
— Ueber das Tejřovicer Cambrium. R.	94	II	95
— Ueber die sogenannte Rückenlippe bei den Scaphiten und über Guilfordia acanthochila Weinz. sp. R.	94	II	470
Jamieson, T. F.: On the Climate of the Loess Period in Central Europe and the Causes which produced it. R.	90	II	424
— On the Scandinavian Glacier. R.	93	I	59
— On Glen Roy. R.	93	I	135
— The Scandinavian Glacier and some Inferences derived from it. R.	94	II	134

	Jahrg.	Bd.	Seite
Janda, F.: Einige Idrianer Mineralien und Gesteine. R.	1893	II	75
Janet, Ch.: Sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le dépôt de la craie dans le bassin Anglo-Parisien. R.	92	II	307
— Note sur trois nouvelles Belemnites sénoniennes. R.	93	I	400
— Note sur un Echinocorys carinatus présentant neuf pores génitaux. R.	93	I	412
— Note sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le dépôt de la craie dans le bassin Anglo-Parisien. R.	94	II	117
Janet, Ch. et L. Cuénot: Note sur les orifices génitaux multiples, sur l'extension des pores madréporiques hors du madréporite et sur la terminologie de l'appareil apical chez les oursin. R.	93	I	413
Jankó, J.: Zur Geologie des Djebel-Bu-Korein in Tunis. R.	92	II	74
— Das Delta des Nil. Geologischer und geographischer Aufbau des Deltas. R.	92	II	279
— Abstammung der Platanen. R.	92	II	374
Jannasch, P.: Ueber die Aufschliessung von Sulfiden wie Bournonit, Rothgültigerz u. s. f. in einem mit Brom beladenen Luftstrom. R.	91	II	404
— Ueber eine neue Methode der Pyritanalyse. R.	91	II	404
— Ueber eine neue Methode zur Bestimmung des Schwefels in unorganischen Sulfiden. R.	91	II	405
— Bemerkungen über die Bestimmung von Schwefelsäure bei Gegenwart von Eisen. R.	91	II	405
— Ueber die Aufschliessung des Pyrit im Sauerstoffstrom. R.	91	II	405
— Ueber eine neue Methode zur Aufschliessung der Silicate. R.	92	I	505
Jannasch, P. und G. Calb: Ueber die Zusammensetzung des Turmalins. R.	90	II	194
Jannel, Ch.: Sur le corallien de la région de Lérouville. R.	93	I	520
Jannetaz, Ed.: Note sur une Wernérite (dipyre) du Chili. R.	91	II	28
— Note sur la turquoise dite de nouvelle roche. R.	91	II	28
— Note sur une Dioptase du Congo français. R.	91	II	414
— Sur l'argent natif et la dioptase du Congo français. R.	92	II	10
— Note sur le Feldspath orthose des basaltes de Rogat. R.	92	II	22
— Note sur le talc de Madagascar. R.	92	II	403
— Note sur les calcaires noirs à pyrénéite. R.	93	II	245
— Sur la propagation de la chaleur dans les corps cristallisés. R.	94	I	5
— Sur un nouveau ellipsomètre. R.	94	I	6
— Note sur la propagation de la chaleur dans les corps cristallisés. R.	94	I	247
— Note sur le calcaire noir renfermant les émeraudes de Muso. R.	94	I	257
— Note sur le grenat pyrénéite. R.	94	I	264
— Note sur un nouvel éllipsomètre. R.	94	II	4
Jannettaz, P.: Sur les figures électriques produites à la surface des corps cristallisés. R.	94	II	5
Jaquot, E.: Sur les couches dites crétacé inférieur des environs de Sougraigne. R.	93	I	343
Jatta, A.: Appunti sulla Geologia e Paleontologia della Provincia di Bari. R.	90	II	123
Jefremow, W.: Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten in Form, Bau und Bildungsweise der Schluchten, Hohlwege und Flussthäler. R.	92	II	62
Jennings, A. Vaughan: Note on the Orbitoidal Limestone of North Borneo. R.	90	I	129

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jennings and Williams: On Manod and the Moëlwyns. R.	1892	II	262
Jenny, F.: Ueber Löss und lössähnliche Bildungen in der Schweiz. R.	90	II	129
Jentzsch, Alfred: Ueber eine diluviale Cardium-Bank zu Succase bei Elbing. R.	90	I	326
— *Ueber die angeblichen Yoldia-Thonkerne des schlesischen Diluviums. B.*	*91*	*I*	*290*
— Oxford in Ostpreussen. (Vorläufige Mittheilung.) R.	91	II	325
— Ueber einige Züge in der Oberflächengestaltung Westpreussens. R.	93	II	390
— Ueber ein neues Vorkommen von Interglacial zu Neudeck bei Freystadt, Kreis Rosenberg. R.	93	II	390
— Zur Höhenschichtenkarte von Ost- und Westpreussen. R.	94	I	165
— Bericht über die geologische Abtheilung des Provinzialmuseums der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft bei Gelegenheit der Feier des 100jährigen Bestehens der Gesellschaft 1890. R.	94	I	277
Jeremejeff, P.: Ueber den Glaucolith und Stroganowit. R.	90	I	15
— Ueber die Krystalle von Anatas und Brookit aus den Goldsanden der Region des Kane, Gouvernement des Jenissei. R.	90	I	15
— Krystalle von Zinnstein aus einigen goldführenden Sanden der Region des Jenissei. R.	90	I	16
— Ueber ein Stück gediegen Kupfer aus der Grube Trekhswiatitel am Osinowajafluss im District Krasnojarsk, Gouv. Jenisseisk. R.	90	I	17
— Krystalle von Helvin und von Martit aus dem Ilmengebirge im Ural. R.	90	II	19
— Ueber das gediegen Silber der Grube Tscherepanovsky im Altai und über einige begleitende Mineralien. R.	90	II	20
— Ueber den Granat und den Ortkoklas des Berges Blagodat. R.	90	II	20
— Ueber die Resultate der Untersuchung von Andalusitkrystallen von einem unbekannten Fundort im Ural. R.	90	II	20
— Ueber einen Topaskrystall vom Ilmengebirge. R.	90	II	21
— Ueber das Titaneisen der Grube Nicolas-Maximilian im Ural. R.	90	II	21
— Ueber die Aragonitkrystalle vom Berge Medczianaya in der Nähe der Stadt Kielce. R.	90	II	21
— Neue Flächen an einem russischen Euklaskrystall. R.	90	II	22
— Ueber Bleiglanzkrystalle. R.	91	II	11
— Granatkrystalle aus dem Ural. R.	91	II	11
— Einige Pseudomorphosen der Kupfermineralien von der Grube Medno-Rudiansk bei Nischne-Tagilsk im Ural. R.	91	II	13
— Ueber die Kalkspathkrystalle von Ustj-Zekomst, Distr. Glasov, Gouv. Wiatka, Russland. R.	91	II	13
— Ueber einige Mineralien der Jeremejeff'schen Mineralgrube, Bezirk Slatoust im Ural. R.	91	II	13
— Einige Mineralien der Grube Nikolas-Maximilian im Ural. R.	91	II	14
— Die in dem Gebiet der orenburgischen Kosaken gefundenen Topase. R.	91	II	14
— Ueber Krystalle von Kupferglanz aus dem Turjin'schen Kupferbergwerk. R.	92	I	37
— Ueber einige Mineralien des südlichen Urals. R.	93	I	21
— Diamant vom Flusse Serebrianaja im Ural. R.	93	I	23

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jeremejeff, P.: Ueber die Pseudomorphosen von Quarz nach Kalkspath von der Grube Nikolajewsk im Ural. R.	1893	I	26
— Ueber die Vesuviankrystalle in den Goldsanden des Landes der orenburgischen Kosaken. R.	93	I	33
— Ueber die Linaritkrystalle der Blei- und Silbergrube Bisch-Tscheku. R.	93	I	40
— Ueber die Bittersalzkrystalle einiger Salzseen des Gouv. Astrachan. R.	93	I	40
— Ueber die Diamantkrystalle der Domäne Bissertskaya im Ural. R.	93	II	240
— Ueber ein Exemplar von Ilmenorutil aus der Grube Lobatschewskaja im Ilmengebirge im Ural. R.	93	II	246
— Ueber den Vesuvian der Grube Jeremejewskaya. R.	93	II	251
— Ueber die Pseudomorphosen von Magneteisen nach Ceylanit von der Grube Nicolas-Maximilian im Bezirk von Slatoust im Ural. R.	93	II	256
— Zwei Pseudomorphosen von der Grube Jeremejewskaya in dem Bezirk von Slatoust im Ural. R.	93	II	257
— Ueber einen Euklaskrystall aus den Goldwäschereien am Fluss Kamenka im Ural. R.	94	I	42
— Ueber Krystalle von Linarit und Topas. R.	94	I	55
— Beryllkrystalle von Mursinka im Ural. R.	94	II	225
— Ueber ein Stück nierenförmigen Pseudomalachits. R.	94	II	229
— Ueber den Anglesit der Grube Nikolajewski im Altai. R.	94	II	230
— Astrachanit aus den Seen des Gouvernements Astrachan. R.	94	II	230
— Ueber die pseudomorphe Modification des Arsenoliths im Realgar. R.	94	II	231
— Ueber eine Limonitpseudomorphose vom Ural. R.	94	II	232
— Ueber die Pseudomorphosen nach den Formen der Epidotkrystalle. R.	94	II	232
— Ueber die Pseudomorphosen nach der Form der Perowskitkrystalle. R.	94	II	232
— Krystalle von Gelbbleierz, Kieselzinkerz und Zinkspath aus der Gegend von Semipalatinsk. R.	94	II	234
Jičinsky, W.: R. Falb's Kalender der kritischen Tage pro 1890. R.	91	II	291
Jimbo, K.: General Geological Sketch of Hokkaido with special Reference to the Petrography. R.	94	I	303
Joannis, A.: Sur la fusion du carbonate de chaux. R.	94	I	305
Johansson, K.: Cerussit und Kalkspath von Norberg. R.	94	I	259
John, C. von: Ueber die Gesteine des Eruptivstockes von Jablanica a. d. Narenta. R.	90	I	63
— Chemische Untersuchung eines Mineralwassers vom Gaisberg bei Salzburg. R.	92	II	252
— Ueber die chemische Zusammensetzung des sog. Taraspits von Vulpera bei Tarasp in der Schweiz und die Miemite überhaupt. R.	94	I	257
— Ueber den Moldavit oder Bouteillenstein von Radomilic in Böhmen. R.	94	I	266
— Natürliches Vorkommen von Humussäure in dem Falkenauer Kohlenbecken. R.	94	I	269
— Ueber die chemische Zusammensetzung verschiedener Salze aus den k. k. Salzbergwerken von Kalusz und Aussee. R.	94	I	434
— Ueber die chemische Zusammensetzung der Pyrope und einiger anderer Granate. R.	94	I	436
Johnson, L. C., siehe Smith, E. A.			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Johnston-Lavis, H. J.: Explanation of the Deep Phenomena of Volcanic Action. R.	1890	II	390
— Il Pozzo artesiano di Ponticelli. R.	92	I	289
— Osservazioni geologiche lungo il tracciato del grande emissario-fognone di Napoli dalla Pietra sine a Pozzuoli. R.	92	II	44
— The South-Italian Volcanoes being the Account of an Excursion to them made by English and other Geologists in 1889 under the Auspices of the Geologists' Association of London with Papers of the different Localities by Messrs. Johnston-Lavis, Platania, Sambon, Zezi and Mad. Antonia Lavis. Including the Bibliography of the Volcanic Districts. R.	92	II	48
— The Round Trip in Detail. R.	92	II	48
— A short and concise Account of the Geology of Vesuvius and Mte. Somma. R.	92	II	49
— Thermo-Mineral and Gas springs of Sujo. R.	92	II	50
— Trachite sodalitica recentemente scoperta a Napoli. R.	92	II	254
— Excavations in Naples. R.	92	II	254
— L'eruzione del Vesuvio del 7 Giugno 1891. R.	93	I	490
— Note on the Lithophyses in Obsidian of the Rocche Rosse, Lipari. R.	94	I	293
— The Ejected Blocks of Monte Somma. Part I. Stratified Limestone. R.	94	II	427
— siehe Bauermann, H.			
Jolles, St.: Zur Theorie der gebräuchlichsten krystallographischen Abbildungsmethoden. R.	93	I	227
— Orthogonale Projection krystallographischer Axensysteme. R.	94	I	431
Jones, A.: The Southern Coal-Fields of the Sátpura Gondwána Basin. R.	94	I	125
Jones, T. Rupert: Ostracoda from the Weald Clay of the Isle of Wight. R.	90	I	152
— Notes on the palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. XXVII. On some North American (Canadian) Species. R.	91	I	154
No. XXVIII. On some Scandinavian Species. R.	92	I	422
No. XXIX. On some devonian Entomides. R.	92	I	175
— On some palaeozoic Ostracoda from North America, Wales and Ireland. R.	91	I	334
— On some palaeozoic Ostracoda from Pennsylvania, U. S. R.	91	I	335
— On some fossil Estheriae. R.	91	II	171
— On some devonian and silurian Ostracoda of North America, France and the Bosporus. R.	91	II	460
— On some new devonian Fossils. R.	91	II	460
— On some Estheriae and Estheriae-like shells from the carboniferous Shales of Western Scotland. R.	92	I	422
— Contributions to Canadian Micro-Palaeontology. R.	92	I	581
— On some more fossil Estheriae. R.	92	I	581
— On some small bivalve Shells from the Karooformation, South Africa. R.	92	I	590
— Note on a fossil Cypridina from the South of the Lleyn. R.	93	II	548
— On some fossil Ostracoda from S.-W. Wyoming, and from Utah. R.	94	I	383
— Fossil Phyllopoda of the Palaeozoic Rocks. R.	94	II	163
— On some palaeozoic Ostracoda from Westmoreland. R.	94	II	468

	Jahrg.	Bd.	Seite
Jones, T. Rupert: On some palaeozoic Ostracoda from the District of Girvan, Ayrshire. R.	1894	II	468
— siehe Etheridge.			
Jones, T. Rupert and Hinde: A supplementary Monograph of the Cretaceous Entomostraca of England and Ireland. R.	94	II	165
Jones, T. Rupert and J. W. Kirkby: On the Ostracoda found in the Shales of the upper Coal Measures at Stade-Lane, near Manchester. R.	92	I	423
— — On some Ostracoda from the Mabou Coal-Field. R.	92	II	151
— — Notes on the palaeozoic bivalved Entomostraca. No. XXX. On carboniferous Ostracoda from Mongolia. R.	92	II	360
Jones, T. Rupert and C. D. Sherborn: A supplementary Monograph of the tertiary Entomostraca in England. R.	91	I	335
Jones, T. Rupert and H. Woodward: A Monograph of the British palaeozoic Phyllopoda (Phyllocarida Packard). R.	90	II	329
— — On some palaeozoic phyllopodous and other Fossils. R.	94	II	352
— — The fossil Phyllopoda of the Palaeozoic Rocks. R. .	94	II	163
Jorissen, A.: Sur la présence du tellure et du bismuth dans la galène de Nil-St.-Vincent. R.	94	II	398
Jousseaume: Sur la perforation des roches basaltiques du golfe d'Aden par des galets. Formation d'une marmite des géants. R.	94	I	283
Judd, J. W.: On the Growth of Crystals in Igneous Rocks after their Consolidation. R.	90	II	89
— On Statical and Dynamical Metamorphism. R. . . .	90	II	389
— Chemical Changes in Rocks under Mechanical Stresses. R.	91	I	60
— On the Processes by which a Plagioclase Felspar is converted into a Scapolite. R.	91	I	231
— On the Propylites of the Western Isles of Scotland and their relation to the Andesites and Diorites of the District. R.	91	II	429
— On the Relations between the Gliding Planes on the Solution Planes of Augite. R.	92	I	505
— Additional Note on the Lamellar Structure of Quartz-Crystals, and the Methods by which it is developed. R.	94	II	21
— On Inclusions of Tertiary Granite in the Gabbro of the Cuillin Hills, Skye, and on the Products resulting from the Partial Fusion of the Acid by the basic Rock. R.	94	II	259
— On composite Dykes in Arran. R.	94	II	422
Jüssen, Edmund: Beiträge zur Kenntniss der Klaus-Schichten in den Nordalpen. R.	91	I	299
— Ueber die Klaus-Schichten von Madonna del Monte und Serrada in Südtirol. R.	91	I	300
— Ueber pliocäne Korallen von der Insel Rhodus. R. . .	91	II	195
Jukes-Browne, J.: Note on an undescribed Area of Lower Greensand or Vectian in Dorset. R.	94	I	146
— The Geology of Devizes, with Remarks on the Grouping of Cretaceous Deposits. R.	94	II	320
— Foraminiferal Limestones from the Grenadine Islands West Indies. R.	94	II	478
Jukes-Browne, J. and W. R. Andrews: The lower Cretaceous Series of the Vale of Wardour. R. . . .	94	I	146
Jukes-Browne, A. J. and J. B. Harrison: The Geology of Barbados. R.	93	I	101

K.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kakuchi, Y.: On Cordierite as Contact Mineral. R. .	1892	I	233
Kalb, Georg Wilh.: Ueber die chemische Zusammensetzung und Constitution des Turmalins. R.	90	II	199
Kalecsinsky, A. v.: Die Anwendung eines modificirten Volumenometers zur Bestimmung des specifischen Gewichtes. R.	93	I	228
Kalkowsky, E.: Ueber Geröll-Thonschiefer glacialen Ursprungs im Culm des Frankenwaldes. R.	94	II	54
Kalugin, P.: Edelsteingruben von Mursinka und Alabaschka im Ural. R.	91	II	248
Karakasch, N.: Ueber einige Neocomablagerungen in der Krim. R.	90	II	415
Karitzky, A.: Die Spuren der Jura-Periode längs des rechten Ufers vom Dnjepr im Gouv. Kiew, District Kanew. R.	92	I	360
Karnojitzky, A.: Einige Betrachtungen über die mögliche Ursache der optischen Anomalien in den Krystallen. R. 1893 I 456	94	II	214
— Ueber die optische Anomalie des Berylls. R.	93	I	457
— Ueber die optische Structur des Dioptas. R.	93	I	458
— Mineralogische Notizen. 1. Ueber die optische Structur des Dioptases. 2. Ueber die Anordnung der krystallinischen Individuen im Vergleich zu den pyroelektrischen Erscheinungen im Turmalin. 3. Ueber die Anordnung der krystallinischen Individuen im Turmalin. R. . .	93	II	470
— Krystallographisch-optische Untersuchungen über den Turmalin. R.	94	I	43
— Ueber den Trichroismus des Turmalins. R.	94	I	44
Karpinsky, A.: Ueber die Ammoneen der Artinsk-Stufe und einige mit diesen verwandte carbonische Formen. R.	90	II	440
— Zur Ammoneen-Fauna der Artinsk-Stufe. R.	92	I	426
— Ueber das Vorkommen untersilurischer und cambrischer Ablagerungen im Gouvernement Minsk. R.	92	II	95
— Ueber eine Methode der Untersuchung der pleochroitischen Eigenschaften in mikroskopisch kleinen Krystallkörnern. R.	94	I	4
— Die Lagerstätten der Nickelerze im Ural. R.	94	I	89
Karrer, F.: Führer durch die Baumaterial-Sammlung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. Mit einem Vorwort von A. Brezina. R.	93	I	70
Karsch, F.: Ueber Cryptostemma Guér. als einzigen recenten Ausläufer der fossilen Arachnoideen-Ordnung der Meridogastra Thor. R.	94	II	352
Kasantzew, G.: Ueber die Lagerstätten der Golderze und ihre Analyse. R.	94	I	85
Kast, H. und G. Lagai: Ueber Schwefelverbindungen im Erdöl. R.	93	II	85
Kast, H. und S. Seidner: Zur Bildung des Erdwachses. R.	93	II	85
Kast, H.: Nachwort hiezu. R.	93	II	85
Katzer, Friedrich: Geologische Beschreibung der Umgebung von Ričan. R.	90	I	262
— Die isolirte Silurinsel zwischen Zwanowitz und Woderad in Böhmen. Vorläufiger Aufnahmebericht. R. . . .	90	I	269

	Jahrg.	Bd.	Seite
Katzer, Friedrich: Geologie von Böhmen mit besonderer Berücksichtigung der Erzvorkommen und der verwendbaren Mineralien und Gesteine. R. . . 1890 II 72	1892	II	89
— Beiträge zur Mineralogie Böhmens. R.	93	II	266
— Ueber eine Kalkeinlagerung in den glimmerigen Grauwackenschiefern 2c des böhmischen Untersilurs. R. 1894 I 290	94	I	478
Kayser, E.: Die Fauna des Hauptquarzits und der Zorger Schiefer des Unterharzes. R.	91	I	286
— Ueber einige neue oder wenig gekannte Versteinerungen des rheinischen Devon. R.	91	II	172
— *Ueber das Rothliegende der Gegend zwischen Battenberg und Lollar. B.*	*92*	*I*	*156*
— Lehrbuch der geologischen Formationskunde. Für Studirende und zum Selbstunterricht. R.	92	II	37
— Beiträge zur Kenntniss der Fauna der Siegener Grauwacke. R.	92	II	364
— Lehrbuch der Geologie für Studirende und zum Selbststudium. Theil I. Allgemeine Geologie. R. . . .	94	I	450
Keeler, J. E.: Earthquakes in California in 1889. R. .	83	I	57
Keilhack, K.: Ueber Moränenlandschaft im Weichselgebiet. R.	90	I	319
— Geologische Mittheilungen aus dem südlichen Fläming. R.	90	II	126
— Die Gastropodenfauna einiger kalkhaltiger Alluvialbildungen Norddeutschlands. R.	90	II	128
— Der baltische Höhenrücken in Hinterpommern und Westpreussen. R.	91	I	312
— *Ueber das Alter des Torflagers von Lauenburg an der Elbe. B.*	*92*	*I*	*151*
Keith, Arthur, siehe Geiger, H. R.			
Keller, Harry F.: Ueber Kobellit von Ouary, Col., und über die chemische Zusammensetzung dieser Species. R. .	91	II	233
— siehe Lane, A. C.			
Kellner, W.: Die Mineralien und mineralischen Producte Japans. R.	91	I	99
Kemp, James F.: The Geology of Manhattan Island. R. .	90	I	272
— A Diorite Dyke at Forest of Dean Orange Co. No. 7. R.	90	I	272
— Notes on the Minerals occurring near Port Henry, N. Y. R.	91	II	245
— On certain Porphyrite Bosses in North Westhern New Jersey. R.	91	II	301
— Notes on a Nepheline Basalt from Pilot Knob, Texas. R.	91	II	435
— Barite from Aspen, Colorado. R.	92	II	32
— Gestreifte Magnetitkrystalle aus Mineville, Lake Champlain-Gebiet, Staat New York. R.	93	I	235
— Peridotite Dikes in the Portage Sandstone, near Ithaca, N. Y. R.	94	I	77
— A Basic Dike near Hamburg, Sussex Co., New Jersey, which has been thought to contain Leucite. R. . .	94	II	261
Kempton, C. W.: Native Lead. R.	94	I	252
Kennedy, W.: Houston County. R.	94	I	111
— A Section from Terrell, Kaufman County, to Sabine Pass on the Gulf of Mexico. R.	94	I	113
Kenngott, A.: Ueber Pyrophysalith von Finbo, Augit von Risoe und Martit von Ypanema. B.	*90*	*I*	*87*
— *Ueber die Zusammensetzung des Vesuvian. B.* . . .	*91*	*I*	*200*
— *Die Formel des Axinit. B.* . . . . . *1891 I 267*	*91*	*II*	*335*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kenngott, A.: Elementare Mineralogie besonders zum Zwecke des Selbststudiums leicht fasslich dargestellt. R.	1891	II	228
— *Die Formel des vesuvischen Meionit. B.*	*92*	*I*	*49*
— *Gleitflächen am Doppelspath. B.*	*92*	*I*	*219*
— *Ueber die Formel der Turmaline. A.*	*92*	*II*	*44*
— *Zur Formel der Turmaline. B.*	*93*	*II*	*71*
— *Zusammensetzung des Helvin. B.*	*93*	*II*	*72*
Kerner v. Marilaun, Fritz: Die letzte Vergletscherung der Central-Alpen im Norden des Brenner. R.	91	II	138
— Die Verschiebungen der Wasserscheide im Wippthale während der Eiszeit. R.	94	II	46
Keyes, Ch. R.: On the Attachement of Platyceras to Palaeocrinoids and its Effects in modifying the Form of the Shell. R.	91	II	182
— The Carboniferous Echinodermata of the Mississippi Basin. R.	92	I	185
— Fossil Faunas in Central Iowa. R.	94	I	131
— Annotated Catalogue of Minerals. R.	94	I	244
— The Redrock Sandstone of Marion County, Iowa. R.	94	I	337
— Synopsis of American Carbonic Calyptraeidae. R.	94	I	516
— Stratigraphy of the Carboniferous in Central Iowa. R.	94	II	441
Kidston, Rob.: On Neuropteris plicata Sternb. and Neuropteris rectinervis Kidst. n. sp. R.	90	I	173
— On the fossil Flora of the Staffordshire Coal Fields. R.	90	I	173
— Additional Notes on some British Carboniferous Lycopods. R.	91	II	204
— On the fossil Plants in the Ravenhead Collection in the Free Library and Museum, Liverpool. R.	92	I	192
— On some fossil Plants from Teilia Quarry, Gwaenysgor, near Prestatyn, Flintshire. R.	92	I	194
— The Yorkshire carboniferous Flora. R.	93	I	424
— On the Fructification and internal Structure of carboniferous Ferns in their Relation to those of existing Genera, with special Reference to British palaeozoic Species. R.	93	I	426
— On the Fossil Flora of the Staffordshire Coal Fields. Part II. R.	94	II	190
— Notes on the Palaeozoic Species mentioned in Lindley and Hutton's „Fossil Flora". R.	94	II	369
— Notes on some Fossil Plants from the Lancashire Coal Measures. R.	94	II	478
— On the Fructification of Sphenophyllum trichomatosum Stur, from the Yorkshire Coal Field. R.	94	II	481
Kiesow, J.: Beitrag zur Kenntniss der in westpreussischen Silurgeschieben gefundenen Ostracoden. R.	92	II	359
Kikuchi, Yasushi: On Anorthite from Miyakejima. R.	92	I	511
— On Pyroxenic Components in certain Volcanic Rocks from Bonin Islands. R.	92	I	313
— siehe Sekiya, S.			
Kilian, W.: Sur quelques fossiles du crétacé inférieur de la Province. R.	90	I	356
— Structure géologique des environs de Sistéron, Basses-Alpes. R.	90	II	85
— Description géologique de la Montagne de Lure. R.	90	II	278
— Contributions à l'étude géologique des Basses-Alpes. R.	91	I	118
— Communication sur les assises supérieures du système			

	Jahrg.	Bd.	Seite
jurassique et les couches inférieures du terrain crétacé dans le bassin delphino-provençal. R.	1892	I	361
Kilian, W.: Notes géologiques sur le Jura du Doubs. V. Sur une Ammonite nouvelle du Callovien de Mathay. R.	92	I	425
— Découverte du Jurassique supérieur dans les chaînes alpines. R.	92	I	360
— Sur la structure du Massif de Varbuche (Savoie). R. .	92	I	545
— Contributions à la connaissance géologique des chaînes alpines entre Moutiers (Savoie) et Barcelonnette (Basses-Alpes). Terrains antérieurs au jurassiques. R. . .	92	I	545
— Notice explicative de la carte orogéologique au 80 Millième des environs de Montbéliard dressée par M. G. Boyer d'après les explorations de M. W. Kilian. R.	92	II	106
— Sur les chaînes alpines entre Moutiers et Barcelomette. R.	92	II	275
— Mission d'Andalousie. I. Le Gisement tithonique de Fuente de los Frailes. II. Etudes paléontologiques sur les terrains secondaires et tertiaires de l'Andalousie. R.	92	II	428
— Sur la structure géologique des chaînes alpines de la Maurienne, du Briançonnais et des régions adjacents. R.	93	I	97
— Sur le bajocien du Var. R.	93	I	519
— Sur l'existence du Jurassique supérieur dans le massif du Grand-Galibier. R.	93	I	520
— Sur quelques Ammonitides appartenant au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. Contribution à l'étude des Céphalopodes crétacés du Sud-Est de la France par G. Sayn et W. Kilian. R.	93	II	551
— Sur quelques Céphalopodes nouveaux ou peu connus de la période sécondaire. II. Notice préliminaire sur les Ammonites du calcaire Valanginien du Fontanil (Isère). R.	93	II	552
— Sur l'existence de phénomènes de recouvrement aux environs de Gréoulx (Basses-Alpes) et sur l'âge de ces dislocations. R.	94	I	283
— Sur l'allure tourmentée des plis isoclinaux dans les montagnes de la Savoie. R.	94	II	291
— Notes sur l'histoire et la structure géologique des chaînes alpines de la Maurienne, du Briançonnais et des régions adjacentes. R.	94	II	83
— Sur une secousse seismique, ressentie à Grenoble, le 8 avril 1893. R.	94	II	247
— siehe M. Bertrand.			
Kilian, W. et F. Leenhardt: Note sur les sables de la vallée d'Apt. R.	91	I	308
Kilian, W. et J. Révil: Une excursion en Tarentaise, la Brèche Nummulitique et son extension au Nord de Moutiers. R.	94	I	491
Kimball, J.: Siderite-Basins of the Hudson River Epoch. R.	92	II	75
— Genesis of Iron Ores by Isomorphous and Pseudomorphous Replacement of Limestone. R.	94	I	90
Kindall, P. F.: Glacial Geology, old and new. R. . .	94	II	336
King, Cl.: The Age of the Earth. R.	94	II	241
Kinkelin, Fr.: Der Pliocänsee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen Mainläufe. R.	90	I	448
— Der Basalt in der Senke Louisa-Flörsheim. R. . . .	90	I	448
— Erläuterungen zu den geologischen Uebersichtskarten der Gegend zwischen Taunus und Spessart. R.	90	I	449

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kinkelin, Fr.: Beiträge zur Geologie der Umgebung von Hanau. R.	1890	I	449
— *Das Alluvium (Altalluvium) oder Pliocän in der Raunheimer Schleuse. B.*	*90*	*I*	*190*
— Eine Episode aus der mittleren Tertiärzeit des Mainzer Beckens. R.	90	II	418
— Altes und Neues aus der Geologie unserer Landschaft. R.	93	I	132
— Neogenbildungen westlich von St. Barthelmae in Unterkrain. Der äussere Mundsaum von Pereiraïa Gervaisii Vez. R.	93	I	364
— Ein fossiler Giftzahn. R.	93	I	549
Kinnear, W. Tait: Note on the Occurrence of a New Carboniferous Crustacean at Adross Castle, Fife. R.	90	II	329
Kirkby, James W.: On the Occurrence of marine Fossils in the Coal Measures of Fife. R.	90	II	406
— siehe Jones, T. R.			
Kislakowsky, E. D.: Ueber den Meteoriten von Turgaisk. R.	92	I	51
Kišpatić, M.: Ueber Serpentine und Serpentin-ähnliche Gesteine aus der Fruška-gora. R.	90	II	260
— Meerschaum aus Ljubić-planina bei Prnjavor in Bosnien. R.	94	I	443
Kissling, E.: Die versteinerten Thier- und Pflanzenreste der Umgebung von Bern. Excursionsbüchlein für Studirende. R.	92	I	153
Kittl, E.: Zur Kenntnis der fossilen Säugethierfauna von Maragha. R.	90	I	340
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Säugethiere von Maragha in Persien. I. Carnivora. R.	90	I	340
— Ueber die miocänen Ablagerungen der Bucht von Gaden. R.	90	I	452
— Säugethierreste von Fratescht. R.	90	I	459
— Mammuthfunde in der inneren Stadt Wien. R.	90	II	138
— Reste von Listriodon aus dem Miocän Nieder-Oesterreichs. R.	92	I	159
— Das Gosauvorkommmen in der Einöd bei Baden. R.	94	II	122
Kjerulf, Th.: Beskrivelse af en raekke norske bergarter. R.	93	I	497
Klaatsch, H.: Zur Morphologie der Fischschuppen und zur Geschichte der Hartsubstanzgewebe. R.	93	I	549
Klautzsch, Ad.: Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere vom Rio Hatuncama bis zur Cordillera de Llangagua. R.	94	I	465
Klebs, R.: Ueber die Fauna des Bernsteins. R.	92	II	459
Klein, C.: Die Meteoriten-Sammlung der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 15. October 1889. R.	90	I	413
— Ueber eine Methode, ganze Krystalle oder Bruchstücke derselben zu Untersuchungen im parallelen und im convergenten polarisirten Lichte zu verwenden. R.	91	I	18
— *Mineralogische Mittheilungen XII. (Mit 5 Holzschn.) 27. Neue Erhitzungsapparate für mikroskopische Untersuchungen. — 28. Ueber die Methode der Einhüllung der Krystalle zum Zweck ihrer optischen Erforschung in Medien gleicher Brechbarkeit. — 29. Die optischen Eigenschaften des Rhodizits vom Ural und sein Verhalten bei der Erwärmung. — 30. Die optischen Eigenschaften des Jeremejewits und sein Verhalten gegen Druck und Erwärmung. — 31. Das Verhalten der*			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Analcimkrystalle bei der Erwärmung. — 32. Die optische Structur von Chabasit und Phakolith und ihr Verhalten bei der Erwärmung. A.	*1891*	*I*	*65*
Klein, C.: Mineralogische Mittheilungen XIII. (Mit 16 Holzschn.) 33. Ueber das Krystallsystem des Apophyllits und den Einfluss des Drucks und der Wärme auf seine optischen Eigenschaften. A.	*92*	*II*	*165*
— Ueber Construction und Verwendung von Drehapparaten zur optischen Untersuchung von Krystallen in Medien von ähnlicher Brechbarkeit. R.	93	I	8
— Flussspath von Rabenstein bei Sarntheim. R.	93	II	14
— Ueber das Arbeiten mit dem in ein Polarisationsinstrument umgewandelten Polarisationsmikroskop und über eine dabei in Betracht kommende, vereinfachte Methode zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung. R.	94	II	4
Klemencic, Ignaz: Ueber den Glimmer als Dielektricum. R.	92	I	502
Klement, C.: Analyses chimiques de quelques minéraux et roches de la Belgique et de l'Ardenne française. R.	90	I	69
— Analyses chimiques d'eaux de puits artésiens: Les puits artésiens de Willebroeck. R.	91	II	69
Klemm, G.: Section Riesa-Strehla. Blatt 16. R.	91	II	267
— Section Neustadt-Hohwald. Blatt 69. R.	92	II	81
— Chiastolithschiefer und Hornblendeporphyrit im Oberlausitzer Flachland. R.	92	II	411
— Section Stolpen. R.	93	II	89
— Section Pillnitz. R.	93	II	92
— Section Königswartha-Wittichenau. R.	93	II	94
— Die Gliederung des Schwemmlandes am unteren Main. R.	94	I	496
— Ueber den sogen. archäischen District von Strehla bei Riesa in Sachsen. R.	94	II	289
Klever, E.: Zur Kenntniss der Morphogenese des Equidengebisses. R.	91	I	327
Klika, G.: Die tertiären Land- und Süsswasser-Conchylien des nordwestlichen Böhmen. R.	93	I	553
Kliver, M.: Ueber den geognostischen Horizont der in den vier benachbarten, an der bayerisch-preussischen Landesgrenze bei Saarbrücken gelegenen Steinkohlengruben Frankenholz, Mittelbexbach, Wellesweiler und Ziehwald bebauten Flötzgruppen. R. 1890 I 295	91	II	295
— Ueber die Fortsetzung des Saarbrücker productiven Steinkohlengebirges in der Bayerischen Pfalz. R.	94	I	93
Klockmann, F.: E. S. Padmore's Bilder aus den Oberharzer Gruben. B.	*90*	*I*	*98*
— Lehrbuch der Mineralogie für Studirende und zum Selbstunterricht. R. 1891 II 226	93	I	223
— Mineralogische Mittheilungen aus den Sammlungen der Bergakademie zu Clausthal. 1. Ueber einige seltene argentinische Mineralien. R.	93	I	22
— Der geologische Aufbau des sogenannten Magdeburger Uferrandes mit besonderer Berücksichtigung der auftretenden Eruptivgesteine. R.	93	II	98
Kloos, J. H.: Vorläufige Mittheilung über die neuen Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland. R.	90	I	138
— Entstehung und Bau der Gebirge, erläutert am geologischen Bau des Harzes. R.	90	II	232
— Untersuchungen über Gesteine und Mineralien aus West-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Indien. 5. Mikroskopische Untersuchung der von Martin mitgebrachten Gesteine aus Holländisch-Guyana. R.	1890	II	277
Kloos, J. H.: Zur Entstehung des lössartigen Lehmes. R.	94	II	333
— siehe Otto, R.			
Klvaňa, Jos.: Natrolith und Analcim von Palzendorf bei Neu-Titschein, und das Gestein, in dem sie beide vorkommen. R.	93	II	252
Knickenberg, F.: Die Nordgrenze des ehemaligen Rheingletschers. R.	90	II	425
Knochenhauer, B.: Die Goldfelder in Transvaal mit besonderer Berücksichtigung der de Kaap Goldfelder. R.	91	II	299
— Bergmännische Mittheilungen aus Serbien. R.	94	I	82
Knott, Cargill G.: Notes on a Large Crystal Sphere. R.	90	I	206
Knott, Cargill G. and Aikitsu Tanakadate: A Magnetic Survey of all Japan. R.	92	II	58
Knop, A.: Beitrag zur Kenntniss der in den Diamantfeldern von Jagersfontein vorkommenden Mineralien und Gesteine. R.	90	II	97
— Der Kaiserstuhl im Breisgau. R.	93	II	503
Knowlton, F. H.: The Fossil Wood and Lignites of the Potomac Formation. R.	90	I	179
— New Species of Fossil Wood (Araucarioxylon arizonicum) from Arizona and New Mexico. R.	90	I	179
— Description of two new Species of Fossil Coniferous Wood from Iowa and Montana. R.	90	I	180
— Description of two Species of Palmoxylon — one new — from Louisiana. R.	90	I	180
— Description of a new Fossil Species of the Genus Chara. R.	90	I	180
— Description of a Problematic Organism from the Devonian at the falls of the Ohio. R.	90	I	371
— Description of Fossil Woods and Lignites from Arkansas. R.	92	II	468
— Fossil Wood and Lignite of the Potomac Formation. R.	93	II	218
— A Revision of the Genus Araucarioxylon of Kraus, with compiled Descriptions and Partial Synonymy of the Species. R.	93	II	427
— siehe Fontaine, W. M.			
Knüttel, S.: Bericht über die vulcanischen Ereignisse im engeren Sinne während des Jahres 1892. R.	94	I	67
Kobell, Fr. von: Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. 13. Auflage von K. Oebbeke. R.	94	I	243
Koby: Monographie des polypiers jurassiques de la Suisse. R.	90	II	334
Koch, Anton: Neuere Mineralvorkommnisse von Rezbanya. R.	90	I	396
— Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. R.	90	I	397
— Ein neues Cölestin- und Barytvorkommen in der Nähe von Torda in Siebenbürgen. R.	90	I	398
— Ergänzende Beobachtungen über das Cölestin- und Barytvorkommen bei Torda in Siebenbürgen. R.	90	I	398
— Neue Daten zur Kenntniss der diluvialen Fauna der Gegend von Klausenburg. R.	90	I	459
— Neue palaeontologische Daten aus den jüngeren Tertiärbildungen Siebenbürgens. R.	90	II	115
— Umgebungen von Bánfy-Hunyad. 1889. Umgebungen von Alparét. 1890. Umgebungen von Torda. 1890. (Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der Länder			

	Jahrg.	Bd.	Seite
der ungarischen Krone. Herausgegeben von der K. Ung. geol. Anstalt.) R.	1891	II	330
Koch, Anton: Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. Nr. 40—59. R.	92	I	39
— Umgegend von Alparét. R.	93	II	168
— Die Arnsteinhöhle bei Mayerling und die diluvialen Funde von Wirbelthier-Resten. R.	93	II	182
— Die im Schlier der Stadt Wels erbohrten Gasquellen nebst einigen Bemerkungen über die obere Grenze des Schliers. R.	93	II	352
Koch, M.: Olivinfels aus dem Gabbrogebiet des Harzes. R.	90	II	244
Koch, K. R.: Ueber künstliche Gletscher. R.	94	II	279
Kocsis, J.: Beiträge zur Foraminiferenfauna der alttertiären Schichten von Kis-Györ. R.	92	II	176
Koenen, A. von: Ueber die sogenannten Rutschflächen im Buntsandstein der Umgebung von Marburg. B.	*90*	*I*	*289*
— Ueber neuere Aufschlüsse im Diluvium bei Göttingen. R.	91	I	309
— Ueber postglaciale Dislocationen. R.	91	I	310
— Beitrag zur Kenntniss von Dislocationen. R.	91	I	312
— *Ueber „Spiegel" im Buntsandstein der Gegend von Marburg. B.*	*91*	*I*	*103*
— *Ueber das Alter der Schotter-Terrassen. B.*	*91*	*I*	*107*
— Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-fauna.			
Lieferung I: (Vorwort, Strombidae, Muricidae, Buccinidae). R.	91	II	177
Lieferung II: Conidae, Volutidae, Cypraeidae. R.	92	I	586
— *Ueber südrussisches Unteroligocän. B.*	*92*	*II*	*85*
— *Ueber die Casseler Tertiärbildungen. B.*	*92*	*II*	*161*
— siehe Frantzen, W.			
König, G. A.: Neue amerikanische Mineralvorkommen. R.	91	II	26
Koenig, Th. und O. von der Pfordten: Zur Constitution des Titaneisen. R.	93	I	471
Köppen: Die vorherrschenden Winde und das Baer'sche Gesetz der Flussbette. R.	90	II	240
Koken, E.: Fossile Fisch-Otolithen. R.	90	I	467
— Thoracosaurus macrorhynchus Bl. aus der Tuffkreide von Maastricht. R.	90	II	324
— Ueber Pleuracanthus Ag. oder Xenacanthus Beyr. R.	91	II	165
— Neue Untersuchungen an tertiären Fisch-Otolithen. II. R.	92	I	576
— Die Hyolithen der silurischen Geschiebe. R.	92	II	363
— *Ueber die Gastropoden der rothen Schlernschichten nebst Bemerkungen über Verbreitung und Herkunft einiger triassischer Gattungen. A.*	*92*	*II*	*25*
— siehe Wöhrmann, von.			
Koksch arow, N. von: Materialien zur Mineralogie Russlands.			
Bd. X. 1. Hälfte. R.	90	II	22
Bd. X. p. 165 bis Schluss. R.	92	I	32
Bd. XI. 1. Hälfte. R.	93	II	1
Bd XI. Schluss. R.	94	I	2
Kolácek, F.: Beiträge zur elektromagnetischen Lichttheorie. R.	90	I	2
Kollbeck, F.: Untersuchungen über die Zersetzung des Quarztrachyts neben den Golderzgangen von Nagyag. R.	90	I	60
— siehe Neubert, E. W.			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Kontkiewicz, S.: Brauner Jura im südwestlichen Theile von Russisch-Polen. R.	1893	I	347
Kornhuber, A.: Carsosaurus Marchesettii, ein neuer fossiler Lacertilier aus den Kreideschichten des Karstes bei Komen. R.	94	II	465
Kosmann, B.: Magnetkies von Kupferberg im Fichtelgebirge. R.	90	I	260
— Die Nickelerze von Frankenstein in Schlesien. R. 1892 I 83	94	II	66
— Ueber die Entstehung und Zusammensetzung der sogenannten basischen Salze. R.	92	II	4
— Mineralien aus den niederschlesischen Erzrevieren. R.	93	I	9
— Ueber die heteromorphen Zustände des Calciumcarbonats. R.	93	II	7
— Neues Vorkommen von Kämmererit oder Rodochrom bei Tampadel in Schlesien. R.	93	II	27
— Der Hydrocalcit von Wolmsdorf, ein neues Calciumhydrocarbonat. R.	94	I	260
Kosmin, N.: Ueber die Gletschererscheinungen im Olekma-Witim-Berglande (Ost-Sibirien) und deren Zusammenhang mit der Bildung der Goldfelder. R.	91	II	335
Kotô, Bundjiro: On the so-called Crystalline Schists of Chichibu (the Sambagawan Series). R.	92	I	314
— The Archaean Formation of the Abukuma-Plateau. R.	93	II	514
— On the Cause of the Great Earthquake in Central Japan, 1891. R.	94	I	282
Kountze, A. F.: Analysis of Alaska Garnet. R.	93	II	480
Kramberger-Gorjanović, D.: Ueber einen tertiären Rudisten aus Podsused bei Agram. R.	90	I	158
— Die präpontischen Bildungen des Agramer Gebirges. R.	92	II	115
— Das Vorkommen der Paludinenschichten in den Maria-Goricaer Hügeln in Croatien. R.	94	I	359
Krasnopolsky, A.: Carte géologique générale de Russie. Feuille 126: Perm-Solikamsk. R.	94	I	319
Krasnow, A.: Materialien für Forschungen der vorgeschichtlichen Natur des Wolga-Gebietes im Gouv. Nishny-Nowgorod. R.	92	I	379
— Ueber das Diluvium des Gouv. Nishny-Nowgorod und seine Rolle in der Entstehung des jetzigen Reliefs. R.	92	I	379
Krause, A.: Ueber obere Kreide-Bildungen an der hinterpommerschen Ostseeküste. R.	91	I	300
— Ueber Beyrichien und verwandte Ostracoden in untersilurischen Geschieben. R.	91	I	430
— Heimathbestimmung eines obersilurischen Diluvialgeschiebes. R.	92	I	556
— Beitrag zur Kenntniss der Ostracoden-Fauna in silurischen Diluvialgeschieben. R.	93	II	410
— Neue Ostracoden aus märkischen Silurgeschieben. R.	94	II	467
Krause, Albert: Notiz über den Diamant. R.	91	II	34
Krause, P. G.: Die Dekapoden des norddeutschen Jura. R.	92	II	456
Kremnitzky, F. J.: Beobachtungen über das Auftreten des Goldes im Verespataker Erzreviere. R.	91	II	72
Krenner, J. A.: Wasserhelle Zinkblende aus Schweden. R.	90	I	217
— Ueber den Pseudobrookit vom Vesuv. R.	90	I	218
Kreutz, F.: Graphit im granitartigen Gestein von Józefówka und Samezyk in Volhynien. R.	90	II	392
— Ursache der Färbung des blauen Steinsalzes. R.	93	II	246

	Jahrg.	Bd.	Seite
Krischtafowitsch, N.: Anzeichen einer interglaciären Epoche in Central-Russland. R.	1892	I	555
— Note préliminaire sur les couches interglaciales de Troïtzkoïe. R.	93	II	391
— Die Hauptresultate der Untersuchung der posttertiären Ablagerungen im centralen Russland. R.	94	II	336
Kroeker, K.: Ueber die Abhängigkeit der specifischen Wärme des Boracits von der Temperatur. (Mit Tafel IV.) A.	*92*	*II*	*125*
Krotow, P. und A. Netschajew: Das Trans-Kama-Gebiet des Gouv. Kasan in geologischer Beziehung. R.	94	I	320
Kroupa, G.: Ueber das Vorkommen der Metacinnabarite. R.	93	II	75
Kruss, M. und H. Landois: Das Mineralreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte. 4. Aufl. R.	90	I	212
— Lehrbuch für den Unterricht in der Mineralogie für Gymnasien, Realgymnasien und andere höhere Lehranstalten. R.	90	I	212
Krysiński, S.: Ueber ein neues Ocularmikrometer und dessen Anwendung in der mikroskopischen Krystallographie. R.	91	I	199
Kudriawzew, N.: Geologische Skizze der Bassins von Desna, Iisdra und Bolwa. Erz- und Steinkohlenlagerstätten. R.	94	I	325
— Geologische Skizze der Gouv. Orel und Kursk im Gebiete des 45. Blattes. R.	94	I	325
Kühn, B.: Untersuchungen an altkrystallinen Schiefergesteinen aus dem Gebiete der argentinischen Republik. (Mit Taf. VI.) A.	*BB*	*VII*	*295*
Kükenthal, W.: Ichthyosaurier und Wale. B.	*92*	*I*	*161*
— Ueber die Entstehung und Entwickelung des Säugethierstammes. R.	94	II	342
Küster, Fr. W.: Ueber eine scheinbare Einschränkung des Raoult'schen Gesetzes über die Gefrierpunktserniedrigung von Lösungen. Schmelzpunkt isomorpher Mischungen. R.	93	I	9
— Ueber die Erstarrungspunkte isomorpher Gemische. R.	93	I	9
Küster, Emil: Die deutschen Buntsandsteingebiete, ihre Oberflächengestaltung und anthropogeographischen Verhältnisse. R.	93	I	517
Kunisch, H.: Ueber eine Saurierplatte aus dem oberschlesischen Muschelkalk. R.	91	I	428
— Labyrinthodonten-Reste des oberschlesischen Muschelkalks. R.	94	I	379
Kunz, G. F.: Precious Stones. R.	90	I	36
— Diamonds in Meteorites. R.	91	I	45
— Mineralogical Notes. R. 1891 I 234	91	II	43
— On the Group of Meteorites recently discovered in Brenham Township, Kiowa County, Kan. R.	91	I	385
— The Gem Collection of the U. S. National Museum. R.	91	II	40
— On the Meteoric Iron which fell near Cabin Creek, Johnson County, Arkansas, March 27th, 1886. R.	91	II	51
— The Meteoric Iron which fell in Johnson County, Ark., 3.17 p. m. March 27, 1886. R.	91	II	51
— On five new American Meteorites. R.	91	II	52
— Gems and Precious Stones of North America; a popular			

	Jahrg.	Bd.	Seite
description of their occurrence, value, history, archeology, and of the collections, in which they exist, also a chapter on pearls and on remarkable foreign gems owned in the United States. R.	1892	I	1, 497
Kunz, G. F.: Meteoric Iron from Colfax Township, Rutherford Cy. R.	92	I	267
— On the Meteoric Stone from Ferguson Haywood Cy. R.	92	I	267
— A North Carolina Diamond. R.	92	II	211
— Ueber einige neuere nordamerikanische Edelsteinvorkommen. R.	93	I	254
— Gems and Precious Stones of North-America. R. . .	93	I	255
— Mineralogical Notes, on Fluorite, Opal, Amber and Diamond. R.	93	I	256
— Tysonite and Bastnäsite from Crystal Park, near Mainton Springs, Colorado. R.	93	II	470
— Octahedrite (Anatase) from near Placerville, Eldorado County, California. R.	93	II	470
— The Sapphire Deposits of the Northern Missouri River, near Helena, Montana. R.	93	II	470
— Mineralogical Notes on Brookite, Octahedrite, Quartz and Ruby. R.	94	II	31
Kunz, G. F. und E. Weinschenk: Meteoritenstudien. R.	92	II	242
— — Farmington, Washington Co., Kansas Aerolite. R.	92	II	244
Kupelwieser, Fr.: Ueber die Entwickelung und Bedeutung des steiermärkischen Erzberges. R.	94	II	61
Kurowsky, L.: Die Vertheilung der Vergletscherung in den Ostalpen. R.	90	II	425
— Die Höhe der Schneegrenze. R.	93	I	67
Kušta, J.: Oryctoblattina Arndti. R.	91	II	355
— Stanice diluvialního člověka u Lubné v Čechách. R. .	92	II	317
— Příspevky k seznání nejstarších zkamenelin českych a evropskych vubec. R.	93	II	126

L.

Lacava, M.: I bagni di latronico con l'analisi delle acque eseguita dal Dre. Gosio e con un cenno geologico sull' alta valle del Sinni per l'ingegnere G. B. Bruno. R.	93	II	50
Lacrivier, C. de: Contribution à l'étude des terrains crétacées de l'Ariège et de l'Aude. R.	90	II	413
— Note sur la Trias de l'Ariège et de l'Aude. R. . . .	93	II	527
— Note sur la distribution géographique et sur l'âge géologique des ophites et des lherzolites de l'Ariège. R.	94	I	72
— Sur la distribution géographique, l'origine et l'âge des ophites et des lherzolites de l'Ariège. R.	94	I	298
Lacroix, A.: Andalousite et sillimanite de la vallée de Barousse. R.	90	II	39
— Sur les phénomènes de contact de la granulite et des gneiss à wernérite de la Loire inférieure. R. . . .	90	II	81
— Etude petrographique des gneiss de Ceylan et du District de Salem, Madras. R.	90	II	99
— Sur une roche à amphibole sodique (riebeckite), astrophyllite, pyrochlore et zircon de Colorado. R. 1890 II 189	91	I	268
— Sur l'existence de nombreuses zéolithes dans les roches gneissiques de la haute Ariège. R. . . 1890 II 190	91	I	263

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lacroix, A.: Sur l'existence d'une roche à diaspore dans la Haute-Loire. R.	1891	I	5
— Sur la forme cristalline de la carphosidérite. Nouveaux gisements de ce minéral. R.	91	I	5
— Sur les propriétés optiques de la crocidolite et la diffusion de ce minéral. R.	91	I	6
— Sur les propriétés optiques du titanolivine. R.	91	I	6
— Sur les cipolins à minéraux et sur les roches à wernérite de l'Ariège. R.	91	I	263
— Sur les phénomènes de contact de la syénite éléolithique de Pouzac. R.	91	I	265
— Sur l'existence de roches à leucite dans l'Asie Mineure. R.	91	I	267
— Sur la syénite éléolithique de Montréal. R.	91	I	268
— Sur les andésites et labradorites à hypersthène de la Gouadeloupe. R.	91	I	268
— Sur un sulfate de baryte naturel, monoclinique et dimorphe de la barytine. R.	91	I	380
— Sur les zéolithes de gneiss de Cambo. R.	91	II	414
— Contribution à l'étude des roches métamorphiques et éruptives de l'Ariège. R.	92	I	65
— Sur les enclaves acides des roches volcaniques d'Auvergne. R.	92	I	67
— Sur les enclaves du trachyte de Menet, Cantal. R.	92	I	67
— Sur les roches volcaniques de la Martinique et de l'île Saba. R.	92	I	318
— Sur les enclaves des trachytes du Mt. Dore. R.	92	I	294
— Sur une roche éruptive de l'Ariège et sur la transformation des feldspaths en wernérite. R.	92	I	68
— Sur la transformation des feldspaths en dipyre. R.	92	II	215
— Sur l'existence de la lavénite dans les phonolithes néphéliniques de la Haute-Loire. R.	92	II	216
— Sur la fayalite des enclaves volcaniques des trachytes du Capucin (Mont-Dore). R.	92	II	216
— Sur l'existence de la leucite en veinules dans un basalte du Mont-Dore. R.	92	II	261
— Sur les roches à leucite de Trébizonde. R.	92	II	267
— Sur quelques roches d'Arménie. R.	92	II	267
— Minéralogie de la France et de ses colonies I. 1. R.	93	I	224
— Sur l'existence de la cristobalite associée à la tridymite et au quartz comme minéral de nouvelle formation dans les enclaves quartzeuses du basalte de Mayen (Prusse-Rhénane). R.	93	I	237
— Sur l'anatase et la brookite de quelques roches françaises. R.	93	I	237
— Note préliminaire sur un minéral nouveau (morinite) de Montebras (Creuse). R.	93	I	248
— Etude pétrographique des éclogites de la Loire-Inférieure. R.	93	I	273
— Description des gneiss à pyroxène de Bretagne et des cipolins qui leur sont associés. R.	93	I	274
— Sur le rélation existant entre la forme et la nature des gisements de l'andalousite de l'Ariège. R.	93	I	276
— Contributions to the Study of the Pyroxene Varieties of Gneiss and of the Scapolite-bearing Rocks of Ceylon and Salem. R.	93	I	506
— Sur la magnésioferrite du roc de Cuzeau. R.	93	II	246

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lacroix, A.: Sur les déformations subies par les cristaux de quartz des filons de Pitourles-en-Lordat (Ariège) et sur les minéraux formés par l'action de ces filons sur les calcaires paléozoïques. R.	1893	II	247
— Fouquéite. R.	93	II	250
— Matériaux pour la minéralogie de la France. R.	93	II	265
— Sur les minéraux des sanidinites du Plateau Central de la France. R.	93	II	265
— Sur la dioptase du Congo Français. R.	94	I	42
— Sur l'axinite des Pyrénées, ses formes et les conditions de son gisements. R.	94	I	43
— Sur les relations entre la forme et la nature des gisements de l'andalousite de l'Ariège. R.	94	I	45
— Sur l'existence de zéolites dans les calcaires jurassiques de l'Ariège et sur la dissémination de ces minéraux dans les Pyrénées. R.	94	I	48
— Sur les modifications minéralogiques, effectuées par lherzolite sur les calcaires du jurassique inférieur de l'Ariège. Conclusions à en tirer au point de vue de l'histoire de cette roche eruptive. R.	94	I	299
— Sur les roches basiques à néphéline du plateau central de la France. R.	94	II	424
— siehe Des Cloizeaux, A.			
— siehe Michel-Lévy, A.			
Lacroix, A. et Ch. Baret: Sur la bertrandite d'un nouveau gisement de la Loire-Inférieure. R.	93	I	239
Ladd, G. E.: Notes on the Clays and Building Stones of certain Western Central Counties tributary to Kansas City. R.	93	II	337
Ladrière: Découverte d'un silex taillé et d'une défense de Mammouth à Vitry-en-Artois. R.	90	I	333
— Sur les dépôts phosphatés de Montay et de Forest, Nord. R.	90	II	86
Lagai, G., siehe Kast, H.			
Lagorio, A.: Ueber die künstliche Darstellung des Leucits und dessen optische Anomalien. R.	94	I	13
— Krystallographische Untersuchung einiger künstlicher Mineralien. R.	94	I	13
Lahusen, J.: Ueber die russischen Aucellen. R.	90	I	158
Lake, Ph.: The Geology of South Malabar, between the Beypore and Ponnani Rivers. R.	94	II	297
Lakowitz: Betuloxylon Geinitzii nov. sp. und die fossilen Birkenhölzer. R.	91	II	206
Lambert, M. J.: Note sur le genre Echinocyamus van Phelsum 1774. R.	92	II	365
— Observations sur quelques Hemicidaris. R.	93	I	412
Lamplugh, G. W.: On the Subdivisions of the Speeton Clay. R.	92	I	364
— On the Drifts of Flamborough Head. R.	93	I	60
— siehe Pawlow, A.			
Landero, C. F. de: On Pink Grossularite from Mexico. R.	93	II	479
Landesque, L.: Sur le Calcaire à Palaeotherium de l'Agenais et du Périgord. R.	90	I	121
— L'Agenais et le Périgord dans les époques du miocène inférieur et du miocène moyen. R.	90	I	454
— Quelques renseignements nouveaux sur les terrains tertiaires des environs de Beaumont. R.	90	II	306

	Jahrg.	Bd.	Seite
Landois, H.: Die Familie Megistopodes, Riesenbauchflosser. (Mit Taf. V.) A.	*1894*	*II*	*228*
— siehe Kruss, M.			
Lane, A. C.: The Geology of Nahaut. R.	90	I	85
— A Pocket Mapping Instrument. R.	90	II	102
— On the Recognition of the Angles of Crystals in Thin Sections. R.	93	I	68
— Petrographical Tables. R.	93	I	69
Lane, A. C., H. F. Keller and F. F. Sharpless: Notes on Michigan Minerals. R.	94	I	58
Lang: H. O.: Ueber geriefte Geschiebe von Muschelkalkstein der Göttinger Gegend. R.	90	I	297
— Beschaffenheit und Mächtigkeit der Lettenkohlenstufe bei Göttingen. R.	90	I	299
— Ueber die Individualität der Gesteine. R.	92	I	274
— Versuch einer Ordnung der Eruptivgesteine nach ihrem chemischen Bestande. R.	93	I	486
— Das Mengenverhältniss von Calcium, Natrium und Kalium als Vergleichungspunkt und Ordnungsmittel der Eruptivgesteine. R.	93	I	486
— Beiträge zur Systematik der Eruptivgesteine. R.	93	II	484
Langdon jr., D. W.: Geology of Mon Lois Island, Mobile Bay. R.	92	II	318
— Variations in the Cretaceous and Tertiary Strata of Alabama. R.	93	II	387
Lange, Th.: Beiträge zur Kenntniss der Flora des Aachener Sandes. R.	94	II	194
Langenbeck, R.: Die Theorien über die Entstehung der Koralleninseln und Korallenriffe und ihre Bedeutung für geophysische Fragen. R.	92	II	169
— Die Erdbebenerscheinungen in der oberrheinischen Tiefebene und ihrer Umgebung. R.	94	II	245
Langenhan und Grundey: Das Kieslingswalder Gestein und seine Versteinerungen. R.	93	II	157
Langsdorff, W.: Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Oberharzes, insbesondere in der Umgebung von Lautenthal und im Innerstethal. R.	94	II	101
Lapparent, A. de: Cours de Minéralogie. 2. Auflage. R.	90	I	18
— Sur l'origine des roches éruptives. R.	90	I	253
— Sur la rélation des roches éruptives acides avec les émanations solfatariennes. R.	90	II	79
— La nature des mouvements de l'écorce terrestre. R.	90	II	236
— Note sur le rôle des agents minéralisateurs dans la formation des roches éruptives. R.	90	II	401
— De la mésure du temps par les phénomènes de sédimentation. R.	91	II	262
— Sur un sphéroide de pyromeride. R.	91	II	287
— Sur le conglomérat à ossements de Gourbesville (Manche). R. 1891 II 329	92	II	113
— Sur les éruptions porphyriques de l'île de Jersey. R.	92	I	68
— La formation de la craie phosphatée en Picardie. R.	92	I	367
— Sur l'argile à silex du bassin de Paris. R.	92	I	295
— Note sur la formation des ressauts de terrain dits rideaux. R.	92	II	65
— Sur la chronologie des roches éruptives à Jersey. R.	92	II	261
— Note sur la formation de l'argile à silex. R. 1892 II 262	93	I	523
— Sur le caractère terrigène de la craie. R.	94	II	117

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lapworth, Ch.: On the Discovery of the Olenellus-Fauna in the Lower Cambrian Rocks of Britain. R. . .	1891	II	111
— On Olenellus Callavei and its geological Relations. R.	92	I	541
Laromiguière, Jules: Bassin houiller de Carmaux-Albi. R.	93	II	83
Larrazet: Le „Steneosaurus“ de Parmilien. R.	91	II	346
Lasne, H.: Sur les diaclases et les rideaux des environs de Doullens. R. . . . . 1892 I 133	92	I	367
— Sur l'origine des rideaux en Picardie. R.	92	II	66
— Sur les terrains phosphatés des environs de Doullens, étage sénonien et terrains superposés. R.	94	I	352
Laspeyres, H.: Mittheilungen aus dem mineralogischen Museum der Universität Bonn. IV. Theil. 21. Polydymit (sog. Nickelwismuthglanz) von der Grube „Grüneau“ bei Kirchen. 22. Krystallisirter Antimonnickelglanz (Ullmannit) von der Grube Landeskrone bei Wilnsdorf unweit Siegen. 23. Krystallisirter Kupferantimonglanz (Wolfsbergit) von Wolfsberg im Harz. R.	92	II	408
— Der Einbruch von Diabas in die Flötze der Steinkohlenformation auf der Grube Heinitz bei Saarbrücken. R.	94	II	59
— Das Vorkommen und die Verbreitung des Nickels im rheinischen Schiefergebirge.			
I. Abschnitt. R.	94	II	61
II.—IV. (Schluss.) R.	94	II	274
— Vorrichtung am Mikroskope zur raschen Umwandlung paralleler Lichtstrahlen in convergente. R.	94	II	214
Laspeyres, H. und K. Busz: Mittheilungen aus dem mineralogischen Museum der Universität Bonn.			
III. Theil. 15. Arsenantimonnickelglanz (Korynit) von der Grube Storch und Schöneberg bei Siegen (L.). 16. Wismuthantimonnickelglanz (Kallilith), ein neues Nickelerz von der Grube Friedrich bei Schönstein a. Sieg (L.). 17. Sychnodymit, ein neues Kobalterz von der Grube Kohlenbach bei Eisenfeld, unweit Siegen (L.). 18. Datolith von Andreasberg (B.). 19. Sublimirte Mineralien vom Krufter Ofen am Laacher See (B.). R.	92	II	406
V. Theil. 24. Haarförmiger und gestrickter Kupferkies von der Grube Heinrichssegen bei Müsen (L.). 25. Beyrichit von der Grube Lammerichskaule bei Altenkirchen im Siegenschen (L.). 26. Zwillinge von Kobaltglanz nach der Oktaëderfläche von der Grube Wingertshardt bei Siegen (L.). 27. Kobalt- und nickelreicher Eisenkies von der Grube Heinrichssegen bei Müsen (L.). 28. Skorodit von Lölling (B.). 29. Pyrargyrit von Mexico (B.). 30. Anatas von Bourg d'Oisans, Dauphiné (B.). 31. Diopsid von Achmatowsk (B.). 32. Schwefel von Milo (B.). 33. Schwefel von Roisdorf bei Bonn (B.). 34. Schwefel von Bassick, Vereinigte Staaten N.-A. (B.). 35. Schwefel von Conil bei Cadiz, Spanien (B.). R.	93	II	258
Laspeyres, H., K. Busz und W. Bruhns: Mittheilungen aus dem mineralogischen Museum der Universität Bonn. II. Theil. 7. Die Grundformen der Glimmer und des Klinochlors (L.). 8. Schwefel von Bassick,			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Vereinigte Staaten N.-A. (vergl. auch Sitzungsber. niederrhein. Ges. Bonn 1889. p. 48) (B.). 9. Beryll von S. Piero, Elba (B.). 10. Flussspath von Cornwall (B.). 11. Goethit von St. Just, Cornwall (B.). 12. Hypersthen vom Rocher du Capucin, Mont Dore (B.). 13. Korund vom Laacher See (siehe auch Sitzungsber. niederrhein. Ges. Bonn 1890. p. 31) (Br.). 14. Phosphosiderit, ein neues Mineral von der Grube Kalterborn bei Eiserfeld im Siegenschen (vergl. auch Sitzungsber. niederrhein. Ges. Bonn 1890. p. 29) (Br. und B.). R.	1892	I	226
Lattermann, G.: Die Lautenthaler Soolquelle und ihre Absätze. R.	91	I	248
Launay, L. de: Sur les dislocations du terrain primitif dans le nord du plateau central. R.	90	II	85
— Note sur les roches primitives de la feuille de Brives. R.	90	II	386
— La géologie de l'île Metelin. R.	91	I	266
— Sur les porphyrites de l'Allier. R.	91	II	283
— Sur les gîsements de kaolin des Colettes, Dép. Allier. R.	91	II	285
— Etude sur le terrain permien de l'Allier. R.	91	II	315
— Mémoire sur l'industrie du cuivre dans la région d'Huelva (Rio-Tinto, San-Domingo etc.). R.	92	I	84
— Études sur le Plateau Central. I. La vallée du Cher dans la région de Montluçon. R.	93	II	105
Launay, L. de et E. A. Martel: Note sur quelques questions relatives à la géologie des grottes et des eaux souterraines. R.	92	II	66
La Valle, Giuseppe: Sul diopside delle „Borne de' Brous" presso Ala in Val d'Ala. R.	90	II	215
— Sull' Epidoto di Val d'Ala. R.	91	II	408
Lavenir, A.: Sur la martite. R.	90	II	38
Lavis, Antonia and H. J. Johnston-Lavis: Bibliography of the Geology and Eruptive Phenomena of the South Italian Volcanoes that were visited in 1889 as well as of the Submarine Volcano of a. D. 1831. R.	92	II	51
Lawson, A. C.: Notes on some Diabase Dykes of the Rainy Lake Region. R.	90	I	278
— Gneissic Foliation and Schistose Cleavage in Dykes and their Bearing on the Problem of the Origin of the Archaean Rocks. R.	90	I	279
— Note on the Occurrence of native Copper in the Animikie Rocks of Thunder Bay. R.	90	II	384
— Report on the Geology of the Rainy Lake region. R.	91	II	89
— Note on the Prepalaeozoic Surface of the Archaean Terranes of Canada. R.	92	II	293
— The Internal Relations and Taxonomy of the Archaean of Central Canada. R.	92	II	293
— The Geology of Carmelo Bay. R.	94	I	267
— The Anorthosytes of the Minnesota Coast of Lake Superior. R.	94	II	264
— The Lacolitic Sills of the North-West Coast of Lake Superior. R.	94	II	264
— siehe Adams, Fr. D.			
Lawton, Chas. D.: Mines and Mineral Statistics. R. . .	90	II	384
Lebedew, N.: Obersilurische Fauna des Timan. R. . .	94	I	122
Lebesconte: La Théorie, qui considère les Cruziana comme des contre-moulages de pistes d'animaux, ne peut plus exister. R.	91	II	374

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lebesconte: Assises siluriennes les plus anciennes de Bretagne (suite). R.	1891	II	438
Le Chatelier, H.: Sur la dilatation du quartz. R. 1890 II 189	91	I	209
— Sur la polarisation rotatoire du quartz. R. 1891 I 207	91	I	209
— Sur des essais de reproduction des roches acides. R.	92	II	271
— Sur la fusion du carbonate de chaux. R.	94	I	305
— siehe Mallard, Er.			
Lechleitner, H.: Eine eigenthümliche Ausbildung der Gosauformation in Brandenberg. R.	93	I	521
— Eine neue Lagerstätte dioritischer Gesteine bei Vahrn am Eisack. R.	93	II	331
— Neue Beiträge zur Kenntniss der dioritischen Gesteine Tirols. R.	93	II	487
Le Conte, J.: Theories on the Origin of Mountains. R.	94	II	242
Lecornu: Sur le terrain silurien du Calvados. R.	90	II	289
Ledoux, A. R.: The Pipe-Creek Meteorite. R.	91	I	50
Leenhardt, siehe Depéret, Ch.			
— siehe Kilian, W.			
Lehmann, Friedrich: Die Lamellibranchiaten des Miocäns von Dingden. I. Theil: Asiphonida und Siphonida integripalliata. R.	93	II	200
Lehmann, O.: Ueber Zwillingsbildung bei Chlorbaryum. R.	90	II	204
— Ueber das Wandern der Ionen bei geschmolzenem und festem Jodsilber. R.	91	II	4
— Ueber fliessende Krystalle. R.	91	II	4
— Ueber tropfbar flüssige Krystalle. R.	91	II	5
— Ueber krystallinische Flüssigkeiten. R.	91	II	5
— Einige Verbesserungen des Krystallisationsmikroskops. R.	91	II	224
— Ueber elektrolytische Krystallisation und die Dimorphie von Blei. R.	92	II	3
— Ueber die Definition des Begriffes „Krystall“. R.	93	I	455
— Die Krystallanalyse oder die chemische Analyse durch Beobachtung der Krystallbildung mit Hilfe des Mikroskops mit theilweiser Benutzung seines Buches über Molecularphysik. R.	93	I	459
— Ueber künstliche Färbung von Krystallen. R.	93	II	5
Leidy, Joseph: Remarks on the Nature of organic Species. R.	90	II	331
— Notice on some fossil human Bones. R.	90	II	427
Lemberg, J.: Zur Kenntniss der Bildung und Umwandlung von Silicaten. R.	91	I	228
— Die Aufstellung des Mischungsgesetzes der Feldspäthe durch J. F. Hessel. R.	92	I	31
— Zur mikrochemischen Untersuchung einiger Minerale. R. 1892 II 7	94	I	7
— Zum mikroskopischen Nachweis des Eisens. R.	94	I	460
Le Mesle: Jurassique du Zaghouan. R.	90	II	110
— Sur la géologie de la Tunisie. R.	91	II	298
— Communication. R.	93	I	349
Lemoine, V.: Sur quelques mammifères carnassiers recueillis dans l'éocène inférieure des environs de Reims. R.	90	I	340
— Étude sur les rapports des mammifères de la faune cernaysienne et des mammifères crétacés d'Amérique. R.	92	I	413
— Étude d'ensemble sur les dents des mammifères fossiles des environs de Reims. R.	93	II	394
Lendenfeld, R. von: An Exploration of the Victorian Alps. R.	94	II	299

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lendenfeld, R. von, siehe Schulze, F. E.			
Lenk, H., siehe Felix, J.			
Lennier, G.: Description des fossiles du Cap de la Hêve. I. Partie. Etage kimméridien. R.	1892	II	354
Lent, Karl und G. Steinmann: Die Renggeri-Thone im badischen Oberlande. R.	94	I	140
Leonhard, G. und R. Hörnes: Grundzüge der Geognosie und Geologie. 4. Aufl. 2. u. 3. Lief. R.	90	II	232
Leppla, A.: Rothliegendes und Buntsandstein im Haardtgebirge. R.	90	II	293
— Ueber den Buntsandstein im Haardtgebirge. R.	90	II	293
— Zur Lössfrage. R.	90	II	425
— *Was ist Ober-Rothliegendes? B.*	*92*	*II*	*78*
— *Ueber die Lagerungsform des Remigiusberger Eruptivgesteins. B.*	*93*	*I*	*134*
— Ueber die Zechsteinformation und den unteren Buntsandstein im Waldeckischen. R.	93	I	342
— Ueber das Grundgebirge der pfälzischen Nordvogesen (Hartgebirge). R.	93	II	327
Leppla, A. und A. Schwager: Der Nephelinbasalt von Oberleinleiter. R.	90	II	65
Lepsius, R.: Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. I. 2. R.	91	II	106
— Ueber die fossilen Reste aus dem mitteloligocänen Meeressandstein bei Heppenheim an der Bergstrasse. R.	92	I	367
— Das Bohrloch der Gebrüder Becker in der Mauerstrasse in Darmstadt. R.	92	I	368
— Griechische Marmorstudien. R.	92	II	260
— Die erste Quarzporphyr-Effusiv-Decke im Saar-Nahe-Gebiet nachgewiesen. R.	93	I	271
— Berichtigung zu Steinmann: Einige Fossilreste aus Griechenland. R.	93	II	386
Lesley, T. P.: Second Geological Survey of Pennsylvania. R.	90	I	279
Lesquereux, Leo: Specimens of fossil Plants collected at Golden, Colorado 1883, for the Museum of comparative Zoology at Cambridge, Mass. R.	90	I	373
— Recent Determinations of fossil Plants from Kentucky, Louisiana, Oregon, California, Alaska, Greenland etc., with Description of new Species. R.	90	I	373
Leuze, A.: Pseudomorphosen von Kalkspath nach Aragonit von Burgheim bei Lahr. R.	90	I	14
— Kalkspäthe aus dem Tavetsch. R.	90	I	14
— Kalkspäthe aus dem Bündner Schiefer, insbesondere von Churwalden. R.	90	I	15
— Beiträge zur Mineralogie Württembergs. R. 1890 I 394	91	II	230
— Die Mineralien und Pseudomorphosen des Roseneggs. R.	90	II	50
— Ueber die Formen der in Württemberg gefundenen Gypse und über Zwillingslamellen in Gyps. R.	91	II	230
— Die Gypse von Iselshausen. R.	93	II	34
— Mineralogische Notizen. R.	93	II	36
— Pseudomorphosen von Rotheisen nach Pyrit von Antonio Pereira. R.	93	II	257
Leverett, F.: On the Correlation of Moraines with Raised Beaches of Lake Erie. R.	93	II	174
— Pleistocene fluvial Planes of western Pennsylvania. R.	94	II	459

	Jahrg.	Bd.	Seite
Le Verrier: Sur la structure des porphyres quartzifères du Forez. R.	1890	II	80
— Sur quelques roches porphyriques du Forez. R.	90	II	81
— Sur la structure de gneiss. R.	90	II	81
— Sur une venue de granulite à riebeckite de Corse. R.	91	I	266
Lewakowsky, J.: Einige Beiträge zur Kenntniss der Schwarzerde (Tschernosem). R.	90	I	328
— Die Gewässer Russlands in ihren Beziehungen zur Bevölkerung. R.	92	II	61
Leyst, E.: Untersuchungen über die Bodentemperatur in Königsberg i. P. R.	94	II	37
Liebetrau, Edmund: Beiträge zur Kenntniss des unteren Muschelkalkes bei Jena. R.	91	I	295
Liebisch, Th.: Ueber eine Vorrichtung zur Beobachtung der äusseren conischen Refraction unter dem Mikroskop. R.	91	I	3
— Physikalische Krystallographie. R.	91	I	193
— Ueber Absorptionsbüschel pleochroitischer Krystalle. R.	91	I	196
— Ueber thermoelektrische Ströme in Krystallen. R.	92	I	501
Liebrich, A.: Beitrag zur Kenntniss des Bauxits vom Vogelsberge. R.	92	I	277
— *Ueber eine eigenartige Kalksteinbildung in doleritischen Verwitterungsproducten. A.*	*93*	*II*	*75*
Lienenklaus, E.: Die Ober-Oligocän-Fauna des Doberges. R.	91	II	443
Liétard, siehe Oehlert.			
Lima, W. de: Sur les couches de Bussaco. R.	92	I	351
— Note sur un nouvel eurypterus du Rothliegendes de Bussaco. R.	94	I	189
— Noticia sobre as camadas da serie permocarbonica do Bussaco. R.	94	II	102
Linck, G.: Beitrag zur Kenntniss der Sulfate von Tierra amarilla bei Copiapó in Chile. R.	90	II	216
— Aetzfiguren am Sylvin. R.	93	I	24
— Ueber die Zwillingsbildung und den orientirten Schimmer am gediegen Eisen. R.	93	I	231
— Geognostische Beschreibung des Thalhorn im oberen Amariner Thal. R.	93	II	355
— Ueber Hercynit aus dem Veltlin. R.	94	II	21
— siehe Hettner, A.			
Lindgren, W.: The Gold Deposit at Pine Hill. R.	94	II	218
— Sodalite-Syenite and other Rocks from Montana. R.	94	II	262
— The Auriferous Veins of Meadow Lake, California. R.	94	II	429
— siehe Melville, W. H.			
Lindner, A.: Experimentelle Prüfung der von Clarke und Schneider für den Serpentin aufgestellten Constitutionsformel. R.	94	I	438
Lindsay, J.: Notes on the Geology of Ayrshire. R.	91	II	437
Lindström, G.: Zwei Idokrasanalysen. R.	90	II	33
— Weitere Mittheilung über Wismuthminerale von Gladhammar. R.	90	II	53
— On the Genus Ascoceras Barrande. R.	91	II	357
— The Ascoceratidae and the Lituitidae of the Upper Silurian Formation of Gotland. R.	91	II	358
— Einiges über die silurische Gattung Calostylis. R.	92	II	370
— Ueber die Gattung Prisciturben Kunth. R.	92	II	370
— Mineralanalysen. R.	93	II	9

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lion, G.: Traité élémentaire de cristallographie géométrique à l'usage des candidats à la licence et des chimistes. R. 1892	II		207
Lisitzin, G.: Några iakttagelser gjorda i trakterna norr om Ladoga sjö, sommaren 1889. R.	93	II	106
— Iakttagelser gjorda under malm- och mineralletningar sommaren 1890. R.	93	II	106
Lister, J. J.: Notes on the Geology of the Tonga Islands. R. 1892 II 281	93	I	319
Litschauer, L.: Vertheilung der Erze in den Lagerstätten metallischer Mineralien. R.	94	I	468
Liversidge, A.: Metallic Meteorite, Queensland. R. . .	91	I	47
Loczka, J.: Mineralchemische Mittheilungen. R. 1890 II 218	91	I	239
Lodin: Sur l'origine des gîtes calaminaires. R.	93	I	80
Löfstrand, G.: Om apatitens förekomstsätt i Norbottens län jemfördt med dess uppträdande i Norge. R. 1893 I 36	93	II	63
— Aro jernmalmerna och apatiten i Norrbotten lagerbildningar. R. . . . . 1893 II 64	93	II	270
— Basiska utsöndringar och gångformiga bildningar af jernmalm i sura eruptiva bergarter inom Norbottens län. R.	93	II	71
Lörenthey, E.: Die pontische Stufe und deren Fauna bei Nagy-Mányok im Comitate Tolna. R.	91	II	330
Lösch, A.: Ueber zwei Exemplare des Magneteisens vom Berge Wyssokaja bei Nischne-Tagilsk (Ural). R. . .	93	I	24
Löwinson-Lessing, F.: Zur Bildungsweise und Classification der klastischen Gesteine. R.	90	I	55
— Die agronomische Kartirung, ein kritischer Versuch. R.	90	I	131
— Die Olonezer Diabasformation. R.	90	II	266
— Note sur la structure des roches éruptives. R. . . .	92	I	273
— Deuxième note sur la structure des roches éruptives. R. 1892 I 273	92	II	248
— Etude sur la composition chimique des roches éruptives. R.	92	I	274
— Ueber die säcularen Verschiebungen der Meere und Festländer. R.	93	II	321
— Les ammonées de la zone à Sporadoceras Münsteri. R.	93	II	375
Löwl, F.: Die gebirgsbildenden Felsarten. R.	94	I	457
Lohest, Maximin: Recherches sur les poissons des terrains paléozoïques de Belgique. I. Theil: Poissons de l'ampélite alunifère des genres Campodus Petrodus et Xystracanthus. R.	90	I	348
— Découverte du plus ancien amphibien connu et de quelques fossiles remarquables dans le Famennien supérieur de Modave. R.	91	II	158
— Sur la présence d'un banc de calcaire à échinides à la partie supérieure du calcaire à crinoides, exploité pour pierres de taille. R.	94	I	479
Lommel, E.: Neue Methode zur Messung der Drehung der Polarisationsebene für die Fraunhofer'schen Linien. R.	92	I	211
— Interferenz durch circulare Doppelbrechung. R. . . .	92	I	211
— Die Curven gleicher Lichtstärke in den Axenbildern doppelbrechender Krystalle. R.	92	I	213
Lomnicki, A. M.: Ein Beitrag zur Geologie Lembergs. R.	93	I	527
Lorenzo, G. de: Avanci morenici di un antico ghiacciaio del monte Sirino nei dintorni di Lagonegro. R. . .	94	I	101
— Sul Trias dei dintorni di Lagonegro in Basilicata. R.	94	II	446

	Jahrg.	Bd.	Seite
Loretz, H.: Contactmetamorphische Umwandlung von phyllitischem Schiefer durch Kersantit. R.	1890	II	246
— Ueber das Vorkommen von Kersantit und Glimmerporphyrit in derselben Gangspalte bei Unterneubrunn im Thüringer Walde. R.	91	I	65
— Mittheilung über einige Eruptivgesteine des Rothliegenden im östlichen Thüringer Walde. R.	91	II	277
— Der Zechstein in der Gegend von Blankenburg und Königsee am Thüringer Walde. R.	92	II	297
— Ueber das Vorkommen von verkieseltem Zechsteinkalk. R.	93	II	130
— Bemerkungen über den Paramelaphyr. R.	94	I	459
Lorié, J.: Contributions à la géologie des Pays-Bas. R.	92	I	147
— Wat eenige diepe puthoringen ons geleerd hebben. R.	92	I	149
— Verslag over eenige boringen in het oostelijke Gedeelte der Provincie Utrecht. Eenige Onderzoekningen in den Nieuwen Maasmond. R.	94	II	333
Loriol, P. de: Etudes sur les Mollusques des couches coralligènes de Valfin (Jura). R.	91	II	176
— Description de la Faune jurassique du Portugal. Embranchement des Echinodermes. 1. Fasc. Echinides réguliers ou endocycliques. R.	91	II	190
— Note sur deux Echinodermes nouveaux. R.	91	II	192
— Crinoides. R.	92	I	449
— Etudes sur les Mollusques des couches coralligènes inférieures du Jura bernois, accompagnées d'une notice stratigraphique par E. Koby. R.	92	II	136
— Notes pour servir à l'étude des Echinodermes. III. R.	93	II	208
Lortet: Les reptiles fossiles du bassin du Rhône. R.	94	I	376
Lory, P.: Sur les Hoplites valanginiens du groupe de Hoplites neocomiensis. R.	93	II	553
Lossen, K. A.: Ueber Gneissgranite als Structurabänderungen der Eruptiv-Granitgänge im Harzburger Gabbro und im Ecker-Gneiss. R.	90	I	255
— Vergleichende Studien über die Gesteine des Spiemonts und des Bosenbergs bei St. Wendel und verwandte benachbarte Eruptivtypen aus der Zeit des Rothliegenden. R.	92	I	275
— Bänderstructur im Gabbro des Bärensteins (Radauthal). R.	92	II	411
— Ueber Quarzporphyr-Gänge an der Unter-Nahe und über das räumliche Verhalten der Eruptiv-Gesteine des Saar-Nahe-Gebietes zum Schichtenaufbau. R.	92	II	412
— Andalusit-Krystalle vom Koleborn und Schellenberg im Harzburger Forst. R.	92	II	412
— Ueber geologische Aufnahmen auf dem Blatte Harzburg. R.	93	I	269
— Ueber die fraglichen Tertiärablagerungen im Gebiete der Elbingeröder Mulde und ihre wahrscheinlichen Beziehungen zur Braunkohlenformation des nördlichen Harzrandes. R.	93	I	362
Lotti, B.: Il Monte di Canino in provincia di Roma. R.	90	I	119
— Les transgressions secondaires dans la Chaîne Métallifère de la Toscane, traduit de l'italien par A. Cheteux. R.	90	II	109
— Sur les roches metamorphosées pendant l'age tertiaire dans l'Italie centrale. R.	91	II	289
— Ulteriori notizie sul giacimento cuprifero di Montecastelli in provincia di Pisa. R.	92	II	73

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lotti, B.: Sul giacimento cuprifero di Montaione in Val d'Elsa. R.	1892	II	73
— Sopra una nota del Prof. L. Bucca sull' età del granito elbano. R.	93	I	278
— Considerazioni sintetiche sulla orografia e sulla geologia della Catena metallifera in Toscana. R.	93	I	303
— Ueber die Entstehung der Eisenerzlagerstätten der Insel Elba und der toscanischen Küstenregion. R.	93	II	71
— Descrizione geologico-mineraria dei dintorni di Massa Marittima in Toscana. R.	94	I	83
— Sulla genesi dei giacimenti metalliferi nelle roccie eruttive basiche. R.	94	II	276
— Il regione sotterraneo delle sorgenti dell' Elsa in provincia di Siena. R.	94	II	417
— Descrizione geologico-mineraria dei dintorni di Massa Marittima. R.	94	II	432
— Due parole sulla posizione stratigrafica della flore fossile del verrucano nel Monte Pisano. R.	94	II	443
Louis, H.: On the Mode of Occurrence of Gold. R.	94	II	218
Lovrekovič, St.: Ueber die Amphibolite bei Deutsch-Landsberg. R.	94	I	461
Low, A. P.: Report on Explorations in James Bay and Country east of Hudson Bay, drained by the Big, Great Whale and Clearwater Rivers. R.	91	II	91
Lowag, Jos.: Die Goldlagerstätten von Dürrseifen und Umgebung in Oesterreichisch-Schlesien. R.	94	I	85
Lucas, R. N.: Notes on the Older Rocks of Finland. R.	92	I	310
Ludeking, C.: Synthesis of the Minerals Crocoite and Phoenicochroit. R.	94	II	230
Ludwig, E.: Der Preblauer Säuerling. R.	91	II	74
— Die Mineralquellen Bosniens. R.	91	II	74
— Fortgesetzte Untersuchungen über die arsenhaltigen Vitriolquellen von Srebrenica in Bosnien. R.	91	II	74
— Die Mineralquellen des Büdös (Bálványos) in Siebenbürgen. R.	91	II	74
Ludwig, H.: Echinodermen in Dr. H. G. Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs. II. Bd. 3. Abth. Holothurioidea. R.	92	II	367
Lüdecke, O.: Ueber Datolith. Eine mineralogische Monographie. R.	90	II	28
— Datolith von Tarifville, U. S.	90	II	31
— Ueber Axinit im Harze und die chemische Zusammensetzung des Axinits überhaupt. R.	90	II	49
— Die isopleomorphe Gruppe der Mesotype. R.	92	I	223
— Ueber Heintzit, ein neues Borat von Leopoldshall. R.	92	II	18
— Ueber Heintzit und seine Identität mit Hintzeït und Kaliborit. R.	94	I	19
Lüdecke, Carl: Untersuchungen über Gesteine und Böden der Muschelkalkformation in der Gegend von Göttingen. R.	94	I	480
Lüdeking: Synthèse du crocoïte et du phönicochroïte. R.	93	I	266
Luedeking, C. and H. A. Wheeler: Notes on a Missouri Barite. R.	94	I	51
Lugeon, M., siehe Golliez, H.			
Lundbohm, H.: Ueber den älteren baltischen Eisstrom im südlichen Schweden. R.	90	I	129

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lundbohm, H.: Geschiebe aus der Umgegend von Königsberg. R.	1892	I	307
— Om Gellivare malmberg och apatitundersökningarna derstädes. R.	1893	II	64
— siehe Nordström, Th.	93	II	269
Lundgren, Bernhard: Ofversigt af Sveriges mesozoiska Bildningar. R.	90	II	297
— Om kritfaunan vid Tormarp i Halland etc. R.	90	II	410
— Bemerkungen über Permfossilien von Spitzbergen. R.	91	II	121
— Was ist unter Dictyonema-Schiefer zu verstehen? R.	92	I	342
— Studier öfver fossilförande lösa block, 6.—9. R.	92	I	375
— Smånotiser om de lösa jordlagren. R.	92	I	376
Lundström, C. H., siehe Sjögren, Ant.			
Luquer, L. Mc I.: Mineralogical Notes. R.	94	I	273
Luzi, W.: Ueber künstliche Corrosionsfiguren am Diamanten. R.	93	II	241
— Zur Kenntniss des Graphitkohlenstoffes. R.	93	II	241
— Beiträge zur Kenntniss des Graphitkohlenstoffes. R.	93	II	241
— Ueber Allotropie des amorphen Kohlenstoffes. R.	93	II	241
— Ueber Graphitoid. R.	93	II	241
— Ueber die Ursache der schwarzen Farbe der Steinkohlen und Anthracite. R.	93	II	241
— Ueber Graphit und Graphitit. R.	93	II	241
— siehe Beck, R.			
Lydekker, R.: Notes on the Sauropterygia of the Oxford and Kimmeridge Clays, mainly based on the Collection of Mr. Leeds at Eyebury. R.	90	I	141
— Note on the Classification of the Ichthyopterygia (with a Notice of two new Species). R.	90	I	142
— Catalogue of the Fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History). Part I. Containing the Orders Ornithosauria, Crocodilia, Dinosauria, Squamata, Rhynchocephalia and Proterosauria. Part II. Containing the Orders Ichthyopterygia and Sauropterygia. R.	90	I	342
Part III. Order Chelonia. R.	92	II	453
Part IV. Anomodontia, Ecaudata, Caudata, Labyrinthodontia. Nachtrag. R.	94	II	154
— On a Coeluroid Dinosaur from the Wealden. R.	90	I	346
— On an Ichthyosaurian Paddle Showing the Contour of the Integuments. R.	90	I	348
— Note on some Points in the Nomenclature of Fossil Reptiles and Amphibians, with Preliminary Notices of Two New Species. R.	90	I	466
— British Museum Catalogue of Fossil Reptilia, and Papers on the Enaliosaurians. R.	90	II	143
— Notes on the Remains and Affinities of five Genera of Mesozoic Reptiles. R.	90	II	144
— Note on Hylaeochampsa. R.	90	II	324
— On the Occurrence of the Striped Hyaena in the Tertiary of the Val d'Arno. R.	90	II	431
— On Remains of Eocene and Mesozoic Chelonia, and on a Tooth of (?) Ornithopsis. R.	91	I	151
— Ichthyosaurus acutirostris, zetlandicus and longifrons. R.	91	I	151
— On a New Species of Otter from the Lower Pliocene of Eppelsheim. R.	91	I	423

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lydekker, R.: On the Tortoises described as Chaibassia. R.	1891	II	156
— Note on certain Vertebrate Remains from the Nagpur District. (With a Description of a Fishs-kull by A. Smith Woodward.) R.	91	II	342
— On the Pectoral and Pelvis Girdles and Skull of the Indian Dicynodonts. R.	91	II	346
— The Generic Position of the so-called Plesiosaurus indicus. R.	91	II	347
— On a Crocodilian Jaw from the Oxford Clay of Petersborough. R.	92	I	163
— On Ornithosaurian Remains from the Oxford-Clays of Huntingtonshire. R.	92	I	162
— On Remains of Small Sauropodous Dinosaurs from the Wealden. R.	92	I	162
— On a peculiar Horn-like Dinosaurian Bone from the Wealden. R.	92	I	162
— Catalogue of the Fossil Mammalia in the British Museum. Part IV. Proboscidea. R.	92	I	410
Part V. Tillodontia, Sirenia, Cetacea, Edentata, Marsupialia, Monotremata and Supplement. R.	92	I	411
— On two new Species of Labyrinthodonts. R.	92	I	164
— Notes on New and other Dinosaurian Remains. R.	92	I	413
— On a Cervine Jaw from Algeria. R.	92	II	450
— On the Remains of some large Extinct Birds from the Cavern-Deposits of Malta. R.	93	I	391
— On a Collection of Mammalian Bones from Mongolia. R.	93	II	539
— On the Occurrence of the so-called Viverra Hastingsiae of Hordwell in the French Phosphorites. R.	93	II	540
— On Lower Jaws of Procoptodon. R.	93	II	544
— On British Fossil Birds. R.	93	II	544
— On Pleistocene Bird Remains from the Sardinian and Corsican Islands. R.	93	II	545
— Note on some Fossil Indian Bird Bones. R.	93	II	545
— On Dacrytherium ovinum from the Isle of Wight and Quercy. R.	94	I	179
— On a remarkable Sirenian Jaw from the Oligocene of Italy, and its bearing on the Evolution of the Sirenia. R.	94	I	180
— On the generic Identity of Sceparnodon and Phascolonus. R.	94	I	181
— Remarks on some recently described Extinct Birds of Queensland. R.	94	I	182
— On a New Species of Moa. R.	94	I	376
— On the Remains of a large Stork from the Allier Miocene. R.	94	I	376
— On certain Ornithosaurian and Dinosaurian Remains. R.	94	I	379
— On Zeuglodont and other Cetacean Remains from the Tertiary of the Caucasus. R.	94	I	507
— On a New Species of Trionyx from the Miocene of Malta and a Chelonian Scapula from the London-clay. R.	94	I	509
— Note on a nearly perfect Skeleton of Ichthyosaurus tenuirostris from the Lower Lias of Street, Somerset. R.	94	I	509
— On a Labyrinthodont Skull from the Kilkenny Coal measures. R.	94	I	512
— On Part of the Pelvis of Polacanthus. R.	94	II	158
— On a mammalian Incisor from the Wealden of Hastings. R.	94	II	154

	Jahrg.	Bd.	Seite
Lydekker, R., siehe Boulenger, G. A.			
Lyons, H. G.: On the Bagshot Beds and their Stratigraphy. R.	1891	I	123

M.

Macadam, Ivison: Analyses of Various Mineral Substances. R.	90	II	220
Machado, Jordano: Beitrag zur Petrographie der südwestlichen Grenze zwischen Minas-Geraës und S. Paulo. R.	90	I	93
Macivor, R. M. Emerson: On the Occurrences of Chrom Iron Ore in Australasia. R.	90	II	375
— Note on extensive Discoveries of Alum-Stone (Alumite) and Sulphur in New South Wales. R.	90	II	376
— On Australian Gold and native metallic Antimony. R.	90	II	376
Mackintosh, James B.: Notes on some Native Iron Sulphates from Chili. R.	93	I	251
— siehe Hidden, W. E.			
Macpherson, J.: Contributions à l'étude des mouvements moléculaires dans les roches solides. R.	93	II	335
Maillard, G.: Note sur la géologie des environs d'Annecy, La Roche, Bonneville et de la région comprise entre Le Buet et Sallanches. Haute Savoie. R.	91	II	281
— Note sur diverses régions de la feuille d'Annecy. R.	94	I	315
Major, C. J. Forsyth: Sur l'âge de la faune de Samos R.	92	II	134
— Considérations nouvelles sur la faune des vertébrés du Miocène supérieure dans l'île de Samos. R.	92	II	135
— Le gisement ossifère de Mytilini. R.	92	II	135
— On the Fossil Remains of Species of the Family Giraffidae. R.	93	I	542
— Exhibition of, and Remarks upon, a Tooth of an Antbear (Orycteropus) from the Upper Miocene of Maragha. R.	94	I	507
Malagoli, M.: Descrizione di alcuni foraminifere nuovi del Tortoniano. R.	92	I	189
— Foraminiferi miocenici del calcare a Lucina pomum Duj. e del arenaria compatta di Pantano nelle province di Modena e Reggio dell' Emilia. R. 1892 I 600	94	II	185
— Foraminiferi pliocenici di Cà di Roggio nello Scandianense. R.	93	I	203
— Foraminiferi pliocenici di Castellarquato e Lugagnano, nella provincia di Piacenza. R.	93	II	423
Malaise, C.: Sur la présence du Dictyonema sociale à Gleize. R.	91	II	437
— Observations sur quelques graptolithes de la bande silurienne de Sambre et Meuse. R.	92	I	113
— Les schistes siluriens de Huy et leur signification géologique. R.	92	I	113
— Sur les graptolithes de Belgique. R.	92	I	594
— Découverte de cristaux d'Arsénopyrite, à Court-St.-Etienne. R.	94	II	403
Mallard, Er.: Sur la Sellaïte. R.	90	I	34
— Note sur la Mélanophlogite. R.	91	I	201
— Sur la tridymite et la cristobalite. R.	91	I	205
— Sur les clivages du quartz. R.	91	I	211
— Sur la Lussatite, nouvelle variété minérale cristallisée de silice. R.	91	I	211

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mallard, Er.: Sur le grenat Pyrénéite. R.	1893	I	239
— Sur le fer natif de Cañon Diablo. R.	94	I	275
Mallard, Er. et E. Cumenge: Sur une nouvelle espèce minérale, la Boléite. R.	93	I	232
Mallard, Er. et H. Le Chatelier: Sur la variation qu'éprouvent, avec la température, les biréfringences du quartz, de la barytine et du disthène. R. 1891 I 208	91	I	209
Mangold, A.: Die alten Neckarbetten in der Rheinebene. R.	94	I	163
Mansel-Pleydell, J. C.: On a new Specimen of Histionotus angularis Egerton. R. 1891 I 152	92	I	420
Mar, F. W.: On the so-called Perofskite from Magnet Cove, Arkansas. R.	94	I	25
Marcou, Jules: Palaeontologic and stratigraphic „Principles" of the Adversaries of the Taconic. R.	91	II	113
— Canadian geological Classification for the Province of Quebec. R. 1891 II 113	92	I	343
— Reply to the Questions of Mr. Selvyn on „Canadian geological Classification for Quebec". R.	91	II	114
— Barrande and the Taconic system. R.	91	II	114
— The lower and middle Taconic of Europe and North America. R.	91	II	114
— Geology of the Environs of Quebec. R.	92	I	343
— The mesozoic Series of New Mexico. R.	92	I	329
— Jura, Neocomian and Chalk of Arcansas. R.	92	II	107
— The Triassic Flora of Richmond, Virginia. R.	93	I	211
— The American Neocomian and the Gryphaea Pitcheri. R.	93	II	156
Marek, W.: Ausdehnung des Wassers. R.	93	II	16
Margerie, Emm. de: Note sur la structure des Corbières. R.	91	II	283
— Sur la découverte de phénomènes de recouvrement dans les Appalaches. R.	93	I	320
Margerie, E. de et F. Schrader: Sur une nouvelle carte géologique des Pyrénées françaises et espagnoles. R.	94	II	68
Mariani, E.: La molassa miocenica di Varano. R.	90	II	420
— Foraminiferi delle marne plioceniche di Savona. R.	90	II	447
— Foraminiferi del calcare cretaceo del Costone di Gaverno in Val Seriana. R.	93	I	202
— Il calcare liasico di Nese in Val Seriana. R.	93	II	212
Mariani, E. e C. F. Parona: Fossili Tortoniani di Capo S. Marco in Sardegna. R.	90	II	153
Marinelli, O., siehe Agostini, A. de.			
Marion, A. F.: Doliostrobus Sternbergii, nouveau genre de conifères fossiles tertiaires. R.	91	I	173
Markownikow, B.: Dihydrothenardit — ein neues Mineral. R.	90	I	16
— Lagerstätten des Thenardit in Russland. R.	90	I	16
— Berichtigung des Artikels über den Dihydrothenardit. R.	93	I	42
Marr, J. E.: On the Coniston Limestone Series. R. 1893 I 116	93	II	519
— Notes on the lower palaeozoic Rocks of the Fichtelgebirge, Frankenwald and Thüringerwald. R.	91	II	118
— On the Wenlock and Ludlow Strata of the Lake District. R.	94	II	99
— Notes on the Skiddaw Slates. R.	94	II	301
— Further remarks of the Coniston Limestone R.	94	II	99
— siehe Harker, A.			
— siehe Nicholson, H. A.			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Marsh, O. C.: Restoration of Brontops robustus, from the Miocene of America. R.	1890	II	140
— Discovery of cretaceous Mammalia. R.	90	II	141
— Comparison of the principal Forms of the Dinosauria of Europe and America. R.	90	II	433
— Notice of new American Dinosauria. R.	90	II	434
— Note of gigantic horned Dinosauria from the Cretaceous. R.	90	II	435
— The Skull of the gigantic Ceratopsidae. R.	90	II	435
— Description of new Dinosaurian Reptiles. R.	91	I	149
— Notice of a new Genus of Sauropoda and other new Dinosaurs from the Potomac Formation. R.	91	II	155
— Distinctive Characters of the Order Hallopoda. R.	91	II	155
— Notice of a New Fossil Sirenian from California. R.	91	II	341
— Additional Characters of the Ceratopsidae, with Notice of new cretaceous Dinosaurs. R.	91	II	451
— Note on Mesozoic Mammalia. R.	92	I	569
— Notice on some extinct Testudinata. R.	92	II	149
— A horned Artiodactyle (Protoceras celer) from the Miocene. R.	92	II	331
— Notes on mesozoic vertebrate Fossils. R.	93	I	164
— Discovery of cretaceous Mammalia. Part III. R.	93	I	389
— The gigantic Ceratopsidae, or horned Dinosaurs, of North America. R.	93	I	394
— Restoration of Triceratops. R.	93	I	397
— Restoration of Stegosaurus. R.	93	I	548
— Notice of new Reptiles from the Laramie Formation. R.	93	II	191
— Notes on triassic Dinosauria. R.	93	II	192
— A new Order of extinct eocene Mammals (Mesodactyla). R.	93	II	403
— Notice of new vertebrate Fossils. R.	94	I	182
— Restoration of Mastodon americanus Cuv. R.	94	I	375
— A new cretaceous Bird allied to Hesperornis. R.	94	I	508
— The Skull of Torosaurus. R.	94	II	157
— Restoration of Claosaurus and Ceratosaurus. R.	94	II	345
Marsson, Th.: Die Bryozoen der weissen Schreibkreide der Insel Rügen. R.	90	I	161
Martel, E. A.: Sur la traversée de la rivière souterraine de Bramabiau et sur la formation des cañons des Causses. R.	90	I	328
— siehe Launay, L. de.			
Martel, E. A. et G. Gaupillat: Sur la formation des sources dans l'intérieur des plateaux calcaires des Causses. R.	91	I	263
— — Sur la rivière du Tindoul de la Vayssière et les sources de Salle-la-Source. R.	94	I	283
Marten, H. J.: On some Waterworn and Pebble-worn Stones from the Apron of the Holt-Fleet-Weir on the River Severn. R.	92	II	67
Martin, A.: Die phonolithischen Gesteine des Laacher-See-Gebietes und der Hohen Eifel. R.	91	II	68
— Untersuchungen eines Olivingabbros aus der Gegend von Harzburg. R.	93	I	269
Martin, Joh.: Beiträge zur Kenntniss der optischen Anomalien einaxiger Krystalle. (Mit Taf. I. II.) A.	*BB*	*VII*	*1*
Martin, K.: Ein Ichthyosaurus von Ceram. R.	90	I	143
— Palaeontologische Ergebnisse von Tiefbohrungen auf Java, nebst allgemeinen Studien über das Tertiär von Java, Timor und einiger anderer Inseln. R.	90	I	313

	Jahrg.	Bd.	Seite
Martin, K.: Die Fauna der Kreideformation von Martapoera. R.	1890	II	415
— Versteinerungen der sogenannten alten Schieferformation von West-Borneo. R.	90	II	416
— Untersuchungen über den Bau von Orbitolina (Patellina auct.) von Borneo. R.	90	II	446
— *Eine neue Orbitolina von Santander. (Mit Taf. II.) A.*	*91*	*I*	*58*
— *Ueber tertiäre Versteinerungen von Adonara. B.*	*91*	*II*	*222*
— *Mammuthreste aus Niederland. A.*	*92*	*I*	*45*
— Die Fossilien von Java auf Grund einer Sammlung von Dr. R. D. M. Verbeek. Die Foraminiferen führenden Gesteine. Studien über Cycloclypeus und Orbitoides. R.	92	II	373
— Ueber neue Stegodon-Reste aus Java. R.	92	II	451
Martiny, Stefan: Die durch den Antonstollen erschlossenen Gänge zwischen Vihnye und Hodrusbánya. R.	91	II	72
Marx: Geognostische und bergmännische Mittheilungen über den Bergbaubezirk von Iglesias auf der Insel Sardinien. R.	94	I	82
Mascarini, A.: Le piante fossili nel travertino ascolano. R.	92	I	467
Matteo, V. de: Nota sui giacimenti di combustibili fossili dell' Italia meridionale. R.	94	II	276
Matteucci, R. V.: La regione trachitica di Roccastrada. R.	92	I	73
— Sulla fase eruttiva del Vesuvio cominciata nel Giugno 1891. R.	92	II	258
— Note geologiche e studio chimico-petrografico sulla regione trachitica di Roccastrada in Provincia di Grosseto. Memoria seconda. R.	93	I	279
Matthew, G. F.: Sur le développement des premiers trilobites. Aus d. Englischen übers. von Forir. R.	90	I	352
— On some Remarkable Organisms of the Silurian and Devonian Rocks in Southern New Brunsvick. R.	90	II	328
— On Cambrian Organisms in Acadia. R.	91	I	285
— Eozoon and other Low Organisms in Laurentian Rocks at St. John. R.	91	II	309
— On the Occurrence of Sponges in Laurentian Rocks at St. John. R.	91	II	309
— President's Annual Address. R.	91	II	309
— On the Occurrence of Leptoplastus in the Acadian Cambrian Rocks. R.	91	II	459
— Illustrations of the Fauna of St. John Group. No. V. R.	92	I	112
— On the Classification of the Cambrian rocks in Acadia. R.	92	II	296
— On some Causes, which may have influenced the Spread of the Cambrian Faunas. R.	94	II	299
— On a New Horizont in the St. John Group. R.	94	II	300
— Note on Leptoplastus. R.	1894	II	300, 352
— Second Note on Stenotheca. R.	93	I	554
— On the Diffusion and Sequence of the Cambrian Faunas. R.	94	I	117
— Notes on Cambrian Faunas: Development of the Fauna of Band b in the Acadian Division of the St. John Group. R.	94	I	475
Matthew, W. D.: On Topaz from Japan. R.	94	I	44
Mattirolo, E.: Analisi di una Breithauptite del Sarrabus (Sardegna). R.	93	II	15
Maurer, Fr.: Palaeontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon. (Mit Taf. I—IV.) A.	93	I	1

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mayer-Eymar, K.: Zwölf neue Arten aus dem Londinian des Monte Postale bei Vicenza. R.	1890	I	157
— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs (suite). R.	90	I	157
— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs (suite). R. 1890 I 158	90	II	332
— La faune miraculeuse du Londinien d'Appenzell. R.	91	I	123
— Ueber das Tongrian von Cairo (Aegypten) R.	91	I	128
— Diagnoses ostrearum novarum ex agris Aegyptiae nummuliticis. R.	91	I	159
— Diagnoses Ostrearum ex agris molasicis. R.	92	I	437
— Trois Spondyles nouveaux du Parisien inférieur de la Suisse. R.	92	I	181
— Diagnoses specierum novarum ex agris Helvetiae nummuliticis. R.	92	I	589
— Aliae Ostreae novae quatuor. R.	92	I	589
— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs. R.	92	II	462
— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs. R.	94	I	388
— Le Ligurien et le Tongrien en Egypte. R.	94	II	327
Mazzuoli, J.: Sur la genèse des roches ophiolitiques. R.	93	I	277
— Nuove osservazioni sulle formazioni ofiolitiche della riviera di levante in Liguria. R.	93	I	277
— Le argille scagliose nella galleria di Pratolino presso Firenze. R.	93	II	169
McCook, Henry C.: A new fossil Spider, Eoatypus Woodwardii. R.	91	II	357
McCormik, Calvin: The Inclusions in the Granite of Craftsbury, Vermont. R.	90	I	278
McGee, W. J.: Classification of Geographic Forms by Genesis. R. 1890 I 52	90	II	238
— Notes on the Geology of Macon County, Missouri. R.	90	I	437
— Three Formations of the Middle Atlantic Slope. R.	90	II	124
— The Geologic Antecedents of Man in the Potomac Valley. R.	90	II	427
— The Appomattox Formation in the Mississippi Embayment. R.	92	I	554
— The Southern Extension of the Appomattox formation. R.	92	I	554
— The Columbia Formation. R.	92	I	392
— The Geology of the Head of Chesapeake Bay. R.	92	I	381
— The Gulf of Mexico as a Measure of Isostasy. R.	94	I	65
McInnes, Wm., siehe Bailey, L. W.			
McKenny Hughes, F. C.: On the Manner of Occurrence of Beekite and its Bearing upon the Origin of Silicious Beds of Palaeozoic Age. R.	91	I	232
McKnight, F.: A new Protaster from Australia. R.	92	I	449
McMahon, C. A.: On the Hornblende-schists and Banded Crystalline Rocks of the Lizard. R.	91	I	94
— Notes on Bowenite or Pseudo-Jade from Afghanistan. R.	92	I	44
— Note on the Alleged Genesis of Rutile in Fireclays. R.	92	I	272
— Notes on the micro-chemical Analysis of rockmaking Minerals. R.	94	II	7
— Notes on Dartmoor. R.	94	II	260
— siehe Bonney, T. G.			
Meem, John G.: Limonite Pseudomorphs after Pyrite. R.	90	I	221

	Jahrg.	Bd.	Seite
Mehnert, E.: Untersuchungen über die Entwickelung des Beckengürtels der Emys lutraria taurica. R. . .	1894	I	183
Meli: Sul rinvenimento dei resti fossili di un grande avvoltoio racchiuso nel peperino Laziale. R.	91	I	331
Melnikow, M.: Glimmer und Zirkon als neue Objecte des Bergbaus. R.	90	II	22
— Ueber Mineralien aus dem transuralischen Baschkirien. R.	91	II	11
Melville, W. H.: Josephinite a new Nickel-Iron. R. 1893 II 278	94	I	433
— Diaspore Crystals. R.	93	II	467
— Metacinnabarite from New Almaden, California. R. .	94	I	16
— Powellite-Calcium Molybdate: A new mineral Species. R.	94	I	49
Melville, W. H. and W. Lindgren: Contributions to the Mineralogy of the Pacific Coast. R.	92	I	48
Melzi, Gilberto: Di un nuovo giacimento mineralogico interessante sulle sponde del laghetto di Piano. R. . .	91	II	31
— Ricerche microscopiche sulle rocce del versante valtellinese della catena Orobica occidentale. R.	92	I	289
Meneghini, G.: Paleontologia dell' Iglesiente in Sardegna. Fauna Cambriana. Trilobiti. R.	92	I	172
Mercalli, G.: L'isola Vulcano e lo Stromboli dal 1886 al 1888. R.	90	I	79
— Osservazioni petrografico-geologiche sui Vulcani Cimini. R.	90	I	80
— Sopra alcune lave antiche e moderne dello Stromboli. R.	92	I	517
— I terremoti napoletani del secolo XVI ed un manuscritto inedito di Cola Anello Pacca. R.	93	II	46
— Le lave antiche e moderne dell' isola Vulcano. R. . .	93	II	52
— Il terremoto sentito in Napoli nel 25 Genaio 1893 e lo stato attuale del Vesuvio. R.	93	II	483
— Sopra l'eruzione dell' Etna cominciata il 9 Luglio 1892. R.	93	II	492
— Note geologiche e sismiche sulle Isole di Ponza. R. .	94	I	281
— siehe Ricco, A.			
— siehe Silvestri.			
Mercerat, Alcides: Datos sobre restos de mammíferos fósiles, pertenecientes á Los Bruta, conservados en el museo de la Plata y procedentes de los terrenos e cenos de Patagonia. R.	92	II	337
— Notas sobre la paleontología de la República Argentina. II. Sinopsis de la familia de los Protoxodontidae, conservados en el museo de La Plata. R. . .	93	I	386
III. Sinopsis de la familia de los Bunodontheridae, conservados en el museo de La Plata. R. . .	93	I	387
— Caracteres diagnósticos de alcunas especies de Creodonta. R.	93	I	388
— Nota sobre alcunas especies de un genero aberrante de los Dasypoda. R.	93	I	389
— Observations relatives à deux articles critiques de Mr. Florentino Ameghino. R.	93	I	544
— Caracteres diagnósticos de alcunas especies del gen. Theosodon. R.	93	II	402
— siehe Moreno, F. P.			
Mercey, N. de: Remarques sur les gîtes de phosphate de chaux de la Vicardie. R.	93	I	277
— Transport des galets recueillis dans la craie de la Somme. R.	94	II	117
Merrill, Fred. J. H.: On the Metamorphic Strata of Southeastern New York. R.	93	I	330

	Jahrg.	Bd.	Seite
Merrill, George P.: Secondary Enlargement of Augites in a Peridotite from Little Deer Isle, Maine. R. . .	1890	I	273
— On a Peridotite from Little Deer Isle, in Penstscot Bay, Maine. R.	90	II	268
— On the Serpentine of Montville, New Jersey. R. . . .	91	I	103
— On the Ophiolite of Thurman, Warren Co., N. Y., with Remarks on the Eozoon Canadense. R.	91	I	103
— On the Ophiolit of Thurman, Warren Cty., New York, with Remarks on the Eozoon canadense. R. . . .	91	II	301
— Notes on the Serpentinous Rocks of Essex County, New York; from Aqueduct Shaft 26, New York City; and from near Easton, Pennsylvania. R.	91	II	303
— On the San Emigdio Meteorite. R.	91	II	417
— Preliminary Handbook of the Department of Geology of the U. S. National Museum. R.	92	II	247
— An Account of the Progress in Petrography for the years 1887, 1888. R.	92	II	247
— Handbook for the Department of Geology in the U. S. National Museum. Part I. Geognosy. The Materials of the Earth's Crust. R.	93	II	281
— On some Basic Eruptive Rocks in the Vicinity of Lewiston and Auburn, Androscoggin Co., Maine (with Analyses by R. L. Packard). R.	93	II	495
— siehe Clarke, F. W.			
Merrill, G. P. and R. L. Packard: On an Azure blue Pyroxenic Rock from the Middle Gila, New Mexico. R.	94	I	78
Meschinelli, Luigi: Studio sulla flora fossile di Monte Piano. R.	90	II	170
Meunier, F.: Aperçu des genres de Dolichopodidae de l'ambre suivi du catalogue bibliographique des Diptères fossiles de cette résine. R. . . . . 1893 II 550	94	II	166
Meunier, St.: Sur la météorite d'Eagle Station, nouveau spécimen de brahinite. R.	90	I	41
— Détermination lithologique de la météorite de Fayette County, Texas. R.	90	I	42
— Sur les rapports mutuels des météorites et des étoiles filantes. R.	90	I	43
— Détermination lithologique de la météorite de San Emigdio Range, Californie. R.	90	I	413
— Altération remarquable du fer météorique de San Francisco del Mezquital. R.	90	II	60
— Sur les conditions favorables à la fossilisation des pistes d'animaux. R.	90	II	79
— Sur les conditions géologiques du gisements phosphaté de Beauval. R.	90	II	86
— Sur le terrain oligocène de Coudrai près des Nemour. R.	90	II	112
— Analyse de la météorite de Migheï (Russie); présence d'une combinaison non signalée jusqu'ici dans les météorites. R.	90	II	229
— Contribution à la géologie de l'Afrique occidentale. R.	90	II	416
— Sur la matière noire de la Chantonnite. R.	90	II	59
— Analyse de la météorite de Phu-Hong; remarques sur le type limerickite. R.	91	I	45
— Examen lithologique et géologique de la météorite de Jelica. R.	91	II	51
— Entwurf einer Theorie über die Ursache der Erdbeben. R.	91	II	57

	Jahrg.	Bd.	Seite
Meunier, St.: Sur une pluie de pierrailles calcaires, récemment survenue dans le Dép. de l'Aube. R.	1892	II	262
— Mineralsynthesen. R.	94	I	12
— Fer météorique récemment tombé à Hassi Jekna en Algérie. R.	94	I	275
— Aperçu sur la constitution géologique des régions situées entre Bembé et le pic Crampel. R.	94	I	302
— Examen de quelques roches, recueillies par le prince Henri d'Orléans sur la basse Rivière Noire au Tonkin. R.	94	I	303
— Examen minéralogique et lithologique de la météorite de Kiowa, Kansas. R.	94	I	448
— Sur le fer météorique d'Augustinowka. R.	94	I	449
— Remarques géologiques sur les fers météoriques diamantifères. R.	94	I	449
— siehe Daubrée, A.			
Meyer, A. B.: Neue Beiträge zur Kenntniss des Nephrit und Jadeït. R.	93	II	25
— Ueber Jadeït mit niedrigem specifischem Gewicht von Bamo in Parma. R.	93	II	248
— Ueber Bernstein-artiges prähistorisches Material von Sicilien und über barmanischen Bernstein. R.	94	I	52
— Nephrite Hatchet from British New Guinea. R.	94	II	408
— Intorno alla Nefrite di Sicilia. R.	94	II	408
— Wurde Bernstein von Hinterindien nach dem Westen importirt? R.	94	II	409
Meyer, Abraham: Notes on the Presence of Umbral on Mountain Limestone in Lycoming County, Tenna. R.	94	I	125
Meyer, H.: Zur Bestimmung der Wärmeleitungsfähigkeit schlecht leitender fester Körper nach absolutem calorimetrischem Maasse. R.	91	I	200
Meyer, O. E.: Messung der erdmagnetischen Kraft in Schlesien und Untersuchungen über Gebirgsmagnetismus. R.	90	I	53
— Ueber Gebirgsmagnetismus. R.	90	I	53
— Ein Bergmagnetometer. R.	90	II	237
— Ein Gebirgsmagnetometer. R.	90	II	237
Mialovich, Carl: Die Tiefbohrung Nr. 3 im Norden der k. k. Saline zu Wieliczka. R.	93	II	82
Michael, Richard: Die Vergletscherung der Lassingalpen. R.	92	I	149
— Cenoman und Turon in der Gegend von Cudowa. R.	94	II	115
Michel, L.: Recherches sur la cristallisation du minium et du peroxyde de plomb (Plattnerite). R.	92	I	19
— Sur la production artificielle de l'azurite et de la gerhardtite. R.	92	I	19
— Sur un nouveau gisement de célestine. R.	92	I	41
— Sur quelques minéraux provenant des Malines. R.	92	I	237
— Sur la présence de la bertrandite dans le béryl de Limoges (Haute-Vienne). R.	92	II	218
— Sur la reproduction du rutile. R.	94	II	13
— Sur la reproduction du grenat mélanite et du sphène. R.	94	II	13
— Sur une nouvelle espèce minérale de Bamle. R.	94	II	29
— Sur quelques minéraux provenant des environs de Thiviers. R.	94	II	233
Michel-Lévy, A.: Sur un gisement le mélaphyres à enstatite. R.	90	II	80
— Propriétés optiques des auréoles polychroiques. R.	91	I	7

	Jahrg.	Bd.	Seite
Michel-Lévy, A.: Sur l'existence du péridot microlithique dans les andésites et les labradorites de la Chaine des Puys. R.	1891	I	265
— Structures et classification des roches éruptives. R.	91	I	388
— Sur les roches éruptifs et cristallins du Lyonnais. R.	91	II	284
— Sur les moyens 1° de ceconnaître les sections parallèles à g^1 des Feldspaths dans les plaques minces des roches; 2° d'en utiliser les propriétés optiques. R.	92	I	30
— Etude sur les roches cristallines et éruptives des environs du Mont-Blanc. R.	92	I	107
— Note sur la prolongation vers le sud de la chaine des Aiguilles Rouges, montagnes de Pormenaz et du Prarion. R.	93	I	494
— Etude sur les pointements de roches cristallines qui apparaissent au milieu du Flysch du Chablais, des Gets aux Fenils. R.	93	I	494
— Sur les pointements de roches cristallines du Chablais. R.	93	II	59
— Sur quelques minéraux provenant de Condorcet. R.	93	II	265
— Sur un nouveau gisement d'andalousite dans les schistes carbonifères du Beaujolais. R.	94	I	264
— siehe Fouqué, F.			
— siehe Jacquot.			
Michel-Lévy, A. et A. Lacroix: Indices de réfraction principaux de l'Anorthite. R.	92	I	31
— — Tableaux des minéraux des roches, résumé de leurs propriétés optiques, cristallographiques et chimiques. R.	92	I	209
— — Les minéraux des roches. I. Application des méthodes minéralogiques et chimiques à leur étude microscopique par A. Michel-Lévy. II. Données physiques et optiques par Michel-Lévy et Alf. Lacroix. R.	92	I	209
Michel-Lévy, A. et Munier-Chalmas: Etude sur les environs d'Issoire. R.	90	II	309
— — Sur de nouvelles formes de silice cristallisée. R.	91	I	207
— — Mémoire sur diverses formes affectées par le réseau élémentaire du quartz. R.	94	I	254
Michel-Lévy et Termier: Note sur un nouvel exemple d'association d'andalousite et de sillimanite à axes parallèles. R.	90	II	38
Mickwitz, A.: Vorläufige Mittheilung über das Genus Obolus. R.	92	I	182
Miczynski, K.: Egynehány Radácson, Eperjes mellett gyüjtött fosszil nörénymaradvány. R.	93	I	576
Middlemiss, C. S.: Preliminary Note on the Coal Seam of the Dore Ravine, Hazara. R.	94	II	110
— Geological Sketch of Naini Tal; with some Remarks on the natural Conditions governing Mountain Slopes. R.	94	II	296
— Physical Geology of the Sub-Himalaya of Garhwál and Kumaun. R.	94	II	434
Mieg, Mathieu: Note sur le gypse de Zimmersheim (près Mulhouse). R.	90	I	451
Mieg, Mathieu, G. Bleicher et Fliche: Contribution à l'étude du terrain tertiaire d'Alsace et des environs de Mulhouse. R.	91	I	119
— — Contributions à l'étude du terrain tertiaire d'Alsace. Kleinkembs et de lac sundgorien. R. 1893 II 387	94	II	125

	Jahrg.	Bd.	Seite
Miers, H. A.: Contributions to the Study of Pyrargyrite and Proustite. R.	1890	II	1
— Calcites from the Neighbourhood of Egremont, Cumberland. R.	90	II	381
— Mineralogical Notes. Polybasite; Aikinite; Quartz; Cuprite; the Locality of Turnerite. R.	91	I	377
— Sanguinite, a new Mineral, and Krennerite. R.	92	I	43
— A Student's Goniometer. R.	92	II	4
— The Hemimorphism of Stephanite; the cristalline Form of Kaolinite. R.	92	II	14
— Hemimorphismus und neue Flächen am Stephanit. R.	92	II	14
— The Tetartohedrism of Ullmannite. R.	92	II	402
— *Spangolith von Cornwall. B.*	*93*	*II*	*174*
— Auripigment. R.	94	I	15
Miers, H. A. und G. T. Prior: Danalith von Cornwall. R.	93	II	251
Miklucho-Maklaj, M.: Geologische Untersuchungen in den Kreisen Nowgrad-Wolynsk und Shitomir, Gouvernement Wolhynien. R.	94	I	324
— Ueber die unregelmässige Structur des Quarzes. R.	94	II	222
Milch, L.: Die Diabasschiefer des Taunus. R.	90	II	249
— Ueber ein neues krystallisirtes Borat von Stassfurt. R.	92	I	18
— Ueber Epsomitkrystalle von Stassfurt-Leopoldshall. R.	93	I	250
— Beiträge zur Kenntniss des Verrucano. Erster Theil. R.	93	II	332
— Petrographische Untersuchung einiger ostalpiner Gesteine. R.	94	II	60
Mill, Hugh Robert: The Vertical Relief of the Globe. R.	91	II	260
Mills, J. E.: Stratigraphy and Succession of the Rocks of the Sierra Nevada of California. R.	94	II	89
Milne, John: Earth Tremors in Central-Japan. R.	91	II	56
— Ueber die Verbreitung von Erderschütterungen auf kleinen Gebieten. R.	91	II	56
— Bericht über die Erdbebenbeobachtungen in Japan f. d. J. 1886. R.	91	II	57
Milne-Edwards: A.: Remarques. R.	92	I	156
Minnigerode, B.: Ueber die Symmetrieverhältnisse der Krystalle. A.	*94*	*I*	*92*
Mitscherlich, A.: Erinnerung an Eilhard Mitscherlich. 1794—1863. R.	94	II	393
Moberg, Joh. Chr.: Om fördelningen af Sveriges vigtigare Kritförekomster på två skilda bäcken. R.	90	II	410
— Bemerkungen über den Orthocerenkalk Oelands. R.	91	II	311
— Ueber eine Abtheilung des Dictyonema-Schiefers Oelands, dem Ceratopyge-Schiefer Norwegens entsprechend. R.	92	I	342
— Ueber die Grenze zwischen Cambrium und Untersilur in Schweden. R.	92	I	342
— Om ett par synonymier. R.	92	I	593
— Om skiffern med Clonograptus tenellus Lins., dess fauna och geologiska ålder. R.	92	II	465
— Om en nyupptäckt fauna i block af kambrisk sandsten, insamlade af Dr. N. O. Holst. R.	93	I	144
— Om några nya Graptoliter från Skånes undre Graptolitskiffer. R.	93	I	200
— Till frågan om Pygidiets byggnad hos Ctenopyge pecten Salt. R.	93	I	550
— Om en Hemipter pan Sveriges undre Graptolitskiffer. R. 1893 I 551	93	II	551

	Jahrg.	Bd.	Seite
Moberg, Joh. Chr.: Olenellus ledet i sydlige Skandinavien. R.	1894	I	332
— Bidrag till Kännedomen om Sveriges Mesozoiska Bildningar. R.	94	I	343
— Monograptus försedd med discus. R.	94	I	393
— *Ueber schwedische Kreidebelemniten. A.*	*94*	*II*	69
Moberg, K. Ad.: Jordskalfven i Finland år 1882. R.	93	II	48
— Kartor, plancher och profiler berörande Finlands geologi. R.	95	II	95
Moderni, P.: Osservazioni geologiche fatte nel gruppo della Majella, con appendice palaeontologica di A. Tenelli. R.	92	II	312
Möckel, E.: Die Entstehung des Plauer Sees, des Drewitzer oder Alt-Schweriner Sees und des Krakower Sees. R.	93	I	135
Moeller, V.: Nutzbare Mineralien und Mineral-Gewässer des Kaukasus. R.	91	I	21
Möricke, W.: Das Eruptivgebiet des S. Cristóbal bei Santiago (Chile). R.	92	I	522
— Einige Beobachtungen über chilenische Erzlagerstätten und ihre Beziehungen zu Eruptivgesteinen. R.	93	II	80
— Über grosse Enargitkrystalle aus Chile. R.	94	II	403
Mörtsell: Reisenotizen aus dem fossilführenden cambrisch-silurischen Gebiete im Lappmark von Westerbotten. R.	92	I	341
Mojsisovics, v.: Ueber das Auftreten von oberem Muschelkalk in der Facies der rothen Kalke der Schreyer Alm in den Kalkalpen nördlich von Innsbruck. R.	90	I	102
— Nachweis der Zone des Tropites subbullatus in den Hallstätter Kalken bei Hallein. R.	91	II	320
— Die Hallstatter Entwickelung der Trias. R.	93	II	378
— Vorläufige Bemerkungen über die Cephalopoden-Faunen der Himalaya-Trias. R.	93	II	415
Moissan, H.: Etude de la météorite de Cañon Diablo. R.	94	I	448
Molengraaff, G. A. F.: Ueber vulcanischen Schwefel aus Westindien. R.	90	I	37
— Studien am Quarz. II. R.	91	II	35
— *Cordierit in einem Eruptivgestein aus Südafrika. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*94*	*I*	*79*
Monckton, Horace W.: The Bagshot Beds of Bagshot Heath. R.	92	II	111
— On the Gravels south of the Thames from Guilford to Newbury. R.	93	I	136
Monke, H.: Die Liasmulde von Herford in Westfalen. R.	90	I	115
Montemartini, Cl.: Composizione chimica e mineralogica di una roccia serpentinosa di Borzanasca. R.	92	I	288
Montenosato: Relazione fra i molluschi del quaternario di Monte Pellegrino e di Ficarazzi e le specie viventi. R.	92	II	360
Montessus de Ballore: Sur la répartition saisonnière des seismes. R.	92	II	53
— La France et l'Algière sismiques. R.	93	II	322
Monti, Rina: Appunti petrografici sopra alcune rocce della provincia di Brescia. R.	93	II	58
Moreno, F. P. y Alcides Mercerat: Paleontología argentina I. R.	93	I	544
Morgan: The Pebidian Volcanic Series of St. Davids. R.	91	I	95
Morière: Note sur quelques crustacés fossiles. R.	90	II	146
— Note sur la présence du genre Banksia dans le terrain crétacé des environs de Vimoutiers (Orne). R.	92	I	468

	Jahrg.	Bd.	Seite
Morière: Note sur une nouvelle cycadée du Lias. R. .	1892	I	469
Morize, H.: Photographie des figures de Widmanstaetten. R.	90	I	42
Morlet, L.: Catalogue des coquilles fossiles recueillies dans quelques localités récemment exploitées du bassin de Paris et description des espèces nouvelles. R. . . .	91	II	463
— Diagnosis generis novi molluscorum fossilium. R. . .	92	I	180
Morozewicz, J.: Ueber die Synthese der Minerale der Hauyn-Gruppe. B.	*92*	*II*	*139*
— Petrographisch-synthetische Mittheilungen. (Mit Taf. IV.) A.	*93*	*II*	*42*
— Ueber eine Schlacke mit Wollastonit. R.	94	II	223
Morrison, Wm.: Elaterite: a Mineral Tar in Old Red Sandstone, Ross-shire. R.	90	II	219
Morton, G. H.: On the Bunter and Keuper Formation about Liverpool. R.	91	II	122
Moser, L. C.: Vorkommen von Mercur bei Mance. R. . .	92	I	510
Moses, A. J.: Mineralogical Notes. R.	94	I	268
— siehe Waller, E.			
Moureaux: Sur la variation magnétique pendant le tremblement de terre du 15 Janv. en Algérie. R.	92	II	53
Mouret, G.: Bassin houiller et permien de Brive. I. Stratigraphie. R.	94	I	337
— Note sur la stratigraphie du plateau central entre Tulle et Saint-Céré. R.	93	I	299
Mourlon, M.: Sur la découverte, à Ixelles (les-Bruxelles), d'un ossuaire de mammifères, antérieur au diluvium. R.	90	I	138
— Sur le gisement des ilex taillés attribués à l'homme tertiaire, aux environs de Mons. R.	90	I	139
— Sur la prédominance et l'extension des dépôts de l'éocène supérieur Asschien dans la région comprise entre la Senne et la Dyle. R.	92	II	111
— Sur une nouvelle interprétation de quelques dépôts tertiaires dans le bassin franco-belge. R.	93	I	524
— Sur la position stratigraphique des gîtes fossilifères de l'éocène supérieur au nord de Glabais, près de Génappe. R.	93	I	524
— Les dernières buttes du Wijngaerd Berg à l'est de Bruxelles. R.	93	I	524
— Sur le classement stratigraphique des dépôts de l'étage Asschien dans la série tertiaire à propos d'un mémoire de M. G. Vincent et Conturieaux. R.	93	I	524
Mrazec, L., siehe Duparc, L.			
Muck, F.: Die Westphälische „Pseudo-Cannelkohle“ und ihre Beziehungen zu der echten Cannelkohle und den übrigen Kohlenarten. R.	90	I	256
Muck, Josef: Der Braunkohlenbergbau Ostgaliziens. R. .	93	II	84
Mügge, O.: Ueber elektrolytisch abgeschiedene Kupferkrystalle. R.	90	I	230
— Ueber den Krystallbau der pyrogenen Quarze. A. . .	*92*	*I*	*1*
— Ueber die Krystallform eines neuen triklinen Doppelsalzes, $MnCl_2 . KCl . 2aq$, und Deformationen desselben. (Mit Tafel II.) A.	*92*	*II*	*91*
— Ueber „reciproke“ einfache Schiebungen an den triklinen Doppelsalzen $K_2Cd(SO_4)_2 . 2H_2O$, $K_2Mn(SO_4)_2 . 2H_2O$ und verwandten. B.	*94*	*I*	*106*
— Untersuchungen über die „Lenneporphyre“ in Westphalen			

	Jahrg.	Bd.	Seite
und den angrenzenden Gebieten. (Mit Taf. XXII—XXVIII und 10 Holzschnitten.) A.		*BB VIII*	*525*
Mühlberg, F.: Kurze Skizze der geologischen Verhältnisse des Bözbergtunnels, des Hauensteintunnels, des projectirten Schafmatttunnels und des Grenzgebietes zwischen Ketten- und Tafel-Jura überhaupt. R.	1890	I	438
Müller, G.: Beitrag zur Kenntniss der oberen Kreide am nördlichen Harzrande. R.	90	I	307
Müller, H., siehe Dalmer, K.			
Müller, Wilhelm: Ein neuer Orthoklaszwilling. R.	90	II	25
— *Granat von Kedabék in Kaukasien. B.*	*91*	*I*	*272*
— Kalkspath von Rothenzechau im Kreise Hirschberg in Schlesien. R.	92	I	511
— Ueber Contacterscheinungen am Glimmerschiefer der Schneekoppe. R.	93	I	270
— Künstliche Bildung von Eisenglanz und Magnetit in den Eisenrückständen der Anilinfabriken. R.	94	I	11
Münster, Chr. A.: Kongsbergersölvets sammensätning og en sekundärproces ved dets dannelse. R.	93	II	76
Münzing, L.: Ueber den Aufbau des Periklins aus dem Pfitschthale (Tirol) und seine Stellung im Systeme der Feldspathe. (Mit Taf. I.). A.	*91*	*II*	*I*
Munck, E. de, siehe Rutot, A.			
Munier-Chalmas: Discordance entre les sables de Cuise et le calcaire grossier inférieur. R.	90	II	306
— I. Sur les formations gypseuses du bassin de Paris. II. Sur les dépôts silicieux qui ont remplacé le gypse. R.	90	II	306
— Sur la rôle, la distribution et la direction des courants marins en France, pendant le crétacé supérieur. R. 1892 II 306	94	II	318
— Étude du tithonique, du crétacé et du tertiaire du Vicentin. R.	94	I	156
— siehe Bergeron, J.			
— siehe Michel-Lévy, A.			
Munteanu, J.: Montanistische Skizzen aus Rumänien. R.	91	II	297
Muntz: Sur la décomposition des roches et la formation de la terre arable. R.	94	I	458
Muraközy, K. von: Analyse des Gases des artesischen Brunnens von Püspök-Ladany. R.	91	II	83
— Analyse des im artesischen Brunnen von Szentes gefundenen Vivianit. R.	91	II	83
— Die Bestimmung des specifischen Gewichtes mit einem Volumenometer. R.	93	I	229
— Ueber die Verwitterung der Rhyolith-Trachyte von Nagy-Mihály. R.	94	I	291
Murray, A. F.: Report on the Mount Wills Tin-field. R.	91	II	100
Murray, J.: The Maltese Islands, with special Reference to their geological Structure. R.	91	II	131
Murray, J. and R. Irvine: On Coral Reefs and other Carbonate of Lime Formations in Modern Seas. R.	92	II	248
Murray, J. and A. F. Renard: Report on Deep-Sea Deposits based on the Specimens collected during the Voyage of H. M. S. Challenger in the Years 1872 to 1876. R.	93	II	281
Muschketow, J. W.: Physische Geologie. 2. Theil. Geologische Thätigkeit der Atmosphäre und des Wassers. R.	90	I	50
— Das Erdbeben von Wernoje vom 9. Juni 1887. R.	92	II	58

	Jahrg.	Bd.	Seite
Muschketow, J. W.: Physikalische Geologie, I. Theil. Allgemeine Eigenschaften der Erde. Vulcanische, seismische und Dislocations-Erscheinungen. R. . . .	1894	I	62
— Ueber die ursprüngliche Lagerstätte des Platins im Ural. R.	94	II	218
Muthmann, W.: Messelit, ein neues Mineral. R. . . .	91	II	22
— Untersuchungen über den Schwefel und das Selen. R.	91	II	37

N.

Nagaoka, H., siehe Tanakadate, A.			
Namias, J.: Sul valore sistematico di alcune specie di briozoi. R.	94	I	518
— Briozoi pliocenici del Modenese. R.	94	I	518
— Contributo ai briozoi pliocenici delle provincie di Modena e Piacenza. R.	94	I	519
Nathorst, A. G.: Ueber die Entdeckung des älteren baltischen Eisstroms. B.	*90*	*I*	*184*
— Sur la présence du genre Dictyozamites Oldham dans les couches jurassiques de Bornholm. R.	91	I	173
— Ueber das angebliche Vorkommen von Geschieben des Hörsandsteins in den norddeutschen Diluvialablagerungen. R.	91	I	314
— Nya anmärkningar om Williamsonia. Förberedande meddelande. R.	91	I	350
— Om de fruktformer af Trapa natans L., som fordom funnits i Sverige. R.	91	I	352
— Ueber Goldenberg's Onisima ornata. R.	91	II	207
— *Betrachtungen über das angebliche Vorkommen von Resten von Organismen im Grundgebirge. A.* . . .	*92*	*I*	*169*
— Den arktiska Florans forna utbredning i länderna öster och söder om Oestersjön. R.	92	II	322
— Jordens Historia efter M. Neumayr's „Erdgeschichte" utarbetad med särskild hänsyn till Nordens Urverld. Häftena 1—8. R.	93	I	43
— On the geological History of the prehistoric Flora of Sweden. R.	93	I	211
— Einiges über die Basalte des arktischen Gebietes. R. .	93	I	498
— Beiträge zur mesozoischen Flora Japans. R.	93	II	562
— Zur fossilen Flora Japans. R.	94	I	223
— Ueber die Reste eines Brodfruchtbaumes, Artocarpus Dicksoni n. sp., aus den cenomanen Kreideablagerungen Grönlands. R.	94	I	230
— Om förekomsten af Dictyophyllum Nilssoni Brongn. sp. i Kinas kolförande bildningar. R.	94	II	194
Naumann, Edm.: Fossile Elephantenreste von Mindanao, Sumatra und Malakka. R.	90	II	139
— Stegodon Mindanaensis, eine neue Art von Uebergangs-Mastodonten. R. . . . . 1890 II 140	92	II	143
Negri, Arturo: L'anfiteatro morenico dell' Astico e l'epoca glaciale nei Sette Comuni. R.	91	I	135
— Sopra alcuni fossili raccolti nei calcari grigi dei Sette Comuni. R.	92	II	363
— Studio micrografico di alcuni basalti dei Colli Euganei. R.	92	II	420
Negri, Gio. Batt.: Studio cristallografico della baritina di Levico. R.	90	II	27

	Jahrg.	Bd.	Seite
Negri, Gio. Batt.: Studio cristallografico della cerussite di Auronzo. R.	1891	I	9
— Studio chimico su di alcune natroliti venete. R.	91	II	230
— Note cristallografiche su di alcune natroliti venete e appunti critici. R.	92	I	231
— Sulla heulandite di Montecchio Maggiore. R.	92	I	233
— Studio micrografico di alcuni basalti dei colli Euganei. R.	92	II	254
— Sopra le forme cristalline della baritina di Montevecchio e di Millesimo. R.	94	I	445
— siehe Nicolis, E.			
Negri e Nicolis: Note preliminarie analitiche e geologiche sulla fonte termo-minerale sulfureo-salina di Sermione. R.	92	II	260
Nehring, A.: Ueber palaeolithische Feuersteinwerkzeuge aus den Diluvialablagerungen von Thiede. R.	90	I	138
— Ueber fossile Spermophilus-Reste von Curve bei Wiesbaden. R.	90	I	139
— Torfschwein und Torfrind. R.	90	I	140
— Zur Frage der Abstammung des europäischen Hausrindes. R.	90	I	140
— Ueber das Gebiss von Cervus maral Ogilby sowie über Cervus maral foss. R.	90	I	140
— Ueber Conchylien aus dem Orenburger Gouvernement. R.	90	II	330
— Ueber Cuon alpinus foss. aus dem Heppenloch in Württemberg. R.	91	I	324
— Ueber Spermophilus rufescens foss. und Arctomis bobac foss. von Türmitz im nördlichen Böhmen. R.	91	I	324
— Entgegnung. R.	91	II	142
— Nochmals die Schneestürme als Todesursache diluvialer Säugethiere. R.	91	II	142
— Ueber eine anscheinend bearbeitete Geweihstange des Cervus euryceros von Thiede bei Braunschweig. R. 1891 II 150	93	I	542
— *Diluviale Reste von Cuon, Ovis, Saiga, Ibex und Rupicapra aus Mähren. (Mit Taf. II, III und 3 Zinkographien.) A.*	*91*	*II*	*107*
— Ueber Cuon Bourreti Harlé aus der Grotte von Malarnaud. R.	92	I	567
— Ueber die ehemalige Verbreitung der Gattung Cuon in Europa. R.	92	I	567
— *Diluviale Saiga- und Spermophilus-Reste von Bourg (Gironde). B.*	*92*	*I*	*142*
— Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna. R.	92	II	125
— Diluviale Hystrix-Reste aus Bayrisch-Oberfranken. R.	92	II	141
— Die geographische Verbreitung der Säugethiere in dem Tschernosemgebiete des rechten Wolgaufers, sowie in den angrenzenden Gebieten. R.	92	II	327
— Ueber eine besondere Riesenhirsch-Rasse aus der Gegend von Kottbus, sowie über die Fundverhältnisse der betreffenden Reste. R.	92	II	332
— *Einige Notizen über die pleistocäne Fauna von Türmitz in Böhmen. A.*	*94*	*II*	*278*
Nemes, F. D.: Palaeontologische Studien über das Siebenbürgische Tertiär. R.	90	II	115
Neri, F. N.: Monografia dei fossili del calcare bianco ceroide di Mte. San Giuliano. R.	94	II	341

	Jahrg.	Bd.	Seite
Netschajew, A.: Geologische Untersuchung des Kreises Mamedysch. R.	1894	I	320
— Geologische Untersuchung des nordwestlichen Theiles des Gouv. Kasan. R.	94	I	320
Nettelworth: A Monograph of the Fossil Shells of the Silurian and Devonian Rocks of Kentucky. R.	91	II	461
Neubert, E. W.: Ganggeologische Verhältnisse bei Himmelsfürst Fdgr. bei Freiberg. R.	92	II	69
Neubert, E. W. und F. Kollbeck: Ueber das Vorkommen und die chemische Zusammensetzung eines nickel- und kobalthaltigen Schwefelkieses bei dem Berggebäude Himmelsfürst Fundgrube bei Freiberg. R.	91	II	292
Neufville, R. de: Ueber ein neues Vorkommen des Enargits. R.	93	I	234
Neumayr, M.: Ueber neuere Versteinerungsfunde auf Madagascar. A.	*90*	*I*	*1*
— *Kritische Bemerkung über die Verbreitung des Jura. A.*	*90*	*I*	*140*
— *Ueber Palaëchinus Typhlechinus und die Echinothuriden. B.*	*90*	*I*	*84*
— Ketten- und Massengebirge. R.	90	I	249
— Die Stämme des Thierreiches. I. Bd. Wirbellose Thiere. R.	90	II	131
— Ueber die Herkunft der Unioniden. R.	91	II	183
Neumayr und Uhlig: Ueber die von H. Abich im Kaukasus gesammelten Jurafossilien. R.	93	II	381
Neviani, A.: Le formazioni terziari nella valle del Mesima. R.	92	I	368
— Cenni sulla costituzione geologica del littorale Ionico da Cariati a Monasterace. Memoria postuma dell' ing. V. Rambotti. R.	92	I	369
— Sulla scoperta di marne fogliettate con pesci e tripoli nel pliocene. R.	92	II	116
— Contribuzioni alla geologia del Catanzarese.			
Parte III. Il terziario nel versante ionico da Staletti al fiume Stilaro. R.	92	II	116
Parte IV. Le colline di Santa Maria. R.	92	II	117
— Sulla Ophioglypha (Acroura) granulata Ben. sp. del Muschelkalk di Recoaro. R.	94	II	474
Newberry, J. S.: Rhaetic Plants from Honduras. R.	90	I	372
— The Paleozoic Fishes of North America. R.	93	I	174
Newcomb, S. and C. E. Dutton: The Speed of Propagation of the Charleston Earthquake. R.	91	I	273
Newell, H.: Niagara Cephalopods from northern Indiana. R.	92	I	178
Newton, E. T.: On the Occurrence of Lemmings and other Rodents in the Brick-Earth of the Thames Valley. R. 1891 II 340	93	II	540
— A Contribution to the History of Eocen Siluroid Fishes. R.	92	I	166
— On the Reported Discovery of Dodo's Bones in a Cavern in Mauritius. R.	92	II	452
— Note on an Iguanodont Tooth from the Lower Chalk („Totternhoe Stone"), near Hitchin. R.	93	I	548
— Note on a Species of Onychodus from the Lower Old Red Sandstone of Forfar. R.	93	I	550
— On some New Reptiles from the Elgin Sandstone. R.	94	II	346
Newton, H. A.: Document relatif à la trajectoire suivie par la météorite d'Ensisheim en 1492. R.	92	I	270
— Lines of Structure in the Winnebago Co. Meteorite and in other Meteorites. R.	94	I	273

	Jahrg.	Bd.	Seite
Newton, Richard Bullen: British Eocene Scaphopoda and New Pulmonata. R.	1894	II	358
— On the Occurrence of Chonetes Pratti in the Carboniferous Rocks of Western Australia. R.	94	II	175
— Systematic List of the Frederick E. Edwards Collection of British Oligocene and Eocene Mollusca in the British Museum (Natural History). R.	93	I	147
Niccoli, E.: La frana di Santa Paola. R.	93	II	50
Nicholson, H. A.: On the Relations between the genera Syringolites Hinde and Roemeria Edwards et Haime, and on the genus Caliapora Schlüt. R.	90	II	162
— On the Structure and Affinities of the genus Parkeria Carpent. R.	90	II	340
— On Desmidopora alveolaris Nich., a new genus and species of Silurian Corals. R.	90	II	339
— Note on the Occurrence of Trigonograptus ensiformis Hall sp., and of a Variety of Didymograptus V-fractus Salter, in the Skiddaw Slates. R.	92	I	594
— On some new or imperfectly known species of Stromatoporoids. Part IV. R.	93	I	420
Nicholson, H. A. and G. J. Hinde: Notes on the Palaeontology of Western Australia. R.	92	I	595
Nicholson, H. A. and J. Marr: The Cross Fell Julier. R. 1893 I 96	94	I	333
Nickel, E.: Ueber die Beweisführung in der Zonenlehre. R.	93	I	456
— Die Linearprojection in algebraischer Behandlung. R.	93	I	456
— Ueber ein neues Schema der Zonenrechnung. R.	93	I	456
— Beiträge zur geometrischen Krystallographie. R.	93	I	456
— Ueber Zonencoordinaten. R.	93	I	456
— Ueber die Gleichung der geraden Linie. R.	93	I	456
— Ueber den Gegensatz der symmetrischen und harmonischen Beziehungen bei den Krystallen. R.	93	II	239
Nicklès, René: Sur le sénonien et le danien du sud-est de l'Espagne. R.	90	I	311
— Sur le gault et le cénomanien du sud-est de l'Espagne. R.	91	I	118
— Note sur quelques gisements sénoniens et daniens du sud-est de l'Espagne. R.	91	II	327
— Études géologiques sur le sud-est de l'Espagne. I. Terrains secondaires et tertiaires de la province d'Alicante et du sud de la province de Valence. R.	93	II	159
Nicolis, E. de: Sopra uno scheletro di Teleosteo scoperto nell' eocene medio di valle d'Avesa. R.	90	I	467
— Nuova contribuzione alla conoscenza della costituzione della bassa pianura veronese e della relativa idrografia sotterranea. R.	94	I	497
— siehe Negri.			
Nicolis, E. e G. B. Negri: Sulla giacitura e natura petrografica dei basalti veronesi. R.	92	I	286
Niedzwiedzki, J.: Beitrag zur Kenntniss der Salzformation von Wieliczka und Bochnia, sowie der an diese angrenzenden Gebirgsglieder.			
IV. R.	90	II	114
V. (Schluss) R. 1893 II 166	94	I	471
— Ergänzung zur Fossilliste des Miocäns bei Podhorce in Ostgalizien. R.	91	II	445
— Neuvorkommnisse von Mineralien. R.	92	II	71

	Jahrg.	Bd.	Seite
Niedzwiedzki, A.: Zur Geologie von Wieliczka. R. 1893 II 167	1894	I	471
— Das Salzgebirge von Kalusz in Ostgalizien. R. 1893 II 388	94	I	471
Nies, Fr.: Ueber ein angebliches Vorkommen gediegenen Zinnes und über die specifischen Gewichte der Zinnbleilegirungen. R.	91	II	15
— Zur Erdbebenfrage. R.	93	I	54
Nikitin, S.: Ueber Parabelknoten bei den Ammoniten. B.	*90*	*I*	*188*
— Notizen über den Jura der Umgebungen von Sysran und Saratow. R.	90	II	110
— Quelques excursions dans les musées, et dans les terrains mésozoiques de l'Europe occidentale, et comparaison de leur faune avec celle de la Russie. R.	91	I	304
— Allgemeine geologische Karte von Russland. Bl. 57. Moskau. R.	92	I	329
— Die Spuren der Kreideperiode in Centralrussland. R.	92	I	549
— Dépôts carbonifères et puits artésiens dans la région de Moscou. R.	92	II	99
— Geologische Beschaffenheit des Bezirks Busuluk und dessen Umgebung im Gouv. Ssamara. R.	94	I	325
Nikitin, S. und P. Ossoskow: La région transvolgienne de la feuille 92 de la carte géologique générale de la Russie. R.	90	I	329
Noë, Franz: Geologische Uebersichtskarte der Alpen. 1:1000000. R.	90	II	391
Nölting, J.: Ueber das Vorkommen von Kreide unter dem Diluvium der Gegend von Oldenburg i. Holst. R.	91	II	327
Nötling, Fr.: Report on the Namseka Ruby-Mine in the Mainglon State (Northern Shan States, Upper Burma) R.	94	II	404
— The Occurrence of Jadeite in Upper Burma. R.	94	II	407
— Report on the Tourmaline (Schörl) Mines in the Mainglon State. R.	94	II	409
— On the Occurrence of Burmits in Upper Burma. R.	94	II	410
Noguès, A. E.: Eruption du volcan Calbuco. R.	94	II	416
Noll, F. C.: Zwei Beiträge zur Geschichte des Rheinthales bei St. Goar. R.	94	II	134
Nolan, H.: Note sur le trias de Minorque et de Majorque. R.	90	I	115
Nordenskiöld, A. E. von: Ueber einen neuen Meteoritenfall in Schweden. R.	91	I	49
— Om ett den 5 och 6 Februari 1888 i Schlesien, Mähren och Ungern med snö nedfallet stoft. R.	91	II	61
— Diamanten vom Fluss Pasvig. R.	93	II	13
— Remarques sur le fer natif d'Ovifak et sur le bitume des roches cristallines de Suède. R.	94	I	432
Nordenskjöld, G.: Ueber Mineralien von Drusenort bei Taberg in Wermland. R.	93	I	20
— Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen von Schneekrystallen. R.	94	II	21
— Sur le fer natif d'Ovifak et sur le bitume des roches cristallines de Suède. R.	94	II	423
Nordenskiöld, Otto: Kemisk undersökning af meteoriten från Ostra Ljungby i Skåne. R.	92	I	268
— *Chemische Untersuchung des Ljungby-Meteoriten. A.*	*92*	*I*	*138*
— Zur Kenntniss der sog. Hälleflinten des nordöstlichen Smålands. Vorläufige Mittheilung. R.	93	II	335

	Jahrg.	Bd.	Seite
Nordenström, G.: Ein Fund von Allanit (Cerin) bei Gyttorp im Bergrevier Nora. R.	93	I	32
Nordström, Th., A. Sjögren und Hj. Lundbohm: Betänkanden afgivna af den för undersökning af Apatittilgångar i Norrbotten tilsatta kommission. R.	93	II	63
Novák, Ottomar: Bemerkungen über Pentamerus (Zdimir) solus aus G—g_3 von Hlabozep bei Prag. R.	91	II	366
— Vergleichende Studien an einigen Trilobiten aus dem Hercyn von Bicken, Wildungen, Greifenstein und Böhmen. R.	92	I	172
— On the Occurrence of a new Form of Discinocaris in the Graptolitic Beds of the „Colonie Haidinger“ in Bohemia. R. 1892 II 359	93	I	400
— Revision der palaeozoischen Hyolithiden Böhmens. R.	94	I	195

O.

Obrutschew, W. A.: Transkaspische Niederung. Eine geologische und orographische Skizze. R. 1891 II 336	92	II	276
— Geologische Untersuchung des Gebirgslandes von Olekma-Witim und seiner Goldlagerstätten. R.	92	II	278
— Geologische Untersuchungen im Gouv. Irkutsk. 1889. R. 1894 I 327	94	I	327
— Oro-geologische Beobachtungen auf der Insel Olchon und im westlichen Baikal-Gebiet. R.	94	I	327
— Geologische Beschreibung der Mineralwässer des Klosters des All. Nilus. im Gouv. Irkutsk. R.	94	I	327
Ochsenius, C.: Mineralogisch-Geologisches aus Tarapacá in Chile. R.	90	II	276
— Ueber das Alter einiger Theile der (südamerikanischen) Anden. R.	91	II	99
— Ueber Loth, Pendel, Oceanniveau und Beweglichkeit unserer Erdrinde. R.	92	II	41
— Einiges über Hebungen und Senkungen der Erdrinde. R.	92	II	42
— Zur Entstehung des Erdöls. R.	92	II	74
Odlum, E.: Wie wurden die kegelförmigen Höhlen von Bandaisan gebildet?	91	II	56
Oddone, E. ed A. Sella: Contributo allo studio delle roccie magnetiche nelle Alpi centrali. R.	92	I	55
— Osservazioni e considerazioni sulle roccie magnetiche. R.	92	I	55
Oebbeke, K.: Ueber den Kreittonit von Bodenmais. R.	91	I	17
— Arsenkies aus dem körnigen Kalke von Wunsiedel. R.	91	II	38
— Beiträge zur Kenntniss einiger hessischer Basalte. R.	91	II	278
— siehe Kobell, Fr. von.			
Oehlert, D. P.: Sur la constitution du silurien dans la partie orientale du dép. de la Mayenne. R.	90	I	285
— Sur le dévonien des environs d'Angers. R.	90	II	292
— Notes sur les terrains paléozoiques des environs d'Eaux-Bonnes. R.	90	II	406
— Note sur quelques Pelécypodes des grès siluriens de l'ouest de la France. R.	91	II	363
— Note sur quelques Pelécypodes dévoniens. R.	91	II	364
— Description de deux Crinoïdes nouveaux du dévonien de la Manche. R. 1892 II 464	93	I	563
— Sur le silurien inférieur des Coëvrons. R.	93	I	116

	Jahrg.	Bd.	Seite
Oehlert, D. P.: Sur le genre Spyridiocrinus. R. . .	1893	I	563
Oehlert et Liétard: Note sur les calcaires des environs d'Eaux Bonnes (Basses-Pyrénées). R.	93	I	510
Offret, Albert: De la variation, sous l'influence de la chaleur, des indices de réfraction de quelques espèces minérales dans l'entendue du spectre visible. R. . . .	92	II	393
Ogilvie, Maria M.: Preliminary Note on the Sequence and Fossils of the Upper Triassic Strata of the Neighbourhood of St. Cassian, Tyrol. R.	94	I	132
— Contributions to the Geology of the Wengen and St. Cassian Strata in Southern Tyrol. R.	94	I	132
Oglialoro, A., siehe Palmieri, L.			
Oldham, R. D.: Essays in Theoretical Geology. 3. On the Age and Origin of the Himalayas, with Especial Reference to the Rev. O. Fisher's Theory of Mountain Formation. R.	92	II	280
— Report on the Geology and Economic Resources of the Country adjoining the Sind-Pishin Railway between Sharigh and Spintangi, and of the Country between it and Khattan. R.	94	II	295
— The Deep Boring at Lucknow. R.	94	II	338
Oliff, A. S., siehe Etheridge jr., R.			
Olry: Sur le bassin houiller du Boulonnais. R.	92	I	348
Omboni, G.: Il coccodrillo fossile (Steneosaurus Barettoni Zigno) di Treschè, mi Sette Comuni. R.	92	I	414
Oppenheim, Paul: Neue Crustaceenlarven aus dem lithographischen Schiefer Bayerns. R.	90	I	352
— *Ueber die Jurafauna von Visciano bei Nola in Campanien. B.*	*90*	*I*	*95*
— *Jurassische Insectenreste und ihre Deutungen. A.* . .	*91*	*I*	*40*
— Beiträge zur Geologie der Insel Capri und der Halbinsel Sorrent. R.	91	II	122
— Die Land- und Süsswasserschnecken der Vicentiner Eocänablagerungen, eine palaeontologisch-zoogeographische Studie. R.	92	I	436
— Bemerkungen zu G. Steinmann's „Einige Fossilreste aus Griechenland". R.	93	I	129
— Erwiderung auf L. v. Tausch: Bemerkungen zu Paul Oppenheim's Arbeit: Die Land- und Süsswasserschnecken der Vicentiner Eocänbildungen etc. R.	93	I	181
— Die Brackwasser-Fauna des Eocän im nordwestlichen Ungarn. R.	93	I	181
— Das Auftreten heterogener Geschiebe in den basaltischen Tuffen des Vicentiner Tertiär. R.	93	II	168
— Faunistische Mittheilungen aus dem Vicentiner Tertiär. R.	93	II	169
— Beiträge zur Kenntniss des Neogen in Griechenland. R. .	93	II	170
— Ueber innere Gaumenfalten bei fossilen Cerithien und Melanien. R. . . . . 1894 I 195	94	II	472
— Neue Fundpunkte von Binnenmollusken im Vicentinischen Eocän. R.	94	I	363
— Die Gattungen Dreyssenia van Beneden und Congeria Partsch, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Vertheilung in Raum und Zeit R. . . 1894 I 517	94	II	175
Orton, Edw.: Geological Survey of Ohio. Vol. VI. Economic Geology. R.	90	I	275

	Jahrg.	Bd.	Seite
Orton, Edw.: The Trenton Limestone as a Source of Petroleum and Inflammable Gas in Ohio and Indiana. R.	1892	I	87
— On the Origin of the Rock Pressure of the Natural Gas of the Trenton Limestone of Ohio and Indiana. R. .	92	II	75
Osann, A.: Beiträge zur Kenntniss der Eruptivgesteine des Cabo de Gata. R.	90	II	268
— Ueber den Cordierit-führenden Andesit vom Hoyazo. R.	91	I	86
— *Ueber Zwillingsbildung an Quarzeinsprenglingen aus liparitischen Gesteinen des Cabo de Gata. B.* . . .	*91*	*I*	*108*
— *Ueber ein Mineral der Nosean-Hauyn-Gruppe im Eläolithsyenit von Montreal. B.*	*92*	*I*	*222*
— Ueber die krystallinen Schiefer auf Blatt Heidelberg. R.	91	II	87
— Ueber dioritische Ganggesteine im Odenwald. R. . .	92	II	88
— Ueber den geologischen Bau des Cabo de Gata. R. . .	92	II	423
— Beiträge zur Kenntniss der Eruptivgesteine des Cabo de Gata. II. R.	93	I	282
— siehe Andreae, A.			
Osborn, Henry F.: A Review of the Cernaysian Mammalia. R.	91	I	139
— A Review of the Discovery of the Cretaceous Mammalia. R.	92	I	569
— A Review of the Cretaceous Mammalia. R.	92	I	569
— The Structure and Classification of the Mesozoic Mammalia. R.	92	II	339
— A Reply to Prof. O. C. Marsh's „Note on mesozoic Mammalia". R.	93	I	391
— Sur la découverte du Palaeonictis en Amérique. R. . .	94	II	461
— siehe Scott, W. B.			
Ossoskow, P., siehe Nikitin, S.			
Osswald: Die Bryozoen der mecklenburgischen Kreidegeschiebe. R.	92	II	156
Ototzky, P.: Polymorphismus. Zur Frage über die Mechanik der Materie. R.	94	II	216
Otto, Robert: Eukairit aus Argentinien. R.	91	I	24
Otto, R. und J. H. Kloos: Künstlicher Periklas, ein Product der Chlormagnesiumindustrie. R.	94	II	14
Owens, W. G.: A Meteorite from Central Pennsylvania. R.	93	I	479

P.

Packard, R. L., siehe Merrill, G. P.			
Paglia: Il Villafranchiano nei dintorni del Lago di Garda. R.	91	I	136
Palache, Ch.: The Soda-Rhyolithe north of Berkeley. R. .	94	II	267
Palmieri, L.: Ripetizione, nel di 7 Giugno di questo anno, dei fenomeni notati nello scorso anno il 17 dello stesso mese, all' Osservatorio vesuviano, in occasione delle due ecclissi solari avvenute in detti giorni. R. . .	92	II	47
— Il Vesuvio e la Solfatara contemporaneamente osservati. R.	92	II	47
Palmieri, L. e A. Oglialoro: Sul terremoto dell' Isola d'Ischia della sera del 28 Luglio 1883. R.	92	II	46
Panebianco, R.: Molibdenite ed altri minerali che accompagnano la pseudotridimite di Zovon. R.	92	I	233
— Nota sulla forma cristallina della Melanoflogite. R. .	93	I	26
— Inesattezze ed errori nella determinazione delle costanti cristallografiche dei minerali. 1. Theil. R.	93	II	2
Pantanelli, Dante: Descrizione di Conchiglie mioceniche nuove o poco note. R.	90	I	157

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pantanelli, Dante: Buccinidae, Purpuridae e Olividae del miocene superiore di Montegibbio. R.	1891	II	464
— Pleurotomidi del miocene superiore di Montegibbio. R.	91	II	464
— Tufi serpentinosi eocenici nell' Emilia. R.	92	II	253
Panzerschinski, C.: Ueber eine neue Minerallagerstätte im Ural 2 (Jeremejeff'sche Grube). R.	91	II	11
Paquier, V.: Contributions à la géologie des environs de Grenoble. R.	94	I	350
Parent, H.: Note sur le tertiaire de Boulonnais. R.	94	I	357
Parona, C. F.: Studio monografico della fauna raibliana di Lombardia. R.	90	II	112
— Note palaeontologiche sul lias inferiore nelle Prealpi Lombarde. R.	90	II	438
— I fossili del lias inferiore di Saltrio in Lombardia. I. R.	92	I	560
— Contributio allo studio dei Megalodonti. R.	92	II	363
— Sopra alcuni fossili del Biancone Veneto. R.	93	I	379
— Brevi notizie sulla fauna carbonifera del Monte Pizzul in Carnia. R.	93	II	376
— Fossili del lias medio nel conglomerato terziario di Lauriano (Colli di Torino). R.	93	II	538
— Descrizione di alcuni fossili miocenici di Sardegna. R.	94	II	357
— Revisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte. R.	94	II	460
— siehe Mariani, E.			
Parran: Sur les dunes littorales en Algérie et Tunisie. R.	91	II	298
Partsch, J.: Die Insel Leukas. Eine geographische Monographie. R.	90	II	94
— Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. Heft 1. R.	93	I	47
Pasquier, Léon du: Ueber die fluvioglacialen Ablagerungen der Nordschweiz (ausserhalb der inneren Moränenzone). R.	93	I	368
— Etudes sur les alluvions glaciaires du Nord de la Suisse. R.	93	I	368
— Sur les limites de l'ancien glacier du Rhône le long du Jura. R.	93	I	372
— siehe Steinmann, G.			
Passarge, Siegfried: Das Röth im östlichen Thüringen. R.	93	II	377
Paul, M. C.: Geologische Aufnahmen in der Gegend von Znaim. R.	94	I	155
Pawlow, A.: Genetische Typen der continentalen Formationen der Glacial- und Postglacialzeit. R.	90	I	316
Pawlow, A. et G. W. Lamplugh: Argiles de Speeton et leurs équivalents. R.	93	I	351
Pawlow, Marie: Etude sur l'histoire palaeontologique des Ongulés.			
IV. Hipparion de la Russie. V. Chevaux pleistocènes de la Russie et leurs rapports avec les chevaux des autres pays. R.	91	I	328
VI. Les Rhinocéridae de la Russie et le développement des Rhinocéridae en général. R.	93	II	540
— Le néocomien des montagnes de Worobiewo. R.	93	II	386
— Notice sur l'Hipparion crassum du Roussillon. R.	94	II	153
— Qu'est ce que c'est que l'Hipparion? R.	94	II	154
Peach and Horne: On the Olenellus-Zone in the North-West-Highlands of Scotland. R. 1893 I 115	94	II	97
Peale, Albert C.: Mineral Springs of the United States. R.	90	II	103
Pearce, R.: The Association of Minerals in the Gagnon Vein, Butte City, Montana. R.	91	I	100

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pearce, St. H., siehe Penfield, S. L.			
Pelikan, A.: Natürliche Aetzung an Topaskrystallen von San Luis Potosi in Mexico. R.	1892	I	509
— Ein neues Cordieritgestein vom Mte. Doja in der Adamellogruppe. R.	92	I	286
— Pseudomorphose von Thenardit nach Glaubersalz. R.	93	I	460
— Schwefel von Attchar in Macedonien. R. . 1893 I 460	93	II	240
— Das Tetrakishexaëder (102) am Steinsalz von Starunia. R.	93	I	461
— Sanduhrförmig gebaute Krystalle vonStrontiumnitrat. R.	94	II	23
Pelseneer, Paul: Sur un nouveau Conularia du carbonifère et sur les prétendus „Pteropodes“ primaires. R.	91	II	361
Penck, A.: Theorien über das Gleichgewicht der Erdkruste. R.	90	I	51
— *Ueber Durchbruchthäler. B.*	*90*	*I*	*165*
— Das Endziel der Erosion und Denudation. R.	91	I	52
— Arbeiten des Geographischen Institutes der k. k. Universität Wien. R.	93	I	67
— Die Formen der Landoberfläche. R.	94	I	277
— Das österreichische Alpenvorland. R.	94	I	313
— Ueber die Glarner Doppelfalte. R.	94	I	313
— Die Glacialschotter in den Ostalpen. R.	94	I	367
Penecke, K. A.: Die Molluskenfauna des untermiocänen Süsswasserkalkes von Reuen in Steiermark (Horizont der Helix Ramondi Brong.) R.	92	I	435
— Vom Hochlantsch. R.	92	II	431
Penfield, Samuel L.: Crystallized Vanadinite from Arizona and New Mexico. R.	90	I	227
— Phenacite from Colorado. R.	91	I	34
— Bertrandite from Mt. Antero. R.	91	II	41
— On the Crystalline Form of Sperrylite. R.	91	II	246
— Die Krystallform des Sperrylith. R.	91	II	246
— Crystallized Bertrandite from Stoneham, Me., and Mt. Antero, Colorado. R.	92	II	28
— On some curiously developed Pyrite Crystals from French Creek, Delaware Con., Pa. R.	92	II	211
— On Spangolite, a new Copper Mineral. R.	93	II	35
— Some Observations on the Beryllium Minerals from Mt. Antero, Colorado. R.	93	II	468
— On Connellite from Cornwall. R.	94	I	15
— Chalcopyrite Crystals from the French Creek Iron Mines, St. Peter, Chester Co., Pa. R.	94	I	17
— On the Chemical Composition of Aurichalcite. R.	94	I	24
— Anthophyllite from Franklin, Macon Co., N. C. R.	94	I	40
— siehe Genth, F. A.			
— siehe Hidden, W. E.			
— siehe Iddings, J. P.			
— siehe Wells, H. L.			
Penfield, S. L. and D. N. Harper: On the chemical Composition of Ralstonite. R.	90	I	226
Penfield, S. L. and St. H. Pearce: On Polybasite and Tennantite from the Mollie Gibson Mine in Aspen. R.	94	II	219
Penfield, S. L. and F. L. Sperry: On Pseudomorphs of Garnet from Lake Superior and Salida, Colorado. R.	90	I	223
— — Mineralogical Notes. R.	91	II	241
Penhallow, D. P., siehe Dawson, J. W.			
Penning, W. H.: On the Geology of the Southern Transvaal. R.	93	I	318

	Jahrg.	Bd.	Seite
Penrose jr., A. F.: Nature and Origin of Deposits of Phosphate of Lime. With an Introduction by N. S. Shaler. R.	1891	II	431
— Preliminary Report on the Geology of the Gulf Tertiary of Texas. R.	92	II	18
— siehe Hill, R. T.			
Pergens, Ed.: Sur l'age de la partie supérieure du tufeau de Ciply. R.	90	I	310
— Notes succinctes sur les Bryozoaires. R.	90	II	154
— Zur fossilen Bryozoenfauna von Wola Luzanska. R.	91	II	369
— Bryozoaires du miocène du Gard. R.	92	I	446
— Bryozoaires du sénonien de Sainte-Paterne, de Lavardin et de la Ribochère. R.	94	I	203
— Nouveaux Bryozoaires cyclostomes du Crétacé. R.	94	I	203
— Revision des Bryozoaires du crétacé figurés par d'Orbigny. I. Partie. Cyclostomata. R.	94	I	389
Perner, J.: O radislariéch z českého útvarse křídového. R.	93	II	423
— Kriticky seznam foraminifer z březenskych vrsteo. R.	94	I	524
— Foraminifery Českého Cenomanu. R.	94	I	524
Péron, A.: Note sur les subdivisions des terrains tertiaires moyen et supérieur en Algérie. R.	93	I	366
— siehe Cotteau, G.			
— siehe Thomas.			
Perrot, F. L.: Vérification expérimentale de la méthode de M. Charles Soret pour la mesure des indices de réfraction des cristaux à deux axes. R.	90	II	189
— Recherches sur la réfraction et la dispersion dans une série isomorphe de cristaux à deux axes. R.	92	I	12
Petersen, J.: Beiträge zur Petrographie von Sulphur Island, Peel Island, Hachijo und Mijakeshima. R.	92	I	311
— Der Boninit von Peel Island. Nachtrag zu den Beiträgen zur Petrographie von Sulphur Island u. s. w. R.	92	I	311
Petersen, Th.: Ueber den Anamesit von Rüdigheim bei Hanau und dessen bauxitische Zersetzungsproducte. R.	94	I	460
— Ueber Bauxitbildung. R.	94	I	460
Petersson, Walfr.: Analysen von Gadolinit und Homilit. R.	91	I	372
— Studien über Gadolinit. R.	93	I	240
— Om Routivare järnmalmsfält i Norrbottenslän. R.	94	I	88
Pethő, J.: Geologische Studien in den nördlichen Ausläufern des Hegyes-Drócsa-Gebirges an dem linken Ufer der Weissen Körös. R. 1891 I 126	93	I	95
— Ergänzungsaufnahmen in den rechts- und linksuferigen Theilen des Fehér-Körös-Thales. R. 1891 I 127	93	I	95
— Cucullaea Szabói, eine neue Muschelart aus den hypersenonen Schichten des Pétervárada-Gebirges. R.	93	II	556
Petrie, W. M. Flinders: Wind-Action in Egypt. R.	90	II	95
Pettersen, K.: Kvartärtidens udviklingshistorie efter det nordlige Norge. R.	90	I	79
— Blocktransport in der Umgebung des Torneträsk in der schwedischen Lappmark. R.	90	II	130
— De geologiske bygningsforholde langs den nordlige side af Torneträsk. R.	90	II	265
— Skuringsmärker efter det nuvärende strandbelte. R.	90	II	265
— Blokketransport i strögene om Torneträsk i svensk Lapmark. R.	90	II	265
— Den nord-norske fieldbygning. II. 2. R.	90	II	265

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pfaff, F. W.: Ueber Schwankungen in der Intensität der Erdanziehung. R.	1891	II	54
Pfeffer, Alois: Bergfahrten in die Goldtauern. R.	93	II	79
Pfeffer, G.: Versuch über die erdgeschichtliche Entwickelung der jetzigen Verbreitungsverhältnisse unserer Thierwelt. R.	92	II	324
Pfeiffer, E.: Zum Vorkommen von Schwefelwasserstoff und Schwefel im Stassfurter Salzlager. R.	90	II	375
Pfeiffer, F. B.: Der Erzbergbau in Serbien. R.	93	II	60
Pfeiffer, R.: Ueber kritische Tage und Schlagwetter. R.	92	II	70
Pfordten, O. von der: siehe Koenig, Th.			
Philippi, R. A.: Tertiärversteinerungen aus der Argentinischen Republik. R. 1893 II 538	94	I	370
Philippson, Alfred: Ueber die Altersfolge der Sedimentformationen in Griechenland. R.	93	I	306
— Der Isthmos von Korinth. Eine geologisch-geographische Monographie. R.	93	I	306
— Bericht über eine Reise durch Nord- und Mittel-Griechenland. R.	93	I	306
— Der Gebirgsbau des Peloponnes. R.	93	I	306
— Der Peloponnes. Versuch einer Länderkunde auf geologischer Grundlage. R.	93	I	306
— Erster und zweiter Reisebericht (Nord-Griechenland). R.	94	I	318
— Ueber die Typen der Küstenformen. R.	94	II	41
— Die Küstenformen der Insel Rügen. R.	94	II	41
Piatti, A.: La sorgente termo-solforosa di Sermione sul Lago di Garda. R.	92	II	260
Picard, K.: Ueber Balatonites sondershusanus n. sp. R.	94	II	168
Pichler: Zur Geologie von Tirol. R.	91	II	440
Pidgeon, D.: On certain Physical Peculiarities exhibited by the so-called „Raised Beaches“ of Hope's Nose and the Tatcher Rock Devon. R.	91	II	333
Piedboeuf: Die Tertiärablagerungen bei Düsseldorf. R.	91	II	130
Piette, E.: La caverne de Brassempuy. R.	94	I	178
Pinnow, J., siehe Will, W.			
Piolti, Giuseppe: Gneiss tormalinifero di Villar focchiardo. R.	90	II	94
— Il piano del Moncenisio. R.	90	II	95
— I minerali del gneiss di Borgone (Val di Susa). Cenni descrittivi. R.	91	II	406
— Il calcare del Grand Roc (Alta Valle di Susa). R.	93	II	495
Pirsson, Louis V.: On the Fowlerite Variety of Rhodonite from Franklin and Stirling, N. J. R.	93	II	478
— On some remarkably developed Calcite Crystals. R.	94	I	22
— Gmelinite of Nova Scotia. R.	94	I	46
— On Mordenite. R.	94	I	47
— Mineralogical Notes. R.	94	I	57
— Geology and Petrography of Conanicut Island, Narragansett Bay, Rhode Island. R.	94	II	263
— Note on some Volcanic Rocks from Gough's Island, South Atlantic. R.	94	II	263
— siehe Weed, Walter H.			
Pisani, F.: Notices minéralogiques. R. 1890 I 34	93	II	252
— Sur la cuprodescloizite du Mexique et divers autres vanadates. R.	90	II	39
— Rectification à la note sur le zircon de Binnen. R.	90	II	40

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pizzighelli, G.: Handbuch der Photographie. 2. Aufl. 3 Bände. R.	1893	I	267
Pjatnizky, P.: Bericht der geologischen Forschungen in dem Gebiete der Flüsse Psel und Worskla. R.	91	I	306
— Ueber Rothspiessglanz. R.	93	I	233
— Ueber die Krystallform des Uranotil. R.	93	II	253
Platania, G.: Geological Notes of Acireale. R.	92	II	49
Platz, Ph.: Die glacialen Bildungen des Schwarzwaldes. R.	93	II	537
Ploner, J.: Ueber Granat-Granulit in Tyrol. R.	93	I	490
— Ueber die Krystallformen des Apophyllits der Seiseralpe. R.	93	I	34
Pockels, Fr.: Ueber den Einfluss elastischer Deformationen, speciell einseitigen Druckes, auf das optische Verhalten krystallinischer Körper. R.	90	I	197
— Ueber die durch einseitigen Druck hervorgerufene Doppelbrechung regulärer Krystalle, speciell von Steinsalz und Sylvin. R.	90	II	368
— Ueber die Interferenzerscheinungen, welche Zwillingsplatten optisch einaxiger Krystalle im convergenten homogenen polarisirten Lichte zeigen. R.	91	II	223
— *Ueber den Einfluss des elektrostatischen Feldes auf das optische Verhalten piëzoelektrischer Krystalle. B.*	*94*	*II*	*241*
— *Ueber die Aenderungen des optischen Verhaltens und die elastischen Deformationen dielektrischer Krystalle im elektrischen Felde. A.*	*BB*	*VII*	*201*
— *Ueber die Berechnung der optischen Eigenschaften isomorpher Mischungen aus denjenigen der gemischten reinen Substanzen. A.*	*BB*	*VIII*	*117*
— *Ueber die Aenderung des optischen Verhaltens von Alaun und Beryll durch einseitigen Druck. (Mit Taf. VI und 1 Holzschnitt.) A.*	*BB*	*VIII*	*217*
— *Ueber die elastischen Deformationen piëzoelektrischer Krystalle im elektrischen Felde. A.*	*BB*	*VIII*	*407*
Počta, Ph.: Ueber einige Spongien aus dem Dogger des Fünfkirchner Gebirges. R.	91	II	196
— Ueber den Inhalt eines Quarzknollens von Ruditz. R.	92	I	189
— Ueber einige Spongien aus dem Cuvieri-Pläner von Paderborn. R.	93	I	565
— O geologickém profilu v nádrazi e. k. státní dráhy cís. Františka Josefa v Prage. R.	93	II	374
— Ueber Spongien aus der oberen Kreide Frankreichs in dem k. mineralogischen Museum in Dresden. R.	94	I	209
Poech, F.: Ueber den Manganerzbergbau Čevljanoič in Bosnien. R.	90	II	74
Pöhlmann, R.: Mineralogische Mittheilungen. R.	94	I	59
Pohlig, H.: Ueber Chlorsapphir, einen grünen Edelkorund. R.	90	I	211
— Dentition und Kraniologie des Elephas antiquus Falc. mit Beiträgen über Elephas primigenius Blum. und Elephas primigenius Nesti. Abschnitt I. R.	90	I	462
Zweiter Abschnitt. R.	93	II	400
— Die grossen Säugethiere der Diluvialzeit. R.	91	II	339
— Ovibos moschatus. R.	91	II	340
— Ueber sicilianische Elephantenmolaren. R.	92	I	160
— Mineraleinschlüsse im Basalt. R.	92	I	511
— Ueber Petersburger fossile Säugethierreste. R.	92	II	140
— Ueber neue Ausgrabungen von Taubach bei Weimar. R.	92	II	143
— Ueber vulcanische Säulenbildung am Niederrhein. R.	92	II	414

	Jahrg.	Bd.	Seite
Pohlig, H.: Ueber das Valorsineconglomerat. R. . .	1893	I	271
— Femur von Dryopithecus. R.	93	I	385
— Altpermische Saurierfährten, Fische und Medusen der Gegend von Friedrichroda. R.	94	I	372
— Eine Elephantenhöhle Siciliens und der erste Nachweis des Cranialdomes von Elephas antiquus. R. . . .	94	I	503
— Le premier crâne complet du Rhinoceros (Caenopus occidentalis Leidy). R.	94	I	507
— Die Cerviden des thüringischen Diluvial-Travertines, mit Beiträgen über andere diluviale und recente Hirschformen. R.	94	II	150
Pokorny: Naturgeschichte des Mineralreiches. Bearbeitet von M. Fischer. 16. verb. Aufl. R.	92	I	211
Pollack, V.: Der Bergsturz im „Grossen Tobel“ nächst Langen am Arlberg vom 9. Juli 1892. R.	94	I	285
— Der Bergsturz bei Langen am Arlberg. R.	94	II	41
Pollini, C.: Sopra alcuni avanzi di pesci fossili tertiari conservati nel museo geologico della Regia Università di Genova. R.	90	I	468
Pomel, A.: Note sur deux échinides du terrain éocène. R.	90	I	360
— Notes d'échinologie synonymique. R.	90	I	361
— Sur un gisement de quartz bipyramidé avec cargneule et gipse à Souk-Arras, Algérie. R.	90	II	96
— Sur les tremblements de terre du 15 et 16 Janvière en Algérie. R.	92	II	52
— Sur une Macaque fossile des phosphorites quaternaires de l'Algérie, Macacus trarensis. R.	93	I	540
— Sur le Libytherium maurusium, grand Ruminant du terrain pliocène plaisancien d'Algérie. R.	93	I	544
— Sur deux Ruminants de l'époque néolithique de l'Algérie. R.	93	I	544
— Les échinides du Kef Ighoud. R.	93	I	556
— Aperçu retrospectif sur la géologie de la Tunisie. R. .	94	I	328
— Sur la classification des terrains miocènes de l'Algérie et reponse aux critique de M. Péron. R.	94	I	494
Pompecki, J. F.: Ueber das Einrollungsvermögen der Trilobiten. R.	92	I	170
— Die Trilobitenfauna der ost- und westpreussischen Diluvialgeschiebe. R.	92	I	170
— Bemerkungen über das Einrollungsvermögen der Trilobiten. R.	93	I	178
— Beiträge zu einer Revision der Ammoniten des schwäbischen Jura. 1. Lieferung. I. Phylloceras, II. Psiloceras, III. Schlotheimia. R.	94	I	384
— Palaeontologische Beziehungen zwischen den untersten Liaszonen der Alpen und Schwabens. R.	94	I	483
Porcher, E.: Sur l'épidote. R.	94	II	26
Porter, D. A.: Notes on some Minerals and mineral Localities in the Northern Districts of New-South-Wales. R.	90	II	206
Portis, A.: Sul modo di formazione dei conglomerati miocenici della Collina di Torino; osservazioni, a proposito della nota di L. Mazzuoli: Sul modo di formazione dei conglomerati miocenici del Appennino Ligure. R. .	92	I	143
— Nuove località fossilifere in Val di Susa. R.	92	I	349
Pošepny, F.: Ueber die Adinolen von Přibram in Böhmen. R.	90	II	70
— Ueber einige wenig bekannte alte Goldbergbaue Böhmens. R.	91	II	293

	Jahrg.	Bd.	Seite
Posewitz, Th.: Lateritvorkommen in West-Borneo. R. 1891 I 282	1891	II	102
— Neuere geologische Entdeckungen im nordöstlichen Borneo. R.	91	II	103
— Die Theissgegend von Usterike bis Chmiele. R.	93	II	362
Post, Hans von: Några ord om Gellivaramalmens uppkomst. R. 1893 I 19	93	II	63
— Ytterligare om Gellivaramalmens uppkomst. R. 1893 II 64	93	II	270
Postlethwaite, J.: The Dioritic Picrite of White House and Great Cockup. R.	94	I	301
— Notes on an Intrusive Sheet of Diabase and associated Rocks at Robin Hood, near Bassenthwaite. R.	94	II	261
Potier et Vasseur: Sur les formations infra-tongriennes du bassin de Gironde. R.	91	II	328
Potonié, H.: Der im Lichthof der Königl. geologischen Landesanstalt und Bergakademie aufgestellte Baumstumpf mit Wurzeln aus dem Carbon des Piesberges. R.	91	I	440
— Ueber einige Carbonfarne. R.	91	I	440
II. Theil. R.	93	I	570
III. Theil. R.	93	II	425
— Ueber Psilotiphyllum bifidum (E. Geinitz) Potonié. R.	93	I	573
— *Folliculites Kaltennordheimensis Zenker und Folliculites carinatus (Nehring) Pot. (Mit Taf. V u. VI.) A.*	*93*	*II*	*86*
— Ueber die den Wasserspalten physiologisch entsprechenden Organe bei fossilen und recenten Farnarten. R.	94	I	527
— Die Zugehörigkeit der provisorischen Gattung Knorria. R.	94	I	528
— Ueber Lepidodendron-Blattpolster vortäuschende Oberflächenstructuren palaeozoischer Pflanzenreste. R.	94	I	528
— Ueber die Volumenreduction bei Umwandlung von Pflanzenmaterial in Steinkohle. R.	94	II	430
Powell, J. W.: Sixth Annual Report of the U. S. Geological Survey. R.	90	I	275
Power, Fr. D.: Note on the late Landslip in the Daudenong Ranges. R.	94	II	418
Poynting, J. H.: On a Determination of the Mean Density of the Earth and the Gravitation Constant by Means of the common Balance. R.	94	II	35
— The Mean Density of the Earth. R.	94	II	35
Prendel, R.: Ein Beitrag zur Kenntniss der physikalischen Eigenschaften des Kotschubeïts. R.	90	II	218
— Ueber den Senarmontit. R.	90	II	373
— Einige Worte über die Krystallform des Eises. R.	93	I	24
— Ueber die isodimorphe Gruppe des Antimonoxyds und der arsenigen Säure. R.	93	I	25
— Einige Betrachtungen über Polymorphie und Mimesie. R.	93	I	459
— Analyse des Turmalins von der Urulga (Sibirien). R.	93	II	27
Preston, E. D.: On the Deflection of the Plumb-line and Variations of Gravity in the Hawaiian Islands. R.	92	I	54
— The Study of the Earth's Figure by Means of the Pendulum. R.	94	I	63
Preston, H. L.: Preliminary Note of a new Meteorite from Kenton Co. R.	93	II	279
— Notes on the Farmington, Washington County, Kansas, Meteorite. R.	93	II	279
Prestwich, J.: Considerations on the Date, Duration and			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Conditions of the Glacial Period, with Reference on the Antiquity of Man. R.	1891	I	130
Prestwich, J.: On the raised Beaches and „Head", or rubble Drift of the South of England. R.	93	I	136
Preussner: Merkwürdiges Schwefelvorkommen in Louisiana. R.	90	I	211
Priem, F.: La terre, les mers et les continents, géographie physique, géologie et minéralogie. R.	94	I	276
Primics, G.: Geologische Beobachtungen im Csetrás-Gebirge. R.	91	II	71
— Die Torflager der siebenbürgischen Landestheile. R. 1893 II 175	94	II	136
— Skizzenhafter Bericht über die im nördlichen Theile des Bihar-Gebirges im Jahre 1890 bewerkstelligte geologische Detailaufnahme. R.	93	II	362
Prior, G. T.: Note on Connellite from a New Locality. R.	91	I	231
— On Zinc Sulphide replacing Stibnite and Orpiment; Analyses of Stephanite and Polybasite. R.	91	II	416
— Fergusonite from Ceylon. R.	94	II	229
— siehe Miers, H. A.			
Priwoznik, E.: Ueber die Meteorite von Knyahinya und Hainholz. R.	94	I	274
Probst, J.: Beschreibung einiger Localitäten in der Molasse in Oberschwaben. R.	90	I	450
— Ueber die Ohrenknochen fossiler Cetodonten aus der Molasse von Baltringen. R.	90	II	140
Procházka, V. J.: Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Miocängebiets der Umgebung von Mähr.-Trübau. R.	92	II	177
— Předbežná správa o stratigrafickych a faunistickych pomerech nejzazší části miocaenu západní Moravy. R.	93	I	525
— Miocaen moravsky. Proní příspevek ku poznání rázu zvířeny mořskych jílu a slínu severozápado- a středomoravské oblasti. R.	93	I	526
— Ku stratigrafii oncophorovych usazenin okolí ivančicko-oslavanského na Morave. R.	93	I	526
— Vorläufiger Bericht über die stratigraphischen und faunistischen Verhältnisse des westlichen Miocängebietes von Mähren. — Das Miocän von Mähren. I. Beitrag zur Kenntniss der Fauna der marinen Tegel und Mergel des nordwestlichen und mittleren Gebietes von Mähren. — Zur Stratigraphie der Oncophoren-Sande der Umgebung von Eibenschitz und Oslawan in Mähren. R.	94	II	126
— Ueber fossile Creusien des mährischen, steirischen und croatischen Miocäns. R.	94	II	352
Proescholdt, H.: Ueber eine Diluvialablagerung bei Themar im Werrathal. R.	90	I	456
Prosser, Charles S.: The Thickness of the Devonian and Silurian Rocks of Western Central New York. R.	91	II	312
— The Geological Position of the Catskill Group. R.	91	II	438
— The Devonian System of Eastern Pennsylvania. R.	93	I	334
— The Thickness of the Devonian and Silurian rocks of Western New York; approximately along the Line of the Genesee River. R.	93	I	510
— The Upper Hamilton and Portage Stages of Central and Eastern New York. R.	94	I	334
— The Thickness of the Devonian and Silurian Rocks of Central New York. R.	94	I	335

	Jahrg.	Bd.	Seite
Prosser, Charles S.: The Devonian System of Eastern Pennsylvania. R.	1894	I	336
Pulfrich, C.: Ueber Dispersionsbestimmungen nach der Totalreflexionsmethode mittelst mikrometischer Messung. R.	94	II	210
Pumpelly, Raphael: Report on the Mining Industries of the United States (exclusive of the precious metals) with Special Investigations into the Iron Resources of the Republic and into the Cretaceous Coals of the Northwest. R.	90	I	282
— The Relation of Secular Rock-disintegration to certain Transitional Crystalline Schists. R.	93	I	72
— An Apparent Time-break between the Eocene and Chattahoockee Miocene in Southwestern Georgies. R.	94	II	130
Pumpelly, R. and C. R. van Hise: Observations upon the Structural Relations of the Upper Huronian, Lower Huronian and Basement Complex on the North Shore of Lake Huron. R.	94	II	95
Purves, J. C.: Note sur l'existence de l'Avicula contorta, Portlock, et du Pecten Valoniensis, Defr., dans le rhétien du Luxembourg belge. R.	90	I	299
Pyliaew, M.: Die Edelsteine, ihre Eigenschaften, ihr Vorkommen und ihre Anwendung. R.	90	II	19

Q.

Quelch: Report on the Reef-Corals collected by H. M. S. Challenger. R.	90	I	369
Quenstedt, Fr. A.: Die Ammoniten des Schwäbischen Jura. III. Bd. Der Weisse Jura. R.	90	I	155
— Psammochelys Keuperina. R.	91	I	150
Quiroga, F.: Noticías petrográficas (Fortsetz.). R.	90	I	80
— Anomalías ópticas de la blenda en Picos de Europa. R.	94	I	5
— Observaciones al mapa geológico del Sahara de M. Roland. R.	94	I	98
— Gneis y diabasa del valle de Miñor. R.	94	I	102
— Gneis de glaucophan de monte Galiñeiro, en el valle de Miñor. R.	94	I	102

R.

Rabelle: Note sur les alluvions du Péron. R.	93	II	536
Raciborski, M.: Flora Retyeka pólnocnego stoku gór swietokrzyskich. R.	93	I	430
— Ueber die Osmundaceen und Schizaeaceen der Juraformation. R.	94	II	193
— Flora retyeka w Tatrach. R.	94	II	193
— O Niektórych skamieni alych drzewach okolicy Krakowa. R.	94	II	374
— Permokarbońska flora wapienia Karniowickiego. R.	94	II	374
— Permokarbońska Flora Karniowickiego Wapienia. R.	94	II	374
— Taonurus ultimus Sap. et M. in Galizien. R.	94	II	378
Radkewitsch, G.: Ueber die Kreideablagerungen des Gouv. Podolien. R.	94	I	145
Radovanović, S.: Beiträge zur Geologie und Palaeonto-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
logie Ost-Serbiens. I. Die Liasablagerungen von Rgotina. R.	1890	I	440
Raisin, Miss C. A.: On Devonian Greenstones and Chlorite Schists of South Devon. R.	91	I	90
— On the Lower Limit of the Cambrian Series in Caernarvonshire. R.	92	II	295
— The so-called Serpentines of the Lleyn. R.	94	I	302
— Variolite of the Lleyn and associated Volcanic Rocks. R.	94	II	259
— siehe Bonney, T. G.			
Rammelsberg, C.: Ueber die chemische Natur der Glimmer. R.	90	II	35
— Ueber die chemische Natur der Turmaline. R.	92	I	23
— Ueber die Leucit-Nephelingruppe. R.	94	I	261
Ramond, G.: Esquisse géologique de l'aqueduc de dérivation vers Paris des sources de la vallée d'Avre. R.	92	II	308
— siehe Dollfus, G.			
Ramond, G. et G. Dollfus: Note explicative du profil géologique du chemin de fer de Mantes à Argenteuil. R. 1893 I 132	93	I	524
Ramsay, Wilhelm: Ueber die Absorption des Lichtes im Epidot vom Sulzbachthal. R.	90	I	1
— Geologische Beobachtungen auf der Halbinsel Kola. Nebst einem Anhange: Petrographische Beschreibung der Gesteine des Lujavr-urt. R.	91	I	97
— Om Hoglands geologiska hygnad. R.	92	I	76
— Ueber den geologischen Bau der Insel Hochland. Auszug. R.	92	I	76
— *Ueber die isomorphe Schichtung und die Stärke der Doppelbrechung im Epidot. (Mit Taf. VII.) A.*	*93*	*I*	*111*
— Beskrifning till Kartbladen No. 19 och 20: Hogland och Tytärsaari. R.	93	II	96
— Kurzer Bericht über eine Expedition nach der Tundra Umptek auf der Halbinsel Kola. R.	93	II	108
— Ueber den Salpausselkä im östlichen Finnland. R.	94	II	135
— *Ueber den Eudialyt von der Halbinsel Kola. (Mit Taf. XXIX, XXX.) A.*	*BB*	*VIII*	*722*
Ramsay, W. und H. Berghell: Das Gestein von Jiwaara in Finnland. R.	92	I	307
Ranft, Theod.: Der Zinnbergbau am Bischoffsberge (Mount Bischoff), Tasmania. R.	91	II	295
Ransome, F. L.: The Eruptive Rocks of Point Bonita. R.	94	II	268
Rateau: Hypothèse des cloches sous-continentales. R.	94	II	244
Rath, G. vom: Zur krystallographischen Kenntniss des Tesseralkies. R.	90	I	234
Ratte, F.: Note on a remarkable Example of Fracture in Kerosene Shale. R.	90	II	242
— Notes on Australian Fossils. R.	90	II	327
— Note on some Trilobites new to Australia. R.	90	II	328
— Note on some Australian Fossils. R.	90	II	447
— Additional Evidence on Fossil Salisburiae from Australia. R.	90	II	448
Ratzel, Friedrich: Ueber Karrenfelder im Jura und Verwandtes. R.	93	I	483
Rauff, Hermann: Vorläufige Mittheilung über das Skelet der Anomocladinen, sowie über eine eigenthümliche Gruppe fossiler Kalkschwämme (Polysteganinae), die nach dem Syconen-Typus gebaut sind. B.	*91*	*I*	*278*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rauff, Hermann: Ueber Palaeospongia prisca Bornem., Eophyton z. Th., Chondrites antiquus, Haliserites z. Th. und ähnliche Gebilde. B.	*1891*	*II*	*92*
— *Ueber Polygonosphaerites. (Mit 8 Holzschnitten.) B.*	*93*	*I*	*43*
— *Ueber angebliche Spongien aus dem Archaicum. (Mit 3 Holzschnitten.) A.*	*93*	*II*	*57*
Raulin, V.: Sur quelques faluns bleus inconnus du département des Landes. R.	93	I	525
Raumer, Eduard von: Beitrag zur chemischen Kenntniss einiger palaeolithischer Gesteine des Fichtelgebirges. R.	90	I	261
Ravicz-Raciborski, M.: Zur Frage über das Alter des Karniovicer Kalkes. R.	93	II	130
— Ueber das Rothliegende der Krakauer Gegend. R.	93	II	130
Rayleigh, Lord: On the Reflexion of Light at a Twin Plane of a Crystal. R.	91	II	1
— On the remarkable Phenomenon of Crystalline Reflexion described by Prof. Stokes. R.	91	II	1
Raymaekers, D.: Note sur trois forages exécutés à la brasserie Mertens à Cernybeke près d'Anvers. R.	93	II	533
Raymaekers, D. et E. Vincent: Note sur deux puits artésiens de Bruxelles. R.	92	I	551
Reade, T. Mellard: The Origin of Mountain Ranges considered experimentally, structurally, dynamically and in Relation to their Geological History. R.	90	I	46
— An Estimate of Post Glacial Time. R.	91	II	140
— The Geological Consequences of the Discovery of a Level-of-no-strain in a Cooling Globe. R.	91	II	261
— Tidal Action as an Agent of Geological Change. R.	91	II	261
— A Consideration of the Effects of Contraction during the Cooling of Intrusive Masses of Granite and the Cause of their Solid Continuity. R.	91	II	261
— Physiography of the Lower Trias. R.	91	II	317
— The Perched Blocks of Norber Brow and their Levels relative to their Place of Origin. R.	92	II	65
— The Cause of Active Compressive Stress in Rocks and Recent Rock Flexures. R.	94	I	63
— Faulting in Drift. R.	94	I	284
— Glacial Geology, old and new. R.	94	I	364
Redtenbacher, J., siehe Brauer, Fr.			
Reed, F. R. C.: Woodwardian Museum Notes. R.	94	II	165
Reese, L.: On the Influence of Swamp-Waters in the Formation of Phosphate-Nodules of South Carolina. R.	93	I	290
Regelmann: Geognostische Betrachtung des Schüttergebietes (schwäbische Alb). R.	93	II	44
— Hydrographische Durchlässigkeitskarte des Königreichs Württemberg. R.	94	II	67
— Hydrographische Uebersichtskarte des Königreichs Württemberg. R.	94	II	67
— Gewässer- und Höhenkarte des Königreichs Württemberg. R.	94	II	67
— Geognostische Uebersichtskarte des Königreichs Württemberg. 1 : 600 000. R.	94	II	67
Reid, Clement: Notes on the Sections at Corton, seen during the recent Visit of the Members of the Geological Congress. R.	91	I	173
— The Pliocene Deposits of Britain. R.	92	II	113

	Jahrg.	Bd.	Seite
Reid, Clement: On the Pleistocene Deposits of the Sussex Coast and their Equivalents in other Districts. R.	1893	I	136
Reid, Clement and H. N. Ridley: Fossil Artic Plants from the Lacustrine Deposit at Hoxne, in Suffolk. R. . .	90	I	476
Rein: Ueber die Sierra de Cartagena und das Mar Menor. R.	94	II	274
Reinach, A. von: Das Bohrloch im neuen Wiesbadener Schlachthause. R.	91	I	118
— Ueber die Parallelisirung des südlichen Taunus mit den Ardennen und der Bretagne. R.	93	II	129
— Dass Rothliegende in der Wetterau und sein Anschluss an das Saar-Nahegebiet. R.	94	I	129
— Das Rothliegende im Süden und Westen des französischen Centralplateau. R.	94	I	130
Reis, O. M.: Die Coelacanthinen mit besonderer Berücksichtigung der im Weissen Jura Bayerns vorkommenden Arten. R.	91	II	347
Reiser, Karl A.: Ueber die Eruptivgesteine des Algäu. R.	91	II	84
Reiss, W. und A. Stübel: Reisen in Süd-Amerika. R.	93	I	73 78
Remelé, A.: Untersuchungen über die versteinerungsführenden Diluvialgeschiebe des norddeutschen Flachlandes mit besonderer Berücksichtigung der Mark Brandenburg. I. Stück. 3. Lieferung. R.	92	I	429
Renard, A.: Recherches lithologiques sur les Phthanites du calcaire carbonifère de Belgique. R.	91	II	200
— siehe Murray, John.			
Renaud: Sur les sondages exécutés dans le Pas de Calais. R.	92	II	88
Renault, Bernard: Sur le genre Bornia F. Roemer. R. .	90	II	347
— Sur le fructifications mâles des Arthropitus et des Bornia. R.	90	II	348
— Notice sur les Sigillaires. R.	94	I	396
— Sur les Pterophyllum. R.	94	II	482
— Note sur la Famille des Botryoptéridées. R.	94	II	482
Renault, B. et R. Zeiller: Etudes sur le terrain houiller de Commentry. Livre deuxième. Flore fossile. R. .	93	I	203
Renault, Ch.: Note sur une Eryonidée nouvelle, trouvée à Sainte-Honorine-la-Guillaume. R.	90	II	146
Renevier, E.: Envahissement graduel de la mer éocénique aux Diablerets. R.	93	I	527
— Belemnites aptiennes. R.	94	I	384
Retgers, J. W.: Die Bestimmung des specifischen Gewichts von in Wasser löslichen Salzen. I. R.	90	I	202
II. R.	90	I	205
III. Die Darstellung neuer schwerer Flüssigkeiten. R.	94	II	3
— Das specifische Gewicht isomorpher Mischungen. R. .	90	I	203
— *Ueber die Bildung des Thenardits und Glaserits. B.* .	*91*	*I*	*276*
— *Ueber den Isomorphismus in der Dolomitreihe. (Mit Taf. III.) A.*	*91*	*I*	*132*
— *Der Isomorphismus der Wolframate und Molybdate mit den Sulfaten, Seleniaten und Chromaten. B.* . . .	*92*	*I*	*56*
— Beiträge zur Kenntniss des Isomorphismus. I—IV. R.	92	II	6
V. R.	94	I	249
VI—VIII. R. 1894	II	396	94 II 397
— Contribution à l'étude de l'isomorphisme. R.	92	II	6
— *Ueber krystallinische Schiefer, insbesondere Glaukophanschiefer, und Eruptivgesteine im südlichen Borneo. B.*	*93*	*I*	*39*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Retgers, J. W.: Thalliumsilbernitrat als schwere Schmelze zu Mineraltrennungen. B.	*1893*	*I*	*90*
— Mikroskopisch onderzoek eener verzameling gesteenten uit de afdeeling Martapoera, zuideren ooster-afdeeling van Borneo. R.	93	I	73
— *Der Phosphor als stark lichtbrechendes Medium zu petrographischen Zwecken. B.*	*93*	*II*	*130*
— Die Sublimationsproducte des Arsens. R.	94	I	251
Retgers, J. W. und R. Brauns: Zur Isomorphiefrage in der Dolomitreihe. B.	*92*	*I*	*210*
Retowski, O.: Die Aptychen sind echte Ammonitendeckel. (Mit 1 Holzschnitt.) B.	*91*	*II*	*220*
Reusch, Hans: Jordskjälv i Norge 1887. R.	90	I	75
— Bömmelöen og Karmöen med omgivelser. R.	90	I	76
— Geologisk kart over de skandinaviske lande og Finland. R.	90	II	266
— Fjeld- og jordarter i de skandinaviske lande og Finland. R.	90	II	266
— En dag ved Areskutan. R.	92	I	340
— Skuringsmaerker og moraenegrus eftervist i Finmarken på en periode meget aeldre en „Istiden“. R.	92	I	341
— Geologiske iagttagelser fra Trondhjems stift, gjorte under en reise for Norges geologiske undersoegelse 1889. R.	93	I	96
— Bemärkninger om fjeldbygningen paa sydsiden af Lake Superior i Green Mountains, Nord-Amerika. R.	93	I	333
— Det nordlige Norges geologi. R.	93	II	109
— Iagttagelser fra en reise i Finmarken. R.	93	II	110
— Nogle bemerkninger om Tromsö amts geologi. R.	93	II	110
— Optegnelser fra Balsfjorden. R.	93	II	110
— Nogle bemerkninger om Nordlands amts geologi. R.	93	II	110
— Almenfattelig forklaring af kartet og af en del i det foregaaende anvendte geologiska udtryk. R.	93	II	111
Révil, J., siehe Kilian, W.			
Reyer, Eduard: Eruptiv- und Gebirgstypen. R.	90	II	236
— Ursachen der Deformationen und der Gebirgsbildung. R.	93	I	49
— Geologische und geographische Experimente. I. Heft: Deformation und Gebirgsbildung. II. Heft: Vulcanische und Massenerupt ionen. R.	93	II	499
Reynolds, S.: Certain Fossils from the lower Palaeozoic Rocks of Yorkshire. R.	94	II	352
Reyt, L., siehe Fallot, E.			
Rheineck, H.: Ueber die chemische Zusammensetzung der Turmaline. R.	90	II	203
Riaz, A. de: Note sur le gisement argovien de Trept. R.	93	I	350
Ricciardi, Leonardo: Genesi e composizione chimica dei terreni vulcanici italiani. R.	90	I	418
— Sulle rocce vulcaniche di Rossena nell' Emilia. R.	92	I	286
— Ricerche di chimica vulcanologica. Confronto tra le rocce degli Euganei, del Monte Amiata e della Pantelleria. R.	92	I	287
— Sull' azione dell' acqua del mare nei Vulcani. R.	92	II	48
— Ricerche sulle sabbie delle coste adriatiche e sulle cause dell' interrimento del porto di Bari. R.	93	II	49
— La recente eruzione dello Stromboli in relazione alla frattura Capo Passero-Vulture e sulla influenza lunisolare nelle eruzioni. R.	94	I	280
Riccio, L.: Nuovi documenti sull' incendio vesuviano dell' anno 1631 e bibliografia di quella eruzione. R.	92	II	44

	Jahrg.	Bd.	Seite
Riccio, A.: Tremblements de terre, soulèvement et éruption sous-marine à Pantelleria. R.	1893	I	55
— Eruption de l'Etna de 1892. R.	93	I	491
— L'Eruzione dell' Etna. R.	93	I	491
— Fumo di Vulcano veduto dall' Osservatorio di Palermo durante l'eruzione del 1889 ed applicazione della termodinamica alle eruzioni vulcaniche. R.	93	I	493
— Terremoti, sollevamento ed eruzione sottomarina a Pantelleria nella seconda metà dell' ottobre 1891. R.	93	II	48
Riccò e Mercalli: Sopra il periodo eruttivo dello Stromboli cominciato il 24 giugno 1891. R.	93	II	493
Riche, Attale: Note sur le système oolitique inférieur du Jura méridional. R.	91	II	323
Riche Preller, C. S. du: On the Origin of the Engadine Lakes. R.	94	II	244
Richter: Beobachtungen über das Ausströmen von Kohlenwasserstoffgas und Kohlensäure auf Zeche Shamrock bei Herne und Vergleich des Ergebnisses derselben mit der Falb'schen Schlagwettertheorie. R.	91	II	291
Richter, E.: Geschichte der Schwankungen der Alpengletscher. R.	93	I	374
Richthofen, F. Frh. v.: Geologie. In: G. Neumayr, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen. R.	90	I	44
Rickard, T. A.: The Mount Morgan Mine, Queensland. R.	93	II	350
— The Bendigo Gold-Field. R.	93	II	351
Ricketts, C.: On some Physical Changes in the Earths Crust. R.	90	II	388
Ridley, H. N.: The Raised Reefs of Fernando de Noronha. R.	94	I	69
— siehe Reid, Clement.			
Riecke, E.: Ueber die Pyroelektricität des Turmalins. R.	92	I	213
Riggs, R. B.: On two new meteoric Irons and an Iron of doubtful Nature. R.	90	I	41
— The Analysis and Composition of Tourmaline. R.	90	II	190
— The so-called Harlem Indicolite. R.	91	I	233
Ringueburg: Some new Species of Fossils from the Niagara Shales of Western New York. R.	92	I	154
Rink, H.: Einige Bemerkungen über das Inlandeis Grönlands und die Entstehung der Eisberge. R.	94	I	169
Rinne, F.: Ueber optische Eigenschaften des Eisenglimmers. B.	*90*	*I*	*193*
— Ueber Limburgite aus der Umgebung des Habichtswaldes. R.	90	II	245
— *Ueber eine einfache Methode, den Charakter der Doppelbrechung im convergenten, polarisirten Lichte zu bestimmen. A.*	*91*	*II*	*21*
— *Ueber Olivin- und Plagioklasskelette. (Mit Taf. VI.) A.*	*91*	*II*	*272*
— Ueber Gismondin vom Hohenberg bei Bühne in Westfalen. R.	92	I	505
— *Ueber die Beziehungen zwischen den Mineralien der Heulandit- und Desmingruppe. (Mit Taf. I u. 3 Holzschnitten.) A.*	*92*	*I*	*12*
— Ueber morphotropische Beziehungen zwischen anorganischen Sauerstoff- und Schwefelverbindungen. R.	92	II	4
— Ueber die Umänderungen, welche die Zeolithe durch Erwärmen bei und nach dem Trübewerden erfahren. R.	92	II	237

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rinne, F.: Vergleich von Metallen mit ihren Oxyden, Sulfiden, Hydroxyden und Halogenverbindungen bezüglich der Krystallform. A.	*1894*	*I*	*1*
— *Beitrag zur Kenntniss des Skolezits. (Mit 15 Figuren.) A.*	*94*	*II*	*51*
— *Wachsthumsformen von Aluminiumkrystallen. (Mit Taf. VI.) B.*	*94*	*II*	*236*
— Der Basalt des Hohenberges bei Bühne in Westfalen. R.	94	II	55
— Ueber norddeutsche Basalte aus dem Gebiete der Weser und den angrenzenden Gebieten der Werra und Fulda. R.	94	II	55
Ristori, G.: Ancora sui depositi quaternari del Casentino. R.	91	II	142
— Le scimie fossili italiane. R.	91	II	149
— Sopra i resti di un coccodrillo, scoperti nelle ligniti mioceniche di Montebamboli. R.	91	II	156
— Un nuovo crostaceo fossile del Giappone. R.	91	II	171
— Contributo alle Fauna carcinologica di pliocene italiana. R.	91	II	458
— I crostacei fossili di Monte Mario. R.	91	II	458
— Il bacino pliocenico del Mugello. R.	92	II	117
— Ornitoliti di Montebamboli. R.	92	II	148
— I cheloniani fossili di Montebamboli e Casteani, Maremma Toscana. R.	92	II	148
— I cheloniani delle ligniti del Casino, Siena. R.	92	II	149
— Nota di carcinologia pliocenica. R.	93	I	178
— Resti di crostacei nel pliocene dell' Isola di Pianosa. R.	93	I	178
— Risposta alle osservazioni fatte dal prof. Gaudry sul genere, a cui furono da me riferiti gli avanzi fossili della Scimmia di Valdarno. R.	93	I	386
— Due parole di risposta ad alcune osservazione fatte dal dott. Achille Tellini al mio lavoro „I crostacei fossili di Monte Mario". R.	93	I	400
Rittener, T.: Notice sur un affleurement d'aquitanien dans le Jura Vaudois. R.	92	II	438
Ritter, E., siehe Duparc, L.			
Ritter, R.: Ueber die Reflexion des Lichtes an parallel zur optischen Axe geschliffenem Quarz. R.	91	I	199
Riva, Carlo: Appunti sopra alcune arenarie dell' Appennino. R.	93	II	56
— Sopra alcune rocce della Val Sabbia. R.	93	II	494
Roberts-Austen, W. C. and A. W. Rücker: On the Specific Heat of Basalt. R.	92	II	43
Roberts, T.: On two Abnormal Cretaceous Echinids. R.	94	I	392
Robertson, James D.: On a New Variety of Zinc Sulphide from Cherokkee County, Kansas. R.	94	I	15
Rodler, A.: Ueber Urmiatherium Polaki, einen neuen Sivatheriden aus dem Knochenfelde von Maragha. R.	90	II	432
Rodler, A. und K. A. Weithofer: Die Wiederkäuer der Fauna von Maragha. R.	93	II	398
— siehe Weithofer, K. A.			
Röder, Ch.: Notes on the Permians and superficial Beds at Fallowfield. R.	93	II	523
Roemer, Ferdinand: Ueber eine durch die Häufigkeit Hippuriten-artiger Chamiden ausgezeichnete Fauna der oberturonen Kreide von Texas. R.	90	I	359
— Ueber Blattabdrücke in senonen Thonschichten bei Bunzlau in Niederschlesien. R.	92	II	376
— Smilax aus dem diluvialen Kalktuff von Cannstatt bei Stuttgart. R.	92	II	377

	Jahrg.	Bd.	Seite
Roemer, Ferdinand: Plagiotheutis, eine neue Gattung dibranchiater Cephalopoden aus dem russischen Jura. R.	1893	I	400
Röntgen, W. C.: Einige Vorlesungsversuche. R. . . .	91	II	223
— Elektrische Eigenschaften des Quarzes. R.	92	I	214
Röntgen, W. C. und J. Schneider: Ueber die Compressibilität von verdünnten Salzlösungen und die des festen Chlornatriums. R.	91	I	1
— — Ueber die Compressibilität des Wassers. R. . . .	91	I	1
Röse, C.: Ueber die Entstehung und Formveränderungen der menschlichen Molaren. R.	93	I	383
— Beiträge zur Zahnentwickelung der Edentaten. R. . .	94	I	181
— Ueber die schmelzlosen Zahnrudimente des Menschen. R.	94	II	148
— Ueber die erste Anlage der Zahnleiste beim Menschen. R.	94	II	149
— Ueber den Zahnbau und Zahnwechsel von Elephas indicus. R.	94	II	462
— Ueber die Zahnentwickelung von Phascolomys Wombat. R.	94	II	464
— Ueber die Zahnentwickelung von Chamaeleon. R. . .	94	II	465
— Ueber rudimentäre Zahnanlagen der Gattung Manis. R.	93	II	187
— Ueber die Zahnentwickelung der Krokodile. R. . . .	93	II	187
— Ueber die Zahnleiste und die Eischwiele der Sauropsiden. R.	93	II	187
— Ueber die Zahnentwickelung der Beuteltiere. R. . .	93	II	187
— Zur Phylogenie des Säugethiergebisses. R.	93	II	187
Roger, O.: Verzeichniss der bisher bekannten fossilen Säugethiere. Theil I. R.	94	II	342
Rohon, J. Victor: Ueber fossile Fische vom Oberen Jenissei. R.	91	I	333
— Ueber Pterichthys. R.	93	I	398
— Die Jura-Fische von Ust-Balei in Ost-Sibirien. R. . .	93	II	194
— Holoptychius-Schuppen in Russland. R.	93	II	195
— Die obersilurischen Fische von Oesel. I. Theil. Thyestidae und Trematapidae. R.	94	I	381
Rolland, G.: Sur les atterrissements anciens du Sahara. R.	90	II	99
— Sur l'histoire géologique du Sahara. R.	92	I	98
— Aperçu sur l'histoire géologique du Sahara depuis les temps primaires jusqu'à l'époque actuelle. R. . . .	92	II	279
— Sur le régime des eaux artésiennes dans le haut Sahara de la province Alger, entre Laghout et El Goléa. R.	93	I	66
— Sur le régime des eaux artésiennes de la région d'El Goléa. R.	93	I	66
Rollier, L.: Etude stratigraphique sur les terrains tertiaires du Jura Bernois. R.	93	I	365
— Die Oxfordstufe von Brienz, verglichen mit derjenigen des Jura. R.	93	II	528
Romanowsky, G.: Materialien zur Geologie des Turkestans. III. Lieferung. Palaeontologischer Charakter der Sedimente im westlichen Tjan-Chan und in der Turan-Niederung. R.	94	I	171
Romberg, Julius: Petrographische Untersuchungen an argentinischen Graniten, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Structur und der Entstehung derselben. (Mit Taf. VII—XVIII.) A.	*BB.*	*VIII*	*275*
Romieux, A.: Sur le mode initial de déformation de la croûte terrestre ellipsoidale. R.	90	I	251
— Sur les directions des lithoclases aux environs de Fontainebleau. R.	90	II	113
— Relations entre la déformation actuelle de la croûte			

	Jahrg.	Bd.	Seite
terrestre et les densités moyennes des terres et des mers. R. . . . . 1891 II 260	1891	II	421
Rominger, C.: Description of Primordial Fossils from Mount Stephens, N. W. territory of Canada. R.	90	II	289
Rosenberg-Lipinsky von: Die Verbreitung der Braunkohlenformation im nördlichen Theile der Provinz Schlesien. R.	94	II	324
— Die Verbreitung der Braunkohlenformation in der Provinz Posen. R.	94	II	324
Rosenbusch, H.: Hülfstabellen zur mikroskopischen Mineralbestimmung in Gesteinen. R.	90	I	237
— Ueber die chemischen Beziehungen der Eruptivgesteine. R.	91	II	57
— Berichtigung. R.	91	II	57
— Zur Auffassung der chemischen Natur des Grundgebirges. R.	92	I	275
— Ueber Structur und Classification der Eruptivgesteine. R.	93	I	70
— Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien. Bd. I. Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. R.	93	I	268
— siehe Hunter, M.			
Rosiwal, A.: Zur Kenntniss der krystallinischen Gesteine des centralen Balkan. III. Theil von: Fr. Toula, Geologische Untersuchungen im centralen Balkan. R. .	91	II	84
— Beiträge zur geologischen Kenntniss des östlichen Afrika. II. Ueber Gesteine aus dem Gebiete zwischen Usambara und dem Stefanie-See. Nebst einem Anhange: Ueber Gesteine aus Schoa und Assab. R.	92	II	425
— Aus dem krystallinischen Gebiete zwischen Schwarzawa und Zwittawa. R.	94	II	91
— siehe Höhnel, R. von.			
Rossignoli, Dino: Studio cristallografico del Quarzo di Val Malenco. R.	93	II	18
Roth, Friedrich: Die Tuffe der Umgegend von Giessen. R.	92	II	418
Roth, J.: Die Eintheilung und die chemische Beschaffenheit der Eruptivgesteine. R.	92	I	61
Roth, L. von: Pflanzen des unteren Rothliegenden von Csiklovabánia im Comitate Krasso-Szörény. R.	91	I	166
Roth, Santiago: Beobachtungen über Entstehung und Alter der Pampas-Formation in Argentinien. R.	91	II	134
Roth von Telegd, L.: Die Gegend südöstlich und zum Theil östlich von Steierdorf. R.	90	I	303
— Die unmittelbare Umgebung von Steierdorf-Anina. R. .	93	I	122
Rothpletz, A.: Ueber Gerölle mit Eindrücken. B. . .	*90*	*I*	*92*
— *Ueber die Diadematiden-Stacheln und Haploporella fasciculata aus dem Oligocän von Astrupp. (Mit 7 Holzschnitten.) B.*	*91*	*I*	*285*
— Das Atlasgebirge Algeriens. R.	91	II	297
— Das Karwendelgebirge. R.	92	I	97
— *Stratigraphisches von der Sinaihalbinsel. B.*	*93*	*I*	*102*
— Fossile Kalkalgen aus den Familien der Codiaceen und Corallineen. R.	93	I	577
— Die Perm-, Trias- und Juraformation auf Timor und Rotti im Indischen Archipel. R. . . . 1894 I 144	94	II	102
— Ueber Sphaerocodium Bornemanni, eine neue fossile Kalkalge aus den Raibler Schichten der Ostalpen. R. .	94	I	231

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rothpletz, A. und V. Simonelli: Die marinen Ablagerungen von Gran Canaria. R.	1892	II	315
Roussel, J.: Réponse à M. Viguier et de Lacvivier. R.	90	II	413
— Sur les calcaires cristallins des Pyrénées. R.	91	II	284
— Nouvelles observations sur les terrains primaires et les terrains secondaires des Pyrénées occidentales. R.	92	I	346
— Sur la permanence de l'effort orogénique dans les Pyrénées pendant les périodes géologiques. R.	92	II	276
— Observations sur les terrains secondaires et primaires des Corbières. R.	93	I	343
— Note sur les terrains primaires de Mérens. R.	93	I	510
— Liste des principales espèces d'Echinides des deux couches à Echinanthus de l'éocène inférieur des Pyrénées. R.	93	II	557
Roussel et de Grossouvre: Contributions à la stratigraphie des Pyrénées. R.	94	I	316
— Sur la présence de l'Actinocamax quadratus dans la craie pyrénéenne. R.	94	I	490
Rouville, de: Nouvelles observations sur les terrains tertiaires supérieurs de la région de Pézenas. R.	90	I	123
— Note complémentaire sur le prolongement du massif paléozoique de Cabrières (Hérault). R.	90	I	285
— Sur un horizon à Trinucleus du Glauzy, Hérault. R.	90	I	285
— Sur le permien de l'Hérault. R.	91	II	317
— Note sur la présence du Pleurodictyum problematicum dans le dévonien de Cabrières et sur un nouvel horizon de Graptolites dans le silurien de Cabrières. R.	92	I	346
Rouville, de et Delage: Sur la porphyrite de Cavenac. R.	90	II	80
— Sur les porphyrites de Gabian, Hérault. R. 1890 II 81	91	II	286
Rowe, A. W.: On the Rocks of Essex Drift. R.	90	II	423
Rowe, J.: Der Zinnbergbau in Tasmanien. R.	91	I	100
Rower, Ch.: Notes on the Upper Coal Measures at Slade Lane, Burnaye. R.	93	II	521
Rucktäschel, Th.: Ungleichseitigkeit der Thäler und Wirkung der vorherrschend westlichen Regenwinde auf die Thalformen. R.	90	II	240
Rudler, F. W., siehe Bauermann, H.			
Rudolph, E., siehe Hergesell, H.			
Rudolph, F.: Beitrag zur Petrographie der Anden von Peru und Bolivien. R.	90	I	91
Rücker, A. W., siehe Roberts-Austen, W. C.			
Rüdiger, H.: Ueber die Silur-Cephalopoden aus den mecklenburgischen Diluvialgeschieben. R.	92	I	429
Rüst, D.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen der Trias- und der palaeozoischen Schichten. R.	93	I	567
— Contributions to Canadian Mikro-Paleontology. Part IV. With Introduction by J. B. Tyrell. R.	94	I	395
Rütimeyer, L.: Uebersicht der eocänen Fauna von Egerkingen nebst einer Erwiderung an Prof. E. D. Kope. R.	91	II	142
— Zu der Frage über das Torfschwein und das Torfrind. R.	92	I	409
— Die eocäne Säugethier-Welt von Egerkingen. Gesammt-Darstellung und dritter Nachtrag zu den „Eocänen Säugethieren aus dem Gebiet des Schweizerischen Jura 1862". R.	93	I	147
Rupprecht, G.: Beiträge zur chemischen Kenntniss einiger Gesteine und Mineralien Corsikas. R.	91	II	289

	Jahrg.	Bd.	Seite
Russell, Israel Cook: Geological History of Lake Lahontan, a Quaternary Lake of Northwestern Nevada. R. .	1890	I	280
— On the Subaërial Decay of Rocks and Origin of the Red Color of Certain Formations. R.	91	II	432
— The Quaternary History of Mono Valley, California. R. 1892 I 384	93	I	137
Rutley, Frank: Rock-forming Minerals. R.	90	I	235
— On Fulgurites from Monte Viso. R.	90	II	89
— On Perlitic Felsites, probably of Archaean Age from the Flanks of the Herfordshire Beaëon; and on the possible Origin of some Epidorites. R.	90	II	90
— On Tachylyte from Victoria Park, Whiteinch, Glasgow. R.	91	I	95
— On a Specimen of Banded Serpentine from the Lizard, Cornwall. R.	91	II	288
— On Composite Spherulites in Obsidian. R.	91	II	434
— On some Melaphyres and Felsites of Caradoc. R. . .	92	II	265
— On a Spherulitic and Perlitic Obsidian from Pilas. Jalisco, Mexico. R.	92	II	428
— Notes on Crystallites. R.	93	II	459
— Bemerkung über Manganitkrystalle von Harzgerode. R.	94	I	19
Rutot, A.: Sur l'âge du grès de Fayat. R.	90	II	112
— Note sur quelques coupes de l'éocène au Sud de la vallée de la Sambre. R.	90	II	112
— Constitution géologique des collines d'Hekelghem et d'Esschene entre Assche et Alost. R.	91	I	307
— Sur deux coupes de Bernissartien (Wealdien) au N. E. de Mons. R.	91	II	441
— Sur l'extension des sédiments diéstiens aux sud de Bruxelles. R.	92	I	368
Rutot, A. und E. van den Broeck: Observations nouvelles sur le crétacé supérieur de la Hesbaye. R.	90	I	310
Rutot, A. et E. de Munck: Spongiaires de l'étage landénien. R.	92	II	307
Rzehak, A.: Geologische Ergebnisse einiger in Mähren durchgeführten Brunnenbohrungen. R.	90	I	452
— Die Foraminiferenfauna des grünen Oligocänthones von Nikoltschitz in Mähren. R.	90	II	165
— Die Foraminiferenfauna des blauen Oligocänthones von Nikoltschitz in Mähren. R.	90	II	166
— Die Foraminiferen des kieseligen Kalkes von Nieder-Hollabrunn und des Melettamergels der Umgebung von Bruderndorf in Nieder-Oesterreich.	90	II	344
— Ein neues Vorkommen von Aturienmergel in Mähren. R.	92	I	140
— Ueber ein neues Vorkommen eines diatomeenreichen Thonmergels in Mähren. R.	92	I	140
— Die Conchylienfauna des diluvialen Kalktuffes von Tutschin in Mähren. R.	92	I	434
— Die Foraminiferenfauna der alttertiären Ablagerungen von Bruderndorf in Niederösterreich, mit Berücksichtigung des angeblichen Kreidevorkommens von Leitzersdorf. R.	93	I	201

S.

Sabersky, P.: Mineralogisch-petrographische Untersuchung argentinischer Pegmatite mit besonderer Berücksich-

	Jahrg.	Bd.	Seite
tigung der Structur der in ihnen auftretenden Mikrokline. (Mit Taf. VII.) A.	*BB*	*VII*	*359*
Sacco, Federico: Le ligurien. R.	1890	I	312
— La conca terziaria di Varzi-S. Sebastiano. R.	90	II	123
— I Colli Braidesi. R.	90	II	124
— Un coin intéressant du tertiaire d'Italie. R.	90	II	310
— Il bacino terziario del Piemonte. R.	90	II	310
— Il sero terziario di Moncalvo. R.	90	II	420
— Les conglomérats du Flysch. R.	91	I	124
— Sur la position stratigraphique de charbons fossiles du Piémont. R.	92	I	141
— Studio geologico delle colline di Cherasco e della Morra in Piemonte. R.	92	I	142
— Il pliocene entroalpino di Valsesia. R.	92	I	143
— I colli Monregalesi. R.	92	I	552
— Catalogo palaeontologico del bacino terziario del Piemonte. R.	92	I	558
— L'Appennino settentrionale (Parte centrale). R.	93	I	109
— Il bacino quaternario del Piemonte. R.	93	I	532
— Geologia applicata del bacino terziario e quaternario del Piemonte. R.	93	II	170
— L'âge des formations ophiolitiques recentes. R.	94	I	363
— I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. R.	94	II	173
— Le genre Bathysiphon a l'état fossile. R.	94	II	366
Sachse, R.: Der Löss in landwirthschaftlicher Beziehung. R.	93	II	580
Sachse, R. und A. Becker: Die Walkerde von Rosswein in Sachsen. R.	93	II	502
— — Ueber einige Lösse des Königreichs Sachsen. R.	93	II	502
Safford, J. M. and A. W. Vogdes: Fossil Crustacea from the Lower Silurian of Tennessee. R.	90	II	440
Saladin, Ed.: Note sur les mines de cuivre du Boléo. R.	93	II	74
Salisbury, Rollin D.: A Further Note on the Age of the Orange Sands. R.	92	II	121
— Terminal Moraines in Germany. R.	92	II	316
— Certain extra-morainic Drift Phenomena of New Jersey. R.	92	II	321
— On the northward and eastward Extension of the pre-pleistocene Gravels of the Mississippi Basin. R.	93	I	373
— District Glacial Epochs and the Criteria for the Recognition. R.	93	II	280
— siehe Chamberlin, T. C.			
Salisbury und Wahnschaffe: Neue Beobachtungen über die Quatärbildungen der Magdeburger Börde. R.	91	II	446
Salomon, Wilhelm: Ein neuer Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten. (Mit 2 Holzschnitten.) B.	*91*	*II*	*214*
— Geologische und petrographische Studien am Monte Aviolo im italienischen Theil der Adamellogruppe. R.	92	I	69
— Neue Beobachtungen aus den Gebieten der Cima d'Asta und des Monte Adamello. R.	93	II	51
— Ueber den geologischen Bau und die Fossilien der Marmolata. R.	94	II	106
— *Ueber einige Einschlüsse metamorpher Gesteine im Tonalit. A.*	*BB*	*VII*	*471*
Sambon, L.: Notes on the Eolian Islands and Pumice Stone. R.	92	II	49

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sandberger, F. von: Arsenikkies u. a. Mineralien von Goldkronach, Nickel-Arsenikkies von Neusorg bei Markt Redwitz, Kupferglanz mit Arsengehalt von Winnweiler (Pfalz), Cordierit in einem Einschlusse des Basaltes von Fulda, Analyse des Phonoliths von Heldburg bei Coburg. B.	*1890*	*I*	*99*
— *Synonyme einiger devonischen Versteinerungen. B.*	*90*	*I*	*183*
— *Ein merkwürdiges Geröll aus dem pleistocänen Sande von Mosbach bei Wiesbaden. B.*	*90*	*I*	*273*
— Ueber die Entwickelung der unteren Abtheilung des devonischen Systems in Nassau, verglichen mit jener in anderen Ländern. R.	90	I	292
— Ueber Steinkohlenformation und Rothliegendes im Schwarzwald und deren Floren. R.	1891 I 166	93	II 131
— *Bemerkungen über einige Mineralien von Chanarcillo in Chile. B.*	*91*	*I*	*199*
— *Bemerkungen über den Falkenhaynit von Joachimsthal und sein Verhältniss zu dem Annivit. B.*	*91*	*I*	*274*
— *Ueber Ophit als Umwandlungsproduct von Grammatit und dessen Auftreten in den sog. Eozon-Gesteinen. B.*	*91*	*II*	*90*
— *Bemerkungen über Ditichia, eine neue Nuculaceen-Gattung aus dem Unterdevon. B.*	*91*	*II*	*104*
— *Bemerkungen über pflanzenführende Schichten des obersten Mitteldevons in Nassau und Westphalen. B.*	*91*	*II*	*331*
— Bemerkungen über einige Arten der Gattung Bronteus. R.	92	I	422
— *Hyalophan auf Klüften des Buntsandsteins am Steinberg bei Waldau unweit Furtwangen. B.*	*92*	*I*	*67*
— *Bemerkungen über das Vorkommen des Grammatits in dem Specksteinlager von Göpfersgrün bei Wunsiedel. B.*	*92*	*I*	*68*
— *Die Flora der tiefsten Schichten des Infralias (Rhät) von Burgpreppach bei Hassfurt (Unterfranken). B.*	*92*	*I*	*141*
— *Ein Nocerin-ähnliches Mineral von Arendal in Norwegen. B.*	*92*	*I*	*221*
— *Bemerkungen über einige Mineralien aus dem Fichtelgebirge. A.*	*92*	*II*	*37*
— *Ein neuer Fund in den Specksteingruben von Göpfersgrün bei Wunsiedel. B.*	*92*	*II*	*160*
— *Bemerkungen über einige Tertiärversteinerungen. B.*	*92*	*II*	*160*
— *Widdringtonia keuperina* Heer *im untersten Keupergypse bei Windsheim (Mittelfranken). B.*	*93*	*I*	*50*
— *Die als Erlan bezeichneten Gesteine des Fichtelgebirges. B.*	*93*	*I*	*101*
— Uebersicht der Mineralien des Regierungsbezirks Unterfranken und Aschaffenburg. R.	93	I	254
— *Ueber einige Conchylien aus pleistocänen Kalktuffen Schwedens. B.*	*93*	*II*	*129*
— Nachträgliche Bemerkungen zu meiner Abhandlung: Ueber Steinkohlenformation und Rothliegendes im Schwarzwald. R.	93	II	132
— *Zinckenit von Cinque valle im Val Sugana (Südtyrol). B.*	*94*	*I*	*196*
— *Zanclodon im obersten Keuper Unterfrankens. B.*	*94*	*I*	*203*
— *Sphaerium pseudocorneum* Reuss *sp. im vulcanischen Tuff der Eifel. B.*	*94*	*II*	*90*
— *Ueber die Gerölle des Buntsandsteins, besonders jenes des nördlichen Schwarzwaldes und deren Herkunft. B.*	*94*	*II*	*96*
— *Ueber Dolerit von Djedda bei Mekka*	*94*	*II*	*103*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sandler, Chr.: Strandlinien und Terrassen. R. . . .	1893	I	61
— Zur Strandlinien- und Terrassenliteratur. R.	93	I	92
Sansoni, Francesco: Contribuzioni alla conoscenza delle forme cristalline della Calcite. — Calcite di alcune località di Svezia e Norvegia. R.	91	I	21
— Calcite di alcune località del Baden. R.	92	II	20
Saporta, G. de: Sur les dicotylées prototypiques du système infracrétacé du Portugal. R.	90	I	179
— Sur le rhizome fossilisé du Nymphaea. R.	91	I	444
— Origine paléontologique des arbres cultivés ou utilisés par l'homme. R.	91	II	375
— Sur quelques types de fougères tertiaires nouvellement observées. R.	92	I	467
— Ephédrées; spirangiées et types proangiospermiques. R.	92	I	468
Sapper, Carl: Ueber Erderschütterungen in der Alta Verapaz. R.	91	II	99
— Bemerkungen über die räumliche Vertheilung und morphologischen Eigenthümlichkeiten der Vulcane Guatemalas. R.	94	II	38
Sarasin, Ch.: Die Conglomerate und Breccien des Flysch in der Schweiz. A.	*BB VIII*		*180*
Sardeson, F. W.: Palaeontologic Papers. R.	93	I	116
Sartorius, F.: Ueber hydrostatische Waagen und einige Hülfsmittel zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten und festen Körpern. (Mit 3 Holzschnitten.) B.	*94*	*II*	*237*
Sauer, A.: Section Meissen. Blatt 48. R.	91	I	79
— Ueber die äolische Entstehung des Löss am Rande der norddeutschen Tiefebene. R.	91	I	130
— Der Granitit von Durbach im nördlichen Schwarzwalde und seine Grenzfacies von Glimmersyenit (Durbachit). R.	92	I	281
Sauer, A. und R. Beck: Section Tharandt. Blatt 87. R.	94	II	280
Sauer, A. und N. V. Ussing: Ueber einfachen Mikroklin aus dem Pegmatit von Gasern unterhalb Meissen. R.	92	I	224
Sauvage, H. E.: Sur les reptiles trouvés dans le Portlandien supérieur de Boulogne-sur-Mer. R.	91	II	154
— Note sur les bryozoaires jurassiques de Boulogne. R.	91	II	369
— Note sur les ganoïdes du terrain houiller de Commentry. R.	92	I	419
— Note sur quelques poissons du lias supérieur de l'Yonne. R.	94	II	348
— Note sur les crustacés des terrains jurassiques supérieurs du Boulonnais. R.	94	II	350
— Description de deux espèces nouvelles de poissons du terrain kimmeridgien du Cap de la Hève. R. . . .	94	II	465
Sawinsky, S.: Mikroskopische Untersuchung des Eisens von terrestrischem Ursprung aus den Goldwäschen von Beresowsk. R.	94	II	217
Saxe-Coburg-Gotha, Dom Petro Augusto de: Fer oligiste cristallisé de Bom Jesus dos Meiras, province de Bahia, Brésil. R.	90	II	188
— Sur l'albite de Morro velho. R.	90	II	188
— Sur la millerite de Morro-Velho, province de Minas-Geraës (Brésil). R.	92	I	30
Sayn, G.: Note sur le barrêmien de Colonne. R. . . .	91	II	441
— Note sur quelques ammonites nouvelles ou peu connues du néocomien inférieur. R.	92	I	424

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sayn, G.: Description des ammonites du barrêmien du Djebel-Ouach (près Constantine). R.	1893	II	197
— Sur le néocomien de la Chaîne de Raye et des environs de Combovin (Drôme). R.	93	II	530
Scacchi, A.: Catalogo dei minerali e delle rocce vesuviane per servire alla storia del Vesuvio ed al commercio dei suoi prodotti. R.	91	II	16
— I proietti agglutinanti dell' incendio vesuviano del 1631. R.	92	II	255
— Appendice alla prima memoria sulla lava vesuviana del 1631. R.	92	II	256
— Sopra un frammento di antica roccia vulcanica inviluppato nella lava vesuviana del 1872. R.	92	II	256
— Le eruzioni polverose e filamentose dei vulcani. R.	92	II	257
— Il vulcanetto di Puccianello. R.	93	I	280
— La regione vulcanica fluorifera della Campania. R.	93	I	281
Scacchi, Eugenio: Ueber die Krystallform des Neochrysolith. R.	90	II	57
— Studii sulla mineralogia vesuviana. R.	90	II	207
— Sulla Hauerite delle Solfare di Raddusa in Sicilia. R.	91	II	235
— Dichiarazione sulla scoverta della Hauerite nelle Solfare di Raddusa in Sicilia. R.	91	II	235
— Ancora della Hauerite di Raddusa in Sicilia. R.	91	II	235
Scarabelli, G.: Necessità di accertare se le impronte dette fisiche e fisiologiche provengono dalle superficie superiori o dalle inferiori degli strati. Osservazioni sopra il Nemertilites Strozzi Meng. R.	94	II	484
Schaafhausen: Ueber ein Rhinoceros-Horn von Glogau. R.	90	I	461
— Bruchstücke des Schädels vom Riesenhirsch. R.	91	II	340
Schacko, G.: Ueber die in den Kreidebildungen von Revahl und Klein-Horst beobachteten Foraminiferen und Ostracoden. R.	91	I	165
— Foraminiferen und Ostracoden aus der Kreide von Moltzow. R.	92	II	466
Schäfer, R.: On Phillipsastraea d'Orb., with especial Reference to Phillipsastraea radiata S. Woodw. sp. and Phillipsastraea tuberosa M'Coy sp. R.	90	I	474
Schäff, E.: Ueber den Schädel von Ursus arctos L. R.	91	I	325
— Ueber Insectenreste aus dem Torflager von Klinge. R.	94	II	468
— Eine diluviale Periplaneta. R.	94	II	468
Schafarzik, Fr.: Steinsalzkrystalle von Vizakna. R.	91	I	240
— Ueber einige seltenere Gesteins-Einschlüsse in ungarischen Trachyten. R.	91	II	73
— Daten zur Geologie des Bakony. R.	92	II	274
— Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Orsova, Jesselnitza und Ogradina. R.	93	II	363
Schalch, Ferdinand: Section Dippoldiswalde-Frauenstein. Blatt 100. R.	91	I	67
— Section Glashütte. Blatt 101.	91	I	69
— Section Oschatz-Wellerswalde. Blatt 15. R.	91	II	265
— Section Rosenthal-Hoher Schneeberg. Blatt 103. R.	92	I	95
— Die geologischen Verhältnisse der Bahnstrecke Weizen-Immendingen mit besonderer Berücksichtigung der zwischen Füetzen und Zollhaus entstandenen Braunjura-Aufschlüsse. R.	92	II	103
— Die Gliederung des oberen Buntsandsteins, Muschelkalkes und unteren Keupers nach den Aufnahmen auf Section Mosbach und Rappenau. R.	94	I	341

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schardt, H.: Etude géologique sur quelques dépôts quaternaires fossilifères du canton de Vaud. R.	1891	I	134
— Etudes géologiques sur l'extrémité méridionale de la première chaîne du Jura. R.	94	I	473
— Gneiss d'Antigorio. Observations au Mont-Catogne et au Mont-Chemin. R.	94	II	60
— siehe Favre, E.			
Scharizer, R.: Der Bertrandit von Pisek. R.	90	I	39
— Ueber die chemische Constitution und über die Farbe der Turmaline von Schüttenhofen. R.	90	II	195
— Zur Frage der Structurformeln der metasomatischen Zersetzungsproducte. R.	94	II	9
Schauf, W.: Ueber Meteorsteine. R.	92	I	269
— Ueber die Diabasschiefer (Hornblende-Sericitschiefer K. Koch's) von Birkenfeld bei Eppenhain und von Vockenhausen im rechtsrheinischen Taunus. R.	93	I	271
— Beobachtungen an der Steinheimer Anamesitdecke. R.	93	II	325
Schaufuss, L. W.: Preussens Bernstein-Käfer. Neue Formen aus der Helm'schen Sammlung im Danziger Provinzialmuseum. R.	92	I	424
— Beschreibung der bisher unbeschriebenen Pselaphiden aus dem baltischen Bernstein. R.	93	I	550
Scheerer, F.: Studien am Arsenkiese. R.	94	II	15
Scheibe, R.: Turmalin in Kupfererz aus Lüderitzland. R.	90	I	211
— Schwerspathzwillinge von der Grube Morgenroth-Alexe, nordöstlich Gehlberg, Thüringer Wald. R.	91	I	376
— Ueber Agalith oder Asbestine von Nordamerika. R.	91	I	376
— Krystalle von Magneteisen von Moriah Mine, New York, und Magnet Cove, Arkansas. R.	92	I	32
— Ueber Hauchecornit, ein Nickelwismuthsulfid von der Grube Friedrich (Bergrevier Hamm a. d. Sieg). R.	93	I	466
— Pflanzenreste und Thierfährten aus dem Rothliegenden von Tambach. R.	94	II	442
Schellwien, E.: Der lithauisch-kurische Jura und die ostpreussischen Geschiebe. (Mit Taf. III. IV.) A.	*94*	*II*	*207*
— Die Fauna des karnischen Fusulinenkalk. I. Geologische Einleitung und Brachiopoda. R.	94	II	144
Schenk, A.: Ueber Medullosa Cotta und Tubicaulis Cotta. R.	90	I	172
— Bemerkungen über einige Pflanzenreste aus den triassischen und liassischen Bildungen der Umgebung des Comersees. R.	90	II	167
— Ueber Glacialerscheinungen in Südafrika. R.	91	I	136
— Palaeophytologie. (Handbuch der Palaeontologie von K. A. Zittel. Abth. II.) R.	91	I	336
— Die fossilen Pflanzenreste. R.	91	I	348
— Fossile Hölzer aus Ostasien und Aegypten. R. 1891 I 351	93	II	429
— Ueber den Laterit und seine Entstehung. R.	91	II	306
— Das Auftreten von Kohlen in Süd-Afrika. R.	91	II	315
— Jurassische Hölzer von Green Harbour auf Spitzbergen. R.	91	II	384
— Fossile Hölzer. R.	92	I	603
Schertel, A.: Uranerze der Grube Himmelsfürst bei Freiberg. R.	91	II	292
Schiffmann, W.: Die geognostischen Verhältnisse und die Erzlagerstätten der Grube Diepenlinchen bei Stolberg (Rheinland). R.	90	I	259

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schillbach, H.: Mikroskopische Untersuchung des Schaumkalkes bei Jena. R.	1891	II	65
Schiötz, O. E.: Om merker efter istiden og om isskillet i den östlige del af Hamar Stift, samt om indlandsisens bevägelse. R.	92	I	556
— Noglę bemaerkninger om oejegneisen i sparagmit-kvartsfjeldet longs Riksgraensen. R.	92	I	340
— Sparagmit-kvarts-fjeldet langs Gränsen i Hamar Stift og i Herjedalen. R.	92	I	336
— Das Schmelzen des Binneneises. R.	94	II	46
Schlaepfer, Rodolphe: Recherches sur la composition des micas et des chlorites. R.	91	I	8
Schlechtendahl, D. v.: Physopoden aus dem Braunkohlengebirge von Rott am Siebengebirge. R.	91	II	356
— Mittheilungen über die in der mineralogischen Sammlung aufbewahrten Originale zu Germar's „Insecten im Bernstein eingeschlossen" mit Rücksicht auf Giebel's Fauna der Vorwelt. R.	91	II	356
— Ueber das Vorkommen fossiler „Rückenschwimmer" (Notonecten) im Braunkohlengebirge von Rott. R.	93	II	413
Schlosser, Max: Literaturbericht über Zoologie in Beziehung zur Anthropologie; mit Einschluss der fossilen und recenten Säugethiere			
für das Jahr 1886. R.	90	I	331
für das Jahr 1887 und 1888. R.	91	II	339
für das Jahr 1889. R.	93	I	147
für das Jahr 1890. R.	94	I	177
— Ueber die Deutung des Milchgebisses der Säugethiere. R.	1891	I	142
	93	II	539
— Ueber die Modificationen des Extremitätenskeletes bei den einzelnen Säugethierstämmen. R.	91	I	143
— Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des Europäischen Tertiärs. Theil III. R.	91	II	146
— Die Differenzirung des Säugethiergebisses. R.	92	I	155
— *Ueber die systematische Stellung der Gattungen Plesiadapis, Protoadapis, Pleuraspidotherium und Orthaspidotherium. B.*	*92*	*II*	*238*
— *Bemerkungen zu Rütimeyer's „Die eocäne Säugethierwelt von Egerkingen". B.*	*94*	*II*	*100*
Schlüter, Cl.: Anthozoen des rheinischen Mitteldevon. R.	90	II	155
— Die regulären Echiniden der norddeutschen Kreide. II. Cidaridae. Salenidae. R.	93	II	421
Schlumberger, C.: Note sur les foraminifères fossiles de la province d'Angola. R.	92	I	462
— Note préliminaire sur les foraminifères dragués par S. A. le Prince Albert de Monaco. R.	93	II	559
— Note sur la Ramulina Grimaldi. R.	93	II	559
Schluttig, Emil: Chemisch-mineralogische Untersuchungen von weniger bekannten Silicaten. R.	90	I	212
Schmalensée, v.: Om lagerföljden inom Dalarnes silurområden. R.	94	I	476
Schmalhausen, J.: Tertiäre Pflanzen der Insel Neusibirien mit einer Einleitung von Baron E. von Toll. R.	93	II	564
Schmidt, Ad.: Geologie des Münsterthals im Badischen Schwarzwald. 3. Theil: Erzgänge und Bergbau. R.	90	II	253

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schmidt, Adolf Friedrich Carl: Theoretische Verwerthung der Königsberger Bodentemperatur-Beobachtungen. R.	1894	II	37
Schmidt, Alexander: Mineralogische Mittheilungen. 1. Arsenopyrit aus Serbien. 2. Claudatitkrystalle von Szomolnock (Schmöllnitz). 3. Beaumontit von Schweden. R.	90	I	404
— Mineralogische Mittheilungen. 1. Zirkon, Almandin und Epidot von Australien. 2. Pyrit aus der Umgegend von Porkura, Hunyader Comitat, Ungarn. R.	93	I	252
— Daten zur genaueren Kenntniss einiger Mineralien der Pyroxengruppe. R.	93	II	472
— Ueber den Bournonit von Nagybánya. R.	94	I	252
— Die geologischen Verhältnisse von Czinkota. R.	94	II	453
Schmidt, August: Untersuchungen über zwei neuere Erdbeben, das schweizerische vom 7. Januar 1889 und das nordamerikanische vom 31. August 1886. R.	93	I	55
— Uebersicht und Besprechung der in Württemberg und Hohenzollern in der Zeit vom 1. März 1889 bis zum 1. März 1891 wahrgenommenen Erderschütterungen. R.	93	II	44
— Erdbeben-Commission. Jahresbericht für die Zeit vom 1. März 1891 bis 1. März 1892. R.	93	II	46
— Erdbebenberichte aus Württemberg und Hohenzollern für die Zeit vom 1. März 1892 bis 1. März 1893. R.	94	I	68
Schmidt, Carl: Beiträge zur Kenntniss der im Gebiete von Blatt XIV der geologischen Karte der Schweiz in 1 : 100 000 auftretenden Gesteine. R.	94	I	293
— Die Thermen zu Sanita. R.	91	I	99
Schmidt, C. und G. Steinmann: Geologische Mittheilungen aus der Umgebung von Lugano. R.	92	I	326
Schmidt, Fr.: Weitere Beiträge zur Kenntniss des Olenellus Mickwitzi. R.	90	II	439
— *Ueber neue silurische Fischfunde auf Oesel. B.*	*93*	*I*	*99*
— Einige Bemerkungen über das baltische Obersilur. R.	94	I	334
Schmitz, Note sur les sablonnières de Rocour. R.	93	I	524
Schneider, Ad.: Ueber neue Manganerze aus dem Dillenburgischen. R.	90	I	19
— Das Vorkommen von Inesit und braunem Mangankiesel im Dillenburgischen. R.	90	I	19
Schneider, C.: Zur Kenntniss basaltischer Hornblenden. R.	93	I	30
Schneider, E. A.: An Analysis of a Soil from Washington Territory, and some Remarks on the Utility of Soil-Analysis. R.	91	I	275
— siehe Clarke, F. W.			
Schneider, J., siehe Röntgen, W. C.			
Schneider, R.: Ueber künstlichen Kupferwismuthglanz. R.	92	II	398
— Ueber die Einwirkung des Kupferchlorürs auf Kalium-Eisensulfid und über die Darstellung von künstlichem Kupferkies. R.	92	II	399
— Ueber künstlichen Silberwismuthglanz. R.	92	II	400
Schoenflies, A.: Ueber reguläre Gebietstheilungen des Raumes. R.	93	I	1
— Beitrag zur Krystallstructur. R.	93	I	1
— Ueber das gegenseitige Verhältniss der Theorieen über die Structur der Krystalle. R.	93	I	1
— Bemerkung zu dem Artikel des Herrn E. v. Fedorow, die Zusammenstellung seiner krystallographischen Resultate und der meinigen betreffend. R.	93	II	236

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schoenflies, A.: Antwort auf den Artikel des Herrn Sohncke: Zwei Theorieen der Krystallstructur. R.	1893	II	236
Scholz, M.: Das geologische Profil der Greifswalder Wasserleitung in Vergleich mit den Resultaten verschiedener Tiefbohrungen auf den Inseln Rügen und Usedom, sowie an der Nordküste der Ostsee bei Ystad in Schweden. R.	93	I	531
Schopen, L. F.: Sopra una nuova Waagenia del titonio inferiore di Sicilia. R.	90	I	156
Schrader, A.: Geometrische Untersuchung der Geschwindigkeits-Kegel und der Oberflächen gleichen Gang-Unterschiedes optisch doppeltbrechender Krystalle. R.	94	I	246
Schrader, F., siehe Margerie, E. de.			
Schrauf, A.: Ueber die Verwendung einer Schwefelkugel zur Demonstration singulärer Schnitte an der Strahlenfläche. R.	91	I	3
— Die optischen Constanten des prismatischen Schwefels bei verschiedenen Temperaturen. R.	93	I	229
— Ueber Metacinnabarit von Idria und dessen Paragenesis. R.	93	I	461
— Ueber die Combination von Mikroskop und Reflexionsgoniometer zum Behufe von Winkelmessungen. R.	94	I	245
— Ein billiger Erhitzungsapparat für mikroskopische Präparate. R.	94	I	235
Schreiber, A.: Glacialerscheinungen bei Magdeburg. R.	92	I	145
Schrodt, F.: Beiträge zur Kenntniss der Pliocänfauna Südspaniens. R.	93	I	423
— Zur Foraminiferenfauna der weissen Globigerinenmergel von Oran. R.	93	II	389
— Die Foraminiferenfauna des miocänen Molassesandsteins vom Michelsberg unweit Hermannstadt. R.	94	I	394
Schröder, Henry: Pseudoseptale Bildungen in den Kammern fossiler Cephalopoden. R.	90	I	153
— Ueber Durchragungs-Züge und -Zonen in der Uckermark und in Ostpreussen. R.	90	I	320
— Diluviale Süsswasserconchylien auf primärer Lagerstätte in Ostpreussen. R.	90	II	126
— Untersuchungen über silurische Cephalopoden. R.	92	I	431
Schroeder van der Kolk, J. L. C.: Eine eigenthümliche Folge des Pleochroismus in Gesteinsschliffen. R.	91	I	59
— Verslag eener proeve van geologische Karteering in de omstreken van Markelo, in Juli en Augustus 1891 verricht. R.	93	I	135
— Mededeelingen omtrent de geologie von Neederland, verzameld door de Commissie voor het Geologisch Onderzoek. No. 9. Verslag over eenige geologische Onderzoekningen in den zomer van 1892. R.	94	II	333
— Beitrag zur mikrochemischen Auffindung von Nickel. R.	94	II	394
— Beiträge zur Kenntniss der Mischkrystalle von Salmiak und Eisenchlorid. R.	94	II	395
Schuchert, Ch.: A Classification of the Brachiopoda. R.	94	I	200
— siehe Beecher, Ch. E.			
Schucht, H.: Geognosie des Okerthals. R.	90	II	67
Schütze, R.: Ueber Verwitterungsvorgänge bei krystallinischen und Sedimentär-Gesteinen. R.	91	II	305
Schulte, L.: Geologische und petrographische Untersuchung der Umgebung der Dauner Maare. R. 1892 II 415	94	II	59

	Jahrg.	Bd.	Seite
Schultén, August von: Ueber die Darstellung künstlichen Pyrochroits (krystallisirtes Manganhydrat). R. . .	1890	I	231
— Ueber Darstellung von künstlichem Molybdänglanz. R.	90	II	223
— Synthese des Kainit und des Tachydrits. R.	94	I	12
— Künstlicher Molybdänglanz. R.	94	I	13
Schulze, Erwin: Ueber die Flora der subhercynischen Kreide. R.	91	I	442
Schulze, F. E. und R. von Lendenfeld: Ueber die Bezeichnung der Spongiennadeln. R.	91	I	163
Schulze, Hans: Mineralogisches aus Tarapacá. R. . . .	91	II	21
Schumacher, E.: Zur Verbreitung des Sandlöss im Elsass. R.	91	I	131
— Geologische Beobachtungen in den Hochvogesen. R. .	91	II	137
Schuster, M.: Ueber Findlinge aus dem vicentinischen Basalttuffe. R.	90	II	260
Schwager, A.: Untersuchung von Quell- und Flusswasser aus dem Fichtelgebirge und dem angrenzenden fränkischen Keupergebiete. R.	94	II	271
— siehe Leppla, A.			
Schweinfurth, G.: Bericht über seine während der letzten 15 Jahre in Aegypten ausgeführten Forschungen. R.	91	II	297
Schweitzer, J.: Krystallographische Beschreibung des Eisenglanzes und Fahlerzes von Framont. R. . . .	94	I	53
Scott: W. B.: Beiträge zur Kenntniss der Oreodontidae. R. 1892 I 406	93	II	395
Scott, W. B. and Henry F. Osborn: Preliminary Report on the Vertebrate Fossils of the Uinta Formation, collected by the Princeton Expedition of 1886. R. .	90	I	337
— — The Mammalia of the Uinta Formation. R. . . .	93	I	151
Scudder, Samuel H.: An interesting paleozoic Cockroach Fauna at Richmond, Ohio. R.	91	II	357
— Cockroaches from the Carboniferous Period. R. . . .	91	II	357
— Illustrations of the carboniferous Arachnida of North America, of the Order Anthracomarti and Pedipalpi. R.	92	I	585
— The Insects of the triassic Beds at Fairplay, Colorado. R.	92	I	582
— New carboniferous Myriapoda from Illinois. R. . . .	92	I	585
— Canadian fossil Insects. 1. The tertiary Hemiptera of British Columbia. R	92	I	424
— The fossil Insects of North America, with Notes on some European Species. R.	92	I	582
— The tertiary Insects of North America. R.	92	I	582
— New Types of Cockroaches from the carboniferous Deposits of the United States. R.	92	I	584
— Remains of Coleoptera in the interglacial Clays of Scarboros, Ontario. R.	93	I	399
— Physiognomy of the american tertiary Hemipteras. R.	93	I	551
— The Coleoptera hitherto found fossil in Canada. R. 1893 II 548	94	II	166
— Some Insects of special interest from Florissant, Colorado, and other Points in the Tertiaries of Colorado and Utah. R.	93	II	549
— The tertiary Rhynchophora of North America. R. 1893 II 550	94	II	167
Seamon, W. H.: The Zinciferous Clays of Southwest Missouri and a Theory as to the Growth of the Calamine of that Section. R.	93	I	475
Sederholm, J. J.: Från Anlandsrapakivins västra gräns. R.	92	I	76

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sederholm, J. J.: Ueber die finnländischen Rapakiwigesteine. R.	1892	I	308
— Studien über archaeische Eruptivgesteine aus dem südwestlichen Finnland. R.	92	I	309
— Om istidens bildningar i det inre af Finland. R.	92	I	376
— Sind die Rapakiwimassive als Lakkolithe oder Massenergüsse zu deuten? R.	93	I	289
— Beskrifning till Kartbladet			
No. 18: Tammela. R.	93	II	95
No. 22: Walkeala.	93	II	96
Seeland, F.: Neues Mineralvorkommen am Hüttenberge bei Erzberg. R.	90	I	60
Seeley, H. G.: Researches on the Structure, Organization, and Classification of the fossil Reptilia.			
III. On Parts of the Skeleton of a Mammal from triassic Rocks of Klipfontein, Frasenberg, South Africa (Theriodesmus phylarchus Seeley), illustrating the reptilian Inheritance in the mammalian Hand. R.	90	I	140
II. On Pareiasaurus bombidens (Owen) and the Significance of its Affinities to Amphibians, Reptiles and Mammals. R.	90	I	348
V. On associated Bones of a small anomodont Reptile, Keirognathus cordylus (Seeley), showing the relative Dimensions of the anterior Parts of the Skeleton, and Structure of the Forelimb and Shoulder Girdle. R.	90	I	466
VI. On the Anomodont Reptilia and their Allies. R.	91	II	342
VII. Further Observations on Pareiosaurus. R.	93	II	190
— Note on the pelvis of Ornithopsis. R.	90	I	347
— On the reputed Clavicles and Interclavicles of Iguanodon. R.	90	II	323
— On Cumnoria, an Iguanodont Genus founded upon the Iguanodon Prestwichi Hulke. R.	90	II	323
— On the Mode of Developement of the Young in Plesiosaurus. R.	90	II	326
— On the Ornithosaurian Pelvis. R.	92	II	354
— On the Shoulder Girdle in cretaceous Ornithosauria. R.	92	II	452
— On Agrosaurus Macgillivrayi (Seeley), a saurischian Reptile. R.	94	I	508
— On the os pubis of Polacanthus Foxi. R.	94	I	508
— On Saurodesmus Robertsoni (Seeley), a Crocodilian Reptile from the Rhaetic of Linksfield in Elgin. R.	94	I	509
— On a reptilian Tooth with two Roots. R.	94	II	158
— On further Evidence of Endothiodon bathystoma (Owen) from Oud Kloof in the Nieuwveldt Mountains, Cape Colony. R.	94	II	158
— On a new Reptile from Velte Wreden (Beaufort West), Eunotosaurus africanus (Seeley). R.	94	II	159
— The Mesosauria of South Africa. R.	94	II	159
— On Delphinognathus conocephalus (Seeley) from the Middle Karoo Beds, Cape Colony, preserved in the South African Museum, Capetown. R.	94	II	347
— siehe Brainard, E.			
Seidner, S., siehe Kast, H.			
Sekiya, S.: A Model showing the Motion of an Earthparticle during an Earthquake. R.	90	I	253

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sekiya, S.: The Severe Japan Earthquake of the 15th of January 1887. R.	1892	II	53
— Earthquake Measurements of Recent Years especially relating to Vertical Motion. R.	92	II	53
Sekiya, S. and Y. Kikuchi: The Eruption of Bandai-San. R.	90	II	100
Seligmann: Pseudomorphosen von gediegen Kupfer nach Rothkupfererz. R.	90	I	206
Sella, Alfonso: Ueber die Krystallform des Dolomit und des Magnesit. R.	91	II	410
— Sur la présence du nickel natif dans les sables du torrent Elvo près de Biella (Piémont). R.	92	I	513
— Sul numero delle cifre nelle costanti cristallografiche e sull' uso del metodo dei minimi quadrati per il calcolo di esse costanti. R.	93	II	1
— Compendio delle ricerche del prof. Voigt sull' elasticità dei cristalli. R.	93	II	2
— Sulla variazione dell' indice di rifrazione del diamante colla temperatura e su di una generalizzazione del metodo di minima deviazione col prisma. R.	93	II	13
— Sulla ottaedrite del Biellese. R.	93	II	19
— Beitrag zur Kenntniss der specifischen Wärme der Mineralien. R.	94	I	248
— siehe Oddone, E.			
Sello, L.: Ueber die Verbreitung der Wärme in der Erdrinde. R.	93	II	320
Selwyn, Alfred R. C.: Geological and Natural History Survey of Canada. R.	91	I	383
Vol. III. Part 1, 2. R.	91	II	89
— Geological Age of the Saganaga Syenite. R.	94	II	94
Semon, Rich.: Die Homologien innerhalb des Echinodermenstammes. R.	91	II	187
Sena, Costa: Sur un gisement de staurotides des environs d'Ouro-Preto. R.	91	II	29
Senft, Ferd.: Wanderungen in das Reich der Steine. R.	92	I	497
Serbin, A.: Bemerkungen Strabo's über den Vulcanismus und Beschreibung der den Griechen bekannten vulcanischen Gebiete. R.	94	I	456
Seunes, J.: Note préliminaire sur la géologie des Basses Pyrénées. R.	90	I	120
— Sur quelques ammonites du Gault. R.	90	I	356
— Echinides crétacés des Pyrénées occidentales. R.	90	I	472
Sér. II. R.	91	II	366
— Note sur le crétacé supérieur des Pyrénées occidentales. R.	90	II	413
— Observations sur le crétacé supérieur des Pyrénées occidentales. R.	91	II	328
— Sur la présence du dévonien supérieur dans La Vallée d'Ossau, Basses Pyrénées. R.	92	I	542
— Présentation d'un Mémoire. R.	92	II	106
— Sur le crétacé supérieur de la vallée d'Aspe. R.	92	II	307
— Gault coralligène des Pyrénées. R.	93	I	407
— Dévonien et permo-carbonifère de la haute vallée d'Aspe. R.	94	I	336
— Contributions à l'étude des céphalopodes du crétacé supérieur de France. R.	94	II	353
Seunes et Beaugey: Roches éruptives récentes des Pyrénées occidentales. R.	91	I	265

	Jahrg.	Bd.	Seite
Seward, A. C.: Sphenophyllum as a Branch of Asterophyllites. R.	1891	I	170
— Notes on Lomatophloios macrolepidotus Goldenb. R.	92	II	466
— Variation in Sigillariae. — Tylodendron and Voltzia. Woodwardian Laboratory Notes. R.	93	I	572
Seyffart: Ueber eine Methode zur Bestimmung der Rotationsdispersion circularpolarisirender Substanzen. R.	92	I	211
Seyfriedsberger, G.: Ueber Quecksilbersulfate aus dem Mauerwerke eines Idrianer Ofens. R.	91	I	237
Shaler, N. S.: Preliminary Report on Sea-coast Swamps of the Eastern United States. R.	90	I	278
— On the Occurrence of Fossils of the Cretaceous Age on the Island of Martha's Vineyard, Mass. R.	90	II	305
— Report on the Geology of Martha's Vineyard. R.	92	I	99
— The Topography of Florida. R.	92	I	101
— The Geology of the Island of Mount Desert, Maine. R.	92	I	102
— The Geology of Cape Ann, Massachusetts. R.	92	II	286
Shaler and Förste: On the Geology of the Cambrian District of Bristol-County, Massachusetts. R. . . 1890 I 97	91	II	436
Sharpless, F. F., siehe Lane, A. C.			
Shea, D: Zur Brechung und Dispersion des Lichtes in den Metallen. R.	94	I	246
Sherborn, C. Davies and Frederick Chapman: Foraminifera from the London Clay of Sheppey. R.	90	I	371
— — Additional Note on the Foraminifera of the London Clay exposed in the Drainage Works, Piccadilly, London in 1885. R.	93	I	566
— siehe Burrows, H. W.			
— siehe Chapman, F.			
— siehe Jones, T. R.			
— siehe Woodward, A. Smith.			
Sherzer, Will. H.: A Revision and Monograph of the genus Chonophyllum. R.	94	I	521
Shimek, B.: Notes on the Fossils of the Loess at Iowa City, Iowa. R.	90	II	423
Shrubsole, W. H.: Notes on the Radiolaria of the London Clay. R.	92	I	463
Sibirtzew, N.: Die posttertiären Bildungen im Gebiete des 72. Blattes der geologischen Karte von Russland (Gouv. Nishny und Wladimir). R.	92	I	379
Sicha, Fr.: Untersuchungen über die Wirkungen des beim hohen Drucke mit Kohlensäure gesättigten Wassers auf einige Mineralien. R.	93	II	353
Sickenberger, E.: Natürliche Cämentbildung bei Cairo, Egypten. R.	90	II	275
Sidorenko: Amethyst von Uruguay. R.	93	I	25
Sieger, Robert: Neue Beiträge zur Statistik der Seespiegelschwankungen. R.	90	II	390
— Niveauveränderungen an skandinavischen Seen und Küsten. R.	94	II	43
— Zur Entstehungsgeschichte des Bodensees. R.	94	II	44
— Postglaciale Uferlinien des Bodensees. R.	94	II	44
Siegert, Th.: Section Hirschstein. Blatt 32. R.	91	I	83
— Section Kötzschenbroda. Blatt 49. R.	93	II	90
Siemaschko, J. von: Einige Beobachtungen an dem Meteorsteine von Ochansk. R.	91	I	47

	Jahrg.	Bd.	Seite
Siemiradzki, Joseph von: Kritische Bemerkungen über neue oder wenig bekannte Ammoniten aus dem Braunen Jura von Popielany in Lithauen. B.	*1890*	*I*	*169*
— Ueber die silurischen Sandsteine bei Kielce. R.	90	II	290
— Ueber die Gliederung und Verbreitung des Jura in Polen. R.	91	I	298
— Ueber die Contacterscheinungen bei Dubie im Krakauer Gebiete. R.	91	II	71
— Studien im polnischen Mittelgebirge. R.	92	I	115
— Ueber die Jurabildungen von Popielany. R.	92	I	128
— O mięczakach głowonogych brunatnego Jura w Popielanach na Żmudzi. R.	92	I	128
— *Zur Geologie von Nord-Patagonien. A.*	*93*	*I*	*29*
— Ueber das Jura- und Rhätgebiet am Nordostabhange des polnischen Mittelgebirges im Flussgebiete der Kamienna. R.	93	I	348
— Der obere Jura in Polen und seine Fauna. II. Gastropoden, Brachiopoden und Echinodermen. R.	94	I	487
Silvestri, A.: Sulla molibdenite delle isole dei Ciclopi. R.	94	I	434
— Sulla fluorite di Carrara. R.	94	I	434
Silvestri, O.: Sur l'éruption récente de l'île de Volcano. R.	91	I	266
— Nota preliminare sulla hauerite di Sicilia. R.	91	II	235
— Etna, Sicilia ed Isole vulcaniche adiacenti sotto il punto di vista dei fenomeni eruttivi e geodinamici avvenuti durante l'anno 1888, 1889. R.	92	II	259
— Le maggiori profondità del Mediterraneo recentemente esplorate ed analisi geologici dei relativi sedimenti marini. R.	93	I	66
Silvestri, Mercalli, Grablowitz e Clerici: Le eruzioni dell' isola di Vulcano incominciate il 3 Agosto 1888 e terminate il 22 Marzo 1890. R.	93	I	493
Simonelli, V.: Sopra una nuova specie del genere Pholadomya. R.	90	I	160
— Terreni e fossili dell' Isola di Pianosa nel Mar Tirreno. R.	90	II	420
— Placunanomie del pliocene italiano. R.	92	I	181
— Sopra le affinità zoologiche della Rothpletzia rudista Sim. R.	93	I	401
— siehe Rothpletz, A.			
Simonowitsch, S., siehe Barbot de Marny, N. (Sohn).			
— siehe Sorokin, A.			
Simony, Friedrich: Das Schwinden des Karlseisfeldes. R.	93	I	374
— Das Dachsteingebiet. 1. u. 2. Lieferung. R.	94	II	82
Simpson, George B.: Description of new Species of Fossils from the Clinton, Lower Helderberg, Chemung and Waverly groups. R.	92	I	561
— siehe Hall.			
Simroth, H.: Die Entstehung der Landthiere. R.	93	II	176
Sinigallia, L.: Ueber einige glasige Gesteine vom Vesuv. (Mit 1 Holzschnitt.) A.	*BB VII*		*417*
Sintzow, J.: Notizen über jüngere pliocäne Ablagerungen des südlichen Russlands. R.	90	I	125
— Allgemeine geologische Karte Russlands. Blatt 92: Saratow-Penza. R.	90	II	110
— Einige Worte über Paludina diluviana und ihre verwandte Formen. R.	91	I	315
Sjögren, Ant.: Ueber ein neues Mineral von der Mossgrube in Nordmarken. R.	90	I	24

	Jahrg.	Bd.	Seite
Sjögren, Ant.: Mineralogische Notizen XIV. Ein dem Ekdemit nahestehendes Mineral von der Hastigsgrube, Grubenfeld Pajsberg, Wermland. R.	1890	I	231
— Berichtigung. R.	90	I	231
— Asigterna om jernmalmerna å Gellivara Malmberg och de bergarter, som innesulter malmerna. R. 1893 II 63	93	II	267
— siehe Nordström, Th.			
Sjögren, Ant. und C. Jul. Carlsson: Om recenta lager af jernmalm under bildning på Edslandet. R. . . .	93	II	70
Sjögren, Ant. und C. H. Lundström: Ueber Barysit, ein bisher nicht beobachtetes Bleisilicat von der Harstigsgrube. R.	90	I	24
Sjögren, Hj.: Uebersicht der Geologie Daghestans und des Terekgebietes. R.	90	II	276
— Preliminära meddelanden om de Kaukasiska naftafelten. I. Oefversigt af Apscherons geologi. R.	92	I	370
— On Transverse Valleys in the Eastern Caucasus. R. .	93	I	58
— Beitrag zur Mineralogie Schwedens.			
I. Mittheilungen über Långbanit. R.	93	I	471
II. Astochit. III. Adelit. IV. Svabit. R. . . .	93	II	37
Vorläufige Mittheilungen über die Mineralien der Humitgruppe von Nordmarken. R.	94	I	264
— Preliminära meddelanden från de kaukasiska naftafelten. R.	93	II	86
— Ueber die Entstehung der Schwedischen Eisenerzlager. R.	93	II	273
— Om vätskeinneslutningar i gips från Sicilien. R. . .	94	I	73
— En ny jernmalmstyp representerad of Routivare malmberg. R.	94	I	88
— Ytterligare om Routivare jernmalm. R.	94	I	88
— Untersuchung einiger Mineralien (Axinit, Hedyphan, Schefferit) aus dem Wermländischen Grubenfeld. R.	94	I	272
— Ueber Flüssigkeitseinschlüsse im Gyps von Sicilien. R.	94	II	30
— Contributions to Swedish Mineralogy. R.	94	II	235
Skrodzky, J.: L'infralias d'Agy. R.	93	I	345
— Deuxième note sur l'infralias d'Agy. R.	93	I	345
— Note sur les argiles à poissons (marnes à posidonies) d'Arganchy. R.	93	I	345
Skuphos, Th. G.: Die stratigraphische Stellung der Partnach- und der sogen. Unteren Cardita-Schichten in den nordtyroler und bayerischen Alpen. R.	93	II	524
— Ueber die Entwickelung und Verbreitung der Partnachschichten in Vorarlberg und im Fürstenthum Liechtenstein. R.	93	II	524
— Ueber Hebungen und Senkungen auf der Insel Paros. R.	94	I	457
Sladen, W. Percy: A Monograph on the British fossil Echinodermata from the Cretaceous Formation. Vol. II. The Asteroidea. R.	94	I	205
— siehe Duncan, P. M.			
Slavik, A.: Die Kreideformation in Böhmen und den benachbarten Ländern. R.	93	I	129
— Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordböhmen. R.	93	I	368
— Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes, ihre Deutung und Vergleichung mit anderen Kreidegebieten. R.	93	I	521

	Jahrg.	Bd.	Seite
Slavik, A.: Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Verbreitung in Nordböhmen. R.	1893	II	473
— Die Ablagerungen der permischen Formation bei Vlašim. R.	93	II	376
Sluiter, C. Ph.: Einiges über die Entstehung der Korallenriffe in der Javasee und Branntweinsbai, und über neue Korallenbildung bei Krakatau. R.	91	II	193
Smets, G.: Notices paléontologiques. R.	90	II	325
Smith, E. A.: Underthrust Folds and Faults. R.	94	II	243
— The Post-Eeocene Formations of the Costal Plain of Alabama. R.	94	II	455
Smith, E. A. and L. C. Johnson: On the tertiary and cretaceous Strata of the Tuscaloosa, Tombidgebee and Alabama Rivers. R.	92	I	373
Smith jr., C. H.: A Geological Reconnoissance in the Vicinity of Gouverneur N. Y. R.	94	I	109
— Alnoite, containing an uncommon Variety of Melilite. R.	94	II	262
Smith, Edgar F.: Ueber die Oxydation von Schwefelmetallen mittelst des elektrischen Stromes. R.	93	II	7
Smith, Edgar F. und Wallace: Die Oxydation des Minerals Kupferglanz durch den elektrischen Strom. R.	93	II	7
Smith, Walter B.: Notes on the Locality of Topas Butte. R.	91	I	34
Smock, John C.: Buildingstone in the State of New York. R.	90	I	82
Smyth, H.: On the Clinton Iron Ore. R.	93	I	80
— On a third Occurrence of Peridotite in Central New York. R.	93	I	290
Smyth, H. L.: Structural Geology of Steep Rock Lake. R.	94	I	329
Snow, Charles H.: Turquois in Southwestern New Mexico. R.	94	I	48
Sohncke, L.: Die Entdeckung des Eintheilungsprincips der Krystalle durch J. F. C. Hessel. Eine historische Studie. R.	93	I	3
— Die Structur der optisch drehenden Krystalle. R.	93	II	236
— Zwei Theorieen der Krystallstructur. R.	93	II	236
Sokolow, N.: Ueber die Neogen-Ablagerungen am unteren Don und über die Nordgrenze der pontischen Ablagerungen im europäischen Russland. R.	94	I	156
— Die untertertiären Ablagerungen Südrusslands. R.	94	I	359
— Allgemeine geologische Karte von Russland. Bl. 48. Melitopol. R.	91	I	282
— Geologische Forschungen im Nowomoskowsk'schen Kreise des Gouvernements Jekaterinoslaw und einige neue Daten über die palaeogenen Ablagerungen im Gebiete des Flusses Saljonaja. R.	92	I	370
— Ueber posttertiäre Süsswasser-Ablagerungen Süd-Russlands. R.	92	I	150
— Ueber die Fauna der unteren Oligocänschichten der Umgebung von Jekaterinoslaw. R.	94	II	139
Sokolow, W.: Materialien zur Geologie der Halbinsel Krim. Titonische Ablagerungen. R.	91	I	300
— Kosmischer Ursprung der Bitumina. R.	92	I	270
Solly, R. H.: Pseudomorphs of Haematite after Iron-Pyrites. R.	91	I	231
— On Struvite. R.	91	I	233
— Cassiterite, „Sparable Tin", from Cornwall. R.	92	II	15
— Mineralien aus den apatitführenden Gängen von Nörestadt bei Risör, SO.-Küste von Norwegen. R.	93	II	469
Soltmann, R.: Analyse eines Melanits von Oberrothweil im Kaiserstuhl. R.	93	I	239

	Jahrg.	Bd.	Seite
Somervail, A.: On the Greenstone of Manacle Point, Lizard. R.	1891	I	92
— On the Schists of the Lizard District. R.	91	I	92
— On the Nature and Origin of the Banded Rocks of the Lizard District. R.	92	I	78
— Recent Observations on the Geology of the Lizard District, Cornwall. R.	94	I	317
Sorby, H. C.: On the Microscopical Structure of Iron and Steel. R.	91	I	46
Soret, Charles: Sur un petit réfractomètre à liquides. R.	90	I	33
— Note sur quelques aluns prismatiques d'alumine et d'ammoniaques composées. R.	90	I	35
— Eléments de cristallographie physique. R.	94	I	1
Soret, Ch. et Ch. Eug. Guye: Sur la polarisation rotatoire du quartz aux basses températures. R.	94	II	213
Sorokin, A. und S. Simonowitsch: Geologische Karte des Surahany-Bezirks der Halbinsel Apscheron im Kaukasus. R.	90	I	125
Souheur, L.: Neue Formen am Topas aus dem Ilmengebirge. R.	93	I	246
Spandel, E.: Mittheilungen über neue Aufschlüsse von Erdschichten längs des Maines bei Offenbach und über die Gliederung des Meeresthones daselbst. R.	93	I	363
Spencer, F. W.: Glacial-Erosion in Norway and in High Latitudes. R.	90	I	128
Spencer, J. W.: Post-Pliocene Continental Subsidence (in America) versus Glacial Dams. R.	92	II	64
— The Deformation of Iroquois Beach and Birth of Lake Ontario. R.	92	II	68
— On the Origin of the Basins of the Great Lakes of America. R.	92	II	320
— Deformation of the Algonquin Beach and Birth of Lake Huron. R.	94	I	65
— High Level Shores in the Region of the Great Lakes, and their Deformation. R.	94	I	65
— The High Continental Elevation preceding the pleistocene Period. R.	94	I	162
Sperry, E. S., siehe Penfield, S. L.			
Spezia, Giorgio: Sulla origine del gesso micaceo et anfibolico di Val Cherasca nell' Ossola. R.	90	I	426
— Sull' origine del solfo nei giacimenti solfiferi della Sicilia. R.	93	I	281
Spiegel, L.: Zur Frage nach der Constitution des Fichtelits. R.	92	II	241
Spring, W.: The Compression of Powdered Solids. R.	91	I	244
— Brief notice of a paper by Mr. Hallock entitled: The Flow of Solids etc. R.	91	I	244
— Sur la vitesse de réaction du spath d'Islande avec quelques acides. R.	92	I	220
— Sur la vitesse de dissolution du spath d'Islande dans l'acide chlorhydrique. R.	92	I	221
Sprockhoff, A.: Grundzüge der Mineralogie. 2. Aufl. R.	91	II	229
Stache, G.: Neue Beobachtungen im Südabschnitte der istrischen Halbinsel. R.	90	I	61
— Nachweis des südtyrolischen Bellerophon-Kalk-Horizontes in Kärnten. R.	92	I	117

	Jahrg.	Bd.	Seite
Stadler, G.: Bestimmung des absoluten Wärmeleitungsvermögens einiger Gesteine. R.	1890	I	52
Stahl, W.: Ueber hexagonal krystallisirtes Schwefelzink. R.	90	I	210
Stainier, X.: Matériaux pour la flore et la faune du houillier de Belgique. R.	94	I	479
Stamm, G. A. Ph.: Ueber das Alter der rothen Conglomerate zwischen Frankenberg und Lollar. R.	92	I	543
Standfast, siehe Ettingshausen, C. von.			
Stange, G.: Krystallographische Untersuchung einiger Alkaloidsalze und Ammoniumderivate. (Mit Taf. I.) A.	*94*	*II*	*105*
Stangeland, G. E.: Torvmyrer in den Kartbladet „Sarpsborgs“ Omraade. R.	93	I	534
— Torvmyrer in den Kartbladet „Nannestads“ Omraade. R.	93	II	392
Stanley, W. F.: Probable Amount of former Glaciation of Norway, as demonstrated by present Condition of Rocks upon and near the western Norway. R.	90	II	423
Stanley-Brown, Joseph: Bernardinite: Is it a Mineral or a Fungus? R.	94	I	53
Stanton, F. W.: The Stratigraphic Positions of the Bear River Formation. R.	94	I	355
Stapff, F. M.: Zur Mallet'schen Methode der Bestimmung des Erdbebencentrums. R.	91	II	55
— Diluvialstudien in Lappmarken. R.	91	II	137
— *Ueber die angeblichen Yoldienthonkerne des schlesischen Diluviums. B.*	*91*	*II*	*332*
— Zur Diluvialfrage. R.	93	II	535
— Ueber die Zunahme der Dichtigkeit der Erde nach ihrem Inneren. R.	94	II	36
— Eine zerbrochene Fensterscheibe. R.	94	II	279
Starkl, G.: Farbenerscheinungen und Mikrolithen in Kupferschlacken von der Schmelz bei Annaberg in Niederösterreich. R.	90	II	242
— Ein kleiner Beitrag zur Erzeugung von Isothermen an unorganischen und organischen Substanzen. R.	93	II	457
Staub, M.: Uj adatok a Kolozsvár melletti Felek fosszil florájához. Neue Daten zur fossilen Flora von Felek bei Klausenburg. R.	93	I	432
— Magyarország jégkorszaka és florája. Die Flora Ungarns in der Eiszeit. R.	93	I	432
— A radácsi növényekről. Etwas über die Pflanzen von Radács bei Eperjes. R.	93	I	576
— Dicksonia punctata Stbg. sp. in der fossilen Flora Ungarns. R.	94	I	231
Staudenmaier, L.: Tesseralkies aus den Alpen. R.	93	II	15
Stecher, Ernst: Contacterscheinungen an schottischen Olivindiabasen. R.	90	I	73
Steck, Th.: Die Denudation im Kandergebiet. R.	94	II	44
Steenstrup, K. J. V.: Ueber die Einwirkung des Flugsandes auf die Form der Rollsteine. R.	90	I	458
— Petrografiske noticer. R.	92	I	77
— Er der allerede i Aaret 1729 fört en blok af metallisk nikkeljärn fra Diskobugten i Nord-Grönland til Europa? R.	93	II	72
Stefan, J.: Ueber die Theorie der Eisbildung, insbesondere über die Eisbildung im Polarmeere. R.	94	II	248

	Jahrg.	Bd.	Seite
Stefani, Carlo de: Iconografia dei nuovi molluschi pliocenici d'intorno Siena. R.	1890	II	152
— Andeutungen einer palaeozoischen Flora in den Alpi Marittime. R.	90	II	289
— Le rocce eruttive dell' eocene superiore nell' Appennino. R.	91	I	272
— Le pieghe delle Alpi Apuane. Contribuzione agli studi sull' origine delle montagne. R.	91	II	306
— Gisement carbonifère dans le Monte Pisano. R.	91	II	314
— Nouvelles observations sur le terrain houiller du Monte Pisano. R.	92	I	542
— Note sur le péristome d'un Rhacophyllites. R.	92	I	426
— Nouvelles observations géologiques sur l'île de Sardaigne. R.	93	I	304
— I vulcani spenti dell' Apennino settentrionale. R.	93	II	489
— Il bacino lignitifero della Sieve. R.	94	II	127
— Aperçu géologique de l'Ile de Samos. R.	94	II	431
Stefano, G. di: Il pliocene ed il postpliocene di Sciacca. R.	92	I	144
— Il lias medio del M. San Giuliano (Erice) presso Trapani. R.	92	I	547
— Nota preliminare sui fossili titonici dei dintorni di Triora nelle Alpi Marittime. R.	92	II	302
— A proposito di due Pettini dei calcari nero-lionati di Taormina. R.	94	II	315
Stefano, G. di, ed E. Cortese: Guida geologica dei dintorni di Taormina. R.	93	I	304
Steger: Ueber die Zerstörung von Steinkohlenschichten im Felde der Georg-Grube (Oberschlesien) durch diluviale Gletscher. R.	90	I	255
Stein, F.: Einfluss des Abhanges auf den mechanischen Bau und die physische Beschaffenheit des Bodens. R.	91	II	62
Steinmann, G.: Ueber Schalen- und Kalksteinbildung. R.	91	II	338
— Ueber Pleistocän und Pliocän in der Umgebung von Freiburg i. Br. R.	92	II	123
— A Sketch of the Geology of South America. R.	93	I	48
— Bemerkungen über die tektonischen Beziehungen der oberrheinischen Tiefebene zu dem nordschweizerischen Kettenjura. R.	93	I	108
— Einige Fossilreste aus Griechenland. R.	93	I	129
— *Ueber Thecospira im rhätischen Sandstein von Nürtingen. (Mit 1 Holzschnitt.). B.*	*94*	*I*	*276*
— Ueber die Gliederung des Pleistocän im badischen Oberlande. R.	94	I	365
— Ueber die Ergebnisse der neueren Forschungen im Pleistocän des Rheinthales. R.	94	I	366
— *Ueber das Ambulacralfeld von Pentremites. (Mit 2 Figuren.) A.*	*94*	*II*	*79*
— siehe Lent, K.			
— siehe Schmidt, C.			
Steinmann, G. und H. Bücking: Zur Geologie der Küsten des Cumberlandgolfes. R.	91	II	105
Steinmann, G. und L. Döderlein: Elemente der Palaeontologie. R.	91	I	318
Steinmann, G. und Fr. Graeff: Geologischer Führer der Umgebung von Freiburg. R.	92	I	539
Steinmann, G. et Léon du Pasquier: Compte rendu d'une excursion faite en commun dans le pleistocène			

	Jahrg.	Bd.	Seite
du Nord de la Suisse et des parties limitrophes du Grand-Duché de Bade. R.	1894	I	366
Steinmann, G.: Beiträge zur Geologie und Palaeontologie von Südamerika. I. Palaeozoische Versteinerungen aus Bolivien von Arnold Ulrich. (Mit Taf. I—V und 2 Holzschnitten.) A.	*BB.*	*VIII*	*1*
Stelzner, Alfred W.: Die Lateralsecretions-Theorie und ihre Bedeutung für das Přibramer Ganggebiet. R.	90	II	233
— Freibergs Trink- und Brauchwasser. R.	91	I	247
— Ueber die Isolirung von Foraminiferen aus dem Badener Tegel mit Hilfe von Jodidlösung. R.	91	II	371
— *Ueber das vermeintliche Vorkommen von Diamant im hindostanischen Pegmatit. B.*	*93*	*I*	*139*
— *Ueber Franckeit, ein neues Erz aus Bolivia. A.*	*93*	*II*	*114*
— Die Zinnerzlagerstätten von Bolivia. R.	93	II	81
— Ueber eigenthümliche Obsidianbomben aus Australien. R.	94	II	269
Steusloff, A.: Sedimentärgeschiebe von Neubrandenburg. R.	92	II	446
Stenzel, K. G.: Rhizodendron Oppeliense Göpp. R.	90	II	167
— Nachträge zur Kenntniss der Coniferenhölzer der palaeozoischen Formationen. Aus dem Nachlass von H. R. Göppert. R.	90	II	344
Stephens: Note on a Labyrinthodont Fossil from Cockatoo Island, Port Jackson. R.	90	II	106
— On the Biloela Labyrinthodont (Second Notice). R.	90	II	107
— An Attempt to synchronise the Australian, South African and Indian Coal Measures. Part I. — The Australasian and New Zealand Formations. R.	93	I	511
Sterki, V.: Shells collected in the Sand of a dry Salt Lake near Eddy, New Mexico. R.	94	I	500
Sternberger, Th.: Ein neues Uranpecherz-Vorkommen im Přibramer Bergbaue. R.	94	I	91
Sterneck, Robert von: Bestimmung der Intensität der Schwerkraft in Böhmen. R.	92	I	53
— Die Schwerkraft in den Alpen und Bestimmung ihres Werthes für Wien. R.	93	I	487
Sterzel, T.: Die fossile Flora des Rothliegenden im Plauen'schen Grunde. R.	93	I	428
Stevenson, J.: On the Use of the Name „Catskill". R.	94	II	100
Stjernwall, H.: Bidrag till Finska Lappmarkens geologi. I. Berättelse öfver guldletningsexpeditionen sommaren år 1888. R.	93	II	107
II. Försök till en framställning af de geologiska förhållandena i trakten emellan Könkämäeno och norska gränsen. R.	93	II	107
Stiffe, A. W.: On the Glaciation of Parts of the Ihelam and Sind Rivers, Kashmir. R.	91	II	105
Stirnling, J.: Notes on the Bindi Limestones. R.	91	II	312
Stirup, M.: The true Horizon of the Mammoth. R.	94	II	456
Stöber, F.: Mittheilungen über den Kalkspath von Elsass-Lothringen. R.	94	I	20
— Cölestin von Ville-sur-Saulx. R.	94	I	444
— Cölestin von Brousseval. R.	94	I	444
Stolley, E.: Ueber zwei Brachyuren aus dem mitteloligocänen Septarienthon Norddeutschlands. R.	91	II	355
— Ueber ein Neocomgeschiebe aus dem Diluvium Schleswig-Holsteins. R.	91	II	447

	Jahrg.	Bd.	Seite
Stolley, E.: Die Kreide Schleswig-Holsteins. R. . .	1892	II	436
— *Ueber silurische Siphoneen. (Mit Taf. VII u. VIII.) A.*	*93*	*II*	*135*
— *Ueber die Verbreitung Algen führender Silurgeschiebe. B.*	*94*	*I*	*109*
Stolp, K.: Meteorischer Staub, gesammelt auf den Cordilleren Chile's, und Beobachtung einer Feuerkugel im Lichtschein des westlichen Himmels im Jahre 1883. R.	90	II	230
Stone, G. H.: On the Scratched and Facetted Stones of the Salt Range. R.	91	I	91
— Note on the Asphaltum of Utah and Colorado. R. . .	94	I	91
Stonier, G. A.: Notes on the Geology and Mining in the Trunkey and Tuena Districts. R.	94	I	111
— Note on the Gundelah Coal Field. R.	94	II	309
Storms, R.: Sur la présence d'un poisson du genre thynnus dans les dépôts pliocènes des environs d'Anvers. R.	92	I	165
Story, T. S.: The quantitative Determination of Silver by Means of the Microscope. R.	90	I	278
Straka, J.: Beiträge zur Charakteristik der Erzlagerstätten. (Erzlagerstätten Bosniens.) R.	90	II	74
Streeruwitz, W. H. v.: Trans Pecos Texas. R. . . .	94	I	111
Streng, Aug.: Kleinere Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Giessen. R.	91	I	18
— Neue Funde von Mineralien, Gesteinen und Petrefacten aus der Umgebung von Giessen. R.	91	I	18
— Bemerkungen über den Melanophlogit. R.	91	I	19
— *Ueber den Melanophlogit. B.*	*91*	*II*	*211*
— Uebersicht über die eruptiven Gesteine der Section Giessen. R.	92	I	95
— *Mikrochemische Notizen. B.*	*93*	*I*	*49*
— Ueber die basaltischen Kraterbildungen nördlich und nordöstlich von Giessen. R.	93	II	324
— Ueber den Melanophlogit. R.	94	I	253
— siehe Fuchs, C. W. C.			
Strombeck, A. von: Ueber den oberen Gault mit Belemnites minimus bei Gliesmarode unweit Braunschweig. R.	93	I	360
— Ueber das Vorkommen von Actinocamax quadratus und Belemnitella mucronata. R.	94	II	114
— Ueber den angeblichen Gault bei Lüneburg. R. . . .	94	II	114
Struckmann, C.: Die ältesten Spuren des Menschen im nördlichen Deutschland. R.	90	I	138
— *Die Wealdenbildungen von Sehnde bei Lehrte. A.* . .	*91*	*I*	*117*
— Ueber den Serpulit (Oberen Purbeck) von Linden bei Hannover. R.	93	I	123
— Ueber die bisher in der Provinz Hannover und den unmittelbar angrenzenden Gebieten aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugethiere. Nachträge und Ergänzungen. R.	93	II	393
Strüver, Johannes: Dell' aftalosio di Racalmuto in Sicilia. R.	90	I	31
— Sulla brookite di Beura nell' Ossola. R.	91	I	13
— Contribuzioni alla mineralogia della Valle Vigezzo. R.	91	I	14
— Sulle leggi digeminazione e le superficie di scorrimento nella ematite dell' Elba. R.	91	I	15
— Ematite di Stromboli. R.	91	I	15
— *Weitere Beobachtungen über die Minerallagerstätten des Alathals in Piemont. (Mit Taf. I.) A.*	*91*	*I*	*1*
— Contribuzioni allo studio dei graniti della Bassa Valsesia. R.	92	I	71

	Jahrg.	Bd.	Seite
Strüver, Johannes: Sopra alcune miche del Lazio. R.	1894	I	441
— Sui minerali del granito di Alzo. R.	94	I	446
Struthers, T. R.: Granite. R.	94	I	288
Stuart-Menteath, P. W.: Sur le terrain dévonien des Pyrénées occidentales. R.	92	I	346
— Sur la constitution géologique des Pyrénées. R. 1893 I 303	94	I	475
— Note sur douze coupes des Pyrénées occidentales. R.	93	I	303
— Sur le gisement et la signification des fossiles albiens des Pyrénées occidentales. R.	94	II	451
Stuber, J.: Cölestin von Scharfenberg in Sachsen. R.	93	I	249
— Die obere Abtheilung des unteren Lias in Deutsch-Lothringen. R.	94	I	343
Stuckenberg, A.: Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 138. R.	94	I	319
Stübel, A, siehe Reiss, W.			
Stümcke, M.: Die tertiären Bildungen des Kreideberges bei Lüneburg. R.	90	II	418
Stur, D.: Die Lunzer (Lettenkohlen-) Flora in den „older Mesozoic" Beds of the Coal-Field of Eastern Virginia. R.	90	I	175
— Momentaner Standpunkt meiner Kenntnisse über die Steinkohlenformation Englands. R.	90	I	296
Süess, E.: Are great Ocean Depths permanent? R.	94	I	63
— Die Zukunft des Silbers. R.	94	II	1
— Beobachtungen über den Schlier in Oberösterreich und Bayern. R.	92	II	309
— siehe Höhnel, R. von.			
Supan: Ketten- und Massengebirge. R.	90	I	249
Svedmark, E.: Meteorer iakttagna in om Sverige år 1888. R.	90	I	43
— Om en i Skåne den 3 sistlidne April fallen meteorsten. R.	90	I	414
— Meteorer iakttagna inom Sverige å 1889. R.	91	I	243
— Meteoren den 23 November 1889. Nachtrag. R.	91	I	243
— Meteorer iakttagna i Sverige 1890 och 1891. R.	92	II	244
Swarowsky, A.: Die Eisverhältnisse der Donau in Bayern und Oesterreich von 1850—1890. R.	93	I	67
Syrkin, N.: Neues aus dem Kaukasus. R.	94	I	94
Szabó, J. von: Claudetit von Szomolnok (Schmölnitz) in Nord-Ungarn. R.	91	I	240
— Die geologische Beschreibung der Umgebung von Schemnitz. R.	93	I	79
— Die Bewegungen auf den Schemnitzer Erzgängen in geologischer Beziehung. R.	93	I	79
— Awaruit, ein Nickel-Eisen-Mineral. R.	93	I	231
Szádeczky, J. von: Rhyolithspuren in Schweden. R.	91	I	397
— Petrographische und geologische Verhältnisse des centralen Theiles der Tokaj-Eperieser Gebirgskette in der Umgebung von Pusztafalu. R.	91	II	72
— Beiträge zur geologischen Beschaffenheit der Umgebung von Munkácz. R.	92	I	285
— La montagne de Pilis dans la Szigethhegység du comitat de Zemplén. R.	93	I	71
— Der Granit der Hohen Tatra. R.	94	I	72
— Zur Kenntniss der Eruptivgesteine des Siebenbürgischen Erzgebirges. R.	94	I	292
Szajnocha: Ueber die Stratigraphie der Silurablagerungen in Galizisch-Podolien. R.	90	I	98

	Jahrg.	Bd.	Seite
Szajnocha: Pholadomyocardia Jelskii nov. gen., nov. sp. zpokladów jurajskich pólnocnej Peruwii. R. . . .	1890	I	160
— Ueber den Contact des Porphyrs mit dem Kohlenkalke oberhalb Dubie bei Krzeszowice im Krakauer Gebiet. R.	90	II	260
— Ueber ein fossiles Elenskelet (Cervus Alces Linn.) aus der Höhle bei Jaszczurówka in der Tatra. R. . . .	90	II	431
— Die Mineralquellen Galiziens. Eine vergleichende Darstellung des Auftretens derselben, der chemischen Zusammensetzung und der Entstehungsweise. R. . .	92	I	527
— Ueber einige carbone Pflanzenreste aus der argentinischen Republik. R.	94	I	527
— Ueber eine cenomane Fauna aus den Karpathen der Bukowina. R.	94	II	318
Szontagh, Thomas von: Geologische Studien an der rechten Seite der Maros, in der Gegend von Soborsin und Baja. R.	93	II	362

T.

Taeker, Julius: Zur Kenntniss der Odontogenese bei Ungulaten. R.	93	I	381
Taff, J. A.: Reports on the Cretaceous Area north of the Colorado River. R.	94	I	150
Tanakadate, A. and H. Nagaoka: The Disturbance of Isomagnetics attending the Mino-Owari Earthquake of 1891. R.	94	II	38
— siehe Knott, Cargill G.			
Tanfiljew, G.: Ueber subfossile Strünke auf dem Boden von Seen. R.	94	I	529
Tardy: Sur les températures du sous-sol. R.	93	I	52
Tarr, R. S.: On the Permian of Texas. R.	93	I	120
— Origin of some Topographic Features of Central Texas. R.	93	II	111
— Phenomenon of Rifting in Granite. R.	94	I	76
— siehe Wolff, J. E.			
Tate, T.: Notes on recent Borings for Salt and Coal in the Thees district. R.	94	I	472
Tausch von Glöckelsthurn, L.: Ueber einige nichtmarine Conchylien der Kreide und des steirischen Miocäns und ihre geographische Verbreitung. R. . .	91	II	444
— Ueber eine tertiäre Süsswasserablagerung bei Wolfsberg im Lavantthale (Kärnthen) und deren Fauna. R. .	91	II	444
— Zur Kenntniss der Fauna der „grauen Kalke" der Südalpen. R.	92	I	396
— Ueber die Fossilien von St. Briz in Südsteiermark. R.	92	I	140
— Vorlage des Blattes Prossnitz und Wischau. R. . . .	93	I	94
— Reisebericht von Tischnowitz. R.	93	I	119
— Zweiter Reisebericht. Geologische Mittheilungen aus der weiteren Umgebung von Tischnowitz. R.	93	I	120
— Bemerkungen zu Paul Oppenheim's Arbeit: Die Land- und Süsswasserschnecken der Vicentiner Eocänbildungen. Eine palaeontologisch-zoogeographische Studie. R. .	93	I	181
— Bericht an die Direction der k. k. geol. Reichsanstalt über eine aus dem Fonds der Schlönbach-Stiftung subventionirte Studienreise nach Süddeutschland. R. . .	93	II	200
— Offene Antwort auf eine von Herrn Prof. Dr. G. Böhm			

	Jahrg.	Bd.	Seite
in seiner Arbeit „Lithiotis problematica“ an mich gerichtete Frage. R.	1894	II	174
Tausch von Glöckelsthurn, L.: Zur Megalodus-Frage. R.	94	II	174
Tauss, H., siehe Hatle, E.			
Tchihatchef, F. von: Der körnige Kalk von Auerbach-Hochstädten an der Bergstrasse. R.	91	I	257
Teall, J. J. Harris: British Petrography with Special Reference to the Igneous Rocks. R.	90	I	237
— On an Eclogite from Loch Duich. R.	92	I	296
— On a Micro-granite containing Riebeckite from Ailsa Craig. R.	92	II	216
— siehe Bauermann, H.			
— siehe Dakyns.			
— siehe Fox, H.			
Téglás, G.: Kurze Uebersicht der in der Zone des siebenbürgischen Erzgebirges von Zám bis zum Ompolythale erforschten Höhlen. R.	92	II	275
— Neuere Daten zur älteren Geschichte der Verespataker Bergbaue. R.	93	I	79
Teisseyre, L.: Ueber Proplanulites n. g. A.	*90*	*I*	*148*
— Ueber die systematische Bedeutung der sog. Parabeln der Perisphincten. A.	*90*	*I*	*570*
Teller, Friedrich: Zur Kenntniss der Tertiärablagerungen des Gebietes von Neuhaus bei Cilli in Südsteyermark. R.	90	I	454
— Ein pliocäner Tapir aus Südsteyermark. R.	90	I	460
— Fusulinenkalk und Uggowitzer Breccie innerhalb der Weitensteiner Eisenerzformation und die Lagerungsbeziehungen dieser palaeozoischen Gebilde zu den triadischen und tertiären Sedimenten des Weitensteiner Gebirges. R.	91	II	119
— Daonella Lommeli in den Pseudo-Gailthalerschiefern von Cilli. R	91	II	319
— Der geologische Bau der Rogai-Gruppe und des Nordgehänges der Menina bei Oberburg in Südsteiermark. R.	93	I	121
— Ueber den Schädel eines fossilen Dipnoërs, Ceratodus Sturii nov. spec., aus den Schichten der oberen Trias der Nordalpen. R.	93	II	408
— Mastodon Arvernensis Croiz et Job. aus den Hangendtegeln der Lignite des Schallthales in Südsteiermark. R.	93	II	542
— Ueber den sogenannten Granit des Bachergebirges. R.	94	II	80
Tellini, A.: Nummoliti della republica dell' Equatore. R.	92	I	191
— Le nummulitidi della Majella, delle isole Tremiti e del promontorio Garganico. R.	92	II	373
— Osservazioni geologiche sulle isole Tremiti e sull' isola Pianosa nell Adriatico. R.	93	I	529
— Le nummulitide terziarie dell' Alta Italia occidentale. R.	92	I	462
Tenne, C. A.: Ueber den Sigterit Rammelsberg und über den Abit von Sigterö bei Brevig. A.	*91*	*II*	*206*
Terenzi, Giuseppe: L'aerolito di Collescipoli (Terni). R.	90	II	387
Termier, P.: Note sur un quartz corrodé dans une microgranulite des environs d'Osaka (Japon). R.	90	I	214
— Sur une phyllite nouvelle, la leverriérite, et sur les Bacillarites du terrain houiller. R.	90	II	37
— Etude sur le massif cristallin du Mont-Pilat sur la bordure orientale du plateau central entre Vienne et			

	Jahrg.	Bd.	Seite
Saint-Vallier et sur la prolongation des plis synclinaux houillers de Saint-Etienne et de Vienne. R. . .	1890	II	393
Termier, P.: Sur les séries d'éruptions du Mézenc et du Meygal (Vélay) et sur l'existence de l'aegyrine dans les phonolithes du Vélay. R.	91	I	264
— Note sur un gisement de staurotide aux environs de Saint-Etienne (Loire). R.	91	I	379
— Sur l'existence de tufs d'andésite dans le flysch de la Clusaz. R.	92	I	295
— Note sur la leverriérite. R.	92	I	512
— Sur les terrains métamorphiques des alpes de Savoie. R.	92	II	276
— Les éruptions du Vélay. I. II. R.	93	I	272
— Etude sur la constitution géologique du Massif de la Vanoise (Alpes de Savoie). R.	93	I	299
— Sur l'existence de la microgranulite et de l'orthophyre dans les terrains primaires des Alpes françaises. R.	94	I	298
— Sur les roches de la série porphyrique dans les Alpes françaises. R.	94	II	424
— siehe Michel-Lévy, A.			
Terraillon, H.: Etude sur les gisements cuivreux de la société anonyme de Jerez-Lanteira, province de Grenade. R.	93	II	73
Terreil, A.: Analyse d'une argile chromifère du Brézil. R.	94	I	38
Thaddeef, K.: Bemerkungen über einige Reactionen zum Bestimmen der Mineralien. R.	93	I	230
Than, C. von: Die chemische Constitution der Mineralwässer und die Vergleichung derselben. R.	92	I	526
Thiel, J.: Beiträge zur Kenntniss der nutzbaren Mineralien des bayerischen Waldes mit specieller Berücksichtigung des Silberberges bei Bodenmais. R.	92	II	70
Thilo, E.: Studien über den Goldbergbau und die Goldgewinnung in Siebenbürgen. R.	91	II	294
Thomas, B. W.: Diatomaceae of Minnesota Interglacial Peat. R.	94	I	498
Thomas, H.: Contribution à la Géologie de l'Oise. Notice géologique de Beauvais. R.	93	II	165
Thomas, Ph.: Sur la géologie de la formation pliocène à troncs d'arbres silicifiés de la Tunisie. R.	90	II	96
— Sur les gisements de phosphate de chaux de l'Algérie. R.	90	II	97
— Sur les gisements de phosphate de chaux des hauts plateaux de la Tunisie. R. . . . . 1892 II 268	94	I	160
— Sur quelques roches ophitiques du sud de la Tunisie. R.	92	II	268
— Etage miocène et valeur stratigraphique de l'Ostrea crassissima au sud de l'Algérie et de la Tunisie. R.	94	I	494
Thomas et Peron: Description des mollusques fossiles des terrains crétacés de la région sud des hauts-plateaux de la Tunisie. IIième partie. R.	93	II	157
— — Descriptions des brachiopodes, bryozaires et autres invertébrés fossiles des terrains crétacés de la région sud des hauts-plateaux de la Tunisie, recueillis en 1885 et 1886. R.	94	I	173
Thomassen, Th. Ch.: Berichte über die, wesentlich seit 1834, in Norwegen eingetroffenen Erdbeben. R. . .	91	II	55
— Jordskjaelv i Norge 1888—1890. R.	92	II	52
— Jordskjaelvet den 15 de Mai 1892. R.	93	II	321

	Jahrg.	Bd.	Seite
Thompson, d'Arcy W.: Faut-il associer les zeuglodontes aux cétacés? R.	1892	I	160
— On the Systematic Proposition of Hesperornis. R.	92	I	161
Thompson, Beeby: The Oolitic Rocks at Stowe-Nine-Churches, Northamptonshire. R.	93	I	519
Thompson, Sylvanus P.: On the Use of Fluor-Spare in Optical Instruments. R.	92	I	223
Thomson, J.: On a new species of Diphyphyllum and on a remarkable Form of the genus Lithostrotion. R.	90	I	474
Thomson, J. Stuart: Analyse von Aragonit von Shetland. R.	94	I	23
— siehe Heddle, M. F.			
Thomson, Sir W.: Sur la tactique moléculaire de la macle artificielle du spath d'Islande produite par M. Baumhauer au moyen d'un couteau. R.	90	II	380
Thoroddsen, Th.: Vulkaner i det nordöstlige Island. R.	90	I	422
— Einige Bemerkungen über die Fundstätten des isländischen Doppelspaths. R.	92	I	222
Thoulet, J.: De la solubilité de divers minéraux dans l'eau de mer. R. . . . . 1890 II 188 1891 I 62	91	II	404
— De l'action de l'eau en mouvement sur quelques minéraux. R.	92	II	65
Thürach, Hans: Geognostische Beschreibung der Insel Süd-Georgien. R.	91	II	103
— Uebersicht über die Gliederung des Keupers im nördlichen Franken im Vergleich zu den benachbarten Gegenden. R.	92	I	351
— Ueber die Gliederung des Urgebirgs im Spessart. R.	94	I	310
Thugutt, St. J.: Mineralchemische Studien. R.	93	II	10
Tietze, E.: Die weissen Mergel des Agramer Gebirges. R.	92	II	115
— Neuere Beobachtungen in der Umgebung von Krakau. R.	93	II	130
— Ueber das Alter des Karniovicer Kalkes. R.	93	II	130
— Zur Geologie von Ostrau. R.	94	II	308
— Die Permbuntsandsteinformation bei Krakau. R.	94	II	374
Tigerstedt, A. F.: Eine eigenthümliche Abweichung der Magnetnadel, beobachtet im Rapakiwigebiete bei Wiborg. R.	93	II	51
— Om traktens mellan Höytiäinen och Pielisjärvi geologiska och topografiska byggnad samt några därstädes förekommande malmförande Kvartsgångar. R.	93	II	106
— Om Finlands malmförekomster. R.	94	I	470
Tillo, de: Hauteur moyenne des continents et profondeur moyenne des mers. R.	90	I	252
Tobisch, V.: Das Erzvorkommen von Klostergrab. R.	92	I	83
— Einiges über das Goldvorkommen im Banate. R.	92	I	83
— Die ausserdeutschen Manganerzvorkommnisse. R.	92	I	83
Törnebohm, A. E.: Om högfjällsqvartsiten. R.	92	I	339
— Om fjällproblemet. R.	92	I	339
— Om Sevegruppen och Throndhjems fältet. R.	92	II	295
— Några notiser om Saalekinnen och dess närmasti omgifning. R.	93	I	114
— Om kloritoid och bergbeck i ett qvartsbrott på Kolmården. R.	93	I	497
— Ueber Darstellung von Platinakrystallen im Laboratorium der technischen Hochschule. R.	93	II	40
— Om Pitkäranta malmfält och dess omgifningar. R.	93	II	61

	Jahrg.	Bd.	Seite
Törnebohm, A. E.: Några ord med anledning af tvisten rörande Gellivaramalmernas genesis. R. 1893 II 64	1893	II	268
— Försök till en tolkning af det nordligaste Skandinaviens fjällgeologi. R.	94	I	100
— Några observationer rörande blocktransporten inom det centrala Skandinavien. R.	94	II	458
Törnquist, Sv. L.: Bemerkungen über die älteren palaeozoischen Bildungen in Ost-Thüringen und Voigtland. R.	91	II	115
— Einige Bemerkungen über die cambrische und silurische Korologie des westlichen Europas. R.	92	I	109
— Untersuchungen über die Graptoliten des Siljangebietes. R.	92	II	174
— Några ytterligare anmärkningar om Leptaena-Kalken i Dalarne. R.	93	I	116
— Undersökningar öfver Siljansområdets Graptoliter II. R.	93	I	564
— Ett inlägg i en synonymifraga. R.	94	I	393
— Anmärkningar med anledning af v. Schmalensée's uppsats: „Om lagerföljden inom Dalarnes Siluromräden". R.	94	II	98
Tognini, F.: Studio microscopico di alcune roccie della Ligura. R.	91	II	428
Toldo, G.: Mitridae del miocene superiore di Montegibbio. R.	91	II	464
— Muricidae, Tritonidae e Fasciolaridae del miocene superiore di Montegibbio. R.	91	II	464
Toll, Baron Eduard von: Die palaeozoischen Versteinerungen der neusibirischen Insel Kotelny. Abth. I. R.	90	II	290
— siehe Schmalhausen, J.			
Tolstopiatow, M.: Recherches minéralogiques. R.	94	II	2
Tommasi, A.: Rivista della Fauna Raibliana del Friuli. R.	92	I	153
— Sul lembo cretaceo di Vernasso nel Friuli. R.	93	II	531
— Contribuzione allo studio della fauna cretacea del Friuli. — I fossili senoniani di Vernasso presso S. Pietro al Natisone. R.	93	II	531
Tondera, Franz: Mittheilung über die Pflanzenreste aus der Steinkohlenformation im Krakauer Gebiete. R.	93	II	424
Torell, O.: Undersökningar öfver istiden. III. Temperaturforhållandena under istiden samt fortsatta jakttagelser öfver dess aflagringar. R.	90	II	124
— Om aflagringarna på ömse sidor om riksgränsen uti Skandinaviens sydligare fjelltrakter. R.	92	I	339
— Apatitförekomsterna i Norrbottens län. R.	93	II	64
Tornquist, A.: Der Gypskeuper in der Umgebung von Göttingen. R.	93	II	134
Torrey jr., J., siehe Barbour, E. H.			
Toucas, A.: Note sur le jurassique supérieur et le crétacé inférieur de la vallée du Rhône. R.	92	I	130
— Nouvelles observations sur le jurassique supérieur de l'Ardèche. R.	92	I	132
— Etude de la faune de couches tithoniques de l'Ardèche. R.	92	I	360
— Note sur le sénonien et en particulier sur l'âge des couches à Hippurites. R.	93	II	162
— Sur le sénonien supérieur des Corbières. R.	94	I	490
La Touche, Thom. D.: Re-discovery of Nummulites in Zánskár. R.	92	I	190
— Report on the Coal-fields of Lairungao, Maosandram and Mao-be-lar-kar in the Khasi Hills. R.	94	II	330
Toula, Franz: Ueber Aspidura Raiblana nov. sp. R.	90	I	171

	Jahrg.	Bd.	Seite
Toula, Franz: Neuere Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche. R.	1890	I	45
— *Zur Kenntniss der krystallinischen Gesteine des centralen Balkan. B.*	*90*	*I*	*263*
— *Geologische Untersuchungen im östlichen Balkan. B.*	*90*	*I*	*273*
— *Geologische Untersuchungen im östlichen Balkan und in anderen Theilen von Bulgarien und Ostrumelien. B.*	*92*	*II*	*75*
— *Ueber zwei neue Säugethierfundorte auf der Balkanhalbinsel. B.*	*92*	*II*	*77*
— *Zur Geologie der Bucht von Olmütz in Mähren. (Mit Taf. VI.) A.*	*93*	*I*	*105*
— *Eine marine Fauna aus Mauer bei Wien. B.*	*93*	*I*	*96*
— Reisebilder aus Bulgarien. R.	93	I	305
— *Die Kalke der Grebenze im Westen des Neumarkter Sattels in Steiermark. B.*	*93*	*II*	*169*
— *Ein Ammonitenfund (Acanthoceras Mantelli Sow.) im Wienersandstein des Kahlengebirges bei Wien. A.*	*93*	*II*	*79*
— Ueber Wildbachverheerungen und die Mittel, ihnen zu begegnen. R. 1893 II 323	94	I	457
— Der Stand der geologischen Kenntniss der Balkanländer. R.	94	I	317
— Neuere Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche. IV. R.	94	I	451
— Der Bergsturz am Arlberge und die Katastrophe von Saint-Gervais. R.	94	I	457
— Streiflichter auf die jüngste Epoche der Cultur. R.	94	I	468
— Der Jura im Balkan nördlich von Sophia. R.	94	II	447
— Zwei neue Säugethierfundorte auf der Balkanhalbinsel. R.	94	II	462
— siehe Höhnel, R. von.			
Trabucco, G.: Sulla vera posizione del calcare di Aqui (Alto Monferrato). R.	92	II	313
— L'Isola di Lampedusa, studio geo-paleontologico. R.	92	II	314
— L'Isola di Linosa. R.	93	I	494
Trampler, R.: Die Loukasteine. R.	94	I	435
Traquair, R. H.: Notes on the Nomenclature of the Fishes of the Old Red Sandstone of Great Britain. R.	90	II	327
— Notes on the Devonian Fishes of Scaumenac Bay and Campbelltown in Canada. R.	90	II	438
— On a new Species of Dipterus. R.	91	I	152
— Homosteus Asmuss, compared with Coccosteus Agassiz. R.	91	I	332
— Note on the Genera Tristychius and Ptychacanthus Agassiz. R.	91	I	429
— New Palaeoniscidae from the English Coal-Measures. II. R.	92	I	420
— On the Fossil Fishes found at Achanarras Quarry, Caithness. R.	92	II	456
— Observations on some Fossil Fishes from the Lower Carboniferous Rocks of Eskdale, Dumfriesshire. R.	92	II	456
— On a new Species of Gyracanthus. R.	92	II	456
Traube, Hermann: Untersuchungen an den Syeniten und Hornblendeschiefern zwischen Glatz und Reichenstein in Niederschlesien. A.	*90*	*I*	*195*
— Zinnober und Calomel vom Berge Avala bei Belgrad in Serbien. R.	90	I	25
— *Ueber pleochroitische Höfe im Turmalin. B.*	*90*	*I*	*186*
— *Pyrargyrit von Kajánel in Siebenbürgen. B.*	*90*	*I*	*286*
— Zinkhaltiger Aragonit von Tarnowitz in Oberschlesien. R.	90	II	379

	Jahrg.	Bd.	Seite
Traube, Hermann: Ueber die Krystallform einiger Lithiumsalze. (Mit Tafel I.) A.	*1892*	*II*	*58*
Zweite Mittheilung. (Mit Taf. I.) A.	*94*	*I*	*171*
— *Flächenreiche Krystalle von Chlornatrium. B.*	*92*	*II*	*163*
— Ueber den Pseudobrookit vom Aranyer Berge in Siebenbürgen. R.	93	I	238
— *Ueber die Isomorphie von Sulfaten, Selenaten, Chromaten, Molybdaten und Wolframaten. (Mit 3 Fig.) A.*	*94*	*I*	*185*
— *Ueber die Doppelsalze des weinsauren Antimonoxyd-Bleis und -Baryums mit salpetersaurem Kalium. (Mit Taf. II und 5 Holzschnitten.) A.*	*94*	*I*	*245*
— *Ueber die künstliche Darstellung des Berylls. B.*	*94*	*I*	*275*
— *Eine einfache Verdunklungsvorrichtung für das Goniometer mit horizontalem Theilkreis. (Mit 2 Holzschnitten.) B.*	*94*	*II*	*92*
— Beiträge zur Mineralogie Schlesiens. R.	94	II	411
— *Ueber den Molybdän-Gehalt des Scheelits und die Trennung der Wolframsäure von der Molybdänsäure. A.*	*BB*	*VII*	*232*
— *Ueber die Krystallform des Milchzuckers. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*BB*	*VII*	*430*
— *Ueber die Krystallformen optisch einaxiger Substanzen, deren Lösungen ein optisches Drehungsvermögen besitzen. (Mit 4 Holzschnitten.) A.*	*BB*	*VIII*	*269*
Zweite Mittheilung. (Mit 6 Holzschnitten.) A.	*BB*	*VIII*	*510*
— *Ueber die Krystallform einiger weinsauren Salze. Erste Mittheilung. A.*	*BB*	*VIII*	*523*
Trautschold, H.: Ueber Coccosteus megalopteryx Trd., Coccosteus obtusus und Cheliophorus Verneuili Ag. R.	90	II	145
— Ueber Megalopteryx und Pelecyphorus. R.	94	I	382
Travaglia, R.: Contributo agli studii sulla genesi dei giacimenti di solfo. R.	92	II	74
Traxler, L.: Ueber einige vermeintliche Mineralquellen des Comitates Bereg. R.	92	I	530
Treadwell, F. P.: Ueber die Zusammensetzung des Milarites. B.	*92*	*I*	*167*
Trechmann, C. O.: Twins of Marcasite in Regular Disposition upon Cubes of Pyrites. R.	92	II	14
— Binnite from Imfeld in the Binnenthal. R.	94	II	220
Trottarelli, G.: Analisi chimica dell' aereolite caduto a Collescipoli presso Terni il 3 Febbraio 1890. R.	91	II	238
Tschan, Alfred: Recherches sur l'extrêmité antérieure des oiseaux et des reptiles. R.	91	I	145
Tschebull, A.: Kärnthens Stein- und Braunkohlenformation in nationalökonomischer Beziehung. R.	94	II	430
Tschermak, G.: Die Chloritgruppe. I. u. II. Theil. R.	92	II	218. 227
— Neue Chloritanalysen, ausgeführt im Laboratorium des Herrn Professors E. Ludwig. R.	92	II	227
Tscherne, Max: Bleiniere nach Bournonit von Litica in Bosnien. R.	93	I	248
— Meerschaum von Bosnien und Mähren. R.	94	I	442
Tschernyscheff, Th.: Orthoklas mit Gold. R.	91	II	10
— Notes sur le rapport des dépôts carbonifères russes avec ceus de l'Europe occidentale. R.	92	I	542
— Materialien zur Kenntniss der devonischen Fauna des Altais. R.	93	II	374

	Jahrg.	Bd.	Seite
Tschernyscheff, Th.: Arbeiten im Timangebiet 1889. Vorläufiger Bericht mit einer Karte der Reiserouten. R.	1894	I	323
— Arbeiten im Timangebiet 1890. Vorläufiger Bericht. R.	94	I	323
Tuccimei, G.: Il Villafranchiano nelle valli Sabine e i suoi fossili caratteristici. R.	92	I	553
Turner, H. W.: The Geology of Mount Diablo, California. With a Supplement on the Chemistry of the Mount Diablo Rocks by W. H. Melville. R.	93	I	99
— The Lavas of Mt. Ingalls, California. R.	94	I	79
— Glacial Potholes in California. R.	94	I	499
Tyrrell, J. B.: Notes to accompany a Preliminary Map of the Duck and Riding Mountains in north-western Manitoba. R.	91	II	89
— Gypsum Deposits in Northern Manitoba. R.	92	I	345
— Foraminifera and Radiolaria from the Cretaceous of Manitoba. R.	92	II	175
— Post-tertiary Deposits of Manitoba and the adjoining Territories of northwestern Canada. R.	92	II	319
— Pleistocene of the Winnipeg Basin. R.	92	II	319
— Three deep Wells in Manitoba. R.	93	I	334
— siehe Rüst, D.			
Tzebrikow, W.: Note sur le néocomien de la Crimée. R.	90	II	415

U.

Ubaghs, C.: Quelques considérations sur les dépôts crétacées de Maestricht dans leurs connexions avec les couches dites maestrichtiennes de Ciply. R.	90	I	310
— Considérations paléontologiques relatives au tufeau de Folx les caves. R.	90	I	311
— Quelques considérations sur l'age de la craie tufeau de Folx les caves. R.	90	I	311
— Le crâne de Chelone Hoffmanni. R.	91	II	346
Uhl, J.: Ueber eine eigenthümliche Säulenbildung im Tagbau des Braunsteinbergwerks in der Lindener Mark bei Giessen. R.	91	I	20
— Ueber Regentropfen ebendaselbst. R.	91	I	21
Uhlig, V.: Ueber neocome Fossilien von Gardenazza in Südtyrol. R.	90	I	305
— Ueber die Miocänbildungen in der Umgebung von Prerau in Mähren. R.	92	I	140
— Ueber F. Herbich's Neocomfauna aus dem Quellgebiete der Dombovicioara in Rumänien. R.	92	II	305
— Ueber einige Liasbrachiopoden aus der Provinz Belluno. R.	93	I	408
— Ergebnisse geologischer Aufnahmen in den westgalizischen Karpathen. — 1. Die Sandsteinzone zwischen dem pieninischen Klippenzuge und dem Nordrande. 2. Der pieninische Klippenzug. 3. Das Inselgebirge von Rauschenbach. R.	93	II	138
— Bemerkungen zum Kartenblatte Lundenburg-Göding. R.	94	I	153
— siehe Neumayr.			
Ule, W.: Die Tiefenverhältnisse der ostholsteinischen Seeen. R.	94	II	131
Ulrich, A.: Ueber zwei amerikanische Charakterformen im Devon Süd-Afrikas. B.	*91*	*I*	*273*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Ulrich, A., siehe Steinmann, G.			
Ulrich, E. O.: On some Polyzoa and Ostracoda from the Cambrosilurian Rocks of Manitoba. R.	1890	II	334
— New and little known American Paleozoic Ostracoda. R.	92	II	457
— New lower Silurian Ostracoda. No. 1. R.	94	II	164
— Beecherella, a new genus of lower Helderberg Ostracoda. R.	94	II	164
Ulrich, G. H. F.: On the Discovery, Mode of Occurrence and Distribution of the Nickel-iron Alloy Awaruite on the West Coast of the South Island, New Zealand. R.	92	I	317
Undeutsch: Eine Hypothese über die Erstarrung der Erde. R.	93	II	320
Upham, Warren: Marine Shells and Fragments of Shells in the Till near Boston. R.	91	I	137
— The Structure of Drumlins. R.	91	I	138
— On Quaternary Changes of Levels. R.	92	I	151
— Walden, Cochituate and other Lakes enclosed by modified Drift. R.	92	I	391
— Changes in the Currents of the Ice of the last glacial Epoch in eastern Minnesota. R.	92	II	318
— Conditions of Accumulation of Drumlins. R.	94	I	169
— Criteria of englacial and subglacial Drift. R.	94	I	498
— Estimates of Geologic Time. R.	94	II	241
Ussher, W. A. E.: The Devonian Rocks as described by DE LA BECHE, interpreted in Accordance with Recent Researches. R.	92	I	346
— The Devonian Rocks of South Devon. R.	92	II	98
— On Permian in Devonshire. R.	92	II	433
— The British Culm Measurs. R.	94	I	127
Ussing, N. V.: Ueber ein vermuthlich neues Mineral von Kangerdluarsuk. R.	90	I	25
— Untersuchungen der Mineralien von Fiskernäs in Grönland. R.	91	II	23
— Nogle Graensefaciesdannelser af Nefelinsyenit. R. . .	93	I	500
— siehe Sauer, A.			
Uthemann, A.: Die Braunkohlenlagerstätten am Meissner, am Hirschberg und am Stellberg, mit besonderer Berücksichtigung der Durchbruchs- und Contact-Einwirkungen, welche die Basalte auf die Braunkohlen ausgeübt haben. R.	93	II	164

V.

Vacca, G.: Sopra un notevole cristallo di vesuvianite. R.	94	I	443
Vaček, M.: Ueber die geologischen Verhältnisse des Semmeringgebietes. R.	90	I	269
— Ueber die krystallinische Umrandung des Grazer Beckens. R.	92	II	289
— Ueber die geologischen Verhältnisse des Rosaliengebirges. R.	93	I	112
— Ueber die geologischen Verhältnisse des Grazer Beckens. R.	93	I	335
— Schöckelkalk und Semriacher Schiefer. R.	93	I	336
— Ueber die krystallinischen Inseln am Ostende der alpinen Centralzone. R.	94	II	92
Vaillant: Sur la possibilité du transport des galets dans l'appareil digestif des poissons. R. . . 1894 II 117	94	II	137

	Jahrg.	Bd.	Seite
Valentin, J.: Ueber Baryt aus dem Kronthal im Elsass; natürliche und künstliche Aetzfiguren. R. . . .	1890	I	31
— Die Geologie des Kronthales im Elsass und seiner Umgebung. R.	92	II	88
Vallée-Poussin, C. de la: Notes sur les rapports des étages tournaisien et viséen de M. E. Dupont avec son étage waulsortien. R.	94	I	479
Vallot, J. et A. Delebecque: Sur les causes de la catastrophe survenue à St. Gervais. R.	94	I	285
Varges, W.: Der Lauf der Elbe im norddeutschen Flachlande. Erster Theil. R.	91	II	333
Vasseur, G.: Sur l'existence de dépôts marins pliocènes en Vendée. R.	91	I	120
— Contribution à l'étude des terrains tertiaires du sud-ouest de la France. R.	91	II	329
— Sur les formations infra-tongriennes du bassin de la Gironde. R.	94	II	453
Vasseur et Carez: Sur une nouvelle carte géologique de France au 1 : 500 000. R.	90	II	77
Vater, H.: Section Grossenhain-Priestewitz. Blatt 33. R.	93	I	93
— Ueber den Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystallisation des Calciumcarbonates. Theil I. R. . .	94	II	5
— Dasselbe. II. Theil. Krystallisation des Calciumcarbonates aus sogenannten verdünnten Lösungen. R. . .	94	II	6
Vélain, Ch.: Conférences de pétrographie. 1. fascicule. R.	92	I	61
Venator, M.: Deutsch-spanisch-französisch-englisches Wörterbuch der Berg- und Hüttenkunde, sowie deren Hilfswissenschaften. R.	94	II	393
Venukoff: De la formation du delta de la Néva. R. . .	91	I	267
Verbeek, R. D. M.: Vorläufiger Bericht über Nummuliten, Orbitoiden und Alveolinen von Java und über das Alter der Gesteine, in welchen sie vorkommen. B. .	*92*	*I*	*65*
Vernadsky, Wl.: Note sur l'influence de la haute température sur le disthène. R.	91	I	210
— Ein Beitrag zur Kenntniss des hexagonalen Krystallsystems. R.	91	II	401
— Ueber die Gruppe des Sillimanits und die Rolle der Thonerde in den Silicaten. R.	94	I	44
— Ueber den Polymorphismus als allgemeine Eigenschaft der Materie. R.	94	II	216
Verri, Antonio: Osservazioni geologiche sui crateri Vulsinii. R.	91	I	269
— I tufi vulcanici da costruzione della campagna di Roma. R.	93	I	281
— Note per la storia del Vulcano Laziale. R.	93	II	491
— Le friganea nei tufi dell' Italia centrale. R. 1893 II 550	94	II	166
Verrier, Urban le: Sur une venue de granulite à riebeckite de Corse. R.	90	II	189
Vesterberg, A.: Till frågan om Gotlands postglaciala nivåförändringar. R.	90	I	326
Viguier: Sur l'oligocène du bassin de Narbonne. R. . .	90	II	113
— Etude sur le pliocène de Montpellier. R.	90	II	307
— Monoceros et Parmacella du pliocène de Montpellier d'après P. Gervais. R.	91	I	432
Villot: Sur le classement des alluvions anciennes et le creusement des vallées du bassin du Rhône. R. . .	90	I	328
Vinassa de Regny, P. E.: I Molluschi dei terreni terziari delle Alpi Venete (Nota preventiva). R. . . .	94	I	492

	Jahrg.	Bd.	Seite
Vincent, E.: Procès verbal de la Société R. Malacol. de Belgique 1888. R.	1890	II	357
— Observations sur des fossiles recueillis à Anvers. R.	92	I	434
— Note sur quelques coupes visibles sur la planchette de Saventhem. R.	92	I	551
— Contributions à la paléontologie de l'éocène belge. Pholadidae. R.	93	II	551
— Description d'une nouvelle espèce de Pholadidae des environs d'Anvers. R.	93	II	555
— Observations sur les brachiopodes des sables blancs d'Assche. R.	93	II	557
— Acquisitions à la faune des sables de Wemmel des environs de Bruxelles. R.	93	II	557
— Sur la présence de pennatuliens dans l'éocène belge. R.	93	II	559
— Observations sur Gilbertia inopinata Mor. R.	94	I	387
— Observations sur les Glycimeris landeniens et sur la nomenclature de G. intermedia Sow. R.	94	I	388
— siehe Raymaekers, D.			
Vincent, G.: Documents rélatifs aux sables pliocènes à Chrysodomus contraria d'Anvers. R. 1890 II 113	92	II	309
— Observations relatives à l'âge diestien accordé aux sables ferrugineux des collines des Flandres. R.	92	II	112
— Note sur le Volutopsis norvegica, fossile du crag d'Anvers et remarques sur l'Acanthina tetragona Sow. d'Anvers. R.	92	II	362
Vincent, G. et J. Couturieaux: Quelques mots sur l'âge Ypresien accordé par M. Velge aux sables calcarifères entre la Dyle et la Sennette. R.	92	II	112
— — Sur les dépôts de l'éocène moyen et supérieur entre la Dyle et le chemin de fer de Nivelles à Bruxelles. R.	92	II	308
Vincentini, G.: Cenno sui terremoti manifestatisi sul territorio senese il giorno 30 Novembre 1890. R.	92	II	47
Vine, George Robert: A Monograph of the Polyzoa (Bryozoa) of the Red Chalk of Hunstanton. R.	91	II	369
Viola, C.: Nota preliminare sulla regione dei gabbri e delle serpentine nell' alta valle del Sinni in Basilicata. R.	93	I	279
— Communicazione preliminare sopra un terreno cristallino in Basilicata. R.	93	II	513
— Appunti geologici sulla regione miocenica di Stigliano. R.	94	II	127
Virgilio, F.: Il permo-carbonifero di Valle Stretta (Alte Valle della Dora Riparia). R.	93	II	523
Vogdes, Anthony W.: A Catalogue of North American palaeozoic Crustacea confined to the non-trilobitic genera and species. R.	91	I	153
— A Bibliography of the Palaeozoic Crustacea from 1698 to 1889 including a list of North American Species and a systematic Arrangement of Genera. R.	92	I	169
— Notes on palaeozoic Crustacea. No. 3. On the genus Ampyx, with descriptions of North American Species. R.	94	I	189
— siehe Safford, J. M.			
Vogdt, Constantin von: Ueber tertiäre Ablagerungen der südwestlichen Krim. R.	90	I	125
— Ueber die Obereocän- und Oligocänschichten der Halbinsel Krim. R.	90	II	121
— Mittheilung über den geologischen Bau des Eupatorischen Plateau auf der Halbinsel Krim. R.	90	II	122

	Jahrg.	Bd.	Seite
Vogel, Chr.: Die Quarzporphyre der Umgegend von Grossumstadt. R.	1892	I	281
— siehe Chelius, C.			
Vogel, Friedrich: Das Obersenon von Irnich am Nordrande der Eifel. R.	93	I	128
Vogel, H., siehe Bauer, H.			
Vogel, J. H.: Ueber die chemische Zusammensetzung des Vesuvians. R.	90	II	31
Vogelsang, K.: Beiträge zur Kenntniss der Trachyt- und Basaltgesteine der Hohen Eifel. R.	91	II	65
Vogt, G.: De la composition des roches employées dans la fabrication de la porcelaine en Chine. R.	91	I	267
Vogt, J. H. L.: Einige Bemerkungen über die Zusammensetzung der krystallisirten Schlacken. R.	90	I	243
— Beiträge zur Kenntniss der Gesetze der Mineralbildung in Schmelzmassen und in den neovulcanischen Ergussgesteinen (jüngeren Eruptivgesteinen). R. 1892 I 88	94	I	95
— *Ueber die Zusammensetzung der Melilithmineralien. B.*	*92*	*II*	*73*
— Om dannelsen af de vigtigste i Norge og Sverige representerede grupper af jernmalmforekomster. R.	93	II	68
— De canadiske forekomster af nikkelholdig magnetkis. R.	93	II	72
— Jernnikkelkis fra Beiern i Nordland. R.	93	II	72
— Om verdens nikkelproduktion og om konkurance-betingelserne mellem de norske og de udenlandske nikkelforekomster. R.	93	II	72
Voigt, W.: Bestimmung der Elasticitätsconstanten von Kalkspath. Unter Benutzung der Biegungsbeobachtungen G. Baumgarten's. R.	92	I	2
— Einige Bemerkungen über die Gleitflächen des Kalkspaths. R.	92	I	2
— Ueber die Beziehung zwischen den beiden Elasticitätsconstanten isotroper Körper. R.	92	I	2
— Ueber die elastische Symmetrie des Dolomit. R.	92	I	2
— Bestimmung der Elasticitätsconstanten des brasilianischen Turmalines. R.	92	1	2
— Ueber die innere Reibung der festen Körper, insbesondere der Krystalle. R.	92	I	2
— Einige Berichtigungen zu den von mir mitgetheilten Werthen der Elasticitätsconstanten verschiedener Krystalle und dichter Mineralien. R.	92	I	3
— Allgemeine Theorie der piëzo- und pyroelektrischen Erscheinungen an Krystallen. R.	92	I	215
— Zur Theorie des Lichtes. R.	93	II	4
Voigt, W. und P. Drude: Bestimmung der Elasticitätsconstanten einiger dichter Mineralien. 1. Reihe. 2. Reihe. R.	92	I	2
Volkmann, P.: Einfache Ableitung des Green'schen Ausdrucks für das Potential des Lichtäthers. R.	91	I	197
— Beiträge zur Werthschätzung der Königsberger Erdthermometer-Station 1872—1892. R.	94	II	37
Vrba, Karl: Mineralogische Notizen. R. . 1890 II 55	91	I	24
— Die Krystallform des Tellurdioxyd und des basischen Tellursulfates. R.	93	I	264

W.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Waagen, W.: Salt-Range Fossils. Vol. IV. 1. 2. Geological Results. R.	1893	II	111
— Vorläufige Mittheilung über die Ablagerungen der Trias in der Saltrange (Punjab). R.	94	I	136
Wabner, R.: Ueber das Verhältniss des oberschlesisch-polnischen Steinkohlenbeckens zu den Sudeten und dem böhmisch-mährischen Urgebirgsstocke und zu den Karpathen mit Rücksicht auf die neueren Forschungen und Erfahrungen in der dynamischen Geognosie. R.	94	I	93
Wada, T.: Der Ausbruch des Bandai-San im Juli 1888. R.	90	II	100
Wadsworth, M. E.: Preliminary Description of the Peridotites, Gabbros, Diabases and Andesites of Minnesota. R.	93	I	292
— The South Trap Range of the Keweenawan Series. R. 1893 I 501	94	I	329
— A Sketch of the Geology of the Iron, Gold and Copper Districts of Michigan. R.	94	I	471
Wähner, F.: Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. VI. Theil. R.	92	II	362
Wagner, Richard: Ueber einige Cephalopoden aus dem Röth und unteren Muschelkalk von Jena. R.	90	I	357
— Ueber einige Versteinerungen des unteren Muschelkalks von Jena. R.	94	II	140
Wahnschaffe, F.: Zur Frage der Oberflächengestaltung im Gebiete der baltischen Seenplatte. R.	90	I	317
— Die Bedeutung des baltischen Höhenrückens für die Eiszeit. R. 1890 I 321	90	II	424
— Beitrag zur Lössfrage. R.	91	II	446
— Bemerkungen zu dem Funde eines Geschiebes mit Pentamerus borealis bei Storchberg. R.	91	II	447
— Die Ursachen der Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes. R.	93	I	105
— Ueber einen Grandrücken bei Lubasz. R.	94	II	132
— Bericht über den von der geologischen Gesellschaft in Lille veranstalteten Ausflug in das Quartärgebiet des nördlichen Frankreich und südlichen Belgien. R.	94	II	457
— siehe Berendt, G.			
— siehe Credner, H.			
— siehe Salisbury.			
Waitz, K., siehe Braun, F.			
Walcott, Charles D. V.: Descriptive Notes of new genera and species from the Lower Cambrian or Olenellus-Zone of North-America. R.	91	I	334
— *Auffindung von Fischresten im Untersilur. B.*	*91*	*I*	*284*
— Cambrian Fossils from Mount Stephens, Northwest Territory of Canada. R.	91	II	112
— Stratigraphic Position of the Olenellus-Fauna in North America and Europe. R.	91	II	112
— The Value of the Therm „Hudson River Group“ in geological Nomenclature. R.	92	II	296
— The Fauna of the lower Cambrian or Olenellus-Zone. R.	92	II	328
— Notes on the Cambrian Rocks of Virginia and the southern Appalachians. R.	94	I	333

	Jahrg.	Bd.	Seite
Walcott, Charles D. V.: Notes on the Cambrian Rocks of Pennsylvania and Maryland, from the Susquehanna to the Potomac. R.	1894	I	333
— Description of new Forms of Upper Cambrian Fossils. R.	94	I	373
Wald, F.: Ein Beitrag zur Theorie der Krystallisation. R.	91	I	369
Walford, Edwin A.: On some Bryozoa from the Inferior Oolite of Shipton Gorge, Dorset. R.	92	I	590
Walker, J. F.: On Liassic Sections near Bridport, Dorsetshire. R.	93	I	518
— On Yorkshire Thecidea. R.	93	I	556
— The Discovery of Terebratulina substriata Schloth. in Yorkshire. R.	93	I	556
— On the Brachiopoda recently discovered in the Yorkshire Oolites. R.	93	II	557
— siehe Buckman, J.			
Wallace, siehe Smith, Edgar, F.			
Waller, E. and A. J. Moses: Mineralogical Notes. A probably new Nickel Arsenide. R.	94	I	17
Wallerant, F.: Sur l'éruption actuelle de l'Etna. R.	94	I	280
— Sur l'âge des plus anciennes éruptions de l'Etna. R.	94	II	416
Walter, B.: Genaue Werthe der Brechungsexponenten des Wassers. R.	93	II	16
Walther, Johannes: Ueber Graphitgänge im zersetzten Gneiss (Laterit) von Ceylon. R.	90	II	277
— Ueber die Geologie von Capri. R.	91	II	126
— Die Korallenriffe der Sinaihalbinsel. R.	91	II	448
— Die Denudation in der Wüste und ihre geologische Bedeutung. Untersuchungen über die Bildung der Sedimente in den ägyptischen Wüsten. R.	92	I	58
— Ueber eine Kohlenkalkfauna aus der ägyptisch-arabischen Wüste. R.	93	II	520
— Die nordamerikanischen Wüsten. R.	94	I	66
— Allgemeine Meereskunde. R.	94	I	452
Ward, Lester F.: Remarks on an undescribed Vegetable Organism from the Fort Union Group of Montana. R.	90	I	180
— The Paleontologic History of the genus Platanus. R.	90	I	180
— Synopsis of the Flora of the Laramie Group. R.	90	I	278
— Types of the Laramie Flora. R.	93	II	219
— The Geographical Distribution of Fossil Plants. R.	94	I	526
Ward, H. A.: Preliminary Note of a new Meteorite from Japan. R.	94	I	273
Warren: H. N.: Detection and Estimation of Selenium in Meteoric Iron. R.	90	II	229
Washington, H. S., siehe Hidden, W. E.			
— siehe Hillebrand, W. F.			
Waters, Arthur Wm.: North-Italian Bryozoa. R.	94	I	519
Weber, C.: Ueber zwei Torflager im Bette des Nord-Ostsee-Canales bei Grünenthal. (Mit 1 Holzschn.) A.	*91*	*II*	*62*
— *Ueber das Diluvium bei Grünenthal in Holstein. B.*	*91*	*II*	*228*
— *Ueber Cratopleura holsatica, eine interglaciale Nymphaeacee, und ihre Beziehungen zu Holopleura Victoria Casp. sowie zu recenten Nymphaeaceen. (Mit Taf. IV, V u. 1. Holzschn.) A.*	*92*	*I*	*114*
— *Vorläufige Mittheilung über neue Beobachtungen an den interglacialen Torflagern des westlichen Holsteins. B.*	*93*	*I*	*94*

	Jahrg.	Bd.	Seite
Weber, E.: Die „Weissenberger Gneisse" sind contactmetamorphische Gesteine der nordsächsischen Grauwackenformation. B.	*1891*	*I*	*211*
— Section Königsbrück. Blatt 35. R.	92	I	534
— Section Radeberg. Blatt 51. R.	92	I	535
— Section Kamenz. Blatt 36. R.	92	II	82
— Section Strassgräbchen. Blatt 21. R.	94	II	288
Wedding, W.: Die magnetische Drehung der Polarisationsebene bei wachsender Doppelbrechung in dilatirtem Glas. R.	91	I	195
Wedel, R.: Ueber das Doleritgebiet der Breitfirst und ihre Nachbarschaft. R.	92	I	278
Weed: Walter H.: On the Formation of Siliceous Sinter by the Vegetation of Thermal Springs. R.	91	II	94
— The Diatom Marshes and Diatom Beds of the Yellowstone National Park. R.	91	II	94
— Formation of Travertine and Siliceous Sinter by the Vegetation of Hot Springs. R.	92	I	523
— A Gold-bearing Hot Spring Deposit. R. . 1894 I 14	94	I	87
— The Cinnabar and Bozeman Coal Field of Montana. R.	94	II	123
— Two Montana Coal Fields. R.	94	II	451
Weed, Walter H. and Louis V. Pirsson: Occurrence of Sulphur, Orpiment and Realgar in the Yellowstone National Park. R.	94	I	59
Weibull, Mats: Ueber krystallisirten Fluocerit von Oesterby in Dalarne. R.	93	I	232
— Notiz über die Krystallform des Fluocerits. R.	93	II	14
— Ueber die Krystallform und Zusammensetzung der Arsenkiese. R.	94	II	399
Weigmann, H.: Untersuchung von Magneteisen. R.	93	II	17
Weinschenk, E.: Ueber die Umwandlung des Quarzes in Speckstein. R.	90	II	43
— Ueber einige Bestandtheile des Meteoreisens von Magura, Arva, Ungarn. R.	90	II	57
— Ueber eine Beryllpseudomorphose. R.	90	II	379
— Ueber Serpentine aus den östlichen Centralalpen und deren Contactbildungen. R.	92	I	105
— Beiträge zur Mineralsynthese. R.	92	I	19
— Ganggestein aus dem Habachthal, Oberpinzgau. R.	93	I	490
— Zur genauen Kenntniss der Phonolithe des Hegaus. R.	93	II	487
— *Beiträge zur Petrographie Japans. A.*	*BB VII*		*133*
— siehe Cohen, E.			
— siehe Cushing, H. P.			
— siehe Kunz, G. F.			
Weisbach, A.: Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittelst äusserer Kennzeichen. 4. Aufl.	93	I	226
— *Ueber den Argyrodit. B.*	*94*	*I*	*98*
Weis, L.: Lehrbuch der Mineralogie und Chemie in zwei Theilen für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium. R.	91	II	227
Weise, E. und M. Schröder: Section Oelsnitz-Bergen. Blatt 143. R.	92	II	79
Weiss, Ernst: Fragliche Lepidodendronreste im Rothliegenden und jüngeren Schichten. R.	90	I	173
— Beobachtungen an Sigillarien von Wettin und Umgegend. R.	91	II	383

	Jahrg.	Bd.	Seite
Weiss, Ernst: Drepanophycus spinaeformis Göpp., Sigillaria Brardi Germ., Odontopteris obtusa Brongn. R. .	1892	I	465
— Bemerkungen zu Dawson, devonische Pflanzen. R. . .	93	II	213
Weisz, P.: Der Bergbau in den siebenbürgischen Landestheilen. R.	92	II	72
Weithofer, K. A.: Tapir und Nautilus aus oberösterreichischen Tertiärablagerungen. R.	90	I	140
— Ueber die tertiären Landsäugethiere Italiens. R. . .	91	I	143
— Die fossilen Hyänen des Arnothales. R.	91	I	326
— Ueber Jura und Kreide aus dem nordwestlichen Persien. R.	92	I	133
— Die fossilen Proboscidier des Arnothales. R.	92	II	333
— Ueber Tithon und Neocom der Krim. R.	93	I	351
— siehe Rodler, A.			
Weithofer, K. A. und A. Rodler: Die Wiederkäuer der Fauna von Maragha. R.	92	I	405
Wells, Horace L.: Bismutosphaerite from Willimantic and Portland, Conn. R.	91	I	40
— Sperrylite, a new Mineral. R.	91	II	246
— Sperrylith, ein neues Mineral. R.	91	II	246
— On the Composition of Pollucite and its Occurrence at Hebron. Maine. R.	94	I	39
— siehe Brust, G. J.			
— siehe Dana, E. S.			
Wells, H. L. and S. L. Penfield: On Herderite from Hebron. R.	94	II	228
Welsch, Jules: Sur les terrains crétacés des environs de Tiaret et de Frenda. R.	90	II	112
— Sur un îlôt de terrain cristallophyllien, N. du Chenoua, Algérie. R.	91	II	298
— Découverte du jurassique moyen (dogger) sur les hauts plateaux d'Oran. R.	91	II	441
— Les terrains crétacés du Seressou occidental et de Lehou, département d'Oran, Algérie. R. . . 1891 II 443	93	I	522
— Sur les différentes étages pliocènes des environs d'Alger. R.	91	II	445
— Le terrain pliocène de la Vallée de l'oued Nador. R. .	92	I	372
— Les terrains jurassiques dans les environs de Tiaret, Frenda et Saïda (Département d'Oran, Algérie). R. .	92	II	304
— Sur le miocène dans les environs de Tiaret, dép. d'Oran, Algérie. R.	92	II	440
— Observation. R.	93	I	349
— Note sur les étages miocènes de l'Algérie occidentale. R.	94	I	364
Wendt, A. F.: The Potosi, Bolivia, Silver-District. R. .	92	II	76
Wenjukoff, P. N.: Sphärolith-Tachylit von Sichota, Alin im Ussuri-Gebiet. R.	90	I	54
— Basalte der Mongolei. R.	91	I	280
— Die eutaxitischen Gläser der Liparite. R.	91	I	281
— Sur les profondeurs de la Mer Noire. R.	91	II	448
— Etude sur la faune du calcaire carbonifère inférieur de la région du Bardoun, en Mongolie. R.	91	II	462
Wentzel, J.: Ueber die Beziehungen der Barrande'schen Etagen C, D, E zum britischen Silur. R.	94	I	118
Wermbter, H.: Der Gebirgsbau der Montagne de Lure. B.	*91*	*I*	*212*
— Der Gebirgsbau des Leinethals zwischen Greene und Banteln. (Mit Taf. IV. V.) A. . . . . BB		*VII*	*246*
Werveke, L. van: Ueber Pseudomorphosen von Buntsandstein nach Kalkspath in den Vogesen. R. . . .	90	I	18

	Jahrg.	Bd.	Seite
Werveke, L. van: Ueber das Pliocän des Unter-Elsass. R.	1893	I	528
— siehe Benecke, E. W.			
Wethered, Edw.: On Insoluble Residues obtained from the Carboniferous Limestone Series at Clifton. R. . . .	90	I	74
— On the Microscopic Structure of the Jurassic Pisolite. R.	91	I	89
— On the Occurrence of the Genus Girvanella in Oolitic Rocks, and Remarks on Oolitic Structure. R. . . .	92	I	598
— On the Inferior Oolite of the Cotteswold Hills. R. . .	92	II	265
— On the Microscopical Structure and Residues insoluble in Hydrochloric Acid, in the Devonian Limestones of South Devon. R.	94	I	300
— On the Microscopic Structure of the Wenlock limestone. R.	94	II	303
— On the Microscopic Structure and Residues insoluble in Hydrochloric Acid in the Devonian Limestones of South Devon. R.	94	II	303
Wettstein, R. v.: Die Omorika-Fichte, Picea Omorica (Panc.). Eine monographische Studie. R.	93	I	577
— Der Bernstein und die Bernsteinbäume. R.	93	I	577
Weule, K.: Beiträge zur Morphologie der Flachküsten. R.	93	I	65
Wheeler, H. A.: Plattnerite from Idaho. R.	93	I	237
— Notes on Ferro-Goslarite, a new Variety of Zinc Sulphate. R.	94	I	51
— siehe Luedeking, C.			
Wheeler, William Henry: Bars at the Mouths of Tidal Estuaries. R.	93	I	65
Whidborne, G. F.: A Monograph of the Devonian Fauna of the South of England. R. . . . . 1890 I 151	91	I	431
— The Fauna of the Limestones of Lummaton, Wolborough etc. R.	94	II	172
Whitaker, W.: Sites for Coal-search in the South-east of England. R.	91	II	121
White, Charles A.: On the Permian Formation of Texas. R.	90	I	98
— Contributions to the Paleontology of Brazil; comprising Descriptions of Cretaceous invertebrate Fossils mainly from the Provinces of Sergipe, Pernambuco, Para and Bahia. R.	90	I	358
— On the Age of the Coal, found in the Region traversed by the Rio grande. R.	90	I	447
— The lower Cretaceous of the South-West, and its Relations to the underlying and overling Formations. R. . .	90	II	417
— On the Geology and Physiography of a Portion of northwestern Colorado and adjacent Parts of Utah and Wyoming. R. . . . . 1892 I 333	92	II	288
— On the Inter-relation of contemporaneous fossil Faunas and Floras. R.	92	II	134
— On invertebrate Fossils from the pacific Coast. R. . .	92	II	154
— The Texas Permian and its mesozoic Types of Fossils. R.	92	II	298
— On the Bear River Formation, a Series of Strata hitherto known as the Bear River Laramie. R.	94	I	355
White, D.: On Cretaceous Plants from Martha's Vineyard. R.	93	II	564
White, J. C.: The Mannington Oil Field and the History of its Development. R.	94	I	472
Whiteaves, J. F.: Description of eight new species of Fossils from the Cambro-silurian Rocks of Manitoba. R.	90	II	147
— On some Fossils from the Hamilton Formation of Ontario. R.	90	II	147

	Jahrg.	Bd.	Seite
Whiteaves, J. F.: Illustrations of the fossil Fishes of the Devonian Rocks of Canada. Part I. R.	1890	II	437
— On some Cretaceous Fossils from British Columbia, the North West Territory and Manitoba. R.	91	I	158
— The Fossils of the Triassic Rocks of British Columbia. R.	91	II	170
— The Fossils of the Devonian Rocks of the Mackenzie River Basin. R.	92	I	347
— Descriptions of some new or previously unrecorded species of Fossils from the Devonian Rocks of Manitoba, Canada. R.	92	I	561
— The Orthoceratidae of the Trenton Limestone of the Winnipeg Basin. R.	93	I	179
— A new species of Panenka. R.	93	I	183
— Paucispiral opercula of Gasteropoda in the Guephformation. R.	93	I	183
— Description of four new species of Fossils from the Silurian Rocks of the southeastern Portion of the District of Saskatchewan. R.	93	I	380
— Note on the Ammonites of the Cretaceous Rocks of the District of Athabasca, with Description of four new species. R.	93	II	414
— Description of a new genus and species of Phyllocarid Crustacea from the Middle Cambrian of Mount Stephen B. C. R.	93	II	548
— Notes on the Gasteropoda of the Trenton Limestone of Manitoba. R.	93	II	554
— The Cretaceous System in Canada. R.	94	II	124
— Description of two new species of Ammonites from the Cretaceous Rocks of the Queen Charlotte Islands. R.	94	II	470
Whitfield, J. Edward: Analyses of some Natural Borates and Borosilicates. R.	91	I	42
— A new Meteorite from Mexico. R.	91	II	418
— Observations on some Cretaceous Fossils from the Beyrut District of Syria, in the Collection of the American Museum of Natural History, with Descriptions of some New Species. R.	94	I	189
— Gasteropoda and Cephalopoda of the Raritan Clays and Greensand Marls of New Jersey. R.	94	I	514
— siehe Gooch, Fr. Aug.			
Whitfield, R. P.: Observations on some Cretaceous Fossils from the Beyrut District of Syria, in the Collection of the American Museum of Natural History, with Descriptions of some new Species. R.	93	I	537
Whittle, C. L.: An Ottrelite bearing Phase of a Metamorphic Conglomerate in the Green Mountains. R.	94	II	95
— siehe Davis, W. M.			
Wibel, F.: Thonerdehydrophosphat (? Cöruleolactin) als pseudomorphe Nachbildung eines Gewebes oder Geflechtes. R.	90	I	209
Wichmann, Arthur: Ueber das angebliche Tertiär der Insel Adonara. B.	*92*	*I*	*61*
— *Ueber Glaukophan-Epidot-Glimmerschiefer von Celebes. B.*	*93*	*II*	*176*
— *Ueber das Vorkommen fossiler Hölzer im Feuerstein. B.*	*94*	*I*	*277*
— Bericht über eine im Jahre 1888—89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft aus-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
geführte Reise nach dem Indischen Archipel. I.—III. Theil. R.	1894	I	330
Wichmann, Arthur: Ueber den Ausbruch des Cunung Awu am 7. Juni 1892. R.	94	II	417
Widmann, O.: Mineralanalytische Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium in Upsala. R.	93	II	8
Wiener, O.: Gemeinsame Wirkung von Circularpolarisation und Doppelbrechung. R.	91	I	195
Wiesbaur, F.: Das Vorkommen von Pyropen um Krendorf bei Laun. R.	94	I	437
Wiesner, J.: Ueber den mikroskopischen Nachweis der Kohle in ihren verschiedenen Formen und über die Uebereinstimmung des Lungenpigmentes mit der Russkohle. R.	93	II	244
Wiet: Reprise d'activité du Vésuve. R.	92	I	56
Wigand, A.: Ueber die Trilobiten der silurischen Geschiebe in Mecklenburg. R.	90	I	150
Wiik, F. J.: Die finnischen Mineralien in der Sammlung der Universität Helsingfors. R.	91	II	250
— Ueber die Grundformen in den krystallisirten Mineralien und ihren genetischen Zusammenhang. R.	92	I	15
— Ueber die Molecularstructur der Krystalle. Ein Blick in das Innere der Krystalle. R.	92	I	15
— Universitetes i Helsingfors Mineralienkabinett; kort skildring af dess fordna och nuvarande tillstånd. R.	93	I	480
Wilkinson, C. S.: Description of the Balubula Caves, parish of Malongulli Co., Bathurst. R.	93	II	499
Will, W. und J. Pinnow: Chemische Untersuchung eines Meteoriten von Carcote (Chile). R.	91	I	50
Willett, H., siehe Etheridge jr., R.			
William, Henley, Dalland, Gilbert, Dennison, Harris: Correlation Papers, Neocene. R.	94	I	358
Williams jr., A.: Useful Minerals of the United States. R.	90	I	36
Williams, J. Francis: The Igneous Rocks of Arkansas. R.	93	II	339
— Eudialyte and Eucolite, from Magnet Cove, Arkansas. R.	93	II	471
Williams, George H.: The Gabbros and Diorites of the „Cortlandt Series". R.	90	I	86
— Contributions to the Geology of the Cortlandt Series near Peekskill, N. Y.: the Contact-Metamorphism produced in the adjoining Mica Schists and Limestones by the Massive Rocks of the Cortlandt Series. R.	90	I	88
— Contributions to the Mineralogy of Maryland. R.	90	II	228
— Note on some Remarkable Crystals of Pyroxene from Orange County, N. Y. R.	91	I	42
— The Non-Feldspathic Intrusive Rocks of Maryland and the Course of their Alteration. 1. Paper: The Original Rocks. R.	91	II	92
— Elements of Crystallography for Students of Chemistry, Physics and Mineralogy. R.	91	II	402
— Anglesite, Cerussite and Sulphur from the Mountain View Lead Mine near Union Bridge. R.	92	I	47
— The Greenstone Schist Areas of the Menominee and Marquette Regions of Michigan, a Contribution to the Subject of dynamic Metamorphism in eruptive Rocks, with an Introduction by R. D. Irving. R.	92	I	322
— The Petrography and Structure of the Piedmont Plateau in Maryland. R.	92	II	283

	Jahrg.	Bd.	Seite
Williams, George H.: Geology of the Crystalline Rocks of Baltimore. R.	1892	II	285
— On the Possibility of Hemihedrism in the Monocline Crystal System, with especial Reference to the Hemihedrism of Pyroxene. R.	93	I	238
— Notes on some Eruptive Rocks from Alaska. R.	93	I	505
— On the Hornblende of St. Lawrence County, N. Y., and its Gliding Planes. R.	93	II	24
— Celestite from Mineral County, West Virginia. R.	93	II	33
— Geological Map of Baltimore and Vicinity. R.	93	II	355
— Anatase from the Arvon Slate Quarries, Buckingham Co., Va. R.	94	I	18
— The Volcanic Rocks of South Mountain in Pennsylvania and Maryland. R.	94	I	76
— On the Use of the Terms Poikilitic and Mikropoikilitic in Petrography. R.	94	II	51
— A new Machine for Cutting and Grinding Thin Sections of Rocks and Minerals. R.	94	II	255
— Piedmontite and Scheelite from the Ancient Rhyolite of South Mountain, Pennsylvania. R.	94	II	262
Williams, G. H. and W. B. Clark: Outline of the Geology and Physical Features of Maryland. R.	94	II	72
Williams, Henry S.: The Cuboides-Zone and its Fauna. R.	91	I	115
— The Devonian System of North and South Devonshire. R.	92	II	97
Williams, W. S.: Geology as a Part of a College Curriculum. R.	93	II	280
Williamson, W. C.: On the Organisation of the fossil Plants of the Coal-measures. R. 1891 I 170	94	II	186 369, 372
Willis, Baley: Graphic Field Notes for Areal Geology. R.	93	I	99
Willis, B. and C. W. Hayes: Conditions of Appalachian Faulting. R.	94	II	243
Williston, S. W.: Structure of the Plesiosaurian Skull. R.	92	I	415
Wilson, E.: Fossil Types in the Bristol Museum. R.	92	I	394
Wilson, E. and W. D. Crick: The Lias Marlstone of Tilton, Leicestershire. With Paleontological Notes by E. Wilson. R.	91	II	320
Wiman, C.: Ueber das Silurgebiet des Bottnischen Meeres. R.	94	II	98
Winchell, A.: A Last Word with the Huronian. R.	93	II	126
— Some Results of Archean Studies. R.	93	II	515
Winchell, N. H.: Geological Survey of the State of Minnesota. Fifteenth Annual Report for the year 1886. R.	90	I	275
— The Geological and Natural History Survey of Minnesota. R.	92	II	282
— The Crystalline Rocks, some Preliminary Considerations as to their Structures and Origin. R.	94	II	51
— The Norian of the Northwest. R.	94	II	264
Winchell, H. V.: Geological Age of Saganaga Syenite. R.	94	II	94
Wincza, H.: Ueber ein transitorisches Rudiment einer knöchernen Clavicula bei Embryonen eines Ungulaten. R.	93	I	541
Winklehner, Hans: Neuere Forschungen über Kohle und Kohlenflötze. R.	90	I	255
— Ausströmungen natürlicher Kohlensäure in Süd-Persien. R.	93	II	86
— Salzvorkommen in Süd-Persien. R.	94	I	92
Winslow, Arthur: The Geotectonic and Physiographic Geology of Western Arkansas. R.	92	II	285
— An Illustration of the Flexibility of Limestone. R.	93	I	290

	Jahrg.	Bd.	Seite
Wisniowski, Th.: Einige Bemerkungen über die Technik der mikroskopischen Untersuchungsmethode der Hornsteine. R.	1890	II	242
— Nachricht über Feuersteinknollen aus dem Malm der Umgebung von Krakau. R.	90	II	341
— Beitrag zur Kenntniss der Mikrofauna aus den oberjurassischen Feuersteinknollen der Umgegend von Krakau. R.	90	II	341
— Mikrofauna aus den Ornaten-Thonen der Umgegend von Krakau. II. Theil. Die Spongien des oberen Callovien in Grojec nebst einem Supplement zur Foraminiferenfauna der Grojecer Ornaten-Thone. R.	92	I	596
— Einige Bemerkungen zu Dr. Rüst's Arbeiten: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien. R.	92	I	600
Wöhrmann, von: Ueber die untere Grenze des Keupers in den Alpen. R.	90	I	102
— Die Fauna der sogenannten Cardita- und Raibler Schichten in den nordtiroler und bayrischen Alpen. R.	90	I	102
— *Alpine und ausseralpine Trias. A.*	*94*	*II*	*1*
Wöhrmann, von, und Koken: Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlernplateau. R.	94	II	141
Wölfer: Bericht über einen Grandrücken bei dem Dorfe Krschywagura südlich Wreschen. R.	94	II	131, 456
Woitschach, G. siehe Hussak, E.			
Woldřich, Johann Nep.: Ueber Moldavite von Radomilie in Böhmen. R.	90	I	61
— Diluviale Funde in den Prachover Felsen bei Tičin in Böhmen. R.	90	I	460
— Die diluviale europäisch-nordasiatische Säugethierfauna und ihre Beziehungen zum Menschen. R.	90	II	428
Wolff, H.: Beiträge zur chemischen Kenntniss der basaltischen Gesteine des Knüllgebiets. R.	91	II	278
Wolff, J. E.: Ueber Theralit. B.	*90*	*I*	*192*
— On the lower Cambrian Age of the Stockbridge Limestone. R.	92	II	96
— Metamorphism of Clastic Feldspar in Conglomerate Schist. R.	93	I	293
— The Geology of the Crazy Mountains, Montana. R.	94	II	88
Wolff, J. E. and R. S. Tarr: Acmite Trachyte from the Crazy Mountains, Montana. R.	93	II	497
Wolfskron, Reichsritter von, Max: Lungaus alte Goldbergbaue. R.	93	II	80
Wollemann, A.: Ueber die Gliederung und Fauna der Diluvial-Ablagerungen im Dorf Thiede bei Braunschweig. R.	90	I	331
— Ueber eine Wundnarbe an einem Metatarsus des Riesenhirsches von Thiede. R.	90	I	459
— Ueber die Diluvialsteppe. R.	91	II	332
— Verzeichniss der im Eisenstein des Lias γ von Rottdorf am Kley bei Helmstedt bislang gefundenen Versteinerungen. R.	94	II	340
Woltersdorff, W.: Der Neustädter Hafen und seine Fauna. R.	93	II	393
— Mittheilung über die Entdeckung einer Meeresfauna in der Magdeburger Grauwacke. R.	94	II	101
Wood, Harrie: Annual Report of the Department of Mines, New South Wales. For the Years 1890—1892. R.	94	I	81

	Jahrg.	Bd.	Seite
Wood, Harrie: A Note on the Cretaceous of Northwestern Montana. R.	1894	II	123
Wood jr.: R. W.: The Effects of Pressure on Ice. R.	94	I	97
Woods, H.: Catalogue of the Type Fossils in the Woodwardian Museum, Cambridge, with a Preface by T. Mc Kenny Unghes. R.	93	I	146
Woodward, A. Smith: A Comparison of the cretaceous Fish-fauna of Mount Lebanon with that of the English Chalk. R.	90	I	147
— Occurrence of a Tooth of the blue Shark (Carcharias glaucus) in the Brick-earth of Crayford, Kent. R.	90	I	147
— On the cretaceous Selachian genus Synechodus. R.	90	I	147
— Palaeichthyological Notes. R. 1890 I 148	91	II	456
— Note on an Abnormal Specimen of the Dentition of Rhinoptera. R.	90	II	145
— Synopsis of the cretaceous Foraminifera of New Jersey. Part I. Review of previous Investigations. R.	90	II	447
— Preliminary List of the Foraminifera from the postpliocene Sand at Santa Barbara, California. R.	90	II	447
— Note on the foraminiferal Fauna of the miocene Bed at Petersburg Virginia; with List of the species found. R.	90	II	447
— On the Myriacanthidae — an Extinct Family of Chimaeroid Fishes. R.	91	I	429
— Acanthodian Fishes from the Devonian of Canada. R.	91	I	429
— On the so-called Cretaceous Lizard, Raphiosaurus. R.	91	I	429
— On the Fossil Fish-spines named Coelorhynchus Agassiz. R.	91	II	455
— Preliminary Notes on some new and little-known British Jurassic Fishes. R.	91	II	455
— On Atherstonia, a new Genus of Palaeoniscid Fishes from the Karroo Formation of South Africa; and on a Tooth of Ceratodus from the Stormberg Beds of the Orange Free State. R.	91	II	455
— Note on the Occurrence of a Species of Onychodus in the Lower Old Red Sandstone Passage Beds of Ledbury, Herefordshire. R.	91	II	456
— On the Occurrence of the Devonian Genus Onychodus in Spitzbergen. R.	91	II	456
— On the Tooth of a Carboniferous Dipnoan Fish: Ctenodus interruptus. R.	91	II	457
— On two Groups of Teeth of the Cretaceous Selachian Fish Ptychodus. R.	91	II	457
— On Sclerorhynchus atavus. R.	91	II	457
— Note on Rhinobatus Bugesiacus — a Selachian Fish from the Lithographic Stone. R.	91	II	457
— Catalogue of the Fossil Fishes in the British Museum (Nat. Hist.).			
Part I. Elasmobranchii. R.	92	I	167
Part II. R.	92	II	356
— On the Paleontology of Sturgeons. R.	92	I	419
— On a Microsaurian (Hylonomus Wildi n. sp.) from the Lancashire Coal-Field. R.	92	II	356
— Note on the Occurrence of the Saiga Antelope in the pleistocene Deposits of the Thames Valley. R.	92	II	450
— Notes on some Ganoid Fishes from the English Lower Lias. R.	92	II	456
— Evidence of the Occurrence of Pterosaurians and Plesio-			

	Jahrg.	Bd.	Seite
saurians in the Cretaceous of Brazil, discovered by Joseph Mawson. R.	1893	I	163
Woodward, A. Smith: Evidence of a fossil Tunny from the Coralline Crag. R.	93	I	173
— On some upper cretaceous Fishes of the Family of Aspidorhynchidae. R.	93	I	173
— On some new Fishes from the english Wealden and Purbeck Beds, referable to the genera Oligopleurus, Strobilodus and Mesodon. R.	93	I	174
— The Devonian Fishfauna of Spitzbergen. R.	93	I	177
— A new Theory of Pterichthys. R.	93	I	399
— Note on some Dermal Plates of Homosteus from the Old Red Sandstone of Caithness. R.	93	I	550
— On the Skeleton of a Chimaeroid Fish (Ishyodus) from the Oxford Clay of Christian Malford, Wiltshire. R.	93	II	408
— The Fore-runners of the Backboned Animals. R.	93	II	546
— Supplementary Observations on some fossil Fishes of the english lower Oolites. R.	93	II	546
— On the Lower Devonian Fish-Fauna of Campbellton, New Brunswick. R.	93	II	547
— On some Teeth of new Chimaeroid Fishes from the Oxford and Kimmeridge Clays of England. R.	93	II	547
— On a mammalian Tooth from the Wealden Formation of Hastings. R.	94	I	182
— Note on a Tooth of an extinct Alligator (Bottosaurus belgicus sp. n.) from the Lower Danian of Ciply, Belgium. R.	94	I	183
— Description of the Skull of Pisodus Oweni, on Albula-like Fish of the eocene period. R.	94	I	186
— Note on a Case of Subdivision of the Median Fin in a Dipnoan Fish. R.	94	I	187
— The Hybodont and cestraciont Sharks of the cretaceous Period. R.	94	I	187
— On some Teeth of new Chimaeroid Fishes from the Oxford and Kimmeridge Clays of England. R.	94	I	382
— Pseudotrionyx from the Bracklesham Beds. R.	94	I	509
— Pholidophorus germanicus, an Addition to the Fish Fauna of the upper Lias of Whitby. R.	94	I	512
— Doubly-armoured Herrings. R.	94	I	512
— The fossil Fishes of the Hawkesbury Series at Gosford. R.	94	II	161
— Further Contributions to Knowledge of the Devonian Fish-Fauna of Canada. R.	94	II	350
Woodward, A. Smith and Ch. Davies Sherborn: A Catalogue of British Fossil Vertebrata. R.	91	I	139
Woodward, H.: On Eryon antiquus Broderip from the lower Lias, Lyme Regis, Dorset. R.	90	I	149
— On a new species of Aeger from the lower Lias of Wilmcote, Warwickshire. R.	90	I	150
— On the Discovery of the Larval Stage of a Cockroach, Etoblattina Peachii (H. Woodw.) from the Coal-measures of Kilmaurs, Ayrshire. R.	90	II	330
— On a new british Isopod (Cyclosphaeroma trilobatum) from the Great Oolite of Northampton. R.	92	I	421
— On the Discovery of Turrilepas in the Utica Formation (Ordovician) of Ottawa. R.	92	I	423
— Remarks on the Formation of Landscap-Marble. R.	93	I	287

	Jahrg.	Bd.	Seite
Woodward, H.: Note on a new British species of Cyclus from the Coal Measures of Bacup, Lancashire. R.	1894	II	165
— On a Neuropterous Insect from the Lower Lias, Barrow on Soar, Leicestershire. R.	94	II	165
— siehe Jones, T. R.			
— siehe Etheridge.			
Woodward, R. S.: On the Form and Position of the Sea Level. R.	91	I	245
— Latitudes and Longitudes of Certain Points in Missouri, Kansas and New Mexico. R.	91	I	246
— Formulas and Tables to facilitate the Construction and Use of Maps. R.	91	I	247
— The Mathematical Theories of the Earth. R.	92	I	54
Woolman, Lewis: Marine and Fresh Water Diatoms and Spongespicules from the Delaware River Clays of Philadelphia. R.	93	I	422
Worth, R. N.: The Elvans and Volcanic Rocks of Dartmoor. R.	90	II	91
— On the Volcanic Rocks of Dartmoor. R.	91	I	93
— On the Igneous Constituents of the Triassic Breccias and Conglomerates of South Devon. R.	91	I	93
Wrangel, F. und N. Andrussow: Die Expedition für Tiefenmessungen des Schwarzen Meeres im Jahre 1890. R.	92	II	60
Wright, G. F.: The Ice Age in North America and its Bearings upon the Antiquity of Man. R.	92	II	440
— Unity of the glacial Epoch. R.	94	I	368
Wülfing, Ernst Anton: Berechnung der chemischen Formel der Turmaline nach den Analysen von R. B. Riggs. R.	90	II	193
— Ueber einen Apparat zur Herstellung von Krystallschliffen in orientirter Lage. R.	91	II	401
— Beiträge zur Kenntniss der Pyroxenfamilie in chemischer und optischer Hinsicht. R.	92	II	23
— *Beiträge zur Kenntniss des Kryokonit. (Mit 1 Holzschnitt.) A.*	*BB*	*VII*	*152*
Wulff, G.: Optische Studien an pseudosymmetrischen Krystallen. R.	92	II	207
— Eine Methode, die ebenen Winkel mit dem Mikroskop zu messen. R.	93	I	228
— Ueber die Vertauschung der Ebene der stereographischen Projection und deren Anwendungen. R.	94	I	431
— Ueber die Vereinfachung der krystallographischen Rechnungen. R.	94	II	209
— Beschaffenheit einiger pseudosymmetrischer Krystalle mit Beziehung auf die Theorie von der krystallinischen Beschaffenheit der Materie. R.	94	II	217
Wulff, L.: Beiträge zur Krystallstructurtheorie. R.	93	I	1
— Mittheilungen zur Kenntniss der regulär krystallisirenden Substanzen. R.	94	II	394
Wyroubоff, G.: Recherches sur le polymorphisme et la pseudosymétrie. R.	92	I	16
— Sur un nouveau miscroscope propre aux observations à haute température. R.	94	I	6
— Recherches sur le polymorphisme et la pseudosymétrie (Suite). R.	94	I	8
— Sur la forme cristalline des metatungstates. R.	94	I	10

Jahrg. Bd. Seite

Y.

Yamagawa, Kenjiro: Determination of the Thermal Conductivity of Marble. R. . . . . 1892 II 43
Yeates, W. S.: Pseudomorphs of Native Copper after Azurite, from Grant County, New Mexico. R. . . . . 93 I 460
— Plattnerite, and its Occurrence near Mullan, Idaho. With crystallographic Notes; by Edward F. Ayres. R. 94 II 22
Yokoyama, Matajiro: Jurassic Plants from Kaga, Hida, and Echizen. R. . . . . 91 I 175
— Versteinerungen aus der japanischen Kreide. R. . . . 91 II 172
— On some Cretaceous Fossils from Shikoku. R. . . . 93 I 554
Young, J.: On the Structure of Fistulipora incrustans Phill. R. . . . . 90 I 475

Z.

Zaccagna, D.: Riassunto di osservazioni geologiche fatte sul versante occidentale delle Alpi Graie. R. . . . 94 II 291
Zache, E.: Ueber den Verlauf und die Herausbildung der diluvialen Moräne in den Ländern Teltow und Barnim-Lebus. R. . . . . 92 I 145
— Geognostische Skizze des Berliner Untergrundes. R. . 94 II 73
Zahálka, C.: O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí litomeřickomelnickém. R. . . . . 92 II 306
— O bludivych valounech a o gagatu ve smloném uhlí od Proboštova v Česk. Středohoří. R. . . . . 93 II 388
— Die Kreideformation bei Milleschau im böhmischen Mittelgebirge. R. . . . . 93 II 531
— Stratigraphie des Kreidesystemes in der Umgebung des Georgsberges. R. . . . . 94 I 488
— O slepenci Mlčechvostském· R. . . . . 94 II 133
— O třech nejstarších pásmech křidového útvaru v okolí Ripu. R. 94 II 317
— Pásmo VI. — Vehlovické. (Die VI. Wehlowitzer-Zone.) R. 94 II 317
— Pásmo VII. — Malnické. (Die VII. Malnitzer-Zone.) R. 94 II 317
— Geotektonika křidového útvaru v okolí Ripu. R. . . . 94 II 317
— Petrografická studia v křid. út. ok. Ripu. R. . . . . 94 II 317
Zakrzevski, J. von: Ueber das specifische Gewicht und die Schmelzwärme des Eises. R. . . . . 94 I 287
Zaloziecki, R.: Bemerkungen zur Abhandlung von H. Kast und L. Seidner: Zur Bildung des Erdwachses. R. . 93 II 85
Zareczny, St.: Ueber das Krakauer Devon. R. . . . . 92 I 117
Zeiller, R.: Sur la présence dans le grès bigarré des Vosges de l'Acrostichites rhombifolius Fontaine. R. . . . 90 I 475
— Note sur la flore des lignites de Simeyroles. R. . . . 90 I 476
— Note sur les végétaux fossiles recueillis par MM. Arnaud et Mouret dans les calcaires d'eau douce subordonnés aux lignites de Simeyrols. R. . . . . 92 I 466
— Flore de Commentry, II. Part. R. . . . . 92 I 464
— Sur la constitution des épis de fructification du Sphenophyllum cuneifolium. R. . . . . 93 I 573
— Sur la variations des formes du Sigillaria Brardi Brongniart. R. . . . . 93 II 213
— Bassin houiller et permien d'Autun et d'Épinac. Fasc. II. Flore fossile. I. Part. Fougères. R. . . . . 93 II 214

	Jahrg.	Bd.	Seite
Zeiller, R.: La géologie et la paléontologie du bassin houiller du Gard, de M. Grand'Eury. R. . . .	1894	I	214
— Sur la valeur du genre Trizygia. R.	94	II	480
— siehe Renault, B.			
Zeise, O.: Beitrag zur Kenntniss der Ausbreitung, sowie besonders der Bewegungsrichtungen des nordeuropäischen Inlandeises in diluvialer Zeit. R.	90	I	322
— Beitrag zur Geologie der nordfriesischen Inseln. R. .	92	I	146
Zeller, H. R.: Die Schneegrenze im Triftgebiet. R. . .	94	II	48
Zemiatschensky, P.: Die mineralogische Natur und die Entstehung des Palygorskit. R.	93	I	33
— Ueber einige Contacterscheinungen der Krystallisation. R.	94	I	3
Zepharovich, V. v.: Mineralogische Notizen. No. XI. R.	91	I	374
— Ueber Vicinalflächen an Adularzwillingen nach dem Baveno-Gesetze. R.	91	II	231
— Mineralogisches Lexikon für das Kaiserthum Oesterreich. Bd. III. Enthaltend die Nachträge aus den Jahren 1874—1891 und die Generalregister. Nach des Autors hinterlassenem Manuscript bearbeitet von F. Becke. R.	94	I	2
Zeynek, R.: Saure Erde aus Persien. R.	92	I	310
Zezi, P.: The Travertine and the Acque Albule in the Neighbourhood of Tivoli. R.	92	II	51
Zigno, A. de: Chelonii scoperti nei terreni cenozoici delle Prealpi Venete. R.	91	II	156
Zimanyi, Karl: Krystallographische Untersuchungen des Baryts und Cölestins vom Dobogóberge. R.	90	II	25
— Mineralogische Mittheilungen. R. . . . 1893 I 253	94	I	269
— Ueber den Azurit vom Laurion-Gebirge in Griechenland. R.	93	II	247
Zimmermann, E.: Flussspath im Porphyr bei Oberhof im Thüringer Wald. R.	93	II	14
Zincken, C.: Vorkommen von fossilen Kohlenwasserstoffen etc. in Spanien. R.	91	II	296
Zinkeisen, H.: Ueber die Erzgänge von Güte Gottes zu Scharfenberg. R.	92	II	68
Zirkel, F.: Cordieritbildung in verglasten Sandsteinen. B.	*91*	*I*	*109*
— Lehrbuch der Petrographie. 2. Auflage. I, II. R. . .	94	II	249
Zittel, K. A. von: Handbuch der Palaeontologie. I. Abtheilung: Palaeozoologie. III. Bd. 3. Lief. R.	91	I	424
I. Abtheilung III. Bd. (Schluss). Crocodilia, Dinosauria, Pterosauria, Aves. R.	92	II	350
I. Abtheilung: Palaeozoologie. Bd. 4. Lief. 1—3. R.	94	II	146
— Vulcane und Gletscher im nordamerikanischen Westen. R.	91	II	300
— Die geologische Entwickelung, Herkunft und Verbreitung der Säugethiere. R.	94	II	146
Zollinger, E.: Zwei Flussverschiebungen im Berner Oberland. R.	94	II	44
Zuber, R.: Estudio geológico del Cerro de Cacheuta y sus Contornos. R.	93	I	103
Zujovic, J. M.: Note sur la crête Greben. R.	92	I	358
— Sur les roches éruptives de la Serbie. R.	94	II	422
Zurcher, Ph.: Note sur la continuation de la chaine de la Sainte-Beaume. Notes sur quelques points de la feuille de Castellare. R.	94	I	314

Verschiedenes.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Catalogue of the Michigan Mining School: With Statements concerning the Institution and its Courses of Instruction 1891—1892	1893	II	281
Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen 1891 I 67. II 265. 93 I 91. II 88.	94	II	280
Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten	93	I	84
Festschrift, Freiherrn Ferdinand v. Richthofen zum sechzigsten Geburtstag am 5. Mai 1893 dargebracht von seinen Schülern	94	II	34
Geologische Karte des Grossherzogthums Hessen im Maassstabe von 1 : 25 000	93	I	88
Geologische Notizen vom Bergbau-Districte des Banates (Südungarn) und seinen nutzbaren Gesteinen und Mineralien	90	II	72
Geologische Specialkarte von Elsass-Lothringen 1890 I 100.	93	II	354
L'industrie minérale en Grèce	94	I	447
Materialien zum Studium der Erdbeben in Russland	94	I	69
Mittheilungen aus dem pharmaceutischen Institute und Laboratorium für angewandte Chemie der Universität Erlangen	90	I	261
Société géologique Suisse: Compte rendu de la sixième réunion annuelle en août 1887 à Frauenfeld	90	II	76
The Eruption of Krakatoa and Subsequent Phenomena	94	I	278
The Journal of Geology: A Semi-Quarterly Magazine of Geology and Related Sciences	93	II	280

II. Nekrologe.

	Jahrg.	Bd.
Quenstedt, Friedrich August, † 21. December 1889 . . .	1890	I
Neumayr, Melchior, † 29. Januar 1890	90	I
Zepharovich, Victor Leopold Ritter von, † 24. Februar 1890	90	II
Weiss, Christian Ernst, † 4. Juli 1890	91	I
Ewald, Julius Wilhelm, † 11. December 1891	92	I
Römer, Ferdinand, † 14. December 1891	92	I
Scholz, Max, † 21. Januar 1892	92	II
Novák, Ottomar, † 28. Juli 1892	93	I
Roth, Justus Ludwig Adolph, † 1. April 1892	93	II
Lossen, Karl, † 14. Februar 1893	93	II

III. Zeitschriften.

	Jahrg.	Bd.	Seite
Abhandlungen der geologischen Reichsanstalt. St. Petersburg. (r.)	1890 I	490. II	366
Abhandlungen der kaukasischen Abtheilung der K. russ. Geographischen Gesellschaft. Tiflis	91	I	191
Abhandlungen der Kiewer Naturforscher-Gesellschaft. (r.)	90	II	184
Abhandlungen der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Kasan	90	I	491
Abhandlungen der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Odessa. (r.)	90	II	184
Abhandlungen der neurussischen Naturforscher-Gesellschaft. Odessa. (r.)	91	II	221
Abhandlungen der schweizerischen palaeontologischen Gesellschaft	1890 I 489. 92 II 202. 93 II 229.	94	II 204
Abhandlungen der uralischen Gesellschaft naturforschender Freunde. Ekaterinburg	91	I	455
Abhandlungen, palaeontologische	94	II	384
American Journal of Science	1890 I 193, 387, 487. II 178. 91 I 187, 450. II 217, 476. 92 I 207, 490, 624. II 203, 387, 484. 93 I 221, 449, 588. II 232, 578. 94 I 242, 422, 546.	II	392, 492
Annalen der Physik und Chemie	1890 I 191. II 176. 91 I 363. II 471. 92 I 479. II 479. 93 II 228, 445. 94 I 413.	II	202
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Wien	1893 I 445. II 229, 448.	94	II 386
Annales de la société géologique de Belgique	1890 II 460. 91 II 396. 92 I 208, 622. II 388. 93 I 220. II 230. 94 I 422, 542.	II	288
Annales de la Société géologique du Nord de la France	1890 I 194, 389, 488. II 180. 91 I 188, 452. II 219, 395, 474. 92 I 484, 622. II 388. 93 I 448, 586. II 230, 451, 575. 94 I 542.	II	388, 491
Annales des mines. Paris	1890 I 389. 91 I 452. II 220. 92 I 208, 622		
Annali del Museo civico di Storia naturale. Genova		93	II 576
Annali del R. Istituto tecnico di Udine		93	II 454
Annali del Ufficio centrale meteorologico e geodinamico		93	II 454
Annals of the New York Academy of Science		90	II 362

	Jahrg.	Bd.	Seite
Arbeiten der k. ökonomischen Gesellschaft. St. Petersburg 1890 I 391.	1891	II	398
Arbeiten der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Charkow. (r.)	90	II	463
Arbeiten der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Kasan	94	I	418
Arbeiten der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität St. Petersburg	94	I	421
Arbeiten des Geographischen Instituts der k. k. Universität Wien	91	II	473
Atti del Museo civico di Storia Naturale di Trieste	91	I	190
Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lett. e Arte di Venezia	93	II	578
Atti dell' Accademia di Scienze, Lettere e Arte di Acireale	93	II	452
Atti dell' Accademia Gioenia di Scienze Naturali. Catania. 1890 II 364	93	II	453
Atti dell' Accademia Pontifica de Nuovi Lincei. Roma 1892 I 486.	93	II	454
Atti della R. Accademia dei Lincei. Roma 1890 I 195. 92 II 204, 482. 93 I 587. 93 II 230, 453. 94 I 544.	II		389
Atti della R. Accademia dei Georgofili. Firenze.	93	II	454
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino 1890 I 195, 390. 91 I 190. 93 II 577. 94 I 545.	II		390
Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Napoli 1890 I 390. 92 II 204. 93 I 587. II 453.	94	I	543
Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo	90	I	390
Atti della Società dei Naturalisti di Modena 1891 I 190 93 II 576. 94 I 543.	II		389
Atti della Società Italiana di Scienze Naturali. Milano 1890 I 390. 91 I 190. 93 I 221.	II		452
Atti della Società ligustica di Scienze Naturali. Genova 1892 II 483.	93	I	587
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali. Pisa 1890 I 194, 489. 91 II 397. 92 I 486. 93 I 221, 448. II 451. 94 I 544.	II		390
Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali di Padova	93	II	577
Berg-Journal. St. Petersburg. (r.) 1890 I 195. II 183, 366. 91 I 190. II 222, 398. 94 I 416.	II		205
Bergmännische Zeitung. Charkow. 1894 I 421.	II		207
Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Bergakademien zu Löben und Pribram und der k. Bergakademie zu Schemnitz 1890 I 386. 91 I 450. 92 I 484. 93 I 585.	94	II	204
Berg- und Hüttenmännische Zeitung. Leipzig 1890 I 384. 91 I 448. 92 I 482. 93 I 583.	94	I	539
Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. Wien	91	I	187
Berichte der Akademie für Ackerbau und Forstwirthschaft von St. Peter in Moskau	90	I	392
Berichte der geologischen Reichsanstalt. St. Petersburg. (r.) 1890 I 490. II 462. 91 I 366.	II		221
Berichte der k. Gesellschaft für Landwirthschaft Südrusslands. Odessa	91	II	399
Berichte der k. russischen geographischen Gesellschaft. St. Petersburg. (r.) 1890 I 196, 391. 91 II 399. 94 I 421.	II		207

	Jahrg.	Bd.	Seite
Berichte der k. Universität Warschau	94	II	205
Berichte der ostsibirischen Abtheilung der k. russischen geographischen Gesellschaft. Irkutsk. (r.) 1890 I 391. II 185, 463. 91 I 454. II 221.	94	I	419
Berichte der Universität Tomsk in Sibirien. (r.) 1890 I 491. 91 I 454.	94	I	419
Berichte des Bergingenieur-Vereins zu St. Petersburg 1894 I 419.	II		207
Boletin de la Comision del Mapa geologico de Espana 1892 II 205.	93	II	455
Bolletino del Club Alpino Italiano . . . . . 1893 II 454.	94	I	545
Bolletino del R. Comitato Geologico d'Italia 1890 I 194, 389, 489. II 364. 91 I 189. II 396, 475. 92 I 486. II 204, 482. 93 I 588. II 452.	94	I	544
Bolletino della Società dei Naturalisti di Napoli	93	II	577
Bolletino della Società di Scienze Naturali ed Economiche di Palermo	93	II	578
Bolletino della Società Geologica Italiana 1890 I 194. II 363. 92 II 205, 482. 93 II 578.	94	I	544
Bolletino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali, Padova	93	II	577
Bolletino Scientifico di Pavia . . . . . 1893 II 453.	94	I	544
Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg	94	I	420
Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie . . . . . 1890 II 181. 92 II 481.	93	II	575
Bulletin de la Société française de Minéralogie 1890 I 488. II 180. 91 I 189. 92 I 485. II 202. 93 I 219, 587.	94	I	241, 422
Bulletin de la Société géologique de la France 1890 I 193, 388. II 179, 362. 91 I 452. II 220, 395, 473. 92 I 207, 484, 622. II 202, 388. 93 I 447, 586. II 230, 451, 575.	94	I	421, 542
Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 1890 II 185. 91 I 366, II 398. 92 I 496.	94	I	420
Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala	93	II	230
Bulletin of the Philosophical Society of Washington . . .	93	II	580
Bulletin du Comité géologique. St. Pétersbourg	94	I	417
Bulletin of the Geological Society of America 1892 I 492.	93	I	450
Bulletino del Vulcanismo Italiano	90	I	195
Bulletino dell' Accademia Gioenia di Scienze naturali. Catania 1893 II 453.	94	I	543
Bulletino della Società Malacologica Italiana 1890 I 195, 490. 91 II 397. 93 II 578.	94	I	549
Canadian Record of Science. Montreal 1890 II 362. 91 II 217. 93 I 588. II 579.	94	I	423
Communicacoes da Commissão dos Trabalhos geologicos de Portugal . . . . . 1890 II 461.	93	I	449
Contributions to Canadian Palaeontology . . 1890 I 193.	92	I	491
Correspondenzblatt des Naturforschervereins zu Riga 1890 II 185. 91 I 190.	94	I	420
Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg . . . . . 94 I 421.	II		205
Fennia Sälskapet for Finlands Geografi. Helsingfors 1890 II 366.	93	II	574
Földtani Közlöni (Geologische Mittheilungen). Budapest 1890 I 385. II 178, 360. 91 II 215, 395. 92 I 482. II 480. 94 I 240.	II		204, 386

Jahrg. Bd. Seite

Geognostische Jahreshefte 1890 I 486. 91 II 472. 92 II 478. 94 I 239. II 385
Geological and Natural History Survey of Canada 1890 II 179. 93 I 451
Geological Magazine. London 1890 I 192, 387. II 360. 91 I 188, 364. 92 I 487, 624. II 203, 387, 480. 93 I 219, 245. II 450. 94 I 415, 541
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 1890 I 192, 388, 488. II 179, 365. 91 I 365, 453. II 220, 397, 475. 92 I 495. II 205, 481. 93 I 447, 585. II 229, 574. 94 I 416, 541. II 387, 491
Giornale di mineralogia, cristallografia e petrografia 1890 II 183, 365. 91 I 365, 453. 92 I 623. II 205, 388. 93 I 448. II 231, 454. 94 I 545. II 389, 491
Giornale di Scienze Naturali ed Economiche di Palermo 1890 I 390. 91 II 397. 93 II 577
Hüttenwesen-Zeitschrift. Charkow . . . . . 94 I 419
Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien 1890 I 191. II 177. 91 II 472. 92 II 386, 480. 93 I 584. II 228, 573. 94 I 540. II 203
Jahrbuch der k. preussischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin 1890 I 484. 92 II 198, 476. 93 II 446. 94 II 201
Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen 1890 I 384. 91 I 448. 92 I 482. 93 I 583. 94 I 539
Jahresbericht der k. ungarischen geologischen Landesanstalt. Budapest . . . . . 1892 II 201. 94 I 240
Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 1890 II 359. 91 II 393. 92 II 200. 93 II 447. 94 II 489
Il naturalista siciliano . . . . . 94 I 543
„In Alto." Cronaca della Società alpina friulana. Udine . 93 II 454
Journal of Geology. Chicago . . . . . 93 II 232, 456
Journal of the College of Science, Imperial University of Japan 1890 II 464. 91 I 191. 91 II 400. 92 I 495. II 484. 93 II 231, 578
Materialien zur Geologie des Kaukasus. (r.) Tiflis . . 1891 I 454
Materialien zur Geologie Russlands. St. Petersburg. (r.) 1890 I 491. 91 II 398
Materialien zur Untersuchung russischer Bodenarten. St. Petersburg 1890 I 196, 391. 91 I 190. 94 II 206
Meddelanden från Industristyrelsen i Finland. Helsingfors 93 I 447
Memoirs of the Geological Survey of India. Calcutta 1890 II 362. 92 I 495
Memorie del R. Comitato geologico d'Italia . . . . . 93 II 452
Memorie della R. Accademia dei Lincei. Roma 1891 I 189. 93 II 577
Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna . . . . . 1890 I 489. 93 II 575
Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino 1890 I 390. 91 II 397. 92 I 486
Mémoires du Comité géologique. St. Pétersbourg . . . . 94 I 418
Mineralogical Magazine. London . 1891 II 216. 92 I 487. 93 II 229
Mineralogische und petrographische Mittheilungen. Wien 1890 I 192, 487. 91 I 187. 92 I 479. II 200, 385. 93 I 218, 583. 94 I 238, 412. II 488
Mittheilungen aus dem Jahrbuch der k. ungarischen geologischen Anstalt 1890 II 458. 91 II 394, 473. 92 II 480. 93 I 445. 94 I 240. II 204

Jahrg. Bd. Seite

Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Kiel . . . . . 1891 I 186, 364
Mittheilungen der Commission für die geologische Landesuntersuchung von Elsass-Lothringen 1890 I 383. 91 I 444. 93 I 444. 94 I 413. II 489
Mittheilungen der Grossh. Badischen geologischen Landesanstalt 1891 I 364. 91 II 394. 92 II 385. 94 I 413
Mittheilungen des naturwissensch. Vereins für Steiermark. 93 II 448
Nachrichten über Geophysik . . . . . 94 II 203
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Christiania 1891 I 187. II 397. 92 I 208. 94 I 241
Österreichische Zeitschrift für das Berg- und Hüttenwesen. Wien 1890 I 385. 91 I 450. 92 I 483. 93 I 585. 94 I 540
Översigt af Finska Vetenskaps Societetens Förhandlingar. Helsingfors . . . . . 90 II 463
Palaeontographica. Stuttgart 1890 II 359. 91 I 187. II 214, 471. 92 I 621. II 197, 476. 93 II 228, 444
Palaeontologische Abhandlungen, herausg. von W. Dames und E. Kayser 1890 I 190. II 359. 91 II 392. 92 I 491. 93 I 444. II 444
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1890 I 193, 487. II 362. 91 II 218, 477. 93 I 222. II 580. 94 II 208
Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia . . . 1892 I 624. 93 I 222. II 581. 94 I 433
Proceedings of the Boston Society of Natural History 1890 II 459. 91 II 217. 92 I 207, 491. 93 II 232. 94 II 208
Proceedings of the Californian Academy of Sciences. S. Francisco . . . . . 1890 I 193. II 460
Processi verbali della Società Toscana di Scienze Naturali in Pisa . . . . . 1890 I 489. II 364
Protokolle der Kiewer Naturforscher-Gesellschaft. Kiew. (r.) 90 II 184
Protokolle der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Kasan. (r.) . . . . . 1890 II 184. 91 I 454
Protokolle der Warschauer Naturforscher-Gesellschaft. (r.) 1890 I 392. 91 II 399
Quarterly Journal of the Geological Society of London 1890 I 192, 386. II 360. 91 I 188, 365. II 215, 474. 92 I 206, 487. II 386. 93 I 219, 446. II 449. 94 I 241, 541. II 386
Rassegna delle Scienze geologiche in Italia. Roma 1892 I 486, 623. II 388, 483. 93 II 452
Records of the Geological Survey of India. Calcutta 1890 II 361. 91 II 222. 92 II 483. 93 I 449. II 231, 578. 94 I 423, 545. II 208
Records of the Geological Survey of New-South-Wales 1890 I 491. II 185. 91 I 191. 92 II 206, 389. 93 I 222. II 456, 581. 94 I 547. II 492
Rendiconte dell' Accademia delle Science fisiche e matematiche. Napoli . . . . . 90 I 489
Revue der Naturwissenschaften. St. Petersburg. (r.) 1890 I 491. II 184, 365. 91 I 191, 454. II 222. 94 I 419. II 206
Revue universelle des mines. Paris et Liège 1890 I 389. 91 I 453. 92 I 485. 93 I 587. 94 I 542
R. Istituto di Incorraggiamento di Napoli . . . . . 93 II 577
R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Milano 1893 II 453. 94 I 543. II 389

	Jahrg.	Bd.	Seite
Rivista di mineralogia e cristallographia italiana 1890 I 195. II 364. 91 I 365, 453. 92 I 288, 623. II 389. 93 II 231.	94	I	242
Rivista italiana di Scienze naturali. Siena	93	II	453
Rivista mensile del Club alpino italiano. Torino	94	I	545
Schriften der Neu-russischen Naturforscher-Gesellschaft Odessa	94	II	207
Società italiana delle Scienze, detta dei XL	93	II	454
Südrusslands Bergblatt. Charkow. (r.) . . . . . 1890 I 391.	II		183
Tageblatt der VIII. Versammlung russischer Naturforscher und Aerzte in St. Petersburg. 1889/90	90	I	392
Transactions of the American Institute of Mining Engineers. New York . . . 1890 I 388. 91 I 451. 92 I 492.	93	II	232
Transactions of the American Philosophical Society. Philadelphia	90	II	362
Transactions of the Geological Society of Australasia. London	90	I	492
Transactions of the Manchester Geological Society 1890 II 458. 91 I 450. II 216, 474. 92 I 487. II 481. 93 II 229, 449			
Transactions of the Seismological Society of Japan. Yokohama . . . . . 1890 I 196.	II		464
Travaux de la Société des Naturalists à l'Université Impériale de Charkow	92	I	495
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien 1890 I 385, 487. II 177. 91 I 363, 449. 92 I 206, 482, 621. II 201. 93 I 218, 445, 584. II 228, 448, 574. 94 I 414, 540.	II		203, 489
Verhandlungen der k. russischen mineralogischen Gesellschaft. St. Petersburg. (r.) 1890 I 490. 91 II 398. 93 II 455. 94 I 417.	II		206
Verhandlungen der Naturforschergesellschaft bei der Universität Charkow. (r.)	91	II	399
Verhandlungen der Naturforschergesellschaft in Warschau. (r.)	91	II	399
Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, Westfalens und des Reg.-Bezirks Osnabrück. Bonn 1890 II 359. 91 I 472. 92 II 478. 93 II 447.	94	II	386
Vetenskapliga meddelanden af geograf. föreningen i Finland. Helsingfors	94	I	416
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1890 I 190, 382, 484. II 358, 456. 91 I 362. II 391, 471. 92 I 197, 476. II 205, 621. 93 I 443. II 444.	94	I	238, 538
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate 1890 I 383. 91 I 448. 92 II 482. 93 I 584.	94	II	203
Zeitschrift für Goldwäscherei und Bergbau. Tomsk 1894 I 419.	II		207
Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 1890 I 190, 486. II 177. 91 I 186. II 392. 92 I 199, 477. II 208, 479, 621. 93 I 218, II 444, 572. 94 I 239, 412.	II		385, 488
Zeitschrift für Naturwissenschaften. Halle	90	I	190
Zeitschrift für physikalische Chemie etc. 1892 I 200, 385, 479. II. 480. 93 I 218, 444, 583. II 445, 573. 94 I 414,			538
Zeitschrift für praktische Geologie mit besonderer Berücksichtigung der Lagerstättenkunde 1893 I 444. II 447, 573. 94 I 239, 413, 538. II 202,			385, 489

IV. Sachverzeichniss.

Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind *cursiv* gedruckt.

A.

Aachener Sand, Flora . 1894 II 195
Aachenosaurus multidens 90 II 169
Aalenian . 1893 II 528. 94 I 347
Abbildungsmethoden, krystallographische . . 93 I 227
Abichia . . . . . 90 II 49
Abkühlungsprocess der Erde . . . . . 90 I 49
Ablenkungen der Lothlinie . . . . . 92 I 54
Abrasionsterminante . . 94 II 42
Abriachanit . . . . . 91 I 38
Absoluti, Belemnitengruppe . . . . . 90 I 144
Absorption des Lichtes im Epidot, Sulzbachthal . 90 I 1
— — — in Krystallen 1890 II 187 92 II 1, 208
— bei Mischkrystallen BB VIII *142*
Absorptionsspectren von Didymverbindungen . 92 II 1
Acacia . . . . . 91 II 382
— oregoniana . . . . 90 I 374
Acacioxylon Vegae 1891 I 352. 93 II 430
Acadian . . . . . 92 I 112
Acadisch-russ. Meer während des Tacon . . 91 II 114
Acadna Semseyi . . . 93 II 533
Acanthactinella . . . . 90 II 164
Acanthaspis . . . . . 93 I 175
— decipiens . . . . . 93 I 177
— minor . . . . . 93 I 177
Acanthias alsaticus . . 91 II 328
Acanthicus-Stufe, Karpathen . . . . . 93 II 149
Acanthina tetragona . 1892 II 362
Acanthinula Bigoti . . 90 I 356
— Bigoureti . . . . . 90 I 356
— tuchořicensis . . . . 93 I 554
Acanthoceras Bergeroni . 90 I 356
— Justinae . . . . . 94 I 371
— Mantelli . . . . . 93 II 79
— Migneui . . . . . 90 I 356
— Oamattei . . . . . 90 I 356
— peltoceroides . . . . 93 I 355
— rhotomagense . . . 90 I 356
— Wollgari . . . . . 93 II 414
Acanthochonia devonica . 93 I 47
Acanthodes 1891 I 429. 91 II 165
— hopatini . . . . . 91 I 333
— parvulus . . . . . 91 I 333
Acanthodidae 1891 I 333. 92 II 357
Acanthodii . . . . . 92 II 357
— Old-Red-Sandstone . 90 II 327
Acantholepsis . . . . 93 I 175
Acanthophyllites Nicolai . 94 I 219
Acanthoteuthis, Lyme Regis . . . . . 92 I 178
Acanthothyris, England . 91 I 162
Acaste devonica . . . BB VIII *21*
Accipenser . . . . . 92 I 419
Accipenseriden, Lyme Regis . . . . . 91 I 152
Acer Bendirei . . . . 90 I 374
— borussicum . . . . 93 II 428
— dimorphum . . . . 90 I 394
— pleistocenicum . . . 93 I 435
— terrae coerulae . . . 93 II 428
Aceratherium incivisum 1890 II 35. 93 II 541
Acerinium . . . . . 92 I 614
— aegyptiacum . . . 93 II 430
Achat, Brit. Columbia . 90 II 384

Achat, Paraguay . . 1893 I 506
— Usan, Schottland . . 94 II 223
Achrado crinites . . . 92 II 168
Achyrodon . . . . . 92 II 340
Acidaspidae . . . . . 90 I 151
Acidaspis . . . . . 92 II 151
— Dormitzeri . . . . 90 II 328
— Kalkfauna von St. Malo 90 II 293
— Leonhardi . . . . 90 II 328
— Saskatchewan . . . 93 I 380
Acipenseroidei, Old-Red-Sandstone, Grossbritannien . . . . . 90 II 327
Acirsa penepolaris . . . 90 I 357
Ackerbau, Abhängigkeit von den petrographischen Bedingungen, Norwegen . . . . 94 I 61
Ackerkrume, Einfluss von Kohlensäure auf die Erhaltung . . . . . 93 II 168
Aclis Brugnoniana . . . 90 II 153
Acme laevissima . . . 93 I 554
Acotherulum saturninum. 93 I 148
Acrochordiceras Carlottense . . . . . 91 II 170
— enode . . . . . 94 II 171
Acrocoelum . . . . . 90 II 151
Acroculina bidorsata, Eifel 90 I 184
Acrocyon Eguianus . . 93 I 389
— patagoniensis . . . 93 I 389
Acrodiclidium oligocaenicum . . . . . 93 II 434
Acrodus . . . . . 92 I 418
— Kopfstacheln . . . . 90 II 144
Acrophlyctis . . . . . 90 II 151
Acropora cornuta . . . 90 I 168
— insignis . . . . . 90 I 168
Acroria . . . . . 90 II 152
Acrosalenia Delgadoi . . 91 II 191
— incerta . . . . . 91 II 191
— lybica . . . . . 91 II 191
— Ribeiroi . . . . . 91 II 191
— tenella . . . . . 91 II 191
— venusta . . . . . 91 II 191
Acrosphaera hirsuta . . 93 II 423
Acrostemma . . . . . 90 II 152
Acrostichides rarinervis . 90 I 475
— rhombifolius . . . . 90 I 475
Acrostigma . . . . . 94 II 469
Acrotherium australe . . 93 I 387
— intermedium . . . 93 I 387
— mutabile . . . . . 93 I 387
— patagonicum. . . . 93 I 387
— variegatum . . . . 93 I 387
Acrotrema . . . . . 90 II 152
Acroura granulata . . 1890 I 171
Actaeon Basteroti . . . 94 II 472
— Degrangei . . . . 94 II 472
— Moulinsi . . . . . 94 II 472
— neglectus . . . . . 94 II 472
— orthezi . . . . . 94 II 472
— parvulus . . . . . 94 II 472
— Paulensis . . . . . 94 II 472
— Salinensis . . . . 94 II 472
— saucatensis . . . . 94 II 472
— scalariformis. . . . 94 II 472
— Souverbiei . . . . 94 II 472
Actaeonella abbreviata . 93 I 538
— Absalonis . . . . 93 I 538
— Jura, Campanien . . 90 I 96
Actaeonina marahensis . 93 I 538
— ovata . . . . . 93 I 125
— oviformis . . . . . 91 II 129
— syriaca. . . . . 93 I 538
— transatlantica . . . 93 I 125
Acteosaurus Tommasinii . 94 I 510
Actinistia . . . . . 92 II 358
Actinocamax Alfridi . . 93 I 401
— granulatus . . . . 94 II 71
— Grossouvrei . . . . 93 I 401
— mammillatus. . . . 94 II 74
— quadratus 1894 I 490. 94 II 114
— Toucasi . . . . . 93 I 401
— verus . . . . . 94 II 70
Actinoceratidae . . . . 90 I 354
Actinocyclina . . . . 92 II 374
Actinodaphne Martiniana 91 II 208
Actinodesma . . . . . 93 I 404
Actinodon. . . . . 93 I 173
Actinodonta . . . . . 94 I 175
Actinophorus . . . . . 93 I 177
Actinopteria Boydi. . BB VIII *50*
Actinopterygii . . . . 92 II 358
Actinostroma . . . . . 93 I 421
Actinotheca . . . . . 91 I 407
Acuta-Gruppe der Rhynchonelliden . . . . 91 I 162
Adapis Duvernoyi . . . 93 I 149
— parisiensis . . . . 93 I 149
Adelit, Nordmarken 1893 II 38. 94 II 237
Adelopneustes . . . . 93 I 560
Adelosina polygona . . 94 I 212
Adelphoterium lutarium . 93 I 387
— pumilum . . . . . 93 I 387
— repandum. . . . . 93 I 387
— Rothi . . . . . 93 I 387
— trivium . . . . . 93 I 387
Adeonellopsis incisa . . 94 I 202
— wetherelli . . . . 94 I 202
Adeorbis Duminyi . . . 90 II 153

Adeorbis politus . . 1891 II 463
Adiantides Borgoniana . 93 II 434
— Heerianus . . . . . 91 I 177
— Kochibeanus . . . . 91 I 177
— lanceus . . . . . 91 I 177
— recentior . . . . . 94 I 220
Adiantum Labuanum . . 91 II 209
Adinolen, Přibram, Böhmen . . . . . 90 II 70
Adinotherium pulchrum . 93 I 387
— antiquum . . . . . 93 I 387
— Rabyi . . . . . 93 I 387
Admetula . . . . . 90 II 152
Adocus punctatus . . . 94 II 150
Adranaria . . . . . 91 II 363
Adria . . . . . 93 I 530
Adrianites . . . . 1890 II 149, 150
Adriosaurus Suessi . . 94 I 510
Adular, Schwarzenstein, Tyrol . . . . . 91 I 213
— Bavenoer Zwillinge . 91 II 231
Aechmina abnormis . . 92 II 459
— marginata . . . . 92 II 459
— obtusa . . . . . 94 II 468
— spinosa . . . . . 91 I 334
Aeger Brodiei . . . . 90 I 150
Aegirin . . 1891 I 264. 92 I 26, 248
Aeglina, Silur . . . . 94 I 121
Aegoceras . . . . . 93 II 382
— Haueri . . . . . 94 II 356
— interstriatum . . . 94 II 341
Aellopus elongatus . . . 91 II 457
Aepyronis maximus, Ei . 94 II 464
Aërinit . . . . . 92 I 69
Aëromyrma Sophiae . . 94 II 469
Aesculinae . . . . . 91 I 336
Aesculiphyllum maius 1893 II 565. 94 I 227
— minus . 1893 II 565. 94 I 227
Aestuarien . . . . . 93 I 66
Aestuarienbildung, nordalpine Trias . . . . 94 II 9
Aetna, Ausbruch am 9. Juli 1892 . . . . . 93 I 491
— Thätigkeit 1888, 1889 92 II 259
Aetzung, natürliche, an Topas . . . . . 92 I 509
Affe, Pliocän, Heppenloch 91 I *169*
— Valdarno . . . . . 93 I 386
Affen, fossile 1891 II 149. 92 II 140
— europ. Tertiär . . . 91 II 146
Agalit, Nordamerika . . 91 I 376
Agathaumas 1893 I 547. 94 I 183
Agathiceras . . . . . 90 II 150
Agelacrinus . . . . . 91 II 189
Agents minéralisateurs, Wirkung ders. bei der Bildung der Tiefengesteine . . . . . 1890 I 401
Agglomeratlaven, Colombia . . . . . 93 I 77
Agnostus-Arten, Nordamerika . . . . . 91 II 110
Agriochoerus . . . . . 93 II 396
Agrosaurus Macgillivrayi 94 I 508
Aguilarit . 1893 II 465. 94 II 238
Agustylus cornifex . . . 93 I 389
— primaevus . . . . 93 I 389
Aigialosaurus, Lesina . . 94 I 510
Aikinit . . . . . 91 I 378
Ailuravus Picteti . . . 93 I 149
Ainigmatit, Südnorwegen 92 I 254
Akera siliciosa . . . . 93 I 538
Åkerite, Südnorwegen . 92 I 298
Åkermanit . . . . . 92 I 90
Akmit, Südnorwegen . . 92 I 248
Akmittrachyt, Montana . 93 II 497
Aktinolith, chemisches Verhalten . . . . 94 II *272*
— in Glimmerschiefer, Binnenthal . . . . 94 II 426
— Süd-Borneo . . . . 93 I *40*
Aktinolith-Schiefer, Minnesota . . . . . 94 II 262
— Süd-Borneo . . . . 93 I *39*
Alacaxis . . . . . 90 II 152
Alactaga jaculus foss. . 94 II *285*
Ålandsgranit, Geschiebe . 93 I 142
Ålandsgranitporphyr, Geschiebe . . . . . 93 I 142
Alaria-Kreide von Martapoera (Borneo) . . . 90 II 416
— monodactyla . . . . 93 I 538
Alaun . . . . . 90 I 35
— Ober-Peru . . . . 90 I 49
— optische Anomalien BB VIII *4*
— Veränderung des optischen Verhaltens durch Druck . . . . BB VIII *221*
Alaunablagerungen, Tarapacá . . . . . 91 II 21
Alaunstein, Neu-Süd-Wales . . . . . 90 II 376
Albien, West-Afrika . . 90 II 416
Albit . . . . . 91 II 206
— Challes . . . . . 94 II 406
— in Quarz . . . . . 91 I 380
— Kaltenegg, Steyermark 90 II 16
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Mont-Cenis . . . . 90 II 95
— Morro velho . . . . 90 II 188
— Neubildung in Diabas 92 II 1

Albit, Radiolarien umschliessend . . . 1891 I 7
— Revin . . . . . 94 II 407
— Russland . . . . . 91 I 218
— Südnorwegen . . . 92 I 259
— Süd-West-Afrika 1890 I 115. 90 II 416
— Tampadel . . . . . 94 II 411
— Val di Susa . . . . 91 II 407
Albitschiefer, Massachusetts . . . . . 93 I 293
Albulus vulpes . . . . . 94 I 186
Alcicephalus . . . . . 92 I 405
— coelophrys . . . . . 93 II 398
— Neumayri 1893 I 543. 93 II 398
Alcyonaria hexabranchia 90 II 64
— Langenhani . . . . . 90 II 63
Alectryonia Dilleri . . . 92 II 155
Alethopteris magna . . . 94 I 220
— revoluta . . . . . 91 I 443
Alexia Benoisti . . . . 94 II 356
Algen, Erzeugung von Kieselsinter . . . . . 91 II 94
— Gesteinsbildner in den Ostalpen . . . . . 94 II 21
— in heissen Quellen . 92 I 523
— in Thonschiefer, Saalfelden . . . . . 91 II 436
Algonkian . 1893 I 333. 93 II 517
Algonquin-Becken, ein verschwundener See, Nord-Amerika . . . . . 94 I 65
Alkaliböden, Californien . 94 II 88
Alkalicarbonate, Bildungsweise . . . . . 94 I 10
Alkalihaloidsalze, Krystallform . . . . . 94 I 251
Alkalijodide, Verwendung bei der Analyse . . 94 I 251
Allacodon . . . . . 90 II 143
— fortis . . . . . 93 I 390
— rarus . . . . . 93 I 390
Allamanda crassostipitata 93 II 434
Allanit . . . . . 93 II 461
— gesteinsbildend . . . . 93 I 240
— Gyttorp . . . . . 93 I 32
— im Granit von Nord-Argentinien . . . BB VIII *337*
— in Granit, Alaska . . 93 I 291
— Llano Co. . . . . 93 I 259
— Texas, Baltimore Co. 90 II 228
Allantois . . . . . 93 II 180
Alligatorellus Beaumonti 94 I 378
Alligatorium Meyeri . . 94 I 378
Allodon . . . . . 92 II 342
Allops crassicornis . . . . 94 I 182
Allosaurus medius . . 1891 II 155
Allotheria . . . . . 93 I 390
Allotropie des amorphen Kohlenstoffes . . . 93 II 241
Alluvialgold mit Kupfer . 90 II 206
Alluvium . . . . . 90 I 316
— Comer-See . . . . 93 I 532
— Comitat Torontál . . 93 I 368
— Darmstadt . . . . 93 I 91
— Hegyes-Drócsa . . . 93 I 95
— Königswartha . . . 93 II 95
— Maros . . . . . 93 II 362
— nördl. Norwegen . . 93 II 109
— Péron . . . . . 93 II 536
— Theiss . . . . . 93 II 363
— Trunkey-District . . 94 I 111
Almandin . 1891 II 43. 94 II 225
— Australien . . . . 93 I 252
Almesåkra-Formation . . 92 I *173*
Alnöit, Ste. Anne de Bellevue . . . . . 93 I 291
— New York . . . . 94 II 262
Alnus carpinifolia . . . 90 I 373
— rugosa . . . . . 90 I 373
Alpengletscher, Schwankungen . . . 1893 I 374, 376
Alsbachit, Melibocus . . 94 I 289
— Odenwald . . . . . 92 II 252
Alstonit, mikrochemische Untersuchung . . . 94 I 7
Aluminit, Synthese . . 90 I 18
Aluminium . . . . . 94 I 17
— Krystalle . . . . . 94 II 236
Alunit . . . . . 93 II 466
— Rosita Hill . . . . 93 I 294
— Thera . . . . . 91 II 414
Alvania Aglaja . . . . 90 II 153
— Euphrosine . . . . 90 II 153
— rotulata . . . . . 90 I 157
— Thalia . . . . . 90 II 153
— zibinica . . . . . 90 I 157
Alveolina . . . . . 92 II 374
— oblonga . . . . . 83 II 85
Alveolinen, Java . . . 92 I 65
Alveolinenkalk 1890 I 4. 94 I 158
Amalgam, Leogang . . 93 I 14
Amaltheenthone, Herford 90 I 116
— Leinethal . . . . BB VIII *268*
Amaltheus attenuatus . 93 I 126
— magaritatus . . . . 94 I 192
— Whiteavesi . . . . 92 II 155
Amarantit 1890 I 55. II 268. 93 II 462
— abeihensis . . . . 93 I 538
— Calama . . . . . 91 II 20
— Chile . . . . . 93 I 252
Amblotheriidae . . . . 92 II 344

Amblotherium . . . 1892 II 340
Amblyacrum . . . . . 90 II 152
Amblypterus Traquairi . 94 I 373
Amblypygus Lorioli, Pliocänkalk, Insel Pianosa 90 II 421
Ambonychiinae . . . . 93 I 404
Amesit . . . . . 92 I 223
Amethyst in Basalt . . 91 II 429
— Uruguay . . . . . 93 I 25
Amia Kehreri . . . . 93 II 547
Ammoneen, Ural . . . 93 II 375
— Athabasca . . . . 93 II 414
— Constantine . . . . 93 II 197
— Oxfordzone . . . . 93 II 529
— Unterkreide . . . . 93 II 551
— Valanginien, Fontanil 93 II 552
Ammoneen-Fauna in den Fusulinenkalken des Sosio-Thales, Palermo 90 II 147
Ammoniak, Bestimmung sehr kleiner Mengen . 93 I *49*
Ammoniakalaun, Aenderung des optischen Verhaltens bei Deformationen . . . . . BB VIII *237*
Ammoniten Bathonien . 90 II 107
— brauner Jura, Lithauen 90 I *169*
— der Artinsk-Stufe 1890 II 44. 92 I 426
— des mittleren Lias . 92 II 153
— des schwäbischen Jura 1890 I 155. 93 I 536. 94 I 384
— des Valanginien . . 92 I 424
— Gault . . . . . 90 I 356
— Gross-Britanniens . . 94 II 470
— Mexico . . . . . 90 II *273*
— Mitteljura . . . . 94 I 191
— Neocom . . . . . 90 I 356
— Parabelknoten . . . 90 I *188*
— Riesenformen . . . 93 I 401
— Systematik . . . . 94 I 145
Ammonitenkalk, Lombardei 93 II 355
— rother, Karpathen . . 93 II 148
Ammonites balderus 1890 II *79*. 93 I 536
— bidichotomus . . . 90 II *82*
— bimammatus . . . . 93 I 537
— Binderi . . . . . 93 I 536
— bistrictus . . . . . 90 I 359
— Cautleyi, Jura . . . 90 I *152*
— circumplicatus . . . 93 I 536
— clypealis . . . . . 90 I *182*
— crenosus . . . . . 93 I 536
— desmonotus . . . . 93 I 536
— Emscheris . . . . . 90 I *180*
— Fialar . . . . . 93 I 536
Ammonites folleatus . 1890 I 359
— Hookeri, Jura . . . 90 I *151*
— Howelli . . . . . 92 II 155
— inflexus . . . . . 90 II 107
— involutus . . . . . 90 II *85*
— jurensis . . . . . 94 I 139
— Kner . . . . . 94 I 147
— Kurrianus . . . . 93 I 537
— laeviusculus . . . . 94 I 192
— lingulatus . . . . 93 I 536
— Loscombi . . . . . 92 II 153
— Lucasi . . . . . 90 II 107
— Margae, Nordrand des Harzes . . . . . 90 I *178*
— mutabilis . . . . . 93 I 536
— nodosus-Schichten, agronomische Untersuchung 94 I 483
— nudus . . . . . 93 I 536
— octogonus, Jura . . 90 I *151*
— offarcinatus . . . . 90 I 359
— planula . . . . . 93 I 536
— — gigas . . . . . 93 I 536
— retrocostatus . . . . 90 II 107
— Schenki, Jura . . . 90 I *153*
— sergipensis . . . . 90 I 359
— Streichensis . . . . 90 II *85*
— subinflexus . . . . 90 II 107
— syrtalis, Salzberg . . 90 I *182*
— tenuistriatus . . . . 90 II 107
— Texanus . . . . . 90 I *180*
— Theodorii, Jura . . . 90 I *151*
— torquatus Jura . . . 90 I *153*
— Turneri . . . . . 92 II 155
— Wallichi, Jura . . . 90 I *152*
Ammoniumsulfat, specifisches Gewicht . . . 90 I 202
Ammonoceras . . . . 91 II 360
Ammosaurus maior . . 94 I 182
Ammotragus tragelaphus 91 II 137
Amnigenia rhenana . . 94 II 473
Amnioten . . . . . 94 I 502
Amorphospongia tumescens . . . . . 94 I 174
Ampelodaphne grandifolia 93 II 434
Amphiastraea . . . . 90 II 339
Amphibien, britisches Museum . . . . . 90 I 342
— Nomenclatur . . . . 90 I 466
— Perm . . . . . 93 II 407
Amphibol . . . 1893 II 469, 487
— Roda, Tyrol . . . . 91 I 216
— secundär . . . . . 93 II 22
— See von Vico . . . 91 I 12
— Südwest-Afrika . . . 90 I 114
— Synthese . . . . . 93 I 265
— Umbildung in Chlorit 92 II 231

Amphibol, Val di Susa 1891 II 407
Amphibol-Andesit, östlich. Balkan . . . . . 90 I 282
— — Colombia . . . . 93 I 77
— — Ecuador . . . . 93 I 78
— — Mexico . . . . . 90 II 275
— — pyroxenführend, Cingolina . . . . . 93 I *131*
Amphibol-Biotit-Gestein mit Enstatit und Diallag, Garabal Hill . . 93 I 286
Amphibol-Biotit-Gneiss, centraler Balkan . . 90 I *272*
Amphibol-Dacite, Colombia . . . . . 93 I 77
Amphibolgesteine . . . 94 I 461
— Mähren . . . . . 94 II 420
— Ténès . . . . . 90 II 405
Amphibolgneiss . . . . 93 II 488
— Allier-Thal . . . . 93 II 101
— centraler Balkan . . 90 I 272
— mit Diopsid, Ceylon . 90 II 99
— mit Kokkolith, Ceylon 90 II 99
Amphibol-Granitit, centraler Balkan . . . 90 I 265
— Elsässer Belchen . . 93 I 489
— Riesa-Strehla . . . 91 II 268
— Transvaal . . . BB VII *119*
Amphibolit, Abukuma-Plateau . . . . . 93 II 514
— Afrika . . . . . 92 II 425
— Bacher Gebirge . . . 94 I 462
— Deutsch-Landsberg . 94 I 461
— Einschluss des Basaltes, Marburg . . . 91 II *266*
— Habendorf, Schlesien . 90 II 243
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Königreich Sachsen 1891 II 266, 270
— Ligurien . . . . . 91 II 428
— Mt. Blanc . . . . 94 I 463
— Mt. Pilatus . . . . 90 II 395
— Ortosee . . . . . 93 II 488
— Stubaierthal . . . . 90 II 259
Amphibolite . . . . . 92 I 291
Amphibol-Ouachitit . . 93 II 341
Amphibol-Pyroxen-Andesit, Colombia . . . 93 I 77
— — Ecuador . . . . 93 I 78
Amphibolschiefer . . . 92 I 291
— Cap Lizard . . . . 91 I 94
— centraler Balkan . . 90 I *272*
Amphibrachium crassum . 94 I 525
— fragile . . . . . 94 I 525
— truncatum . . . . 94 I 525
Amphiceras aegoceroides 92 I 426
Amphiclina . . . . 1891 II 465
— austriaca . . . . . 93 II 419
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Amphiclinodonta . . . 93 II 419
Amphicoryna parasitica . 93 II 559
Amphicyon 1893 I 149. 93 II 184
Amphidiscophora, Malm, Krakau . . . . . 90 II 342
Amphidozotherium Cayluxi 93 I 149
Amphiglypha prisca . . 90 I 171
Amphilestes . . . . . 92 II 339
Amphimelania Krambergeri . . . . . 94 I 359
Amphiobe cherichirensis . 93 I 560
Amphioxus . . . . . 93 II 178
Amphistegina Cessoni . 90 II 447
— foveolata . . . . . 94 II 368
— maculata . . . . . 94 II 368
Amphitheriinae . . . . 92 II 344
Amphitherium . . . . 92 II 339
Amphitylus . . . . . 92 II 339
Amphypora socialis . . 94 I 171
Amplagladius . . . . 90 II 152
Amplexus hercynicus . . 90 II *212*
— tortuosus . . . . . 90 II *212*
Ampyx americanus 1890 II 440. 94 I 189
— nasutus . . . . . 90 II 440
Amygdalaceen . . . . 91 I 343
Amynodontidae . . . . 93 I 154
Anabacia . . . . . 90 II 337
Anachoropteris Decaisnii 1891 I 170, 171
Analcim . . . . 1890 I *123*, *133*
— Bachd Beg. . . . . 90 II 219
— in Diabas. . . . . 92 II *1*
— in Mandelstein, Bachd More . . . . . 90 II 219
— in Mandelstein, Lunga 90 II 219
— Julianehaab . . . . 93 I 500
— krystallographisch. Untersuchung . . . . . 94 I 13
— Mt. Somma . . . . . 94 I 45
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Neu-Titschein . . . 93 II 252
— New Jersey . . . . 94 II 261
— optisches Verhalten . BB VII *2*
— Pseudomorphosen nach Leucit, Julianehaab . 93 I 500
— pseudomorph nach Leucit . . . . . 92 II *156*
— Puy-de-Dôme . . . 94 II 234
— Südnorwegen . . . 92 I 263
— Synthese . . . . . 91 II *90*
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 239

Analcim, Wasserverlust bei der Erwärmung . 1891 I *93*
Anamesit, Capraja . . . 94 II 428
— Giessen . . . . . 93 II 324
— Kaiserstuhl . . . . 93 II 504
— Rüdigheim bei Hanau, Zersetzungsproducte . 94 I 460
— Steinheim . . . . . 93 II 326
Ananchytes orbicularis . 91 II 332
— texana . . . . . 94 I 372
Ananchytidae . . . . 92 II 164
Anar . . . . . 91 II 176
Anarosaurus pumilio . . 91 I 332
Anas lignitifila . . . . 92 II 148
Anatas . . 1893 II 471. 94 I *24*
— auf Schiefer . . . . 94 I 18
— Biellese . . . . . 93 II 19
— Dauphiné . . . . . 93 II 261
— Goldsand der Region des Kane, Gouvernement Jenissei . . . 90 I 15
— im Lenneporphyr . BB VIII *559*
— in Fleckschiefer . . 92 II 263
— Krystallskelette . . 94 II *191*
— künstliche Darstellung 1894 II *147*, *185*
— Nil-St.-Vincent . . . 94 II 404
— Pranal . . . . . 93 I 237
— specifische Wärme . . 94 I 249
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Zwilling . . . . . 94 II *193*
Anatina . . . . . 93 II 158
— orientalis . . . . . 93 I 538
— texana . . . . . 94 I 372
Anchilophus Desmaresti . 93 I 148
— Gaudini . . . . . 93 I 148
Anchisaurus colurus 1893 II 192. 94 I 182
— solus . . . . . 93 II 192
Anchitherium . . . . . 93 II 184
Ancillaria ancillops . . 93 I 538
— canalis . . . . . 91 II 181
— digitalis . . . . . 91 II 181
— intermedia . . . . 91 II 181
— obovata . . . . . 91 II 181
— olivaeformis . . . . 92 II 462
Ancyloceras . . . . . 94 I 194
Ancylus-Schicht . . . . 94 I 168
— Oeland . . . . . 91 II 447
Ancyropyge . . . . . 92 II 151
Andalusit . . . . . 93 II 16
— Ariège . . . . . 93 I 276
— — Zusammenhang von Form und Vorkommen 94 I 45
— Beaujeu . . . . . 94 I 264
— Čejov . . . . . 93 II 16, 266
Andalusit, chemisches Verhalten . . . . . 1894 II *267*
— in Culmschiefer, Harzburg . . . . . 92 II 412
— im Gneiss, Argentinien BB VII *311*
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *339*, *383*
— Süd-Borneo . . . . 93 I 41
— Ural . . . . . 90 II 20
— Verwachsung mit Sillimanit . . . . . 90 II 39
Andalusitglimmerfels . . 94 I 71
Andalusitglimmerschiefer, Oschatz-Wellerswalde 91 II 266
Andalusit-Gneiss, Riesa-Strehla . . . . . 91 II 268
Anden, colombianische . 93 I 73
— postglaciales Alter . 93 I 320
Andendiorite . . . . . 92 I 522
Andengranit . . . . BB VIII *292*
Andesin-Quarztrachit, Banat . . . . . 90 II 73
Andesit . . . . 1893 II 365, 493
— Afrika . . . . . 92 II 426
— Almeria . . . . . 90 II 268
— argentinische Cordilleren . . . . . 93 I 105
— Armenien . . . . . 92 II 267
— Bolivia . . . . . 92 II 77
— Cabo de Gata 1892 II 423. 93 I 283
— Capraja . . . . . 94 II 428
— Carthagena . . . . 93 I 284
— Colombia . . . . . 93 I 77
— Cypern . . . . . 93 II 59
— Duperré . . . . . 90 II 404
— Hachijo . . . . . 92 I 312
— Hoyazo . . . . . 91 I 86
— Kaiserstuhl . . . . 93 II 504
— Karpathen . . . . 93 II 144
— Madagascar . . . . 90 II 96
— Martinique . . . . 92 I 318
— Mijakeshima . . . . 92 I 312
— Minnesota . . . . 93 I 292
— Mono Lake . . . . 92 I 387
— Mt. Ingalls, Californien 94 I 79
— Munkács . . . . . 92 I 285
— Peel, Island . . . . 92 I 312
— Rhobell-Fawr . . . 94 II 258
— Rosita Hills . . . . 93 I 294
— S. Cristobal . . . . 92 I 522
— Sandwich-Inseln . . 92 I 320
— sanidinführend, Colorado . . . . . 90 I 84
— Siebengebirge . . . 93 II 486

Andesit, Stromboli . . 1892 I 518
— Sulphur, Island . . . 92 I 311
— Tonga-Inseln . . . 92 I 273
— Vélay . . . . . 91 I 264
— Vicentin . . . . . 94 I 160
— West-Cordilleren . . 94 I 465
— Yellowstone-Park . . 91 I 102
Andesitpechstein, Japan BB VII *147*
Andesittuff, centraler Balkan . . . . . 90 I *269*
— Jesso . . . . . 94 I 304
— im Flysch bei La Clusaz 92 I 295
— östlicher Balkan 1890 I *280*, *282*
— Ungarn . . . . . 91 I 127
Andriania Stoppanii . . 90 II 167
Andromeda crassa . . . 90 I 374
Androstachys cebennensis 94 I 220
Anelasma . . . . . 90 II 152
Angiopteris . . . . . 90 I 172
Angiospermen, erstes Auftreten . . . . . 91 II 375
— monokotyledone, Uebergangstypus . . . 91 II 376
Anglesit, Altai . . . . 94 II 230
— Diepenlienchen . . . 92 I 507
— Mies . . . . . 93 I 13
— Union Bridge . . . 92 I 47
Angularia . . . . . 92 II *32*
— marginata . . . . 94 II 142
Angulatenschichten, Herford . . . . . 90 I 116
Anhydrit, Pyrenäen . . 91 I 379
— Kalusz . . . . . 94 I 472
— Leogang . . . . . 93 I 17
— Nachbildung . . . . 94 II *257*
— Philadelphia . . . . 91 II 27
— Sublimationsproduct . 93 II 264
Animike . . . . 1893 II 516, 517
Anisaster confusus . . . 90 I 361
Anisoceras Haradanum . 91 II 174
— subquadratum . . . 91 II 174
— subundulatum . . . 91 II 174
Anisolophus Burmeisteri . 93 I 388
— Fischeri . . . . . 93 I 388
Ankerit, steierisches Erzgebirge . . . . . 94 I 4
Anneliden . . . . . 93 II 305
Annelidian, Montagne-Noire . . . . . 90 I 96
Annularia elegans . . . 94 I 218
— polonica . . . . . 94 II 375
— radiata . . . . . 93 II 424
— spathulata . . . . 93 II 424
Annuosaurus . . . . . 93 II 192
Anomalien, optische, Ammoniakalaun BB VIII *237*, *242*
Anomalien, optische, bei Eudialyt . . . . BB VIII *727*
— — der Krystalle 1892 I *198*. 93 I 223
— — durch isomorphe Beimischung . . 1892 I *203*, *206*
— — durch mechanischen Druck . . . . 1892 I 203, 206
— — durch Ueberlagerung von verschieden orientirten Lamellen . 92 I *201*
— — einaxiger Krystalle BB VII *1*
— — Kaliumlithiumselenat . . . . . 94 I 180
— — mögliche Ursache 1893 I 456. 94 II 214
— — weinsaures Antimonoxyd-Baryum + salpetersaures Kali . 94 I *250*
Anomalina floscularia . . 91 II 175
— globigerinoides . . . 94 II 368
Anomia helvetica . . . 90 I 158
— incurvata . . . . . 93 I 182
— Koeneni . . . . . 93 I 126
— provincialis . . . . 90 I 158
— texana . . . . . 94 I 370
Anomocladinen, Skelet . 91 I *278*
Anomodontherium montanum . . . . . 93 I 388
Anomodontien . . . . 91 II 342
Anomoeodus Fraiponti . 91 I 153
Anomolocaris canadensis. 93 II 548
Anomozamites elegans . 90 I 372
Anona coronelensis . . . 93 II 434
— speciosa . . . . . 93 II 434
Anoplophora ovalis . . 90 I 114
Anoplotherida . . . . 93 I 148
Anoplotherium . . . . 94 I 179
Anorthit . . . . . 92 II *68*
— Brechungsindices . . 92 I 31
— Miyaka . . . . . 92 I 511
— See von Vico . . . 91 I 13
— Synthese . . . . . 92 I 92
Anorthit-Gneiss, Ceylon . 93 I 508
Anorthoklas . . . . . 93 II 497
Anorthosit BB VIII 419, 434, 491
— Lake Superior . . . 94 II 265
Anoterit, Finnland . . . 92 I 309
Anser anatoides . . . . 94 II 345
Anthenea, Schlumbergeri 91 II 192
Anthochroit . . . . . 90 II 270
Antholithus minus . . . 93 I 206
— Noeggerathi . . . . 93 I 206
Anthomorpha . . . . . 91 II 197
Anthophyllit, chemisches Verhalten . . . . . 94 II 270

Anthophyllit, Franklin, Macon Co. . . . 1894 I 40
Anthozoen, Embryologie. 94 II 474
— Rheinisches Mitteldevon . . . . . 90 II 155
Anthracit . . . . 1893 II 241, 245
— Dannemora . . . . 94 II 423
Anthracitformation, Vanoise . . . . . 93 I 300
Anthracomarti . . . . 94 II 353
Anthracomartus . . . . 92 I 176
Anthracoptera, Verwandtschaft mit Anthracomya . . . . . 94 II 359
Anthracosia Löwensoni . 94 I 198
— obscura . . . . . 94 I 198
— oviformis . . . . . 94 I 198
— subnucleus . . . . 94 I 198
— truncata . . . . . 94 I 198
— Wenjukowi . . . . 94 I 198
Anthracotherida . . . . 93 I 148
Anthracotherium magnum 92 II 332
— minimum . . . . . 92 II 332
— monsvialense . . . 92 I 158
Antiarcha . . . . . 92 II 357
Antidaphne lotensis . . . 93 II 434
Antidorcas Atropatensis . 93 II 398
Antiklinaltheorie . . . 94 I 472
Antilope Maupasi, Algier 93 I 544
— rupicapra. . 1891 II *133, 138*
Antilopen . . . . . 92 I 405
Antimon . . . . . 94 I *29*
— Bassenthwaite . . . 94 II 261
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 201
— Queensland . . . . 90 II 376
— Wärmeleitung . . . 94 I *5*
Antimonbromür . . . . 94 I *41*
Antimonchlorür . . . . 94 I *41*
Antimonerze, Portugal . 94 II 61
Antimonglanz . . . . 94 I *35*
— Beobachtungen über die Reflexion des Lichtes an demselben . . 90 I 2
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 206
Antimonide . . . . . 92 II 210
Antimonit . . . . . 91 II 406
— Allehar . . . . . 92 I 510
— Leogang . . . . . 93 I 14
— Ungarn . . . . . 94 II 32
Antimonjodür . . . . 94 I *40*
Antimonnickelglanz . . 93 II 260
— Siegen . . . . . 92 II 409
Antimonoxyd-Baryum, weinsaures, Doppelsalz mit Kalisalpeter . . 94 I *246*
Antimonoxyd-Blei, weinsaures, Doppelsalz mit Kalisalpeter . . . 1894 I *245*
Antimonsilber . . . . 94 I *33*
Antipleura . . . . . 91 II 362
Aparchites inornatus . . 92 II 458
— leperditioides . . . 94 II 468
— oblongus . . . . . 92 II 458
— subovatus . . . . . 94 II 468
— subtruncatus . . . . 94 II 468
— Whiteavesii . . . . 91 I 154
Apateolepis australis . . 94 II 161
Apateopholis lanatus . . 93 I 173
Apatit 1891 II 43. 93 II 265, 469, 493
— Aetzfiguren . . . . 91 II 32
— Alexander Co., Nord-Carolina . . . . . 90 II 48
— Anorthosit, Canada BB VIII *446*
— Basalt, Marburg . . 91 II 242
— Entstehung in Schlacken . . . . . 94 I 96
— Floitenthal, Tyrol . . 91 I 215
— Gellivara . . . . . 93 II 269
— Glimmerschiefer, Argentinien . . . . BB VII *355*
— Gneiss, Argentinien BB VII *307*
— Granit, Nord-Argentinien. . . . BB VIII *356, 385*
— Granit, Ortasee . . 94 I 446
— Jacupirangit . . . . 92 II 145
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— Lava des Mt. Vulture BB VII *597*
— Norbotten 1893 I 36. 93 II 272
— Pegmatit, Argentinien BB VII *400*
— Phosphoritlagerstätte Ciply . . . . . 90 I 69
— Pisek . . . . . 91 I 26
— Quebec . . . . . 93 I 261
— Schweden . . . . . 93 I 478
— Südnorwegen . . . 92 I 240
— Südwest-Afrika . . . 90 I *109*
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Vesuvlava . . . . BB VII *421*
— Winkelverhältnisse . 91 II 33
Apatitgänge, Krystallskelette . . . . . 93 II 52
— Skandinavien . . . 93 II 64
Apatitgruppe, Synthese . 92 I 20
Apatitschiefer . . . . 92 II 87
Apertur, numerische . BB VII *68*
Aphrosiderit . . . . . 92 II 232
Aphtalos, Racalmuto in Sicilien . . . . . 90 I 31
Apiatoma . . . . . 90 II 152
Apiocrinus . . . . . 90 I *94*
Aplit, Alaska . . . . . 93 I 291
— Lausitz . . . . 1892 II 83, 84

Aplit, Odenwald . . 1892 II 252
Aplitgänge, Melibocus . 94 I 289
Apochrysa excelsa . . . 90 II *12*
Apocynophyllum chilense 93 II 434
— crenulatum . . . . 93 I 431
— grandifolium . . . . 93 I 576
— radácsiense . . . . 93 I 576
— willughbeioides . . . 91 II 209
Apophyllit, Krystallsystem, optische Eigenschaften 92 II 165
— optische Anomalien BB VII *5*
— optisches Verhalten in der Hitze . . . . . 90 I *123*
— Prismen . . . . . 90 II 41
— Rezbanya . . . . . 90 I 396
— Seiser-Alp . . . . . 93 I 34
— Südnorwegen . . . 92 I 265
— Synthese . . . . . 90 I *120*
— über Gyrolith, Fladda 90 II 219
— Wärmeleitung . . . 94 I 6
— Wassergehalt . . . 90 I *121*
Apophysen von Gneiss in Anorthosit, Canada BB VIII *474*
Aporrhaïs . . . . . 92 II 361
— magarita . . . . . 91 I 158
— pleurotomoides 1891 II 129. 93 I 538
Appomatox-Formation 1890 II 124. 92 I 554
Apricardia . . . . . 93 II 158
Apscheron-Serie . . . . 93 II 86
Apteryx, Queensland . . 94 I 182
Aptien, Algier . . . . 93 I 522
— Spanien . . . . . 93 II 160
Aptychen . . . . . 91 II *220*
— Isolirung derselben von den Ammonitengehäusen . . . . . 94 II 138
Aptychenschiefer, Centralappennin . . . . . 94 I 346
Aptychopsis Williamsii . 94 II 352
Aquitanien, Gironde 1891 I 122. 94 II 357, 455
— Umgebung von Issoire 90 II 310
— Vicentin . . . . . 94 I 159
Aquitanische Schichten . 93 II 168
Arabellites cornutus . . 92 II 372
Arachniden der Steinkohlenformation . . . . 92 I 177
Arachnocariden . . . . . 93 II 177
Arachnoiden im Bernstein 92 II 460
Aragonit . 1890 II 42. 93 II 1
— Analyse . . . . . 94 I 23
— Beinertianus, Culm, Glätzisch-Falkenberg. 90 II 346
— Berg Medczianaya . 90 II 21
Aragonit, Cantal . . 1894 I 435
— Einfluss der Temperatur auf die optischen Eigenschaften . . . 92 II 396
— Hohe Höwen. . . . 93 II 36
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Mies . . . . . 93 I 12
— Neussargues . . . . 93 I 28
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— pseudomorph n. Kalkspath . . . . . 90 I *12*
— Symmetrie . . . . 94 I 258
— Texas . . . . . 92 II 22
— zinkhaltiger, Tarnowitz, Oberschlesien . 90 II 379
Aralia lasseriana . . . 90 I 374
— palaeocarpa . . . . 91 I 338
— pungens . . . . . 94 I 230
Araliaceen . . . . . 91 I 338
Araliophyllum . . . . 91 I 338
Aralocaspische Schichten 1892 I 372. 93 II 88
Araneae . . . . . 92 I 177
Aräoxen, Mexico . . . 90 II 40
Arapahoe-Schichten, Colorado . . . . . 94 I 495
Araucariopsis macractis . 93 II 429
Araucarioxylon 1892 I 605. 93 II 219, 427
— arizonicum . . . . 90 I 179
— australe . . . . . 94 I 532
— virginianum . . . . 90 I 179
Araucarites borussicus . 93 II 429
— carbonaceus, Kohlenformation . . . . . 90 II 347
— cupreus, Perm . . . 90 II 347
— elberfeldensis, Kohlenformation, Grafschaft Mark . . . . . 90 II 347
— mansfeldensis, Perm . 90 II 347
— Sternbergii . . . . 91 I 174
— Tchihatcheffianus, Culm, Altai . . . . . 90 II 347
— Ungeri, Devon, Saalfeld in Thüringen . . 90 II 346
— uralensis, Perm . . . 90 II 347
Arbacidae . . . . . 92 II 161
Arca antiopa . . . . . 91 II 177
— brevifrons . . . . . 94 I 190
— Cazioti . . . . . 90 II 332
— Fontanesi . . . . . 90 II 332
— lirata . . . . . 94 I 370
— platensis . . . . . 94 I 370
— plicatocostata . . . 91 I 159
— rustica . . . . . 94 I 388
— scrorcula . . . . . 90 II 332

Arca subterebrans . . . 1891 II 177
— tetragona . . . . . 90 II 332
Arcestes angustus . . . . 94 II 171
— bilabiatus . . . . . 94 II 171
— californiensis . . . . . 94 II 111
— giganto-galeatus . . . 90 I 155
— persulcatus . . . . . 94 II 103
— rhaeticus . . . . . 90 I 155
— tridens . . . . . 94 II 103
— ventricosus . . . . . 94 II 171
Arcestidae . . . . . 90 II 149
Archäische Formation, Argentinien . . . . . 92 II 294
— Canada . . . . . 92 II 293
— Gliederung . . . . . 92 II 282
— Kleinasien . . . . . 92 II 292
— Maryland . . . . . 92 II 285
— Mexico . . . . . 90 II 27
— Mont-Blanc . . . . . 92 I 107
— nördl. Appennin . . . 93 I 109
— Odenwald . . . . . 92 I 104
— Olekma-Witim . . . . 92 II 279
— Shropshire . . . . . 92 II 292
— Steiermark . . 1892 II 289, 291
— Unterabtheilungen . . . 93 I 330
Archaeobatis . . . . . 93 I 177
Archaeoceti . . . . . 92 II 144
Archaeocyathinae . . . 91 II 197
— Australien . . . . . 91 II 200
Archaeocyathus minganensis . . . . . 91 II 197
Archaeolithothamnium . 93 I 578
Archaeophyton Newberryanum . . . . . 91 I 350
Archaeopteryx, Flughaut . 91 I 147
Archaeoscolex corneus, Devon . . . . . 90 II 329
Archaeoscyphia . . . . . 91 II 199
Archaeozoon acadiense . 91 II 309
Archaicum, Argentinien BB VIII *296*
— Britannien . . . . . 91 I 90
— Central-Pyrenäen . . . 91 I 260
Archiacia palmata . . . . 93 I 559
— acuta . . . . . 93 I 559
— saadensis . . . . . 93 I 559
— sandalina . . . . . 93 I 559
— santonensis . . . . . 93 I 559
Archicapsa Rüsti, Krakau 90 II 343
Arcomya . . . . . 93 II 158
Arcopagia planissima . . 93 I 538
Arctomyina . . . . . 90 II 430
Arctomys bobac 1890 I 459. 91 I 334. 94 II *283*
— marmotta . . . . . 93 I 539
Ardescien . . . . . 92 I 361
Ardisia crassifolia . . . 93 II 434
Arethusina . . . . 1892 I 173, 344
Aretosaurus Osborni . . . 92 I 413
Arfvedsonit, Colorado . . 91 I 268
— Südnorwegen . . . 92 I 253
Argile à Silex, Normandie 93 I 523
— variolés, Basses-Pyrénées . . . . . 91 I 413
Argille scagliose, Florenz 93 II 169
— Tarent . . . . . 94 II 127
Argillochelys . . . . . 91 I 151
Argolis . . . . . 93 I 313
Argovien, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 474
— Trept (Isère) . . . . 93 I 350
Argyrodit . . . . . 94 I *99*
Arietenschichten, Herford 90 I 116
Arietina clays, Del Rio 94 I 355
Artistes alienigenus, Spezzia . . . . . 90 II 297
— anastreptotychus . . . 92 II 362
— Cordieri . . . . . 92 II 362
— ligusticus . . . . . 92 II 362
— nepos . . . . . 94 II 356
— rotiformis . . . . . 92 II 362
— rotticus, Lias . . . . 94 I 144
— subsalinarius . . . . 92 II 362
— Wichmanni, Lias . . 94 I 144
Arietites-Arten, Lias, Deutsch-Lothringen . 94 I 344
Arionellus . . . . . 94 II 96
Ariophanto saucatsensis . 94 II 356
Aristolochiaceen . . . . 91 I 343
Arius crassus . . . . . 92 I 166
— Egertoni . . . . . 92 I 167
— gagorides . . . . . 92 I 166
— germanicus . . . . . 92 I 167
— Paroni . . . . . 92 I 166
Arkansit . . . . . 91 I 220
Arkona Beach, Nord-Amerika . . . . . 94 I 65
Arkose, Cosne, Dep. Allier 91 II 316
— cambrische, Westliches Finnland . . . . . 90 I 284
— Lennegebiet . . . BB VIII *624*
— mitteleocän, Velay . 93 II 102
— Pillnitz . . . . . 93 II 93
— Unteritalien . . . . 91 II *55*
— vorcambrische . . . 93 I 333
Arnagerkalk, Bornholm . 93 I 144
Arnagerquarzit, Bornholm 93 I 144
Arnagersandstein, Bornholm . . . . . 93 I 144
Arnimit, Synthese . . . 92 I 20
Arniotites vancouverensis 91 II 170
Arnusien, Montpellier . . 90 II 308
Aromit, Atacama . . . 90 I *49*

Arpedium stillicidii . 1893 II *549*
Arsen . . . . . 94 I *28*
— British Columbia . . 90 II 384
— drei Modificationen . 94 I 251
— in Erzen . . . . . 93 II 276
Arsenantimonnickelglanz, Siegen . . . . . 92 II 406
Arseneisen . . . . . 91 I 151
Arsenide . . . . . 92 II 210
Arsenjodür . . . . . 94 I *42*
Arseniopleit, Sjögrubenfeld, Oerebro . . . 90 II 54
Arsenit, künstlich . . . 93 I 25
Arsenkies . 1891 I *151*. 94 II 15
— Court-St.-Etienne . . 94 II 403
— Goldkronach bei Markt Redwitz . . . . . 90 I *99*
— gold- und silberhaltig, Serbien . . . . . 90 II 75
— Hühnerkofel . . . . 92 II 70
— in Granit, Ortasee . 94 I 447
— Krystallform und Zusammensetzung . . . 94 II 399
— Leogang . . . . . 93 I 15
— silberhaltig . . . . 93 II 78
— Wunsiedel . . . . 91 II 38
Arsenolith, Pseudomorphose . . . . . 94 II 231
Arsenopyrit, Cziclova . . 90 II 218
— goldhaltig . . . . . 94 I 85
— Petrowitz . . . . . 93 II 266
— Serbien. 1890 I 404, 91 I 239
— — chemische Analyse 90 II 218
Arsensäure, Unterscheidung von Phosphorsäure . . . . . 94 I 7
Arsentypus der Metalle . 94 I *4*
Artesische Brunnen, Algier . . . . . 93 I 66
— Hód-Mezö-Vásárhely . 90 I 453
Arthante geniculatoides . 93 II 434
Arthesina, Obersilur . . 91 I 404
Arthrodira . . . . . 92 II 358
Arthropitus cruciatus . . 93 I 205
— elongata . . . . . 93 I 205
— männliche Fruchtorgane . . . . . 90 II 348
— stephanense . . . . 93 I 205
Arthropoden . . . . . 92 II 359
Arthroporella catenularia 93 II *145*
Arthrostigma . . . . . 93 II 213
Articulina extensa . . . 94 II 367
Artiodactyla . . . 1890 II 315, 431
Artiodactylen im Miocän 92 II 331
Artisia alternans . . . 93 I 206
— costata . . . . . 93 I 206
Artisia varians . . . . 1893 I 206
Artocarpidium Martinianum . . . . . 91 II 208
— ovalifolium . . . . 93 II 432
— Silvani . . . . . 94 I 531
Artocarpus Dicksoni . . 94 I 230
Artodictis australis . . 93 I 388
— Muñizi . . . . . 93 I 388
Arvicola . 1890 II *35*. 93 I 539
Asaphus diurus . . . . 92 II 151
Asar . . . . . 94 I 499
— Entstehung . . . . 92 I 392
— Mecklenburg . . . . 94 I 164
— Norddeutschland . . 90 I 320
— Posen . . . . . 94 II 131
— Wreschen . . . . . 94 II 456
Asbest, Mies . . . . . 93 I 13
— Mont Cenis . . . . 90 II 95
— Ottawa Co. . . . . 92 II 26
— Quebec . . . . . 90 II 383
Asbolan, Leogang . . . 93 I 17
Asbydiabas, Geschiebe . 93 I 143
Asche, Tiefsee . . . . . 93 II 309
— vulcanische, Entstehung . . . . . 92 II 257
Aschenauswürfe im Lennegebiet . . . . . BB VIII *640*
Aschenstructur des Lenneporphyrs . . BB VIII *576* *647*
Ascoceras gradatum . . 91 II 359
— Murchisoni . . . . 91 II 357
Ascoleras ampulla . . . 91 II 359
— bohemicum . . . . 91 II 359
— cochleatum . . . . 91 II 359
— collare . . . . . 91 II 359
— cucumis . . . . . 91 II 359
— decipiens . . . . . 91 II 359
— dolium . . . . . 91 II 359
— fistula . . . . . 91 II 359
— lagena . . . . . 91 II 359
— manubrium . . . . 91 II 359
— pupa . . . . . 91 II 359
— reticulatum . . . . 91 II 359
— sipho . . . . . 91 II 359
Ascoceratidae . . . . . 90 I 354
— Ober-Silur, Gotland . 91 II 358
Aspendesia meandriniformis . . . . . 91 I 159
Asperolith, Pseudomorphose nach Malachit . 91 II 13
Asphalt, Dannemora . . 94 II 423
— Tertiär, Utah . . . 94 I 91
Aspidiopsis . . . . . 94 I 528
Aspidoceras . . . . . 90 II 147
— diversiforme . . . . 90 I 175
— perarmatum, Polen . 94 I 487

Aspidochiroten . . . 1892 II 368
Aspidodiadematidae . . 92 II 160
Aspidopholas Staineri . . 93 II 555
Aspidorhynchidae . . . 93 I 173
Aspidorhynchus sp. . . . 93 II 546
Aspidosoma petaloides, Harz . . . . . 94 II 360
Aspidura Ludeni . . . 90 I 171
— prisca . . . . . 90 I 171
— Raiblana . . . . . 90 I 171
— scutellata . . . . . 90 I 171
Asschien . . . . . 93 I 524
Astarte . . 1892 II 361. 93 II 158
— acuminata . . . . 94 I 372
— aequilatera . . . . 93 I 126
— angulata . . . . . 93 II 200
— elongata . . . . . 93 I 381
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— Pironae . . . . . 91 II 176
— pulchella . . . . . 93 I 381
— trapeziformis . . . . 93 I 381
— Valfinensis . . . . 91 II 176
Astartopsis . . . . . 92 II 138
Asteractinella . . . . 90 II 164
Asterienkalk, Gironde . 94 II 453
— Pont-de-la-Mave . . 94 II 455
Asteroblastus stellatus . 94 II *82*
Asterocyclites . . . . 94 I 172
Asteroiden . . . . . 91 II 187
Asterolepis . . . . . 92 II 358
Asterophyllites . . . . 91 I 170
— flexuosus . . . . . 93 I 204
— polyphyllus . . . . 94 I 218
— subulatus . . . . . 94 I 218
— trichomatosus . . . 94 II 481
Asteroplax scabra . . . 93 I 178
Asterosteidae . . . . 92 II 358
Asterosteus . . . . . 93 I 175
Asthenosoma . . . . . 90 I *85*
Astien, Montpellier . . 90 II 308
— Nador-Thal . . . . 92 I 373
— Umgebung von Bra . 90 II 124
Astieria sulcosa . . . . 93 I 355
Astochit, Wermland . . 93 II 37
Astrachanit, Astrachan . 94 II 230
Astraea Bowerbanki . . 90 I 370
Astraeidae . . . . . 93 I 192
Astraeomorphinae . . . 93 I 197
Astrakanit . . . . . 93 I 42
Astrocladia frutectosa . . 94 I 210
Astrocoenia . . . . . 90 II 337
— hexactis . . . . . 93 I 195
— Ohmanni . . . . . 93 I 195
— Waltheri . . . . . 93 I 195
Astrohelia regularis . . 94 I 171
Astropecten Pichleri, Cardita-Schichten . . 1890 I 107
Astrophyllit, Colorado . 94 I 56
— Südnorwegen . . . 92 I 245
Asymtoceras Newtoni . . 93 I 180
Atakamit . 1891 II 20. 93 II 463
Atelestit, Grube Neuhilfe, Sachsen . . . . . 90 II 386
Atherstonia, Karroo-Formation, Süd-Afrika . 91 II 455
Athyriata . . . . . 94 I 201
Athyris . . . . . 91 II 186
— laeviuscula . . . . 92 I 590
— Macleayana . . . . 93 II 129
— reticularis . . . . 91 II 186
Atlantosaurus . . . . 90 II 434
Atlas, tunisischer . . . 93 II *26*
Atocus defessus . . . . 93 II 549
Atomodesma undulata . 94 II 103
Atomzahl eines Gesteins . 92 I 62
Atopsaurus Jourdani . . 94 I 378
Atractosella . . . . . 90 II 163
Atractotrema . . . . 90 II 151
Atremata 1892 I *193*. 94 I 200
Atrypa, Nord-Patagonien 93 I *28*
— palmata . . . . BB VIII *61*
— reticularis 1891 II 184. BB VIII *662*
Atryptheridae . . . . 93 I 386
Aturia Basteroti, Biarritz 94 II 472
Aturitenmergel, Mähren . 92 I 140
Atys camaleis . . . . 90 II 153
— silvestris . . . . . 90 II 153
— utriculus . . . . . 90 I 357
Aublysodon . . . . . 93 I 164
AucellaBlanfordiana, Jura 90 I 153
— brasiliensis . . . . 90 I 359
— Bronni, Jura . . . 90 I 150
— bulloides . . . . . 90 I 158
— inflata . . . . . 90 I 158
— Keyserlingi . . . . 90 I 158
— piriformis . . . . . 90 I 158
— precarinata . . . . 94 I 506
— Sjögreni . . . . . 93 II 382
— terebratuloides . . . 90 I 158
— trigonoides . . . . 90 I 158
— volgensis . . . . . 90 I 158
Aucellen, Jura, Mexico . 90 II 273
Auchenaspis . . . . . 94 I 382
Auerlith, Green River . 91 II 240
Auflösung der Krystalle . 92 II 236
Augen im Sericitschiefer, pyrithaltig . . . . 91 I 91
Augengneiss, Schweden . 92 I 340
Augenstructur, Entstehung . . . . . 91 I 88

Augit 1893 II 331, 474, 487. 1894 I *82*
— Anorthitfels, Canada BB VIII *441*
— Basalt, Marburg . . 91 II *162*
— Boninit . . . . . 92 I 313
— Eifel . . . . . 92 II 415
— Fortwachsen desselben in Peridotit, Maine . . 90 I 273
— Ijolith . . . . . 92 I 307
— Laven des Mt. Vulture BB VII *591*
— Lösungsflächen . . . . 92 I 505
— monoklin-hemiëdrisch . 94 II *67*
— Risoe . . . . . 90 I *89*
— sanduhrförmig . . . 94 II *23*
— Synthese . . . . . 92 I 89
— Tonalit . . . . . BB VII *476*
— Tuff, Campanien . . 91 II *306*
— Vesuvlava BB VII *419*, *422*, *428*
— Zwillingsbildung . . 92 I 505
Augit-Amphibol-Fourchit, Connecticut . . . . 94 II 264
Augitandesit . . . . . 93 II 490
— Bandai San . . . . . 90 II 102
— Guadelupe . . . . 91 I 268
— Kars . . . . . 90 I 82
— M. Rado . . . . . 91 I 271
— Masgerth . . . . . 90 I 82
— Massiv von Cap Djinet 90 II 403
— Meygal . . . . . 93 I 272
— mikrolithisch, Arran . 94 II 422
— östlicher Balkan 1890 I 279, 280, 281, 282
Augit-Aphanit, Rhowell-Fawr . . . . . 94 II 258
Augitdiorit, Capverden . 91 I 402
— Colorado . . . . . 90 I 84
— Predazzo . . . . . 90 I *77*
— Tirol . . . . . 90 I *76*
Augit-Diorite, Süd-Borneo 93 I *42*
Augitfels, Süd-Borneo . 93 I *43*
Augitgranit, Elsässer Belchen . . . . . 93 I 489
— in Gabbro, Skye . . 94 II 259
Augit-Hornblende-Biotit-Bomben, Laacher See 92 II 417
Augit-Hornblende-Gneiss, Ceylon . . . . . 93 I 507
Augitit, Limerick . . . 94 I 302
— östlicher Balkan . . 90 I 282
Augitite . . . . . 92 I 285
Augit-Norit (Hyperit), Cortlandt Series . . 90 I 87
Augit-Peridotit (Pikrit), Cortlandt Series . . 90 I 87
Augitporphyr bei Timan. 91 II 425
— Ehrwald . . . . . 92 I 285
Augitporphyr, Fassathal 1890 I *81*
— Pillersee . . . . . 90 II 259
Augitporphyrit . . . . 93 II 444
— Alaska . . . . . 93 I 506
— Bergmassiv von Menez-Hom . . . . . 90 II 398
— Dep. Saône et Loire . 91 II 288
— Grossenhain . . . . 93 I 94
— I. of Man . . . . . 92 II 264
— Magdeburger Uferrand 93 II 98
— östlicher Balkan . . 90 I *280*
— Pyrenäen . . . . . 91 II 287
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
— Transvaal . BB VII *123*, *126*
Augitreihe, optische Constanten . . . . . BB VIII *171*
Augitsyenit, Capverden . 91 I 402
— Cingolina . . . . . 93 I *126*
— Nassau, Sachsen . . 91 II 276
— Südnorwegen . . . 92 I 296
— Tirol . . . . . 90 I *76*
Augittrachyt, Campanien 91 II 305
— Ponza-Inseln . . . . 94 I 281
Aulacoceras acus . . . 94 II 169
Aulocystis . . . . . 90 II 160
Aulopora . . . . . 93 I 420
Aurichalcit . . . . . 92 II 211
— Mexico . . . . . 93 II 278
— Zusammensetzung . . 94 I 24
Auricula Sandbergeri . . 91 II 328
Auripigment, Casa Testi 1892 II 10, 11
— Leogang . . . . . 93 I 14
— mikroskopische Untersuchung . . . . . 94 I 15
— Yellowstone Park . . 94 I 59
Ausbruch des Aetna 93 II 483, 492
Ausgleichungsmethoden der geometrischen Krystallographie . . . 94 I 430
Auslaugungsprocess der Suspensionen von Kalk- und Magnesiacarbonaten . . . . . 94 I *264*
Auslöschung, undulöse . 93 II 247
— — im Quarz, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *364*
Auslöschungsschiefe bei monoklinen Krystallen 94 II 209
Ausscheidungen, basische, von Titaneisen . . . . 93 II 69
— granitoide . . . . . 93 II 359
— von Hornblende und titanreichem Eisenerz 93 II 71
Austinkalk . . . . . 94 I 152

Austinocrinus Eckerti. 1891 II 192
Australanthus, Echiniden-Gattung . . . . . 94 I 391
Auswürflinge, agglutinirende . . . .1892 II 255, 256
— des Monte Somma. . 94 II 427
Avellana subincrassata . 91 I 158
Avicula . . . . . 93 I 403
— contorta, Rhät, Luxemburg . . . . . 90 I 299
— Foulloni . . . . . 93 II 136
— Frechi . . . . . 93 I 182
— globulus . . . . . 90 I 176
— Hallensis . . . . . 90 I 107
— Haradae . . . . . 91 II 175
— Kokeni. . . . . 94 II 141
— lamellosa . . . . . 93 I 182
— Leveretti . . . . . 94 I 372
— lima . . . . . 91 I 406
Aviculidae, Stammbaum . 91 II 361
Aviculiden, Devon . . . . . 93 I 402
Aviculinae . . . . . 93 I 403
Aviculomya peralata . . 91 I 406
Aviculopecten . . . . . 93 I 403
— aegypticus . . . . . 93 II 521
— borealis . . . . . 91 II 122
— Lindströmi . . . . . 91 II 122
— pygmaeus. . . . . 91 II 122
— Toulai . . . . . 91 II 122
Aviculopectiniinae . . . . 93 I 403
Awaruit . 1892 I 317. 93 I 231
Axinella, Malm, Krakau. 90 II 342
Axinit . . . .1891 I 44. 93 II 463
— Bergmannstrostes Umbruch . . . . . 90 II 50
— chemische Zusammensetzung . . . . . 90 II 49
— Formel. 1891 I 267. 91 II 335
— in Granit, Ortasee . 94 I 446
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Nordmarken 1894 I 272, II 235
— Pyrenäen . . . . . 94 I 43
— Radauthal . . . . 90 II 50
— Treseburg i. Harz . . 90 II 49
— Val di Susa . . . . . 91 II 407
— Wormke . . . . . 90 II 49
Axenwinkel, Messung am Polarisationsmikroskop BB VII *506*
Axophyllum medulosum . 94 I 171
Azalea procumbens . . 91 I 344
Azeca vitrea . . . . . 93 I 554
Azorit, S. Miguel, Azoren 90 I 33
Azoxyanisol . . . . . 91 II 5
Azoxyphenetol . . . . 91 II 5
Azurit, Leogang . . . . 93 I 17
— Arizona . . . . . 94 I 23
Azurit, Laurion . . . 1893 II 247
— Synthese . . . . . 92 I 19

B.

Ba $(Sb O)_2 (C_4 H_4 O_6)_2$ + $2\frac{1}{2}H_2O$, Krystallform BB VIII *501*
Ba $(Sb O)_2 (C_4 H_4 O_6)_2$ + Na Cl + $5H_2O$, Krystallform . . . . . BB VIII *504*
Ba $(Sb O)_2 (C_4 H_4 O_6)_2$ + Na NO_3 + H_2O, Krystallform . . . . BB VIII *532*
Babinet'scher Compensator BB VII *74*. BB VIII *219*
Babingtonit, künstlich . . 93 I 263
Bachitherium. . . . . 93 I 148
Bacillariten, Kohlensandstein der Loire und des Gard . . . . . 90 II 37
Bactrellaria . . . . . 90 I 167
— rugiga . . . . . 90 I 167
Baculites Héberti . . . . 91 I 123
Badiotites Celtensis . . 91 II 170
Bänderthon, Colmnitz, Sachsen . . . . . 91 I 85
— Riesa, Sachsen . . . 91 II 270
Bären, Pyrenäen . . . . 94 II 149
Baer's Gesetz der Flussbette . . . . . 90 II 240
Bagania pupiformis . . 91 II 463
— Raincourti . . . . 91 II 463
Bagshot-Schichten 1891 I 123. 92 II 111
Baiera palmata . . . . 90 II *448*
Bajocien . . . . . 93 II 528
— Alpenkette . . . . 90 I 117
— Montagne de Lure . 90 II 280
— Süd-Frankreich . . . 91 II 323
— Var . . . . . 93 I 519
Bairdia anticostiensis . . 91 II 461
— cestriensis . . . . 92 II 459
— leguminoides. . . . . 92 II 459
Baku-Serie . . . . . 93 II 86
Balachany-Serie . . . . 93 II 86
Balaenidae . . . . . 92 II 147
Bala-Gesteine, Caernarvonshire . . . . . 90 II 261
Balantiostoma . . . . 90 I 169
Balanulina Kitteli . . . . 90 II 344
Balanus Hameri, Pleistocän . . . . . 91 II 461
Balatonites acuti . . . . 91 II 171
— arietiformes . . . . 91 II 171
— sondershusanus . . . 94 II 168

Balatonites trinodosus 1894 II 170
Baldisserit . . . . . 92 II 253
Baleiochthys graciosa . . 93 II 194
— lata . . . . . 93 II 194
Balsfjordgruppe . . . . 93 II 110
Bañados . . . . . 93 I *25*
Bandjaspis, Meissen, Sachsen . . . . . 91 I 81
Banksia . . . . . 92 I 468
— Arten, fossile . . . 93 I 436
Banura Cuadrae . . . 93 II 434
Barbaronthea Florissanti 93 II 549
Barbus fossilis, Java . . 90 I 313
Barkevikit, Südnorwegen 92 I 253
Barosaurus lentus . . . 91 I 150
Barren . . . . . 93 I 65
— Bildung . . . . . 93 II *167*
Barroisella . . . . . 93 II 202
Barybraxis lata . . . . 93 I 551
Barychilina . . . . . 92 II 458
— pulchella . . . . . 92 II 459
— puncto-striata . . . 92 II 459
Barysit, Bleisilicat von der Harstigsgrube . . . 90 I 24
Baryt, Allmendingen, Weisser Jura . . . . . 90 I 39
— Aspen . . . . . 92 II 32
— Binnen . . . . . 90 I 34
— Canda . . . . . 91 I 250
— Clausthal . . . . . 90 I 399
— Dabogoberg . . . . 90 II 25
— Doppelbrechung, Abhängigkeit von der Temperatur . . . . 91 I 209
— Einfluss der Temperatur auf die optischen Eigenschaften . . . 92 II 397
— Gänge, Darmstadt . . 93 I 90
— Grube Alte Grimberg, Siegen . . . . . 90 I 399
— Grube Beschert Glück, Freiberg . . . . . 90 I 400
— Grube Isaak, Freiberg 90 I 400
— Harstigen . . . . . 90 II 226
— Harz . . . . . 90 I 400
— Hütschenthaler Gang . 90 I 402
— Hüttenberger Erzberg 93 I 38
— Iberg bei Grund . . 90 I 403
— Idria . . . . . 93 I 464
— in einem Ammonit von Luxemburg . . . . 91 II 7
— Koppánd . . . . . 90 I 397
— Kronthal i. Elsass, Aetzfiguren . . . . . 90 I 31
— Kulenriet, Bayreuth . 90 I 399
— Levico im Val Sugana 90 II 27
Baryt, Puy-de-Dôme . 1893 I 249
— — Aetzfiguren . . . 90 I 33
— Rosenhöfer Zug . . 90 I 403
— Semmering . . . . 92 II 71
— Silbernaaler Zug . . 90 I 403
— Südwest-Afrika . . . 90 I *109*
— Torda, Siebenbürgen 1890 I 398, 399
— Tyrol . . . . . 91 I 212
— Valsugana . . . . 90 II 26
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
— Zellerfelder Hauptzug 90 I 402
— Zwillinge . . . . . 92 II 32
Barytfeldspath, Sjögrube . 90 I 231
Barytglimmer . . . . 90 II 37
Barytocalcit, Mies . . . 93 I 12
Baryum-Feldspath . . . 91 II 244
— Nitrat, optische Anomalien . . . . . 92 I *200*
Basalt, Abessinien . . . 93 II 55
— Afrika . . . . . 92 II 426
— Appennin . . . . . 91 I 272
— argentinische Cordillere 93 I 105
— arktisches Gebiet . . 93 I 498
— Armenien . . . . . 92 II 267
— Bett des Allier . . . 92 I 68
— Colombia . . . . . 93 I 77
— Darmstadt . . . . 93 I 90
— Eisenrüttel . . . . 92 II 250
— Euganeen . . 1892 II 254, 420
— Gegend von Ain-Témouchent . . . . . 90 II 406
— Gegend von Dellys . 90 II 403
— Giessen 1892 I 95. 93 II 324
— Grossdehsaer Berg . 90 II 68
— Hessen . . . . . 91 II 278
— Hohenberg, Westfalen 94 II 55
— I. of Man . . . . 92 II 264
— Lausitz . . . . . 92 II 81
— Louisa-Flörsheim . . 90 I 448
— Marburg . . 1891 II 156, 231
— Meygal . . . . . 93 I 272
— mit Hornblende, Madagascar . . . . . 90 II 96
— Mongolei . . . . . 91 I 281
— Monte Baldo . . . 90 I *82*
— Nemours . . . . . 90 II 405
— Oberlausitz . . . . 90 II 68
— Odenwald . . 1892 II 252, 253
— Quarz-führender . . 92 I 80
— Sachsen 1891 I 69, 71. II 273. 92 I 94
— Sandwich-Inseln . . 92 I 319
— Siebenbürgen . . . 94 I 292
— South Mountain . . 94 I 77
— specifische Wärme . . 92 II 43

Basalt, Stromboli . . 1892 I 517
— Tihany . . . . . 92 II 274
— Tirol . . . . 1890 I *72, 82*
— Trunkey District . . 94 I 111
— Tumbarumba . . . 94 I 162
— Vélay . . . . . 91 I 264
— Venetien . . . . . 91 II 426
— Verwitterung . . . 92 I 277
— Vicentin . . . . . 94 I 159
— Virginia . . . . . 91 I 113
Basalteisenstein . . . . 92 I 277
Basaltgesteine,Systematik 90 II 249
Basaltglas, tachylytähnliches, von Pantellaria 93 II 58
Basaltjaspis, Marburg . 91 II 246
Basaltlehm, Odenwald . 91 II 252
Basaltobsidianbomben, Kilimandscharo . . . 91 II 88
Basalttuff, Breitfirst . . 92 I 280
— Giessen . . . . . 92 II 418
— Stromboli . . . . . 92 I 519
Basanit, Afrika . . . . 92 II 426
— Cabo de Gata . . . 92 II 424
— Hessen . . . . . 91 II 278
— Kaiserstuhl . . . . 93 II 504
— Mt. Vulture . . . BB VII *601*
Baseopsis sibirica . . . 91 II 357
Basiliit, Gouvernement Oerebro . . . . . 94 I 270
Basin ranges . . . . . 93 I 482
Bastit, Borzonasca . . . 92 I 288
Bastnäsit . . . . . 93 II 470
Batêa . . . . . 93 II 324
Bath . . . . . 93 II 384
Bath-Stufe, Madagaskar . 90 I *3*
Bathonien . . . . . 90 II 107
— Alpenkette . . . . 90 I 117
— Montagne de Lure . 90 II 280
— Savoyen . . . . . 94 I 348
— Süd-Frankreich . . . 91 II 323
Bathysiphon . . . . . 94 II 366
— appeninicum . . . . 94 I 394
— taurinense . . . . 94 I 394
Bathysoma Lütgeni . . 94 II 349
Bathystoma . . . . . 90 I 168
Batodon tenuis . . . . 93 I 391
Batrachier, Becken . . 93 II 406
Batrachit, mikrochemische Untersuchung . . . 94 I 7
Batrisus antiquus . . . 93 I 551
— pristinus . . . . . 93 I 551
Baumaterial-Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums Wien . 93 I 70
Baumstumpf,Carbon,Osnabrück . . . . . 91 I 440
Bauxit . . 1892 I 277. 93 II *78*
— Bildung . . . . . 94 I *460*
— Garlaban . . . . . 90 II 85
Bayanoteuthis . . . . 92 II 361
Baylea Koninckii . . . 94 I 517
Bear River Formation, Wyoming . . . . . 94 I 355
Beaumontit, Schweden . 90 I 406
— Ramsö . . . . . 91 II 87
Beben, kryptovulcanische 94 I 455
— tektonische . . . . 94 I 454
— vulcanische . . . . 94 I 455
Becken, Entwickelung . 93 II 403
Beckengürtel der Schildkröten . . . . . 94 I 183
Beecherella angularis . . 94 II 164
— avicula . . . . . 94 II 164
— carinata . . . . . 94 II 164
— cristata . . . . . 94 II 164
— ovata . . . . . 94 II 164
— subtumida . . . . 94 II 164
Beekit, Süd-Devon . . . 91 I 232
Beerbachit, Odenwald . 94 I 290
Belemnitella mucronata 1890 II 418. 94 II *74*, 114
— plena . . . . . 90 II 411
Belemniten, Aptienmergel 94 I 384
— Classification . . . 93 II 413
— Kreide, Schweden . . 94 II *69*
Belemnites Africanus . . 90 I *9*
— binervius . . . . . 90 I *4*
— breviaxis . . . . . 93 I 353
— conicus . . . . . 90 I *4*
— cristatus . . . . . 93 I 353
— explanatoides . . . 93 I 353
— Gerardi, Jura . . . 90 I *149*
— minimus . . . . . 93 I 360
— mosquensis . . . . 93 I 353
— mucronata . . . . 90 I 170
— obeliscoides . . . . 93 I 353
— obtusirostris . . . . 93 I 353
— pistilliformis . . . . 90 I *4*
— plenus . . . . . 92 I 366
— polygonalis . . . . 90 I *4*
— Rouilleri . . . . . 93 I 353
— speetonensis . . . . 93 I 353
— westfalicus . . . . 91 I 165
Belemnocrinidae . . . . 92 II 168
Bella bucciniformis . . 90 II 153
Bellasien, Portugal . . 94 I 353
— Torres-Vedras . . . 93 II 159
Bellerophon 1890 II 151. 92 II 372
— Antonii . . . . . 93 II 521
— Bolivien . . . . BB VIII *41*
— carinatus . . . . . 93 II 521
— latofasciatus . . . . 90 II *237*

Bellerophonkalk, Kärnten 1892 I 117
— Süd-Tirol . . . . . 93 I 120
Belonesia . . . . . 92 II 256
Belonorhynchus gigas . . 94 II 162
— gracilis . . . . . 94 II 162
Belonostomus Comptoni . 93 I 173
— indicus . . . . . 91 II 342
Beloptera . . . . . 92 II 361
Belopterina . . . . . 92 II 361
Belostoma deperditum 1890 II *20*. 91 I *50*
Beloveszaschicht, Karpathen . . . . . 93 II 142
Beluga, Kaukasus . . . 94 I 507
Bendigo-Goldfeld, Australien . . . . . 93 II 351
Beneckeia . . . . . 90 I 357
— Buchi . . . . . 94 II 141
— cognata . . . . . 94 II 141
Benettia grosse-serrata . 93 II 434
Benettites . . . . . 90 I 172
Benthos . . . . . 93 II 303
Benzil . . . . . BB VII *30*
Berca-Sandsteine, Ohio . 94 II 442
Berezit, Ural . . . . . 94 I 86
Bergbau, Banat . . . . 90 II 72
— der Alten . . . . . 93 II 350
— in Spanien . . . . 93 II 61
— Münsterthal . . . . 90 II 253
Bergholz, Rhodus . . . 94 I 74
Bergkalk, Armenien . . . 91 I 277
Bergmagnetometer . . . 90 II 237
Bergmilch . . . . . 94 I 260
Bergpech, Schweden . . 93 I 497
Bergrutschungen . . . 93 I 45
Bergschlipf bei S. Paolo . 93 II 50
— Victoria . . . . . 94 II 418
Bergstürze . . . . . 93 I 45
— 1892 am Arlberg 1894 I 285, 457. II 41
Bergwerksindustrie, Quebec 93 I 261
Bergwesen, Canada . . 90 II 383
Bernardinit . . . . . 94 I 53
Bernissartia . . . . . 90 II 324
Bernissartien, Hennegau . 91 II 441
Bernstein, baltischer . . 93 I 211
— Barma . . . . . 94 I 52
— Fauna . . . . . 92 II 459
— Nordamerika . . . . 91 I 208
— Pflanzenreste . . . 92 II 378
— Sicilien . . . . . 94 I 52
— Süd-Mexico . . . . 93 I 256
Bernsteinbäume 1892 II 178. 93 I 577
Bernsteinfauna . . . . 93 I 551
Bernstein-Inclusen, Sicilien 94 II 469
Bernstein-Insecten . . 1894 II 166
Bernstein-Käfer . . . . . 92 I 424
Berrias-Stufe . . . . . 92 I 361
Berthierit, Como . . . 94 II 18
Bertrandit . . . . . 93 II 468
— Colorado . . . . . 91 II 41
— La Chapelle-sur-Erdre 93 I 239
— Limoges . . . . . 92 II 218
— Mt. Antero . . 1892 II 27, 29
— Pisek 1890 I 39. II 55. 91 I 27
— Stoneham . . . . . 92 II 29
Berycopsis Lindströmi . 94 II 349
Beryll . . . . . 93 II 468
— Aenderung des optischen Verhaltens bei Deformationen . . BB VIII *255*
— Allier . . . . . 93 II 264
— Colorado . . . . . 91 I 36
— Elba . . . . . 93 II 26
— Hiddenit-Pocket . . 90 II 48
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *358*, *385*
— im Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *399*
— Maine . . . . . 91 II 39
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Mt. Antero . . . . 92 II 27
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Nord-Amerika . . . 92 I 500
— optische Anomalie . . 93 I 457
— Puy-de-Dôme . . . . 90 I 35
— Sant' Illarione . . . 93 I 32
— S. Piero . . . . . 92 I 229
— Südwest-Afrika . . . 90 I *114*
— Synthese . . . . . 94 I *275*
— Ural . 1891 II 249. 94 II 225
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Willimantic . . . . . 91 II 241
Beryllium . . . . . 94 I *6*
Berylliumoxyd . . . . 94 I *6*
Berylliumsulfat . . . . 92 II 207
Beryllonit, Maine . . . 91 II 44
Beryllpseudomorphose . . 90 II 379
Bestimmung der Mineralien, Reactionen . . 93 I 230
— — Tabellen . . . . 93 I 226
Betula fallax . . . . . 90 I 373
— nana, Torflager im Nord-Ostsee-Canal . . 91 II 76
— paucidentata . . . . 94 I 531
— Schimperi . . . . . 90 I 373
— sublenta 1893 II 566. 94 I 228
Betulinium . . . . . 92 I 613
Betuloxylon Geinitzii . . 91 II 206
Bewaldung Südrusslands . 91 I 316

Bewegungen auf den Chemnitzer Erzgängen . 1893 I 79
— der Continente 1890 II 235. 93 I 45
— moleculare, in Gesteinen 93 II 335
Beyrichia . 1892 I 581. 94 I 514
— acadica . . . . . 91 I 154
— aequilatera . . . . 91 I 334
— arcuata . . . . . 91 I 154
— bidens . . . . . 94 II 468
— borussica . . . . . 92 II 360
— carinata . . . . . 94 II 467
— Chambersi . . . . . 92 II 372
— Clarkei . . . . . 91 I 334
— Damesii . . . . . 93 II 411
— devonica . . . . . 91 II 460
— — Devonshire . . . . 90 I 184
— diffissa . . . . . 91 II 461
— digitata . . . . . 91 I 430
— dissecta . . . . . 94 II 467
— erratica . . . . . 91 I 430
— Gedanensis . . . . . 92 II 360
— granulata . . . . . 91 I 334
— Hallii . . . . . 91 I 334
— hamiltonensis . . . . 91 I 334
— harpa . . . . . 94 II 467
— hieroglyphica . . . . 93 II 411
— Kloedeni 1891 I 154. 91 II 460
— Kochii . . . . . 92 II 360
— Kolmodini . . . . . 91 II 460
— Lyoni . . . . . 92 II 459
— mammillosa . . . . . 94 II 467
— marchica . . . . . 91 I 430
— munda . . . . . 90 I 166
— navicularis . . . . . 90 I 166
— oculina . . . . . 91 I 334
— palmata . . . . . 91 I 430
— parasitica . . . . . 91 I 334
— plicatula . . . . . 94 II 467
— primitiva . . . . . 91 I 154
— protuberans . . . . . 92 II 360
— pustulosa . . . . . 92 II 360
— radians . . . . . 94 II 467
— radula . . . . . 90 I 166
— Reuteri . . . . . 93 II 411
— rostrata . . . . . 94 II 467
— signata . . . . . 94 II 467
— simulatrix . . . . . 92 II 459
— Steusloffi . . . . . 93 II 411
— subquadrata . . . . . 91 II 460
— tricollina . . . . . 92 II 459
— trisulcata . . . . . 91 I 334
— Wilckensiana . . . . 92 II 360
Beyrichien in untersilurischen Geschieben . . . 91 I 430
Beyrichienkalke . . . . . 92 I 556
Beyrichit . . . . . 1894 I *33*
— Altenkirchen . . . . . 93 II 259
Biancone, Südtirol . . . . 94 I 486
Biancone-Fossilien, Venetien . . . . . 93 I 379
Biber, Saint-Girons . . 94 II 138
Bicknell-Sandstein, Californien . . . . . 94 II 112
Bicornes . . . . . 91 I 344
Bief à silex, Artois . . 91 I 120
Biflustra scutelliformis . 90 I 166
Bifrontia Crenensis . . 91 II 463
Bignonia gigantifolia . . 93 II 434
Billingsella . . . . . 93 II 205
Billingsites . . . . . 91 II 359
Biloculina discus . . . 94 II 367
— nodosa . . . . . 94 II 367
— undulata . . . . . 93 I 567
Bimammatus-Zone, Polen 94 I 487
— Portugal . . . . . 94 I 142
Bimsstein . 1892 I 74. 93 II 307
— Campanien . . . . 91 II *309*
— italienischer . . . . BB VII *427*
— Krakatoa . . . . . 94 I 278
— Löslichkeit . . . . . 91 II 404
Bimssteinsand, Giessen . 91 I 18
Bimssteintuffe, Giessen . 92 II 418
Bindi limestone, Australien 91 II 313
Binnenmollusken, Eocän . 94 I 363
Binnit, Binnenthal . . . 94 II 220
— hemiëdrische Krystalle 94 II 19
Biographie v. E. Mitscherlich . . . . . 94 II 393
Biotit . . . . 1893 II 266, 487
— Analyse, Henderson Co. 94 I 33
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *323, 380*
— im Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *397*
— im Tonalit, Adamellogruppe . . . . . BB VII *477*
— in Andesit . . . . . 94 I 466
— in Anorthitfels, Canada BB VIII *443*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *344*
— in Granit, Ortasee . 94 I 446
— in Tuff, Campanien . 91 II *307*
— Lava des Mt. Vulture BB VII *599*
— Leilenkopf . . . . . 93 I 488
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Neubildungsproduct von Grauwacken . . 90 II *187*
— secundäre Bildung in Glimmerschiefer . . 94 II 426
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *41*
— Südwest-Afrika . . . . 90 I *113*

Biotit, Synthese . . . 1892 II 270
Biotit-Andesit, Cabo de Gata . . . . . 93 I 283
— Japan . . . . . BB VII *147*
— Pusztafalu . . . . 91 II 72
— pyroxenführend, Cingolina . . . . . 93 I *131*
Biotit-Augitgranit, Elsässer Belchen . . . . . 93 I 489
Biotit-Augit-Porphyrit, Devonshire . . . . 94 I 300
Biotit-Diorit-Porphyrite, Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
Biotitgneiss, Altenberg . 93 I 92
— Argentinien . . . BB VII *349*
— Berra, Schweiz . . BB VIII *198*
— Centralplateau, Frankreich . . . . . 93 I 299
— granatführend, Unteritalien . . . . . 91 II 55
— Habendorf, Schlesien . 90 II 243
— Insel Barbe, Lyon . . 90 I 215
— Insel Sark . . . . 93 I 285
— mit Sillimanit, Ceylon 90 II 99
— Pfalz . . . . . 93 II 328
— Saint Nazaire . . . 93 I 275
— Süd-Georgien . . . 91 II 105
— Zuli, Congo . . . . 94 I 302
Biotitgranit, Finnland . 94 I 75
— Grossdehsaer Berg . 90 II 68
— Habkern, Schweiz . BB VIII *208*
— Margeride . . . . 93 II 101
— Ormonds, Schweiz . BB VIII *186*
— Pfalz . . . . . 93 II 328
— Transvaal . . . . BB VII *118*
— Unteritalien . . . . 91 II *54*
Biotithornfels . . . . 94 I 71
Biotit-Peridotit, New York 93 I 290
Biotit-Sillimanit-Gneiss, Ceylon . . . . . 93 I 506
Biotit-Trachyt, östlicher Balkan . . . . . 90 I *281*
Birkenhölzer, fossile . . 91 II 206
Biselenaria offa . . . . 94 I 202
Bismutit, Colorado . . . 94 II 31
— Jackson Co. . . . . 90 II 46
Bismutosphaerit . . . . 91 I 40
Bithinella Falloti . . . 94 II 356
Bithinia Chedevillei . . 91 II 463
— goniophora . . . . 91 II 463
Bittersalz, Astrachan . . 93 I 40
— Idria . . . . . 93 I 464
— Sibirien . . . . . 94 I 92
— Thal des Sabato, Unteritalien . . . . . 91 II 46
Bitubigera compressa . . . 90 I 165
Bitumen, Eisenerzlager, Schweden . . . . 1894 I 432
Bitumina . . . . . 92 I 270
Bivalven, Kreide, Syrien 94 I 190
— Tunis . . . . . 93 II 157
Bivalven-Fauna, Argentinien . . . . . 93 I 124
Blattabdrücke in senonen Thonschichten, Bunzlau . . . . . 92 II 376
Blattbeben . . . . . 94 I 455
Blau, ägyptisches . . . 90 II 40
Blauneria Guestieri . . 94 II 356
Blauquarz, Saalekinnen . 93 I 114
Blechnum antediluvianum 93 II 434
Blei . . . . . 94 I *19*
— Dimorphie . . . . 92 II 3
— Gesammtproduction . 91 II 293
— im Neotesit, Gouv. Oerebro (Schweden) . 90 II 53
— Mexico . . . . . 94 I 252
— Sjögrubenfeld . . . 90 II 53
Bleibergbau, Siebenbürgen 92 II 72
Bleibromid . . . . . 94 I *44*
Bleichlorid . . . . . 94 I *44*
Bleierz, Donetzgebiet . . 94 II 414
— Mendoza . . . . . 93 I 103
— Oberschlesien . . . 94 I 87
— Russland . . . . . 93 II 61
— Vorkommen im böhmischen Mittelgebirge . 90 II 257
Bleierz-Formation, edle, Kötzschenbroda . . . 93 II 91
Bleiglanz . . . . . 91 II 11
— Heilbronn . . . . . 93 II 36
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Mies . . . . . 93 I 10
— Nil-St.-Vincent . . . 94 II 398
— Oberflächenschicht . . 90 I 12
— Pontgibaud . . . . 93 II 264
— Sardinien . . . . . 94 I 82
— Silberberg . . . . 92 II 70
— silberhaltig, British Columbia . . . . . 90 II 384
— silberhaltig, Donetzgebiet . . . . . 94 I 470
— silberhaltig, Serbien . 90 II 75
— Südnorwegen . . . 92 I 238
— Südwest-Afrika . . . 90 I 105
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Tunis . . . . . 92 II 74
— Tyndrum, Analyse . 90 II 220
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
Bleijodid . . . . . 94 I *39*
Bleiniere, Mies . . . . 93 I 13
— nach Bournonit, Litica 93 I 248

Bleinitrat, optische Anomalien . . . . . 1892 I *200*
Bleioxyd . . . . . 94 I *19*
Blende . . . . . 91 II 406
— Altai . . . . . 90 II 20
— Härtecurve . . . . 91 II 9
— Kamenskaya . . . . 91 II 15
— Verespatak . . . . 90 I 397
Blocklehm, Bildung . . . 94 I 364
— Russland . . . . . 94 II 327
— Santander . . . . . 90 I 81
Blocktransport, Skandinavien 1890 II 130, 265. 94 II 458
Blöcke, erratische, Sisley-Bill . . . . . 93 I 136
— exotische, Flysch, Schweiz . . . . . BB VIII *180*
— — Karpathen . . . 93 II 143
Blödit . . . . . 91 II 21
— Chile . . . . . 90 II 276
— Douglashall b. Westeregeln . . . . . 90 I 29
Blue Clay, Malta . . . . 91 II 132
Bodenabsorption . . . . 90 I 133
Bodenanalysen, Washington . . . . . 91 I 276
Bodenarten, Absorptionsfähigkeit . . . . . 90 I 262
— Classification . . . . 91 II 335
Bodentemperatur, Elsass . 94 II 245
— Königsberg . . . . . 94 II 37
Bohnerz, Paraguay . . . 93 I 506
Bohrloch, Anvers . . . . 93 II 533
— Lucknow . . . . . 94 II 338
— Manitoba . . . . . 93 I 334
— südöstliches England . 91 II 121
— Sulz, Württemberg 1892 II 39. 93 II 522
— Wiesbaden . . . . . 91 I 118
Bohrprofile, Diluvium, Utrecht . . . . . 94 II 333
Bohrungen, Tees District 94 I 472
—, Texas . . . . . 94 I 495
Bokum-Beds, Texas . . . 93 I 379
Bolca-Stufe, venetianische Alpen . . . . . 94 I 493
Boldérien . . . . . 93 I 524
Boleït . . . . . 93 I 232
Bolivina campanulata . . 94 II 367
— euplectella . . . . 91 II 175
— glutinata . . . . . 94 II 367
— ovata . . . . . 94 II 367
— strigillata 1893 II 560. 94 I 393
— substriata . . . . . 94 II 367
Bollia bilobata . . . . . 91 II 460
Bollia duplex . . . . 1894 II 467
— granifera . . . . . 92 II 459
— granulosa . . . . . 91 I 430
— Hindei . . . . . 91 II 460
— major . . . . . 94 II 467
— minor . . . . . 94 II 467
— obesa . . . . . 92 II 459
— pumila . . . . . 92 II 458
— rotundata . . . . . 93 II 411
— semicircularis . . . . 93 II 411
— semilunata . . . . 91 II 461
— sinuata . . . . . 93 II 411
— symmetrica . . . . . 91 I 334
— ungula . 1891 I 335. 92 II 459
— V-scripta . . . . . 91 I 430
Bolites . . . . . 93 II 75
Bolodon . . . . . 92 II 340
— Wealden . . . . . 94 II 154
Bolodontidae . . . . . 92 II 341
Bombaciphyllum opacum . 93 II 434
Bombax firmifolium . . . 93 II 434
— playense . . . . . 93 II 434
Bonarówkaschichten, Karpathen . . . . . 93 II 141
Bonebed, Erklärung desselben . . . . . 91 II 317
Boninit, Peel Island 1892 I 311, 313
Bor . . . . . 94 I *22*
Boracit . . . . . 1892 I *199*, *202*
— Douglashall b. Westeregeln . . . . . 90 I 29
— künstliche Herstellung auf nassem Wege . . 91 I 240
— optische Anomalie BB VII *1*. 93 I 28
— specifische Wärme . . 92 II *125*
Bornetella nitida . . . 93 II *137*
Bornia Enosti, Steinkohlenbecken von Autun . . 90 II 348
— männliche Fruchtorgane 90 II 349
Borsäure, Bestimmung derselben . . . . . 91 I 42
Borsonia . . . . . 92 I 588
Bos Bison . . . . . 93 I 539
— bubalus, Algier . . . 93 I 544
— primigenius . . . . . 93 I 183
Bosque Division, Texas . . 94 I 151
Bothriolepis 1892 II 358. 93 I 177
Bothrodendron . . . . . 92 I 197
— Wükianum . . . . . 91 II 205
Bothrolabis pristinus . . . 90 II 323
— subaequans . . . . . 90 II 322
— trichaenus . . . . . 90 II 323
Botriopygus Alabaminensis 93 II 209
Botryocrinites . . . . . 92 II 168
Botryocrinus pinnulatus . 93 II 558

Botryocrinus quinquelobus 1893 II 558
Botryogen . . . . . 90 I *65*
Botryopteriden . . . . 94 II 482
Bottosaurus belgicus . . 94 I 183
— Harlani . . . . . 94 I 183
Boulder beds, Saltrange . 93 II 117
— clay, Essex . . . . 90 II 423
— Mündung des Dee . 91 II 140
Bournonit . . . . . 91 II 405
— Nagybánya . . . . 94 I 252
— Oberzeiring, Steyermark 90 II 17
Bouryia . . . . . 90 II 151
Bouteillenstein, Böhmen . 94 I 266
Boutillieria . . . . . 90 II 151
Bowenit . . . . . 92 I 44
Bowmanites Dawsoni 1893 I 205. 94 II 372
— germanicus . . . . 94 II 371
Brachiopoden, alpine Trias 1892 I 437. II 463. 93 II 418
— Amerika . . . . . 93 II 202
— Belluno . . . . . 93 I 408
— Bolivien . . . . . BB VIII *51*
— der cambrischen und silurischen Diluvialgeschiebe . . . . . 92 I 182
— des Hallstätter Kalks, Neuburg an der Mürz 91 II 318
— Eintheilung . . . . 94 I 200
— Entwickelung . . . . 92 I *178*
— Grauwacke von Seifen 93 I *1*
— Hercyn, Nord-Amerika 93 I 118
— Hindelang . . . . 93 II 379
— Jura, Südtirol . . . 91 I 485
— Lias, Hallstatt . . . 91 I 160
— — Puntadura u. Longobucco . . . . . 93 I 409
— Mt. Grappa . . . . 94 I 505
— Salzburgischer Hochkorallenkalk . . . . 90 I 100
— Serajewo . . . . . 94 II 107
— Silur-Entwickelung . 91 II 184
— St. Cassian . . . . 90 II 333
— tertiäre, Wiener Becken 90 II 154
— Tiefsee . . . . . 93 II 305
— Untersilur, Minnesota 93 I 116
Brachiospongia . . . . 92 II 371
— digitata 1891 II 462. 92 II 372
Brachymylus 1893 II 547. 94 I 383
Brachyopina . . . . . 94 I 512
Brachytrema Cossmanni . 93 I 381
— parvula . . . . . 93 I 381
Brachyuren, mitteloligocäner Septarienthon . 91 II 355
Bradicardia . . . . . 92 II 138
Bramatherium 1890 II 432. 93 I 543
Branchiacanthus semiplanus . . . . . 91 II 168
Branchiosaurier . . . . 93 I 471
Branchiosaurus amblystomus . . . . . 93 II 407
— caducus . . . . . 93 II 407
— gracilis . . . . . 91 II 158
Brandtit, Analyse . . . . 93 II 9
Brasonia purpurea . . . 92 I *132*
Brauneisenerz, Afrika . . 92 II 426
— Capo Bianco, Elba . 90 II 18
— Donetzgebiet . . . . 94 I 469
— Kaiserstuhl . . . . 93 II 504
— Säulenbildung . . . . 91 I 20
— See von Vico . . . 91 I 11
— Spessart 1893 I 87. 94 I 309
Braunit . . 1894 I *20*. 94 II 405
— Gouv. Oerebro . . . 90 I 260
Braunkohle . . . . . 93 II 244
— böhmisches Mittel-Gebirge . . . . . 93 II 97
— Bommersheim . . . 93 I 133
— Italien . . . . . 94 II 276
— Ostgalizien . . . . 93 II 84
— Rumänien . . . . . 91 II 84
— versteinert . . . . 91 I 19
Braunkohlenformation, Colmnitz, Sachsen . . 91 I 85
— des nördlichen Harzrandes . . . . . 93 I 363
— Kloster St. Marienstern, Sachsen . . . 94 II 287
— Königswartha . . . 93 II 94
— Kötzschenbroda . . . 93 II 92
— Lausitz . . . . 1892 II 83, 84
— Meissner . . . . . 93 II 164
— Strassgräbchen, Sachsen 94 II 288
Brazilit . 1892 II *141*. 93 I *89*
Breccien, Bergmassiv von Menez-Hom . . . . 90 II 399
— Chablais . . . . . 93 II 59
— Höttinger . . . . . 91 I 132
— Isère . . . . . 94 I 491
— mikrogranitisch, Forez 90 II 81
— vulcanische, Randecker Maar . . . . . 90 II 256
— Weitensteiner Gebirge 91 II 119
Breccienmarmor, Tekerö . 90 I 397
Breccienstructur des Anorthosit . . . BB VIII *454*
Brechungsexponent mikroskopischer Krystalle . 94 II 210
Brechungsexponenten, Bestimmung . . . . . 93 I 8

Brechungsgesetz bei Metallen . . . . . 1894 I 246
Brechungsindex des Diamant, Veränderung mit der Temperatur . . 93 II 13
Brechungsindices isomorpher Stoffe . . . . 92 I 12
— d. Krystalle, Abhängigkeit von der Temperatur . . . . . 92 II 393
Breithauptit, Analyse . . 93 II 15
Brennstoffe . . . . . 94 I 468
Brennstoff-Lagerstätten Russlands . . . . . 93 II 60
Bretonian . . . . . 92 I 112
Breunerit, Umwandlungsproduct des Olivins in Alnöit . . . . . 93 I 291
Brewsterit, Krystallform . 92 I *14*
— optische Eigenschaften 92 I *33*
— Zusammensetzung . . . 92 I *26*
Breynella equizonata . . 94 II 178
Brissus depressus . . . . 94 II 179
Brithopus . . . . . 91 II 344
Brocchia . . . . . 92 II 361
— argentina . . . . . 94 I 370
Brochantit, Chile . . . . 90 II 45
— Utah . . . . . 91 II 49
Brodkrustenbomben, Volcano . . . . . 93 II 49
Brom, Verwendung desselben statt Chlor bei Analysen . . . . . 91 II 405
Bromal, specifisches Gewicht . . . . . 94 II 3
Brombenzylcyanid, Para- BB VII *12*
Bromnatrium, zur Herstellung monochromatischen Lichtes . . . . 91 I 199
Bromzimmtaldehyd . . . . 91 II *12*
Bronteus . . . . . 92 I 422
— Kalkfauna von St. Malo 90 II 293
— pardalios . . . . . 90 I 152
— sibiricus . . . . . 93 II 374
Brontops robustus, Miocän 90 II 140
— validus . . . . . 94 I 182
Brontornis, Argentinien . 93 I 545
Bronzit, Andesit, Japan BB VII *136*, *149*
— Basalt, Marburg . . . 91 II *184*
— Grönland . . . . . 91 II 24
— in Chondrit, Lundsgården . . . . . 92 I *139*
— in Chondrit, Misshof 1892 I *90*, *98*
— in Sanukit, Japan . BB VII *146*
— Lava des Mt. Vulture BB VII *600*
Bronzit-Limburgit . . . 1892 I 312
Bronzitserpentin, Rosswein, Sachsen . . . . 91 I 72
Brookit . . 1893 II 344. 94 I *24*
— Beura . . . . . 91 I 14
— Californien . . . . . 94 II 31
— Contactmineral . . . 92 I *159*
— Goldsand der Region des Kane, Gouv. des Jenissei . . . . . 90 I 15
— Magnet Cove, Arkansas 90 I 224
— Saint Nazaire . . . . 93 I 237
— specifische Wärme . . 94 I 249
— Tirol . . . . . 93 I 253
Browneichthys . . . . . 91 II 455
Bruchlinie, Mähren . . . 94 II 80
Bruchsystem, Syrien . . . 94 II 293
Bruchzone, Ostafrika . . 94 I 106
Brucit . . . . . 94 I *38*
— Synthese . . . . . 94 I 12
— Ural . . . . . 91 II 14
Bruckmannia fertilis . . 94 I 218
Bruiachit . . . . . 91 I 233
Brunnen . . . . . 93 I 45
Brunnenbohrungen, Mähren 90 I 452
Brushit, Dép. Hérault . . 94 II 27
Bruxellien . . . . . 93 I 524
Bryozoen 1892 I 446, 590. 93 II 305
— der Kreidegeschiebe Mecklenburgs . . . 92 II 156
— Eintheilung . . 1894 I 201, 389
— Halbinsel Kertsch . . 90 II 154
— Jura . . . . . 91 II 369
— Kreide, Schweden . . . 94 II 360
— Modena . . . . . 94 I 518
— palaeozoische . . . . 92 I 183
— Red Chalk v. Hunstaton 91 II 369
— Schreibkreide, Rügen. 90 I 161
— Senon . . . . . 94 I 203
— Wola Luzanska . . . 91 II 369
Bryaxis glabrella . . . . 93 I 551
— veterum . . . . . 93 I 551
Bucania . . . . . 90 II 151
Buccinidae . . . 1891 II 177, 180
— oberes Miocän . . . . 91 II 464
Buccinum . . . . . 92 II 361
Buccitriton scalatum . . 93 I 538
Buchit in Basalt, Marburg 91 II *236*
Bulges . . . . . 93 II 352
Bulimina baccata . . . . 91 II 175
— capitata . . . . . 91 II 175
— cuspidata . . . . . 94 II 476
— ezoënsis . . 1891 II 173, 175
— ornata . . . . . 94 II 367
— porrecta . . . . . 94 II 476
— Schwageri . . . . . 91 II 175

Bulimina trigona 1893 II 560. 94 I 393
Buliminus samius . . . 94 II 432
Bulimus . . . . . 93 I 554
— decollatus . . . . . 93 I *65*
Bulla . . . . . 91 II 328
— Bezançoni . . . . . 91 II 463
Bunker-Andesit, Rosita Hills . . . . . 93 I 294
Bunodella horrida, Silur. 90 II 328
Bunodontheridae, Eocän, Santa Cruz . . . . 93 I 387
Bunodontherium patagonicum . . . . . 93 I 388
Bunsenit . . . . . 94 I *19*
Buntkupfererz, British Columbia . . . . . 90 II 384
— Kishorn, Analyse . . 90 II 220
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Südwest-Afrika . . . . 90 I *105*
Buntsandstein, Elsass . . . 91 II 108
— Gerölle, Schwarzwald 94 II *97*
— Haardtgebirge . . . . 90 II 293
— Heidelberg . . . . . 92 II 85
— Leinethal . . . . BB VII *255*
— Liverpool . . . . . 91 II 122
— Meissen . . . . . 91 I 94
— Mosbach, Neckarthal . 94 I 341
— Nordrand des Spessarts 90 II 407
— Pseudomorphosen nach Kalkspath, Vogesen . 90 I 18
— Spessart 1893 I 85. 94 I 309
— Verbreitung in Deutschland . . . . . 91 I 292
— Waldeck . . . . . 93 I 342
Buntsandstein-Gebiete, deutsche, Oberflächengestaltung u. anthropogeographische Verhältnisse . . . . . 93 I 517
Burdigalien . . . . . 94 I 491
Burmit, Birma . 1894 II 409—411
Bursulella rostrata. . . 93 II 411
Buxaceen . . . . . 91 I 337
Byrrhus ottawensis . . 93 II 549
Byssopteria . . . . . 93 I 404
Bythinella cyclothyra . . 93 I 554
— gracilis . . . . . 93 I 554
Bythinia Leberonica . . . 90 II 332
Bythinus caviceps . . . 93 I 551
— foveopunctatus . . . 93 I 551
— tenuipes . . . . . 93 I 551
— typicus . . . . . 93 I 551
Bythocypris Browni . . 94 II 165
— cornuta . . . . . 93 II 411
— devonica . . . . . 92 II 459
Bythocypris favulosa . . 1891 I 335
— indianensis . . . . . 92 II 459
— Lindströmi . . . . 91 II 461
— obtusa . . . . . 91 II 461
— oviformis . . . . . 91 I 335
— punctulata . . . . 92 II 459
— Römeriana . . . . . 94 II 165

C.

Ca $(Sb\,O)_2$ $(C_4H_4O_6)_2$ + KNO_3 + H_2O, Krystallform . . . . . BB VIII *525*
Cadmium . . . . . 94 I *10*
Cadmiumoxyd . . . . 94 I *10*
Cadomia . . . . . 91 II 363
Cadulus . . . . . 92 II 361
Caecum monterosatus . . 90 II 153
— Nystii . . . . . 90 II 153
Caenobasileus tremontigerus . . . . . 91 II 154
Caenopithecus lemuroides 93 I 149
— pygmaeus . . . . . 93 I 149
Caenopodidae . . . . . 90 II 319
Caesalpina . . . . . 91 II 382
Caesalpiniaceen . . . . . 91 I 343
Caesaria oliganthoides . 93 II 434
— piparoides . . . . . 93 II 434
— serrata . . . . . 93 II 434
— spinulosa . . . . . 93 II 434
Cainotherida . . . . . 93 I 148
Cainotherium . . . . . 93 I 148
Calamariae . . . . . 93 I 425
Calamarieen, Bassin du Gard . . . . . 1894 I 218, 221
Calamitengneiss, östliches Aarufer . . . . . 94 I 297
Calamites . 1893 I 536. 94 II 371
— frondosus . . . . . 94 I 218
— penicellifolius . . . . 94 I 218
Calamocladus decipiens . 94 I 218
— lignosus . . . . . 93 I 204
— parallelinervis . . . 94 I 218
Calamocrinus . . . . . 90 I *95*
— Diomedae . . . . . 93 I 562
Calamodendreen . . . . 93 I 205
Calamodendron fallax . . 94 I 218
— inaequale . . . . . 93 I 205
Calamodendrostachys dubius . . . . . 93 I 205
Calamodon europaeus 1891 II 146. 93 I 149
Calamophyllia, Griechenland . . . . . 93 I 129

Calamosaurus Foxi . 1894 I 379
Calamospondylus Foxi . 90 I 347
Calamostachys Binneyana 91 I 172
— — Fruchtorgane . . . 90 II 349
— Marii . . . . . 94 I 218
— squamosa . . . . . 94 I 218
— vulgaris . . . . . 94 I 218
Calathium paradoxicum . 91 II 199
Calcari alberesi, Florenz 93 II 169
Calceocrinidae . . . . 92 II 168
Calceola-Kalkstein, mikroskopische Untersuchung . . . . . 94 I 300
Calceola-Schichten . . . . 90 II *231*
Calciferous Formation . 92 I 542
Calciostrontianit, Brixlegg 90 I 412
Calciothorit, Südnorwegen 92 I 242
Calciphyton praecambrii, Hracholusk, Böhmen . 93 II 126
Calcisphaera Lemoni . . 90 I 372
Calcispongiae. . . . . 90 II 163
Calciumcarbonat, amorphes, Bildung . . . . 91 I 88
— heteromorpheZustände 93 II 7
— Krystallisation aus verdünnten Lösungen. . 94 II 6
— neue Modification . . 94 II 6
— Schmelzung . . . . 94 I 305
Calciumvanadopyromorphit, Schottland . . . 91 II 18
Caledonit . . . . . 91 I 233
— Schottland . . . . . 91 II 17
Caliapora . . . 1890 II 160, 162
Callianassa . . . . . 92 II 457
— Dyki, Java . . . . . 90 I 313
Callidonna. . . . . 94 I 205
Calliostoma Zetschini . . 92 II 362
Callipteridium Rochei. . 93 II 216
Callipteris bibractensis . 93 II 216
— conferta . . . . . 93 I 573
— Jutieri . . . . . 93 II 216
— latifrons . . . . . 93 I 573
— Pellati . . . . . 93 II 216
Callista syriaca . . . . . 93 I 538
Callitrichaceen . . . . . 91 I 337
Callognathus . . . . . 93 I 176
Callopora Waageni . . 94 I 171
Callovien, Baden . . . . 94 I 140
— Montagne de Lure . 90 II 280
— Savoyen . . . . . 94 I 348
— Steierdorf-Anina . . 93 I 123
— Südfrankreich . . . . 91 II 323
Calomel, Avala 90 I 25. 91 I 25
Calophyllum Nathorsti . 91 II 209
Calostylis . . . . . 92 II 370
Calpiocrinus . . . . . 93 II 518
Calymene, Kalkfauna von St. Malo . . . . . 1890 II 293
Calymenella . . . . . 91 II 459
Cambrium . 1893 II 501. 94 I 117
— Acadia . 1891 I 285. 92 II 296
— Argentinien . . . BB VII *296*
— Bingen. . . . . 91 I 115
— Bornholm . . . . . 93 I 143
— Bristol-County, Massachusetts . . . . . 90 I 97
— Caernarvonshire 1892 II 295. 93 I 115
— Canada . . . . 1891 II 112, 310
— Classification . . . . 92 I 109
— Dalarne . . . . . 94 I 477
— Eruptivgesteine. . . . 92 I 271
— Fauna . . . . . 92 II 328
— Geschiebe auf Oeland 93 I 144
— Gouv. Minsk. . . . . 92 II 95
— Lappland . . . . . 93 II 108
— Massachusetts . . . . 91 II 436
— Montagne Noire 1890 I 96, 285. II 289
— nördl. Norwegen . . . 93 II 109
— Normandie . . . . . 91 I 284
— oberes, Amerika . . 94 I 373
— Pyrenäen 1893 I 509. 94 I 474
— Quebec . . . . . 91 II 438
— Sachsen 1891 I 76. II 271. 94 II 281
— Sandomir . . . . . 92 I *69*
— Sardinien . . . . . 93 II 127
— Schlesien . . . . . 91 I 64
— Selkirk-Range . . . . . 92 II 96
— South Mountain . . . 94 I 333
— Tejrovic . . . . . 94 II 95
— Vermont . . . . . 92 II 96
— Vogtland . . . . . 92 II 79
— Wales . . . . . 90 I 95
— Westeuropa . . . . 92 I 109
Camelopardalis 1890 II 433. 92 I 405
— parva . . . . . 93 I 543
Camerophoria latissima . . 94 II 146
— Sancti Spiritus . . . 94 II 146
Camerospongia Schlüteri. 93 I 566
Campanien . . . . . 93 I 362
Camphoromea speciosa . 93 II 434
Campodus Agassizianus . 90 I 349
Camptomus . . . . . 90 II 142
Canäle des Mars, künstliche Nachbildung . . 91 I 62
Canale, Istrien . . . . 93 I 530
Canaliculati, Belemnitengruppe . . . . . 90 I *144*
Cancellaria . . . . . 91 II 181

Cancellaria austriaca . 1891 II 182
— bicarinata . . . . . 91 II 182
— bistriata . . . . . 91 II 179
— buccinoides . . . . . 91 II 179
— cassistria . . . . . 91 II 179
— Cossmanni . . . . . 91 II 463
— Dregeri . . . . . 91 II 182
— egregia . . . . . 91 II 179
— harpa . . . . . 91 II 179
— Hidasensis . . . . . 91 II 182
— hordeola . . . . . 91 II 179
— interstrialis . . . . . 91 II 179
— labratula . . . . . 91 II 179
— lima . . . . . 91 II 179
— nassoides . . . . . 91 II 179
— nitida . . . . . 91 II 179
— ovata . . . . . 91 II 179
— Puschi . . . . . 91 II 182
— rhombea . . . . . 91 II 179
— rugosa . . . . . 91 II 179
— Saccoi . . . . . 91 II 182
— Schroeckingeri . . . 91 II 182
— simulata . . . . . 91 II 179
— subcylindrica . . . . 91 II 179
— terebralis . . . . . 91 II 179
— tumescens . . . . . 91 II 179
— tumida . . . . . 91 II 179
Cancellaten . . . . . 91 II 384
Cancrinit, Constitution . 94 I 262
— Südnorwegen . . . . 92 I 247
Candona subovata . . . . 94 I 383
— subreniformis . . . . 94 I 383
Caniden, fossile, Heppenloch . . . . . 90 II *34*
Canina . . . . . 90 II 430
Canis megamastoides, mittleres Pliocän, Perrier 90 I 341
— Montousi . . . . . 93 I *539*
Cañons . . . . . 93 I 45
— Sierra Nevada . . . 93 I 101
Capitosaurus silesiacus . 94 I 379
Capparidoxylon . . . . 92 I 615
Cappelinit, Südnorwegen 92 I 256
Capra . . . . . 93 I 539
— aegagrus . . . . . 91 II *137*
— Falconeri . . . . . 91 II *137*
— hircus . . . . . 91 II *137*
Caprikalk . . . . . 91 II 122
Caprina adversa . . . . 91 I 159
— schiosensis . . . . . 93 II 556
Caprinen . . . . . 91 I 159
Caprinula Boissyi . . . 91 I 160
Caprotinenkalke, Mte. Maggiore . . . . . 93 I *59*
Caprovis Savinii . . . . 91 II *149*
Capulus . . . . . 91 II 182
Capulus annulatus . . . 1891 II 175
— cassidarius . . . . 91 II 174
— Foresti . . . . . 90 II 153
— polonicus . . . . . 94 I 488
— rugosus . . . . . 94 I *200*
Carabites exanimus . . 93 II 549
Carabocrinidae . . . . . 92 II 168
Caracal brevirostris . . 93 I 541
Caracolit, Atacama . . 91 I 229
Carapax-Fragmente einer Schildkröte, Bruxellien von Melsbroek . . . 90 II 325
Carbon, ägyptisch-arabische Wüste . . . . . 93 II 521
— Alpen . 1892 II 275. 93 II 507
— Arkansas . . . . . 92 II 285
— Becken von Argentat 94 I 339
— Blanzy . . . . . 93 I 302
— Boulogne . . . . . 92 I 348
— Californien . . . . 94 I 110
— Central-Iowa . . . . 94 II 441
— Donetzgebiet . . . . 94 I 469
— Dover . . . . . 92 I 349
— Fauna und Flora, Belgien . . . . . 94 I 479
— Fifeshire . . . . . 90 II 406
— französische Alpen . 92 I 545
— französisches Centralplateau . . . . . 90 II 78
— Gard . . . . . 94 I 214
— Grajische Alpen . . 94 II 292
— Graissessac . . . . . 91 II 120
— Haute-Garonne . . . 93 II 523
— Ironstone Ridge, Neu-Süd-Wales . . . . 93 II 129
— Lena . . . . . 90 II 99
— M. Pisano . . . . . 92 I 542
— Macon County, Missouri 90 I 437
— Monte Pizzul . . . 93 II 376
— — Flora . . . . . 94 II 192
— NS.-Wales . . . . . 90 II 107
— oberes, Kleinasien . . 93 II 366
— Pflanzenreste . . . . 93 II 424
— Russland . . . . . 92 II 99
— Salzbrunn . . . . . 94 II 76
— Schwarzwald . . . 93 II 131
— Semmeringgebiet . . 90 I 271
— Staffordshire . . . . 94 II 190
— Strettathal . . . . 93 II 523
— Taisnières-sur-Helpe . 94 II 101
— Texas 1892 II 283. 1893 II 111. 94 I 111, 117, 153
— Ural . 1892 I 542. 94 I 320
— Val di Susa . . . . . 92 I 349
— Valenciennes . . . . . 92 I 347
— Vallée du Cher . . . 93 II 106

Carbon, Weitensteiner Gebirge . . . . . 1891 II 119
Carbonfarne 1891 I 440. 93 II 425
Carbonflora, Yorkshire . 93 I 424
Carbonia . . . 1892 I 423. II 151
Carbonicola, Perm, Russland . . . . . 94 I 197
— indeterminata . . . 94 I 198
— nova . . . . . 94 I 198
— recta . . . . . 94 I 198
— striata . . . . . 94 I 198
— subovalis . . . . . 94 I 198
— substegocephalum . . 94 I 198
Carcharias Dyki, Java . 90 I 313
— glaucus, Kent . . . . 90 I 147
— javanus, Java . . . 90 I 313
Carcharodon angustidens 90 I 147
Cardiocarpus emarginatum 90 I 174
— Meachemii . . . . 90 I 174
Cardioceras . . . . . 90 I *143*
Cardiola-Kalk, Thüringen 91 II 118
Cardiola-Schiefer, Schonen 91 II 312
Cardiolaria . . . . . 91 II 364
Cardita . . . . . 93 II 158
— aintabensis . . . . 91 II 332
— bohemica . . . . . 91 I 157
— Cordellai . . . . . 93 II 137
— Guirandi . . . . . 91 II 176
— Martapoera (Borneo) . 90 II 416
— Rawsoni . . . . . 93 I 537
— Sandae . . . . . 90 II 332
— subrevaluta . . . . 90 II 153
— transiens . . . . . 90 I 157
Cardita-Schichten, Alpen 90 I 102
— Hochschwab . . . . 91 II 439
— Mariazell . . . . . 94 II 106
— untere . . . . . 93 II 524
Cardium 1892 II 360. 93 I 555. II 158
— acutum . . . . . 91 II 332
— bellum . . . . . 93 I 538
— Bewertense . . . . 93 I 538
— Birdanum . . . . . 93 I 538
— Bravardi . . . . . 94 I 370
— Cazecae . . . . . 90 II 119
— Cekusi . . . . . 91 II 131
— Dingdense . . . . . 93 II 200
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— Mithridatis . . . . 90 II 121
— plicataeformis . . . 91 II 131
— praeponticum . . . 91 II 131
— Tertiär, Rumänien . 94 I *163*
— Tschaudae . . . . 90 II 119
— Zetes . . . . . 91 II 176
Cardium-Bank, Succase bei Elbing . . . . . 90 I 326
Carentonien, Portugal 1894 I 353
Caricella planilirata . . 93 I 538
Carltonian, Lake Superior 94 II 265
Carnallit, Kalusz . . . . 94 I 472
Carneol, Drusenräume im Buntsandstein, Waldshut, Baden . . . . . 90 II 378
Carnivora . . . . . 90 II 430
— Europäisches Tertiär . 91 II 146
Carolicrinus . . . . . 93 II 518
Carpinoxylon . . . . . 92 I 613
Carpinus subjaponica 1893 II 566. 94 I 228
Carpites cinconae . . . 90 I 374
Carpolites andromedaeformis . . . . . 93 II 433
— cycaeformis . . . . 93 II 434
— gingkoides . . . . 91 I 177
— gregarius . . . . . 93 II *88*
— guilielmaeoides . . . 93 II 434
— striatus . . . . . 93 II 433
— Websteri . . . . . 93 II *110*
Carsosaurus Marchesetii . 94 II 465
Cartennien, Algier . . . 94 I 494
Caruncula von Euphorbia 93 II *94*
Caryates globulus . . . 93 I 538
Caryocrinus ornatus . . 91 II 193
— Vorkommen in Schweden . . . . . 91 II 193
Caryophyllia Bukowskii . 91 II 195
Caryosphaera aequidistans 94 I 395
Cascalho, Agua suja . . 94 II *299*
Cassia . . . . . 91 II 382
Cassianella angusta . . 93 II 136
— Sturi . . . . . 90 I 107
Cassianer Schicht, Süd-Alpen . . . . . 94 II *15*
Cassidaria echinata . . . 91 II 181
— haeringensis . . . . 92 II 462
— tenuis . . . . . 91 II 181
Cassidula orthezensis . . 94 II 356
Cassidulidae . . . . . 92 II 163
Cassidulina inexculta . . 91 I 165
Cassidulus florescens . . 94 I 519
— ligniformis . . . . 93 I 559
— porrectus . . . . . 93 II 209
— Stantoni . . . . . 93 II 209
— subconicus . . . . 93 II 209
Cassiope turonensis, Spanien . . . . . 90 II 414
Cassis . . . . . 92 II 361
— Fuchsi . . . . . 92 II 462
Castanit . . . . . 90 II 267
Castor . . . . . 94 I 178
— fiber . . . . . 90 II 35
Castorina . . . . . 90 II 430

Cataulacus planiceps . 1894 II 469
— Silvestrii . . . . . 94 II 469
Catena metallifera, Toscana . . . . . 93 I 303
Catenicella continua . . 94 I 519
— septentrionalis . . . 94 I 519
Cathartes, Argentinien . 93 I 545
Catillocrinidae . . . . . 92 II 168
Catopygus gibbus . . . 93 I 559
— pusillus . . . . . 93 II 209
Catskill-Gruppe, NewYork 91 II 438
— Nordamerika . . . . 94 II 100
Caulinites schoeneggensis 94 I 531
Caunopora . . . . . 92 II 371
Cavarinella . . . . . 90 I 164
— ramosa . . . . . 90 I 164
Cavicornia . . . . . 90 II 431
Cavilabium . . . . . 90 II 151
Cavoscala . . . . . 94 I 514
Cebochoerus . . . . . 93 I 148
Cecophylla sicula . . . . 94 II 469
Cedroxylon . . . . . 92 I 606
— australe . . . . . 94 I 532
— polonicum . . . . . 94 II 374
Celastraceen . . . . . 91 I 337
Celastrinoxylon affine 1891 I 352. 93 II 430
Celastrus . . . . . 91 I 337
— Gaudini . . . . . 90 I 373
Cellepora birostrata 1894 I 518, 519
— Mohammedi . . . . 94 I 174
— Protea . . . . . 94 I 174
Cellularina . . . . . 94 I 201
Cellulastraea . . . . . 91 II 129
Celtites intermedius . . . 94 II 171
Cement, Russland . . . 93 II 61
Cementbildung, natürliche, Cairo . . . . . 90 II 275
Cenellipsis hexagonalis . 94 I 395
— subsphaerica, Krakau . 90 II 343
Cenoman, Algier . 1893 I 186, 522
— Becken von Runa, Portugal . . . . . 94 I 353
— Bukowina . . . . . 94 II 318
— Cudowa . . . . . 94 II 115
— Kötzschenbroda . . . 93 II 91
— Montagne de Lure . . 90 II 284
— Sachsen 1891 I 70. II 272. 94 II 283, 284
— Sinai . . . . . 93 I 103
— Sougraigne . . . . . 93 I 343
— Süd-Spanien . . . . 91 I 118
— Syrien . . . . . 94 I 191
— Torres-Vedras . . . 93 II 159
— Transgression 1890 II 413. 91 II 125
Cenoman, Tunis 1893 I 318. 93 II 513
Cenosphaera artesiaca . 93 II 423
— jurensis . . . . . 90 II 343
— Malm, Krakau . . . . 90 II 342
— megapora . . . . . 90 II 343
Centaurusschichten, Herford . . . . . 90 I 116
Centren, vulcanische, Nord-Appennin . . . . . 93 II 489
Centrolepis . . . . . 92 II 456
Centronella Arcei . . BB VIII *53*
— Silvetii . . . . . BB VIII *51*
Centronellinen 1890 II 333. 92 I 445
Cephalaspis . . . . . 92 II 358
— Campbelltownensis . 90 II 439
— Whiteavesi . . . . 90 II 439
Cephalopoda, alpiner Unterlias . . . . . 92 II 362
— Bolivien . . . . BB VIII *38*
— Bosnien, Trias . . . 94 II 168
— Britisches Museum . 90 I 354
— Carbon . . . . . 93 I 180
— carbonische, Texas . 92 II 283
— Challenger-Expedition 93 II 305
— Hercyn, Nord-Amerika 93 I 118
— Indiana . . . . . 92 I 178
— in silurischen Diluvialgeschieben . . . . . 92 I 429
— Kreide, Frankreich . 94 II 353
— — von Jerusalem . . 90 I 356
— Lias, Hinterschafberg 94 II 353
— Mt. Grappa . . . . . 94 I 505
— Nord-England . . . 94 I 334
— präcambrische . . . 90 I 152
— Raritan-Schichten, New Jersey . . . . . 94 I 514
— Röth und unterer Muschelkalk von Jena . 90 I 357
— silurische . . . . . 92 I 431
— Tithon . . . . . 93 II 529
— Trias, Himalaya . . 93 II 415
Cephalopodenfauna des Culm bei Herborn . . 91 I 405
Cephalopodenkalk, Gotland 90 II *256*
Cerasit, Japan . . . . . 92 I 235
Ceraspiden . . . . . 92 II 358
Ceratiocaris . . . . . 90 II 329
— longa, Gross-Britannien 90 II 329
— pusillus, Silur . . . 90 II 328
— robusta, Gross-Britannien . . . . . 90 II 329
Ceratiten der Kreide . . 92 I 425
Ceratitenschicht, Saltrange 94 I 136
Ceratites altus . . . . 94 II 170
— aster . . . . . 94 II 169

Ceratites Buchi . . . 1890 I 357
— celtiformis . . . . 94 II 169
— crasseplicatus . . . 94 II 170
— evolvens . . . . . 94 II 170
— labiatus . . . . . 94 II 170
— multinodosus . . . 94 II 169
— multiseptatus . . . 94 II 170
— nodosus als Leitfossil 94 II *30*
— striatus . . . . . 94 II 170
Ceratocephala . . . . 92 II 151
Ceratoconcha costata . . 90 I 158
Ceratodus capensis, Zahnfragment . . . . . 91 II 456
— heteromorphus . . . 90 II 144
— Sturii, Trias . . . . 93 II 408
Ceratophyllum tertiarium 94 I 531
Ceratops 1891 I 149. 92 I 162. 93 I 547
— horridus . . 1890 II 434, 435
— Wyoming . . . . . 94 II 322
Ceratops-Schichten . . . 93 II 173
Ceratopsidae 1890 II 435. 91 II 451
— Nord-Amerika . . . 93 I 394
Ceratopyge-Schiefer . . 92 I 342
Ceratosaurus . . . . . 94 II 345
Ceratotheca . . . . . 94 I 195
Ceratozamites vicentinus. 90 II 170
Cercis . . . . . 91 II 382
Cercomyopsis acutirostris 91 II 184
Ceriopora geniculata . . 94 I 171
— Letourneuxi . . . . 94 I 174
— lineata . . . . . 94 I 171
— orbiculata . . . . . 94 I 174
— strangulata . . . . 90 I 166
— striata . . . . . 90 II *59*
Cerit, Schweden . . . . 94 I 433
Ceritella actaeoniformis . 93 I 381
— multiovulata . . . . 93 I 381
— scalariformis . . . . 93 I 381
Cerithien, Gaumenfalten . 94 II 472
Cerithien-Kalk, Hegyes-Drócsa . . . . . 93 I 95
Cerithiopsis cretacea . . 93 I 538
Cerithium . . . . . 92 II 361
— antecurrens . . . . 90 I 157
— bicinctum . . . . . 93 I 381
— Bodenbenderi . . . 93 I 125
— bosphoranum . . . 90 II 121
— Bourgeati . . . . . 91 II 176
— Brauneri . . . . . 90 I 359
— carinatum . . . . . 93 I 381
— Charpyi . . . . . 91 II 176
— Cloezi . . . . . 91 II 463
— conditum . . . . . 90 II 332
— Conradi . . . . . 93 I 538
— contractum . . . . 93 I 381
Cerithium familiare . 1890 I 157
— Galar . . . . . 91 II 176
— glabrum . . . . . 91 II 129
— Hartii . . . . . 90 I 359
— heptagonum . . . . 90 II 332
— Hörnesi . . . . . 93 II 162
— Josephense . . . . 91 II 176
— Kobyi . . . . . 93 I 381
— Lauingense . . . . 91 I 157
— magnicostatum . . . 93 I 538
— margaritaceum, Tertiär, Rumänien . . . . . 94 I *157*
— Palladini . . . . . 90 I 157
— Pedroanum . . . . 90 I 359
— planum . . . . . 91 I 157
— proctori . . . . . 94 I 372
— productum . . . . 93 I 381
— Sancti-Jacobi . . . 93 I 381
— Schlosseri . . . . . 91 II 176
— semiornatum . . . . 93 I 381
— Sirena . . . . . 91 II 123
— tetralix . . . . . 91 I 157
— Texanum . . . . . 93 I 538
— Treitasi . . . . . 90 I 359
— trilix . . . . . 91 I 157
— Valfinense . . . . . 91 II 176
— ventricosum . . . . 93 I 381
Cerussit . . 1892 I 2. 93 II 1
— Arizona . . . . . 94 I 57
— Auronzo . . . . . 91 I 9
— Diepenlienchen . . . 92 I 507
— Mies . . . . . 93 I 12
— Norberg . . . . . 94 I 259
— Pontgibaud . . . . 94 I 23
— Roanne . . . . . 93 II 247
— Sardinien . . 1890 II 209, 211
— Siebenbürgen . . . 94 I 270
— Tarnowitz . . . . 94 II 412
— Toscana . . . . . 94 I 84
— Union Bridge . . . 92 I 47
Cerviden, Diluvium, Thüringen . . . . . 94 II 150
— Stammesgeschichte . 94 II 153
Cervina . . . . . 90 II 431
Cervus algericus . . . 92 II 450
— dama, Capri . . . . 91 II 123
— elaphus . . . . . 90 I 140
— — Sicilien . . . . 94 I 504
— euryceros, Schädelfragment . . . . . 91 II 341
— — Thiede bei Braunschweig 1891 II 150. 93 I 542
— Hautes Pyrénées . . 93 I 539
— maral, Gebiss . . . 90 I 140
— megaceros var. Ruffii 92 II 332
— pathygenys, Algier . 93 I 544

Cervus tarandus . . 1894 II *288*
— — Arsteinhöhle . . . 93 II 182
Cestracioniden, deutsche Trias . . . . . 90 II 144
Cetacea. . 1890 II 431. 1891 I *198*. 92 I 411. 92 II 144
Cetiosauria . . . . . 93 I 546
Cetodonten, fossile, Ohrenknochen derselben . . 90 II 140
Ceylanit, Neu-Süd-Wales 90 II 207
Chabasit 1890 I *123, 124*. 93 II 8, 28
— Giessen . . . . . 91 I 18
— künstliche Darstellung 90 I *124*
— Löslichkeit in flüssiger Kohlensäure und Neubildung . . . . . 90 I *125*
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— optische Structur . . 91 I *96*
— über Skolecit, Sgeir a Chaisteal . . . . . 90 II 219
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 240
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Chaenocardiola . . . . 91 I 407
Chaenohyus decedens . . 90 II 322
Chaetetes orientalis . . 94 I 171
— vermiporites . . . . 94 I 171
Chaibassia . . . . . 91 II 156
Chalcedon, Afrika . . . 92 II 426
— Canada . . . . . 91 I 241
— Haute Garonne . . . 94 I 254
— Mies . . . . . 93 I 11
Chalicotheriidae . . . . 90 II 320
Chalicotherium . . . . 93 II 184
Chalkolith, Cap Garonne 94 I 49
Chalkophyllit, Utah . . 91 II 48
Chalkopyrit, Mont Cenis. 90 II 95
— Zersetzung, Mexico . 93 II 278
Challenger-Expedition . 93 II 281
Chama bifrons . . . . 91 I 157
— incrassata. . . . . 90 II 332
Chamaeleon, Zahnentwickelung . . . . . 94 II 465
Chamiden, hippuritenartig, Oberturone Kreide von Texas . . . . . 90 I 359
Chamoisit . . . . . 92 II 232
Chamops segnis . . . . 93 II 191
Chamosit, Schweiz . . . 94 I 296
Champsosaurus . . . . 94 I 184
— Heersien . . . . . 91 II 347
Chara . . . . . 90 I 372
— compressa. . . . . 90 I 180
Charakter der Doppelbrechung . . . . 1891 II *21*
— Bestimmung desselben durch einen Keil . . 94 II 4
Charkow-Stufe, Tertiär . 94 I 361
Chazy-Formation . . . 92 II 96
Cheilostomata 1890 I 166. 94 I 201
Cheirotrix, Libanon . . 94 II *233*
Cheiruridae . . . . . 90 I 151
Cheliophorus Verneuilli . 90 II 145
Chelone convexa . . . 91 I 151
— cuneiceps . . . . . 91 I 151
— gigas . . . . . 91 I 151
— Hoffmanni, Schädel . 91 II 346
— Tessoni . . . . . 91 I 151
Chelonia . 1890 I 345. 92 II 454
Chelonier . . . 1892 II 148, 149
Chelydra crassa. . . . . 90 I 334
— Decheni . . . . . 94 I 183
— Murchisonii . . . . 94 I 183
Chelytherium . . . . . 91 I 150
Chemavinit, Canada . . 94 I 53
Chemnitzia . . . . . 92 II *28*
— liasica . . . . . 91 I 159
— longiscata . . . . . 94 II 142
— Manzarinii . . . . 93 II 137
— salida . . . . . 94 II 142
— simplex . . . . . 90 I 114
— terebraeformis . . . 90 I 114
Chemung, Nordamerika . 94 II 100
Chenendopora batillacea . 94 I 209
— conferta . . . . . 94 I 209
— radicata . . . . . 94 I 210
— scutula. . . . . 94 I 210
Chenopus Marioni . . . . 91 I 159
Chernetina . . . . . 92 I 177
Chert-Becken, Irland . . 91 II 200
Chiastolith, Erklärung der Zeichnung . . . . 94 II 27
Chiastolithschiefer, Burkhardtswalde, Sachsen. 91 II *31*
— Königswartha . . . 93 II 94
— Lausitz . . . . . 92 II 411
— Leckwitz, Sachsen . . 91 II 269
— Oporto . . . . . 94 I 475
Chico-Tejou series . . . 92 II 154
Chicoschichten, Mte. Diablo 93 I 100
Chilodonta Bayani . . . 91 II 176
Chilostomella cyclostoma 90 II 344
— eximia . . . . . 91 I 165
— — Ofener Mergel . . 90 II 343
Chilostomellidae. . . . . 93 I 203
Chimaera javana, Java . . 90 I 313
Chimaeriden . . . . . 92 II 357
— Jura, England . . . 93 II 547
Chimaeropsis . . . . . 91 I 430

Chione . . . . . 1893 I 538
— decepta . . . . . 94 I 370
Chirodota . . . . . 92 II 368
Chironomus venerabilis . 91 II 356
Chiroptera . . . . . 90 II 429
— europäisches Tertiär . 91 II 146
Chirotherium-Sandstein . 93 II 378
— Mosbach, Neckarthal . 94 I 341
Chirox . . . . . 92 II 342
Chitinpanzer der Crustaceen 91 II *97*
Chitonen, Oberschlesien . 91 II 462
Chloanthit, Franklin . . . 91 II 27
Chlorbaryum, Zwillingsbildung . . . 1890 II *141*, 204
Chloride der Alkalien am Vesuv . . . . . 92 II 257
Chlorit . . . . . 94 I 32
— Analysen . . . . . 91 I 8
— Bildung in Basalt . . 94 I 77
— Constitution . . . . . 94 I 439
— Granit, Ortasee . . . 94 I 446
— Harstigen . . . . . 92 II 234
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *328*, *382*
— im Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *398*
— in Anorthitfels, Canada BB VIII *444*
— manganhaltig . . . . 90 I 69
— nach Orthoklas vom Strehlenberge . . . . 92 II *40*
— secundäre Bildung . 92 II 231
— Südnorwegen . . . . 92 I 245
— Südwest-Afrika . . . 90 I *113*
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Umbildung . . . . . 92 II 231
— Umwandlung in Biotit, Malvern Hills . . . 94 II 257
— Val di Susa . . . . . 91 II 407
Chloritglimmerschiefer . 94 I 214
Chloritgneiss, centraler Balkan . . . . . 90 I *271*
— Sachsen, Berggiesshübel . . . . . 91 II 270
— — Tanneberg . . . 91 I 76
— Umwandlung in Biotitgneiss . . . . . 91 II 271
Chloritgruppe 1892 II 218, 227, 232
Chloritoid . . . . 1893 II 17, 495
— Michigan . . . . . 94 I 58
— Schweden . . . . . 93 I 497
Chloritoidphyllit, Gerlos 1890 I 60. 90 II 259
Chloritoidschiefer . . . 92 II 292
— Karpathen . . . . . 94 II 256
— Schweiz . . . . . 94 I 295
Chloritoidschiefer (Trias) Vanoise . . . . . 1893 I 301
Chloritschiefer . 1892 II 228, 292
— Aiguilles rouges . . . 93 I 495
— Chichibu . . . . . 92 I 314
— Provinz Kai . . . . . 90 I 136
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *41*
Chlorkalium, Habitus der Krystalle . . . . . 94 II 395
— specif. Gewicht . . . 90 I 203
Chlornatrium, flächenreiche Krystalle . . . . . 92 II *163*
— in harnstoffhaltiger Lösung . . . . . 94 I 250
— specif. Gewicht . . . 90 I 203
Chloroarseniat, Jakobsberg 90 I 411
— Sjögrube . . . . . 90 I 411
Chlorsapphir, grüner Edelkorund . . . . . 90 I 211
Chlorsilber in Liparit . . 93 II 79
Chlorzimmtaldehyd . . . 91 II *12*
Choanoceras mutabile . . 91 II 360
Chodenicer Schicht, Karpathen . . . . . 93 II 144
Choeromorus . . . . . 93 I 148
— pygmaeus . . . . . 94 II 344
Cholesterylbenzoat . . . 91 II 5
Chondren, Bestandtheile des kosmischen Staubes BB VII *160*
Chondrit . . . . . 90 II 440
— Lundsgård . . . 1892 I *138*, 268
— Misshof . . . . . 92 I *89*
— thermisches Verhalten 90 II 59
Chondritenschiefer, rheinisches Devon . . . . . 90 II *216*
Chondrites antiquus . . . 91 II *102*
— filiciformis . . . . . 90 I 374
Chondrodit, Nordmarken 1894 I 265. II 236
— Südwest-Afrika . . . 90 I 112
Chondrophyllum tricuspe . 91 I 443
Chondrostei . . . . . 92 II 358
Chondrosteus . . . . . 92 I 419
— accipenseroides . . . 91 I 152
Chondrostibian, Oerebro . 94 II 226
Chonetes Arcei . . . BB VIII *77*
— dilatata . . . . BB VIII *662*
— extensa . . . . . 91 I 287
— Pratti . . . . . 94 II 175
— Rücki . . . . . BB VIII *79*
— Stübeli . . . . . BB VIII *80*
Chonopectus . . . . . 93 II 207
Chonophyllum . . . . . 94 I 521
Chonostrophia . . . . . 93 II 207
Chorisastraea . . . . . 90 II 335
Chorocotyle . . . . . 94 I 196

Chresmoda obscura 1890 II *3.* 91 I *49*
Chriacus inversus . . . 90 I 335
— priscus . . . . . 90 I 334
— ruetimeyerianus . . 90 I 335
— schlosserianus . . . 90 I 334
— stenops . . . . . 90 I 335
Christiania . . . . . 93 II 207
Christianit, Puy de Dôme 93 II 265
Christobalit 1891 I 205. 94 I *25*
Chromdiopsid in Basalt, Marburg . . . 1891 II *187, 198*
— Jagersfontein . . . 90 II 97
Chromeisen, Neu-Seeland 90 II 376
— Niederschlesien . . . 93 I 9
— Quebec . . . . . 90 II 383
Chromit im Chondrit von Misshof . . . . . 92 I *91*
— Tampadel . . . . . 94 II 411
Chromocyclit . . 1892 II *176, 220*
Chromturmalin, Montgomery County, Maryland . . . . . 90 I 409
Chrysoberyll . . . . . 94 I *17*
— Pribilew . . . . . 92 I 35
— Südwest-Afrika . . . 90 I *108*
Chrysodomus contraria, Anvers 1890 II 113. 92 II 309
Chrysokoll, Reilnigg, Steyermark . . . . . 90 II 17
Chrysolith in Dolerit . . 94 II *103*
Chrysopa protogaea 1890 II *22.* 91 I *52*
Chrysophyllum Velenovskyi . . . . . 93 I 576
Chrysostoma . . . . . 90 II 151
Chrysotil in Basalt, Marburg . . . . . 91 II *192*
Cicada grandiosa . . . 93 II 549
Cidaris baltica . . . . . 93 II 421
— baussetensis . . . . 92 I 185
— Cesaredensis . . . . 91 II 190
— Choffati . . . . . 91 II 190
— cucumifera . . . . . 91 II 190
— cymosa . . . . . 91 II 190
— daglensis . . . . . 93 I 560
— decoratissima . . . 90 I 107
— Dixiensis . . . . . 94 I 372
— Dixoni . . . . . 93 I 560
— Feliciae . . . . . 94 I 520
— gigas . . . . . 93 II 422
— Gomesi . . . . . 91 II 190
— Gourdoni . . . . . 91 II 368
— Gümbeli . . . . . 90 I 107
— Guimarãesi . . . . . 91 II 190
— Guinchoensis . . . . . 91 II 190
Cidaris Kiliani . . . 1890 I 170
— Kimmeridensis . . . 91 II 190
— Louleensis . . . . 91 II 190
— marginata . . . . 91 II 190
— Mattosensis . . . . 91 II 190
— minor . . . . . 91 I 297
— Nevesensis . . . . 91 II 190
— oligocenica . . . . 94 II 178
— palliata . . . . . 91 II 190
— Panasqueirensis . . . 91 II 190
— Penichensis . . . . . 91 II 190
— punctata . . . . . 93 II 421
— pyrenaica . . . . . 92 I 185
— Quiaiosensis . . . . 91 II 190
— Rejaudryi . . . . . 94 I 520
— Sagresensis . . . . 91 II 190
— Schwageri, Cardita-Schichten . . . . . 90 I 107
— Söllingensis . . . . 91 I 434
— subarticulata . . . 91 I *285*
— subvesiculosa . . . 93 I 560
— Terrenzii . . . . . 94 II 461
— texanus . . . . . 93 II 209
— thyrsiger . . . . . 91 II 190
— tribuloides . . . . 94 I 520
— truculenta . . . . 91 II 190
— Valladensis . . . . 91 II 190
— Walcotti . . . . . 93 II 209
Cidarites amalthei . . . 93 I 536
— minor . . . . . 93 I 536
Cidaroida . . . . . 92 II 159
Cimitaria acutirostris . . 91 II 184
Cimolestes . . . . . 90 II 142
Cimolodon agilis . . . 93 I 390
— parvus . . . . . 93 I 390
Cimolodontidae . . . . 90 II 141
Cimolomydae . . . . . 90 II 142
Cimolomys bellus . . . 90 II 141
— gracilis . . . . . 90 II 141
Cimolopteryx rarus . . 93 I 165
— retusus . . . . . 93 I 165
Cinulia tarrantensis . . 94 I 372
Cipitkalk . . . . . 94 I 132
Cipolin . . . . . 92 I 65
— in Gneiss, Ceylon . . 93 I 508
— Saint Nazaire . . . 93 I 275
— Tarascon . . . . . 91 I 263
Circe . . . . . 93 II 158
Circopeltis . . . . . 92 I 184
— Peroni . . . . . 93 I 562
Circularpolarisation und Doppelbrechung . . 91 I 195
— bei Mischkrystallen BB VIII *142*
Cirostrema ausonia . . 90 II 153
— pseudoscaberrima . . 90 II 153
Cirripeden, Canada . . . 90 I 152

Cirripeden, Gotland . 1893 II 196
Cirsope . . . . . 90 II 151
Cissus corylifolia . . . 90 I 373
— duplicato-serrata . . 90 I 373
Cistella interponens . . 90 II 154
Cistudo Kunzi . . . . 92 I 163
— Portisi . . . . . 92 I 163
Cladistia . . . . . 92 II 358
Cladobates . . . . . 93 II 183
Cladochonus . . . . . 93 I 420
Cladodus . . . . . 93 I 176
Cladosictis dissimilis . . 93 I 388
Cladostephus, Vorläufer, Cambrium Portugal . 94 I 475
Cladoxylon . . . . . 90 I 172
Claorhynchus trihedrus . 94 I 183
Claosaurus 1893 I 164. 94 II 345
— agilis . . . . . 91 II 452
— annectens . . . . . 93 II 191
— Marsh . . . . . 94 I 183
Clathraria . . . . . 94 I 396
Clathrodictyon . . . . 93 I 422
Claudetit . . . . . 94 I *29*
— Szomolnok (Schmöllnitz) . . . . . 90 I 404
— Ungarn . . . . . 91 I 240
Clausastraea . . . . . 90 II 336
Clausia lithographica . . 90 I 352
Clausilia filifera . . . 93 I 554
— Uličnyi . . . . . 93 I 554
Clavatula . . . . . 92 I 587
— decipiens . . . . . 91 II 464
— Miocän . . . . . 93 II 199
— opuntia . . . . . 91 II 464
— zibinica . . . . . 91 II 464
Clavella Penrosei . . . 93 I 538
Claviaster libycus . . . 93 I 559
Clavisparsa turbinata . . 90 I 164
Clavulina Szabói-Schichten . . . . . 91 I 165
Clear Fork Beds, Texas . 92 II 283
Cleidophorus fabula . . 92 II 372
Clementia papyracea . . 91 II *222*
Cleodora ortheziana . . 94 II 472
Cliftonit in Meteoreisen von Magura, Arvaer Comitat . . . . . 90 II 59
Climura intermedia . . 90 II 153
Clinolobus . . . . . 90 II 150
Clinopora costulata . . 90 I 164
— lineata . . . . . 90 I 164
Clinotit . . 1892 I 92. 94 I 32
Clintonit, Constitution . 94 I 441
Clintonitgruppe, chemische Constitution . . . . 93 I 478
Clintonitphyllit, Schweiz 94 I 295
Clinura, Miocän . . . 1893 II 199
Clisiophyllum orientale . 94 I 171
— torquatum . . . . . 94 II 103
— Wichmanni . . . . . 94 II 103
Clonograptus tenellus . . 92 II 465
Clupea prattellides . . 94 I 512
Clymenia, Intumescens-zone, New York . . . 93 I 120
Clypeaster atavus . . . 93 I 557
— Paretoi, Pliocänkalk, Insel Pianosa . . . . 90 II 421
Clypeastridae . . . . 92 II 163
Clypeastroidea . . . . 92 II 162
Clytia . . . . . 91 II 176
— Boehmi . . . . . 91 II 176
Coal Measures . . . . . 92 I 192
Coblenzquarzit, Ober-Lahnstein . . . . . 94 II 306
Coblenzschicht, Sauerland BB VIII *662*
Coblenzstufe, rheinisches Devon . . . . . 90 II *22*
Coccoderma suevicum . . 91 II 352
Coccolepis . . . . . 92 II 456
Coccosteidae . . . . . 92 II 358
Coccosteus 1890 II 439. 91 I 333
— canadensis . . . . . 94 II 350
— megalopteryx . . . . 90 II 145
— obtusus . . . . . 90 II 145
— occidentalis . . . . 93 I 175
Cocculina sculpta . . . 90 I 157
Cochlodesma . . . . . 92 II 360
Cochlostyla Lemuziana . 93 I 554
Codein . . . . . 94 II *145*
Codiaceen . . . . . 93 I 577
Codiacrinites . . . . . 92 II 168
Codiopsis Elissae . . . 93 I 560
Codonospermum acuminatum . . . . . 93 I 207
— decangulosum . . . . 93 I 207
— laevi-costatum . . . 93 I 207
— majus . . . . . 93 I 207
— oblongum . . . . . 93 I 207
— olivaeforme . . . . 93 I 207
Coelacanthia quadrispinosa 90 II 121
Coelacanthidae . . . . 92 II 358
Coelacanthinen, Weisser Jura, Bayern . . . 91 II 347
Coelacanthus . . . . . 91 II 353
— elegans . . . . . 91 II 353
— Huxleyi . . . . . 91 II 353
— lepturus . . . . . 91 II 353
— ornatus . . . . . 91 II 353
— Phillipsi . . . . . 91 II 353
— robustus . . . . . 91 II 353
— Tingleyensis . . . . 91 II 353

Coelenterata, Bolivien BB VIII *84*
Cölestin, Brousseval . 1894 I 444
— Dobogoberg . . . . 90 II 25
— Kaiserstuhl . . . . 90 II 41
— Koppánd . . . . . 90 I 397
— Lairdsville, Canada . 90 II 45
— Leogang . . . . . 93 I 17
— Nyons . . . . . 93 II 265
— Scharfenberg 1892 II 69. 93 I 249
— Texas . . . . . 92 II 22
— Torda, Siebenbürgen . 90 I 398
— Unterscheidung von Schwerspath . . . . . 94 I 7
— Vassy . . . . . 92 I 41
— Ville-sur-Saulx . . . 94 I 444
— West-Virginia . . . 93 II 33
Coeloceras cosmopoliticum 94 II *91*
Coelodus cretaceus . . . 91 I 153
Coeloma holsaticum . . 91 II 355
Coelonautilus cariniferus 92 II 152
Coelorhynchus, Fischstacheln . . . . . 91 II 455
Coeloria singularis . . . 91 II *222*
Coelospira . . . . . 91 II 186
Coelosteus . . . . . 93 I 177
Coelurier, Weald der Insel Wight . . . . . 90 I 346
Coelurus gracilis . . . . 91 II 155
Cohenit . . . . . 92 II 245
Coleia . . . . . 92 II 457
— macrophthalma . . . . 92 II 457
Colemanit, Californien . 91 I 43
Coleoptera, Brunnstadt . 93 II 412
— Canada 1893 II 548. 94 II 166
— Scarboros . . . . . 93 I 399
Collina . . . . . 94 I 346
Collopleurus Isabellae . 94 I 521
Collyrites friburgensis . . 93 I 189
Collyritidae . . . . . 92 II 164
Colonienfrage . . . . 94 I 478
Colonienlehre Barrande's 94 II 441
Colonus-Schiefer, Harz . 91 II 118
Colostracon Lewisi . . 93 I 538
Colpodon propinquus . . 93 II 185
Colpospermum sulcatum . 93 I 207
Colpurnia . . . . . 91 II 382
Columbella . . . . . 91 I 432
— vittata . . . . . 90 II 153
Columbellisipho . . . . 90 II 152
Columbia-Formation, quartäre 90 II 124. 92 I 382, 392
Columbit . . . . . 93 II 480, 482
— Delaware County . . 90 I 410
— Ilmengebirge . . . 92 I 35
— Standish, Maine . . 90 I 407
Columnaria . . . . . 1890 II 158
Columnotheca . . . . 90 I 168
— cribrosa . . . . . 90 I 168
Comanche-Series, Texas . 93 II 163
Combretaceen . . . . 91 I 340
Combretum oblongifolium 93 II 434
Commensualismus von Capuliden und Crinoiden 94 I 516
Comoseris . . . . . 90 II 338
Compressibilität von Lösungen . . . . . 91 I 1
Comptoniphyllum japonicum . . 1893 II 565. 94 I 227
— Naumanni 1893 II 565. 94 I 227
Concentration von Lösungen beim Umsatz der Silicate . . . . . 93 II 4
Conchylien, Leobersdorf, Tertiärbecken v. Wien 90 II 331
— Miocän, Monte Gibbio bei Modena . . . . . 90 I 157
— — Steiermark . . . 91 II 444
— Orenburger Gouvernement . . . . . 90 II 330
— Schweden . . . . . 93 II *129*
Concinna-Gruppe der Rhynchonellen . . . . . 91 I 162
Concretionen im Sandstein 92 I 602
— in dolomitischen Kalksteinen . . . . . 92 II 266
Condylarthrenstadium . . 92 II *240*
Conescharellina clithridiata 94 I 202
Confervites ladowiciensis 93 II 432
— primordialis . . . . 91 II *103*
Confusastraea . . . . 90 II 336
Congeria . . . . . 94 II 175
— balatonica . . . . 90 II 332
— euchroma . . . . . 94 I 517
— Partsch . . . . . 94 I 517
— simulans . . . . . 94 I 388
— ungula caprae . . . 94 I 388
Congerien . . . . . 93 II 417
— Szoros Graben, Siebenbürgen . . . . 1894 I *154, 163*
Congerienschichten, Rumänien . . . . . 94 I *168*
Conglomerate 1892 I 293. 93 I 72
— archäische . . . . 92 II 290
— Basilicata . . . . BB VII *584*
— Cernay bei Reims . . 94 I 357
— Garda-See . . . . 91 I 136
— glacial, Wild Duck Creek 94 I 337
— im Flysch, Piemont . 91 I 124
— Keewatin . . . . . 93 II 374
— Lennegebiet . . . BB VIII *624*
— Massachusetts . . . 93 I 293

Conglomerate, Nötsch-Graben, Ost-Alpen 1894 II 60
— Schottland . . . . 93 I 511
— Section Pillnitz . . . 93 II 93
— Småland . . . . . 94 II 438
St. Davids . . . . . 91 I 95
— Sub-Himalaya . . . 94 II 434
— Trias, Süd-Devon . . 91 I 94
— Vierwaldstätter-See BB VIII *212*
— Zilly, geol. Alter . . 90 II 193
— zwischen Frankenberg und Lollar . . . . 92 I 543
Coniferen 1892 I 468, 469, 603. 93 I 207
Coniferenhölzer, Iowa und Montana . . . . . 90 I 180
— palaeozoische . . . 90 II 344
Coniophis praecedens . . 93 II 191
Coniornis altus . . . . 94 I 508
Conische Refraction, äussere, Beobachtung unter dem Mikroskop . . . . 91 I 3
Coniston-Kalk . . . . 94 II 99
— nördliches England . 94 I 333
Coniston-Kalk-Gruppe . 93 II 519
Connellit, Cornwall . . 94 I 15
— Namaqualand . . . 91 I 231
Conocardium . . . . . 93 II 376
— Bocksbergense . . . 90 I 437
Conocephalina . . . . 91 II 110
Conocephalites-Arten, Nordamerika . . . 91 II 109
Conocephalus Cordillerae, Mount Stephens, Canada . . . . . 90 II 290
Conoclypus Lucae . . . 90 I 360
— plagiosomus . . . . 90 I 360
Conortis . . . . . 92 I 586
Conseranit . . . . . 91 II 29
Contacterscheinungen an Quarzporphyr bei Krakau . . . . . 91 II 71
— der Krystallisation . 94 I 3
— Lausitz . . . . . 90 II 187
— Malvern Hills . . . 91 I 94
Contactgesteine von Serpentinen . . . . . 92 I 107
Contacthöfe, Elbthalgebirge . . . . . 94 I 70
Contacthof, böhmisches Mittelgebirge . . . 93 II 97
— des Granit von Lauterbach-Bergen . . . . 92 II 80
— des Lausitzer Granits 92 I 535
Contactmetamorphose bei New Galloway . . . 91 II 431
Contactmetamorphose, Bergmassiv von Menez-Hom . . . . . 1890 II 400
— Fehlen derselben bei Porphyren auf Elba . 94 I *103*
— italienischer Gesteine 91 II 289
— Remigiusberg . . . 93 I *135*
— um Granit . . 92 II 262, 263
— Vicentin . . . . . 94 I 160
Contactstructur . . . BB VII *481*
Contactveränderung der Braunkohle . . . . 93 II 165
Contactzone am Granit der Cima d'Asta . . . . 93 II 51
— am Granitstocke, Tetschen . . . . . 93 II 360
— um Granit und Gabbro, Harz . . . . . 93 I 269
Contchiching-Reihe, Canada . . . . . 91 II 90
Contchiching-Schichten . 92 II 294
Contortae . . . . . 91 I 346
Contractionsfalten . . . 90 I 252
Conularia acuta . . . BB VIII *30*
— africana . . . . BB VIII *29*
— Baini . . . . . BB VIII *36*
— elegantula . . . BB VIII *30*
— Kayseria . . . . . 91 II 465
— Quichua . . . . BB VIII *34*
— Stormsi, Carbon . . 91 II 361
— trentonensis . . . . 92 II 372
— triadica . . . . . 91 II 463
— undulata . . . . BB VIII *31*
Conularida, Bolivia . BB VIII *25*
Conularienschichten, Bolivien . . . . . BB VIII *93*
Conus . . . . . 92 I 586
— Basteroti . . . . . 92 II 462
— Benoisti . . . . . 92 II 462
— bimarginatus . . . 90 I 157
— Cazioti . . . . . 92 II 462
— clanculus . . . . . 92 II 462
— Crenensis . . . . . 91 II 464
— Falloti . . . . . 92 II 462
— gallicus . . . . . 92 II 462
— granulato-cinctus . . 92 II 462
— Lavraldei . . . . . 92 II 462
— peregrinus . . . . . 92 II 462
— praecursor . . . . 92 II 462
— Saucatsensis . . . . 92 II 462
— Vasseuri . . . . . 92 II 462
Copaifera . . . . . 91 II 382
— reticulata . . . . . 93 II 434
Copiapit . 1890 I *59*. 91 II 20
— Chile . . . . . 93 I 252
— Redington Mine . . 92 I 50

Copiapit, Tierra amarilla bei Copiapó in Chile 1890 II 217
Coptochetus . . . . . 90 II 152
Coquandia . . . . . 93 II 158
Coquimbit . 1890 I *59*. 91 II 20
— Chile . . . . . 93 I 251
— Tierra amarilla bei Copiapó in Chile . . . 90 II 216
Coracoid der Reptilien . 91 II 344
Corallien, Lérouville . . 93 I 520
— Tunis . . . . . 93 I 318
Coralline Limestone, Malta . . . . . 91 II 132
Corallineen . . . . . 93 I 577
Coralliochama Bayani . 91 I 160
Coraster Beneharnicus . 90 I 473
— Kreideformation, Pyrenäen . . . . . 90 II 414
— Margaritae . . . . . 91 II 368
— Marsovi . . . . . 90 I 473
— Munieri . . . . . 90 I 473
— sphaericus . . . . . 90 I 473
— Villanovae, Turkestan 1891 II 367, 368
Corax Lindströmi . . . 94 II 349
Corbicula fluminalis . . 93 I 183
— Hamlini . . . . . 93 I 538
Corbiculopsis Birdi . . 93 I 538
— Kreide, Syrien . . . 94 I 190
Corbis Manzavinii . . . 93 II 137
— valfinensis . . . . . 91 II 176
Corbula . . . . . 93 II 158
— aulacophora . . . . . 91 II 463
— Beisseli . . . . . 93 I 182
— neaeroides . . . . . 91 II 129
— olivae . . . . . 93 I 538
— pulchella . . . . . 94 I 370
— Sandbergeri . . . . . 91 I 128
— semistriata, Spanien . 90 II 414
Cordaianthus acicularis . 93 I 206
— fertilis . . . . . 93 I 206
— major . . . . . 93 I 206
Cordaicarpus acuminatus 93 I 206
— discoideus . . . . . 93 I 206
— excelsus . . . . . 94 I 221
— irregularis . . . . . 93 I 206
Cordaicladus distans . . 94 I 221
Cordaiteen . . . 1893 I 206, 426
Cordaites . . . . . 93 II 427
— Brandlingii, Steinkohlenformation und Rothliegendes . . . 90 II 345
— medullosus, Perm, Chemnitz . . . . . 90 II 346
— Ouangondianus, Mitteldevon von Neu-Braunschweig . . . . 1890 II 345
Cordaites Renaulti . 94 II 102
Cordia pulchra . . . . 93 II 434
Cordierit, Basalt von Fulda 90 I *99*
— Einfluss der Temperatur auf die optischen Eigenschaften . . . 92 II 397
— Guilford, Connecticut 94 I 436
— Hoyazo . . . . . 91 I 87
— Humpoletz . . . . . 93 II 267
— in contactmetamorphischen Gesteinen, Lausitz . . . . . 90 II *187*
— im Gneiss, Argentinien BB VII *310*
— im Granit von Nordargentinien . . . BB VIII *361*
— in Andesit, Nagyág . 94 I 293
— in Dacit, Mazarron . 93 I 284
— in verglastem Sandstein . . . . . 91 I *109*
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— Japan . . . . . 92 I 233
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Südafrika . . . . . 94 I *79*
Cordieritgesteine, Cabo de Gata . . . . . 92 II 424
Cordieritglimmerhornfels . 92 I 286
Cordieritgneiss, Connecticut . . . . . 91 I 274
— erratischer Block am Heller bei Dresden . 90 II 243
— Marburg . . . . . 91 II *257*
Cordierithornfels . . . 94 I 71
Cornaceen . . . . . 91 I 338
Cornucaprina . . . . . 93 II *129*
Cornus cretacea . . . . 93 II 428
— Fosteri . . . . . 93 II 220
— submacrophylla 1893 II 567. 94 I 229
Coronaria . . . . . 92 II *31*
Coronatenzone, Leinethal BB VII *271*
Coronura aspectans . . 92 II 151
Corrosionserscheinungen am Flussspath, Sarnthal . . . . . 94 I 4
— am Kalkspath von Steierdorf . . . . 94 I 3
Corvus praecorax . . . 94 II 345
Corynella ficoides . . . 91 II 127
Cosalit, Rezbanya . . . 90 I 396
Coscinocyathus . . . . 91 II 197
Coscinodiscus . . . . 93 II 437

Coscinopleura . . . . 1890 I 167
Cosmoceras aculeatum, brauner Jura, Lithauen 90 I *172*
— Calloviense . . . . . 90 I *2*
— distractum, brauner Jura, Lithauen . . . 90 I *173*
— Duncani . . . . . 90 I *174*
— Grewingki . . . . . 90 I *173*
— Jason, brauner Jura, Lithauen . . . . . 90 I *170*
— Jason-Proniae, brauner Jura, Lithauen . . . 90 I *171*
— lithuanicum, brauner Jura, Lithauen . . . 90 I *172*
— ornatum . . . . . 90 I *173*
— pollux, brauner Jura, Lithauen . . . . . 90 I *171*
— Soemmeringi, Jura . 90 I *151*
— subnodatum, brauner Jura, Lithauen . . . 90 I *171*
Cotteswold-Sand . . . 90 I 118
Cotunnit . . . . . 91 II 20
Coussapoa quinquenervis 93 II 434
Coussarea membranacea . 93 II 434
Covellin . . . . . 94 I *34*
— Leogang . . . . . 93 I 15
Craie grise, Nordfrankreich 1894 I 147. II 116
Crania siluriana . . . 91 II 184
— subanomala . . . . 91 I 119
Craspedites . . . . . 93 I 354
Crassatella . . . . . 93 I 537
— aequalis . . . . . 93 I 182
— kagaharensis . . . 91 II 175
— macrodonta, Kreide von Martapoera (Borneo) . 90 II 416
— Texana . . . . . 93 I 538
Crassulaceen . . . . . 91 I 339
Crataegus betulaefolia . 90 I 373
— Engelhardti . . . . 90 I 373
— Marcouiana . . . . 90 I 375
— myricoides . . . . 90 I 373
Craticularia plicata . . 93 I 565
Cratopleura helvetica 1892 I *125, 129*
— helvetica f. Nehringi . 92 I *130*
— holsatica 1891 II *81.* 92 I *114, 128*
Creccoides Osbornii . . . 93 I 378
Credneria daturaefolia . 93 II 221
Crematogaster praecursor 94 II 469
Crenatula amalthei . . 91 I 297
Crenella . . . . . 92 II 361
Crenilabium . . . . . 90 II 152
Creodonta adaptiva . . 91 II 148
Creodonten . . . . . 93 I 388
Creodonten, europäisches Tertiär . . . . 1891 II 146
Creseis Moulinsi . . . . 94 II 472
— perspectiva . . . . 91 I 119
Creusia Darwiniana . . . 94 II 352
— Fuchsi . . . . . 94 II 352
— miocaenica . . . . 94 II 352
— moravica . . . . . 94 II 352
— Sturi . . . . . 94 II 352
Cribrilina asperula . . . . 90 I 169
— collaris . . . . . 90 I 169
— perforata . . . . . 90 I 169
— triceps . . . . . 90 I 169
— vinei . . . . . 94 I 202
Cricetodon incertum . . 93 I 149
Cricetus frumentarius . . . 90 II *35*
Crinoidea, Bolivien . BB VIII *83*
Crinoiden, Devon, de la Manche . . . . . 93 I 563
— englische . . . . . 92 II 165
— jurassische, Frankreichs 92 I 449
Crinoidenkalk, Südfrankreich . . . . . 91 II 323
— Vorarlberg . . . . . 91 I 117
Crioceras . . . . . 94 I 194
— texanum . . . . . 90 I 360
Criotherium argaloides . 92 II 135
Crisia Berardi . . . . . 94 I 203
— Plauensis . . . . . 94 I 203
— Schmitzi . . . . . 94 I 203
Crisidmonea macropora . 90 I 165
Cristellaria . . . . . 93 II 212
— adunca . . . . . 94 II 476
— clavata . . . . . 94 II 476
— costata . . . . . 94 I 523
— Dingdensis . . . . 94 I 523
— Erato . . . . . 90 II 344
— galea . . . . . 94 II 185
— minuta . . . . . 94 I 523
— raricosta . . . . . 94 I 523
— spoliata . . . . . 91 I 165
— undata . . . . . 94 II 476
Cristobalit, Mayen . . . . 93 I 237
Crocodil, Miocän, Toscana 91 II 156
Crocodileimus robustus . 94 I 378
Crocodilia . 1890 I 342. 92 II 350
Crocodilier, Becken . . 93 II 406
Crocodilus calaritanus . 91 II 452
— Steineri, Schönegg und Brunn bei Wies (Steiermark) . . . . . 90 I 347
— toliapicus . . . . . 92 II 149
Cromyocrinites . . . . 92 II 168
Cronstedtit . . . . . 92 II 229
Crosara-Stufe, Venetianische Alpen . . . . 94 I 493

Crossopterygier 1891 II 355. 92 II 358
Crotalocephalus . . . . 92 I 175
Crustaceen, Boulogne-sur-mer . . . . . 94 II 350
— Fusulinenkalk, Sicilien 94 I 513
— im Bernstein . . . 92 II 460
— palaeozoische . . . 92 I 169
— pliocäne, Isola di Pianosa . . . . . 93 I 178
— Tiefsee . . . . . 93 II 305
— Untersilur, Tennessee 1890 II 146, 440
Crustaceenlarven, lithographischer Schiefer Bayerns . . . . . 90 I 352
Cruziana . . . . . 91 II *103*
— andina . . . . BB VIII *87*
— furcifera . . . . BB VIII *86*
— Ungiltigkeit der Nathorst'schen Hypothese 91 II 374
Cryphaeus convexus . BB VIII *16*
— giganteus . . . . BB VIII *14*
— Green . . . . . BB VIII *13*
— Kalkfauna von St. Malo 90 II 292
— laciniatus . . . . BB VIII *662*
Cryphina, Kalkfauna von St. Malo . . . . . 90 II 293
Cryptiolit . . . . . 92 II 257
Cryptocephalites punctatus 93 II 548
Cryptoconus . . . . . 92 I 586
Cryptoglena adspersa . . 90 I 163
Cryptograptus marcidus . 91 I 439
Cryptonella, Bolivien BB VIII *56*
Cryptoplocus libanensis . 93 I 538
Cryptostemma Westermanni . . . . . 94 II 353
Cryptostoma gastroporum 90 I 169
Ctenacanthus . . . . . 93 I 176
— latispinosus . . . . . 90 II 439
Ctenistodes claviger . . 93 I 551
Ctenobolbina . . . . . 92 II 458
— alata . . . . . 92 II 458
— antespinosa . . . . 92 II 459
— bispinosa . . . . . 92 II 458
— informis . . . . . 92 II 459
— minima . . . . . 92 II 459
— papillosa . . . . . 92 II 459
— punctata . . . . . 92 II 459
— tumida . . . . . 92 II 458
Ctenocrinus . . . . . 92 II 464
Ctenodonta . . . . . BB VIII *44*
Ctenodus interruptus, Zahnfragment . . . . . 91 II 457
— obliquus . . . . . 90 I 350
Ctenoidschuppen . . . . 92 I 164
Ctenolepis cyclus . . . 1893 II 546
Ctenopyge pecten . . . . 93 I 550
Cuboides-Stufe, Nordamerika . . . . . 91 I 116
Cucullaea Althi . . . . 94 I 488
— comanchensis . . . . 94 I 370
— increbrescens . . . . 92 II 155
— Mülleri . . . . . 93 I 182
— rugosa . . . . . 93 I 182
— striatopunctata . . . . 94 I 488
— Szabói . . . . . 93 II 556
Cuculella affinis . . . . 91 II 183
— Krotonis . . . . . 90 II *238*
Culm, Amariner Thal . 93 II 356
— bei Herborn . . . . . 91 I 405
— Dartmoor . . . . . 94 II 260
— England . . . . . 94 I 127
— Magdeburger Uferrand 93 II 98
— Oderthal . . . . . 94 II 309
— Prossnitz . . . . . 93 I 95
— Salzbrunn . . . . . 94 II 75
— Schwarzwald . . . . 93 II 131
— Tiefseefacies . . . . 91 I 406
Culmgrauwacke, Oberharz 94 II 101
Culmsandstein, Iowa . . 94 I 336
Cultrijugatus-Stufe, rheinisches Devon . . . 90 II *225*
Cumnoria, Kimmeridge Clay 90 II 323
Cuon alpinus fossilis Nehring . . . . . 90 II *34*
— — Heppenloch, Württemberg . . . . . 91 I 324
— Bourreti . . . . . 92 I 567
— Edwardsianus . . . 90 II *49*
— europaeus 1890 II *40*. 91 II *108*
— in Europa . . . . . 92 I 567
— Nishneudensis . . . 91 II *110*
— primaevus 1890 II *37*. 91 II *113*
— rutilans . . . . . 90 II *38*
Cupressinoxylon 1892 I 606. 93 II 219
— arkansanum . . . . 92 II 468
— Calli . . . . . 92 II 468
— elongatum . . . . 90 I 180
— erraticum . . . . . 93 II 430
— Glasgowi . . . . . 90 I 180
— Neosibiricum . . . 93 II 569
— Severzovii . . . . . 93 II 430
— sp. . . . . 93 II 430
Cuprit, Bildung aus der Schmelzmasse . . . . 94 I 96
— künstlicher . . . . . 92 I 226
Cuprodescloizit, Mexico . 90 II 39
Curtonotus antiquus . . . 91 II 171
Curven gleicher Lichtstärke . . . . . 92 I 213

Cuspidaria miocenica . 1894 II 357
Cuyahogo-Schiefer, Ohio . 94 II 441
Cyanit . . . 1891 II 43. 93 II 17
— chemisches Verhalten 94 II *267*
— Cortland Series . . . 90 I 88
— Doppelbrechung, Abhängigkeit von der Temperatur . . . . 91 I 209
— Südwestafrika . . . 90 I *109*
Cyanitglimmerschiefer . 94 II 256
Cyanitgneiss, Schottland 94 II 256
Cyathaspis . . . . . 92 II 358
— integer . . . . . 94 II 466
Cyathaxoninae . . . . . 93 I 198
Cyathocrinidae . . . . . 92 II 168
Cyathocrinites . . . . 92 II 168
Cyathocrinus pinnatus BB VIII *662*
— stellatus . . . . . 94 I 171
Cyathopaedium . . . . 90 II 156
Cyathophyllum 1890 II 158. 92 I 186
— im Tuff des Lennegebietes . . . . . BB VIII *645*
— Mitchelli . . . . . 94 II 364
— parallelum . . . . . 94 I 171
Cyathospongia eozoica 1891 II 310. 93 II *59*
Cycadeen . 1892 I 469. 93 I 207
Cycadopteris scolopendrina, Australien . . . . . 90 II 328
Cyclaster . . . . . 94 I 204
— pyriformis . . . . 90 I 472
Cyclocarpus Karniowicensis . . . . . 94 II 375
— melonoides 1891 I 168. 93 II 131
Cycloclypeus . . . . . 92 II 374
Cycloidschuppen . . . . 92 I 164
Cyclolites amalthei 1891 I 297. 93 I 536
Cyclolituites lynceus . . 93 II 417
Cyclora minuta . . . . 92 II 372
Cyclosphaeroma trilobatum 92 I 421
Cyclostigma . . . . . 91 II 205
Cyclotosaurus robustus . 91 II 160
Cyclostomata . . . . . 94 I 202
— Tertiär, Böhmen . . 93 I 554
Cyclus Scotti . . . . 94 II 165
— Woodwardi . . . . 94 II 165
Cycnorhamphus Fraasi . 92 II 354
Cygnus Falconeri . . . 93 I 391
— musicus . . . . . 93 I 391
Cylichna crassiplicata . . 94 I 388
Cylicia rubeola . . . . . 90 I 369
Cylindritella . . . . . 90 I 359
Cylindrites formosus . . 94 I 372
Cylindrites ovalis . . . 1893 I 381
Cylindritopsis . . . . . 90 II 150
Cylindrophyma . . . . . 91 I *281*
Cymbalizon tyroïdes . . 93 I 551
Cynodictis . . . . . 93 I 149
— dubius . . . . . 91 II 146
Cynodon . . . . . 93 I 149
Cynohyaenodon . . . . . 91 II 144
Cyperus subplicatus . . . 94 I 531
Cyphalaspis . . . . . 92 II 372
Cyphaspides . . . . . 92 I 175
Cyphaspis Burmeister . BB VIII *12*
Cyphosoma Aidondi . . 93 I 560
— Baylei . . . . . 93 I 560
— colliciare . . . . . 93 I 560
— Maresi . . . . . 93 I 560
— rhenana . . . . . 91 I 434
— Sancti-Arromani . . 93 I 560
— speciosum . . . . . 93 II 209
Cyphosomatidae . . . . . 92 II 161
Cypraeactaeon . . . . . 90 I 359
Cypricardella curta . . . 91 II 184
— elongata . . . . . 91 II 184
— subovata . . . . . 91 II 184
— unioniformis . . . . . 91 II 184
Cypricardia trapezina . . 93 I 182
Cypridea spinigera . . . 91 I 335
— texana . . . . . 94 I *371*
Cypridella grandiformis . 94 I 514
— Jonesi . . . . . 94 I 514
Cypridellina cypridellopsis 94 I 514
Cypridina Adrianensis . 94 I 514
— elliptica . . . . . 94 I 514
— Herzeri . . . . . 92 II 459
— marginata . . . . . 94 I 514
— primaera . . . . . 94 I 514
— Raisiniae . . . . . 93 II 548
Cypridinella inflata . . . 94 I 514
— rostrata . . . . . 94 I 514
Cyprimeria . . . . . 93 I 538
— depressa . . . . . 93 I 538
— moneta . . . . . 93 I 182
Cyprina . . . 1892 II 361. 93 II 158
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— oolithica . . . . . 93 I 381
— Streeruvitzi . . . . 94 I 372
Cyprinenthone, geol. Alter 90 II 126
Cypris . . . . . 91 II 177
— cornigera . . . . . 90 I 152
Cyrena . . . . . 92 I 590
— Cairensis . . . . . 91 I 128
— circumsulcata . . . 94 I 388
— Dawsoni . . . . . 91 I 128
— Livracensis . . . . 90 I 158
— Michelottii . . . . . 94 I 388

Cyrena sorachiensis . 1891 II 175
Cyrtendoceras . . . . 93 I 180
Cyrtina . . . . . 93 II 419
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Cyrtocalpis crassitestata . 94 I 395
— Etruscorum, Krakau . 90 II 343
Cyrtoceratidae . . . . 90 I 354
Cyrtochetus . . . . . 90 II 152
Cyrtocrinus . . . . . 94 II 182
Cyrtodonta . . . . . 93 I 404
— obtusa . . . . . 94 I 176
Cyrtodontopsis . . . . 93 I 404
Cyrtograptus 1892 I 188. 93 I 564
— radians . . . . . 91 II 117
Cyrtolith, Colorado . . 94 II 240
— Llano Co. . . . . 93 I 259
Cystechinus crassus, Radiolarienmergel von Barbados . . . . . 90 II 445
— clypeatus . . . . . 90 II 445
Cystideen Böhmens. . . 90 I 364
Cystiphoridae . . . . . 90 II 159
Cystiphyllum cryptoseptatum . . . . . 94 I 171
— feragense . . . . . 94 I 171
Cystocidaris . . . . . 91 II 189
Cytherea Avenionensis . 90 II 332
— communis . . . . . 90 I 158
— condentata . . . . 91 II 444
— cyprinaeformis . . . 91 II 444
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— oblonga . . . . . 94 I 370
— pseudoerycinoides . . 90 II 153
Cythere baccata . . . 91 I 335
— monticula . . . . . 94 I 383
Cythereis icenica . . . 94 II 165
— spinicaudata . . . . 94 II 165
— tuberosa . . . . . 94 II 165
— Wrighti . . . . . 94 II 165
Cytherella Chapmani . . 94 II 165
— obliqui-rugata . . . 94 II 165
— obovata . . . . . 94 II 165
— ovatiformis . . . . 92 II 459
— subparallela . . . . 94 II 468
— subreniformis . . . 94 II 165
Cytheridea montosa . . 91 I 335
— tenuis . . . . . 94 I 383
— truncata . . . . . 94 I 383
Cytherideis aequalis . . 94 I 383
— impressa . . . . . 94 I 383
— parallela . . . . . 94 II 165
Cytheropteron cuspidatum 94 II 165
— Sherborni . . . . . 94 II 165
Cytisin, identisch mit Ulexin . . . . . 94 II *106*
Cytisinhydrobromid . 1894 II *121*
Cytisinhydrochlorid . . 94 II *128*
Cytisinhydrojodid . . . 94 II *123*
Cytisintartarat . . . . 94 II *131*

D.

Dachsteindolomit . . . 94 I 136
Dachsteinkalk . . . . 94 II 82
— Schwarzau . . . . 94 II 444
— Südtyrol . . . . . 94 I 485
Dacit, Almeria . . . . 90 II 268
— Bolivia . . . . . 92 II 77
— Cabo de Gata 1892 II 432. 93 I 283
— Carthagena . . . . 93 I 284
— Colombia . . . . . 93 I 77
— L'Oued Tiaminine . . 90 II 404
— Pusztafalu . . . . 91 II 72
— West-Cordilleren . . 94 I 465
— Yellowstone Park . . 91 I 105
Dacochelys . . . . . 91 I 151
Dacrytherium Cayluxi . 94 I 179
— Ovinum . . . . . 93 I 148
— — Wight . . . . 94 I 179
Dadoxylon . . . . . 93 II 427
Dämmerungserscheinungen nach der Eruption des Krakatoa . . . . . 94 I 279
Dämpfe, mineralbildende 93 I 297
Dahllit, Bamle, Norwegen 90 II 223
Dal-Formation . . . . 92 I 173
Dalmanella . . . . . 93 II 205
Dalmanit, Kalkfauna von St. Malo . . . . . 90 II 292
Dalmanites Clarkei . BB VIII *19*
Dalradian, Eruptivgesteine 92 I 271
Dammara Tolli . . . . 93 II 568
Damudas-Schichten, Himalaya . . . . . 94 I 494
Danalith . . . . . 93 II *73*
— Colorado . . . . . 94 II 239
— Cornwall . . . . . 93 II 251
Danburit . . . . . 91 I 44
Danien, Pyrenäen 1890 II 413. 91 II 328
— Spanien 1890 I 311. 91 II 328
Dantiscanus costalis . . 93 I 551
Daonella-Bett, Californien 94 II 111
— Lommeli . . . . . 91 II 319
— tenuistriata . . . . 94 II 111
Dapedius Milloti . . . 94 II 348
Daphnit . . . . . 92 II 228
Daraelites . . . . . 90 II 149
Darapskit, Chile . . . 93 I 262

Darwinornithiden, Argentinien . . . . . 1893 I 545
Dasypoda . . . . . 92 II 339
Dasyporella multipora . 93 II *140*
— silurica . . . . . 93 II *139*
Datolith . . . . . 90 II 28
— Andreasberg . . . . 92 II 407
— Süd-Norwegen . . . 92 I 243
— Tarifville . . . . . 90 II 31
— Theiss . . . . . 91 I *102*
Daviesit, Atacama . . . 91 I 230
Davoei-Kalk, Deutsch-Lothringen . . . . 94 I 345
Davoeischichten, Herford 90 I 116
Davyn, Constitution . . 94 I 262
Dawsonit, Canada . . . 91 I 241
Debeya Haldemiana . . 92 II 376
Decaconocarpus olivaeformis . . . . . 93 I 207
Decadocrinidae . . . . 92 II 168
Dechenella . . . . . 90 I 152
— Kalkfauna v. St. Malo 90 II 293
Dechenit, Mexico . . . 90 II 40
Deckenporphyr, Dippoldiswalde, Sachsen . . . 91 I 68
Deckenschotter, Nordschweiz . . . . . 93 I 370
Declination, magnetische 92 II 44
Deflation . . . . . 92 I 59
— Nordamerika . . . . 94 I 66
Deformationen der Erdkruste, Ursachen . . 93 I 49
— der Krystalle . . . 93 I 7
— des Doppelsalzes von Manganchlorür und Chlorkalium . . . . . 92 II *91*
— elastische, von piëzoelektrischen Krystallen . . . . . BB VIII *407*
Defrancia obvallata . . 90 I 166
De Kaap-Schichten . . 93 I 318
Dekapoden des norddeutschen Jura . . . . 92 II 456
Delessit . . . . . 92 II 232
Delia . . . . . 92 II 138
Delphin, Miocän, Arcevia 94 II 462
— Sassari, Sardinien . . 90 I 342
Delphinidae . . . . . 92 II 145
Delphinognathus conocephalus . . . . . 94 II 347
Delphinula Chantrei . . 91 II 176
— Ogerieni . . . . . 91 II 176
— Porteri . . . . . 91 II 129
Deltabildung 1891 II 284. 93 II *167*
— Newa . . . . . 91 I 267
— Nil . . . . . 92 II 279
Deltabildung, Schweiz 1894 II 45
Deltocyathus lardensis . 91 II 195
Deltoptychius . . . . 92 II 150
Dendrerpeton Acadianum 94 I 379
Dendrit . . . . . 91 II 15
Dendrocrinidae . . . . 92 II 168
Dendrocrinites . . . . 92 II 168
Dentalium . . . . . 92 II 361
— amalthei 1891 I 297. 93 I 537
— haeringense . . . . 92 II 462
Dentin der Selachier . . 91 I *193*
Denudation in der Wüste 92 I 58
— Kandergebiet, Schweiz 94 II 44
— mittlere Grösse . . . 91 I 91
Denudationserscheinungen, Beschreibung u. Erforschung . . . . . 90 I 51
Denver-Schichten, Colorado 1890 I 127. 94 I 495. 94 II 331
Depazea irregularis . . 93 II 432
Depranella . . . . . 92 II 458
— ampla . . . . . 92 II 458
— crassinoda . . . . 92 II 458
— elongata . . . . . 92 II 458
— macra . . . . . 92 II 458
— nitida . . . . . 92 II 458
Dercetis limhamnensis . 94 II 349
Dermoseris . . . . . 90 II 337
Descendenztheorie . . . 90 II 131
Descloizit, Arizona . . 92 II 31
— Montana . . . . . 92 II 30
— New Mexico . . . . 92 II 30
— Obir . . . . . 93 II 254
— pseudomorph nach Vanadinit . . . . . 93 II 255
Desmidopora alveolaris, Obersilur von Dudley . 90 I 339
Desmin (Stilbit) . . . . 90 I *132*
— Floitenthal, Tyrol . . 91 I 215
— Krystallform . . . . 92 I *17*
— optische Anomalie . . BB VII *4*
— Südnorwegen . . . 92 I 265
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 238
Desmoceras affine . . . 93 II 414
— Angladei . . . . . 93 II 198
— Athabascense . . . 93 II 414
— cirtense . . . . . 93 II 198
— Cuvervillei, Albien, West-Afrika . . . . 90 II 416
Desmodium obliquum . . 93 II 434
Desmopteris Guimaraensi 94 II 102
Desmostylus hesperus . 91 II 341
Deutertyrus redivivus . 93 I 551
Devon, Alpen . . . . . 93 II 507
— Altai . . . . . 93 II 374

Devon, Aspe-Thal . . 1894 I 336
— Brasilien . . . . BB VIII *99*
— Catalonien . . . . 94 I 124
— Connecticut . . . . 94 I 124
— Devonshire . . . . 92 II 98
— discordant auf Cambrium, Stavelot . . . 91 II 438
— Eaux Bonnes . . . 93 I 510
— Elbingerode . . . . 91 I 287
— Falkland-Inseln . . BB VIII *108*
— Fischfauna, Canada . 94 II 350
— Graz 1892 II 431. 93 I 335, 336
— Krakau . . . . . 92 I 117
— Mackenzie River Basin 92 I 347
— Mächtigkeit, New York 93 I 510
— Mähren . . . . . 92 II 272
— Manitoba . . . . . 92 I 561
— mittleres, Lennegebiet . . . . . BB VIII *640*
— Nassau . 1890 I 292. 91 II 331
— Navarre . . . . . 92 I 117
— Navarra . . . . . 90 II 106
— Neusibirische Insel Kotelny . . . . . 90 II 291
— New York 1891 II 312. 92 II 98
— Nordamerika 1892 II 97. 93 I 117
— nordamerikanisches, Vergleich mit dem bolivianischen . . . BB VIII *95*
— Nord-Devon . . . . 94 I 123
— oberes, Timangebiet . 94 I 323
— Ostalpen . . . . . 92 II 297
— Ost-Pennsylvania . . 93 I 334
— Pennsylvanien . . . 94 I 336
— Pflanzen . . . . . 93 II 213
— Polen . . . . . 92 I 115
— Pyrenäen . . . 1892 I 346, 542
— rheinisches 1890 I 433. 90 II 201 91 II 172. 93 I *1*
— Rostellec (Finistère) . 90 II 106
— St. Helens, Island . . 94 II 440
— Südafrika . . . . . 91 I *273*
— Südengland . . . . . 90 I 151
— Umgebung von Angers 90 II 292
— unteres, England 1892 I 347. 92 II 97
— unteres, feuille de Luz 94 I 100
— unterstes, Karooformation, Süd-Afrika 1890 I *283*. BB VIII *104*
— Versteinerungen, Bolivien . . . . . BB VIII *9, 90*
— Visé . . . . . 93 I 511
— Vogtland . . . . . 92 II 80
Devonische Fauna, Südengland . . . . . 91 I 431
Diabantit . . . . . 1892 II 232
Diabas . . . 1893 II 336, 357, 362
— Alaska . . . . . 93 I 506
— Algäu . . . . . 91 II 85
— Amphibolitisirung . . 92 I 283
— argentinische Cordillere 93 I 104
— Bassenthwaite . . . . 94 II 261
— Böhmen . . . . . 93 II 518
— Boston, Mass. . . . . 90 I 274
— Caernarvonshire . . . 90 II 263
— Californien . . 1894 II 90, 268
— Cape Ann . . . . . 92 II 287
— Cornwall . . . . . 94 I 317
— Cross Fell Julier . . 93 I 96
— Cumberland . . . . 92 II 265
— Cypern . . . . . 93 II 59
— Darmstadt . . . . 93 I 89
— Ecuador . . . . . 93 I 78
— Einbruch in die Saarbrückener Schichten . 94 II 59
— Elsässer Belchen . . 93 I 488
— Ermensbach . . . . . 93 I 488
— Friedensdorf b. Marburg 92 II 1
— gabbroartig, Insel Bornholm . . . . . 90 II 94
— Gellivaragebiet . . . 93 II 64
— in der Schmelze . . . 94 I 97
— intrusiv und effusiv . 91 I 402
— I. of Man . . . . . 92 II 264
— Kloster St. Marienstern 94 II 287
— Lake Superior . . . 94 II 266
— Lausitz 1892 I 535, 537, 538. 92 II 81, 83, 84, 251
— Leinster . . . . . 91 I 90
— Maryland . . . . . 92 II 283
— Michigan . . . . . 92 I 323
— Minnesota . . . . . 93 I 292
— mit geflossener Oberfläche, Quotshausen . 90 II 247
— Montagne Noire . . 91 II 285
— Mt. Diablo . . . . . 93 I 99
— Nahaut . . . . . 90 I 85
— New Jersey . . . . . 93 I 505
— Nötsch-Graben, Ost-Alpen . . . . . 94 II 60
— Oberwesel . . . . . 94 II 306
— olivinfrei, körnig, Bergmassiv v. Menez-Hom. 90 II 398
— Olonez . . . . . 90 II 266
— ophitischer, Bergmassiv von Menez-Hom. . . 90 II 398
— Pillnitz . . . . . 93 II 93
— Pontevedra . . . . . 94 I 102
— postarchäisch, Canada 91 II 91
— Provinz Kai . . . . . 90 I 135
— Rainy Lake, Canada . 90 I 278

Diabas, Rheinisches Schiefergebirge . . . 1894 II 275
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Rio de Janeiro . . . 94 I 80
— Riviera di Levante . 93 I 277
— Rossena . . . . . 92 I 287
— Stolpen . . . . . 93 II 89
— Strassgräbchen . . . 94 II 288
— Sternsee . . . . . 93 I 489
— Stor-Sottunga . . . 93 I 498
— Südnorwegen . 1892 I 297, 301
— Systematik . . . . . 90 II 249
— Transvaal BB VII *128*. 93 I 318
— Trias, Connecticut . . 91 I 402
— Umwandlung . . . 92 II 215
— Val del Degano . . 91 II 423
— variolitischer . . . 92 I 284
— Vestone . . . . . 93 II 58
— Virginia . . . . . 92 II 427
— Vogtland . . . . . 92 II 79
— West-Cordilleren . . 94 I 465
— West-Pyrenäen . . . . 91 I 265
— zersetzt. Avellino . . 93 II 490
— —, Toskana . . . . . 94 II 427
Diabasader, Glasgow . . 91 I 95
Diabaseruption, New Haven 94 I 77
Diabasfacies, metamorph 93 II 358
Diabasglas, Homertshausen . . . . . 90 II 249
Diabashornfels, Darmstadt 93 I 89
Diabasporphyrit . . . . 92 I 295
— Berneck . . . . . 92 I 284
— Cross Fell Julier . . 93 I 96
— Ecuador . . . . . 93 I 78
— Republik Colombia . 91 II 98
— Tirol . . . . . 1890 I *72, 81*
— Westcordilleren . . 94 I 465
— Yukon-District, British Columbia . . . . . 90 I 432
Diabasporphyrittuff, Shap-Massif . . . . . 94 II 257
Diabasschiefer, Taunus 1890 II 249. 93 I 271
Diabastuff, Amphibolitisirung . . . . . 92 I 283
— Contact mit Granit . 91 II 273
— Sachsen . . . . . 93 II 501
Diachaenites ovalis . . 93 II 432
Diadema amalthei . . . 93 I 536
— nanum . . . . . 92 II *160*
Diadematidae . . . . . 92 II 160
— Oligocän, Astrupp . . 91 I *285*
Diadematoidea . . . . . 92 II 159
Diagonalschichtung der Sandsteine . . . . . 91 I 292
Diallag als faseriger Saum um Olivinkrystalle im Gabbro . . . . . 1894 I 78
Diallag in Diabas, Virginia . . . . . 92 II 427
— in Gabbro, Transvaal BB VII *95*
— Tirol . . . . . 90 I *77*
Diallagfels, Bacher Gebirge 94 I 462
Diallaggabbro, Chablais . 93 II 59
Diallaghypersthengestein, Madagascar . . . . . 90 II 96
Diallagit, M. Viso . . . 93 II 54
Diallagperidotite, Südborneo . . . . . 93 I *42*
Diallagserpentin, Bacher Gebirge . . . . . 94 I 462
Dialopsis . . . . . 90 II 151
Diamant . . . . . 91 II 34
— Cañon Diablo . . . 94 I 448
— Corrosionsfiguren . . 93 II 241
— Fluss Paserig . . . . 93 II 13
— im Pasvigthale in Russisch-Lappland . . . 92 I 36
— in Meteoriten 1891 I 45. 92 I 514. 94 I 275
— Kentucky . . . . . 93 I 256
— Nordamerika . . . 92 I 498
— Nordcarolina 1891 I 50. 92 II 211
— optische Anomalien . 92 I *200*
— Plum Creek . . 1893 I 254, 255
— Serebrianaja . . . . . 93 I 23
— Südafrika . . . . . 93 I 84
— Vorkommen in Meteoriten, Russland . . . 90 II 24
— — vermeintliches im hindostanischen Pegmatit . . . . . 93 I *139*
Diamantfelder, Jagersfontein (Südafrika) . . . 90 II 97
Diamantgänge, Capland, Entstehung durch Explosionsschachte . . . 91 II 422
Diamantkrystalle, Ural . 93 II 240
Diamenocrinus 1892 II 464. 93 I 563
Diamond-Joe-Typus . . 93 II 343
Diaspor . . . 1893 II 466, 467
— Chester . . . . . 90 I 408
— Greiner, Tyrol . . . 91 I 214
— Haute-Loire . . . . 91 I 5
— künstliche Bildung . 94 I 12
— Newlin . . . . . 90 I 408
— Südnorwegen . . . . 92 I 239
— Umwandlung . . . . 93 II 12
Diastictus . . . . . 90 II 151
DiastoporaHunstantonensis 91 II 369

Diastopora Jessoni . . 1891 II 369
Diatomaceen im Miocän Mährens . . . . . 92 I 140
Diatomeen im Cyprina planata-Tuff . . . . . 94 I 356
— in Thon, Philadelphia 93 I 422
— Landénien . . . . 93 II 436
— Norwegen . . . . 91 I 421
— Pariser Becken . . . 93 II 437
— Torflager, Interglacial, Minnesota . . . . 94 I 498
— Ypresien . . . . . 93 II 437
— — Nordfrankreich . 94 I 356
Diatomeenerde . 1893 II 294, 306
Diatomeenlager, Yellowstone Park . . . . 91 II 96
Diatomeenschiefer, Afrika 92 II 426
— Felmenes . . . . . 93 I 96
Diatomit von Mull, Analyse . . . . . 90 II 220
Dibelodon . . . . . 91 II 150
Diceras . . . . . 93 I 555
— Bourgeati . . . . 91 II 176
— Guirandi . . . . . 91 II 176
— Nötlingi . . . . . 91 II 129
Dichelodus . . . . . 92 I 145
Dichobune Langii . . . 93 I 148
— leporina . . . . . 93 I 148
— Mülleri . . . . . 93 I 148
— murina . . . . . 93 I 148
— ovina . . . . . 94 I 179
— pygmaea . . . . . 93 I 148
— Robertiana . . . . 93 I 148
Dichodon Cartieri . . . 93 I 148
— cuspidatus . . . . 93 I 148
Dichograptiden, Untersilur 94 I 392
Dichte der Planeten . . 92 I 55
Dichtigkeitsvertheilung der Erdrinde . . . . . 91 II 420
Dickinsonit . . . . . 93 II 31
Dicksonia punctata . . 94 I 231
— Singeri . . . . . 94 I 231
Dicksoniopteris Naumanni . . . . . 93 II 563
Diclonius . . . . . 93 I 547
Dicodein-Aethylenbromid 94 II *144*
Dicotylinae, John Day-Schichten von Oregon 90 II 322
Dicranophyllum . . . . 90 I 173
— longifolium . . . . 93 I 207
— tripartitum . . . . 94 I 221
Dictyocephalus macrostoma 94 I 395
— microstoma . . . . 94 I 395
Dictyomitra australis . . 94 I 526
— canadensis . . . . 94 I 395
— conulus . . . . . 93 II 423
Dictyomitra multicostata 1893 II 423. 94 I 395
— polypora . . . . . 94 I 395
— triangularis . . . . 94 I 526
Dictyonema . . . 1892 I 457, 593
— Nomenclatur . . . . 94 I 393
— sociale, Gleize . . . 91 II 437
Dictyonema-Schiefer . . 92 I 342
Dictyophyllum Nilssoni . 94 II 194
Dictyopteris, Befruchtung 93 II 217
Dictyopyge illustrans . . 94 II 162
— robusta . . . . . 94 II 162
— symmetrica . . . . 94 II 162
Dictyothyris Rollieri . . 91 II 365
Dictyozamites distans . 91 I 177
— grossinervis . . . . 91 I 177
— indicus . . . . . 91 I 177
— Johnstrupi, Bornholm 91 I 173
Dicynodon Copei . . . 91 II 343
— tigriceps . . . . . 91 II 343
— Indien . . . .1891 II 344, 346
Didelphops . . . . . 90 II 142
Didymictis . . . . . 91 II 148
Didymodus . . . . . 91 II 165
Didymograptus . . . . 92 I 346
— V-fractus . . . . . 92 I 594
Didymorina . . . . . 91 I *281*
Didymosphaera . . . . 91 I *281*
Dielasma turgida, Schleife 94 II 175
Dieretostoma . . . . . 90 II 151
Diestien südlich Brüssel . 92 I 368
Difflugia roseolata . . . 94 II 367
Dihydrothenardit 1890 I 16. 93 I 42
Dikotyledonen, geologisches Alter . . . . 90 I 178
— Ursprung . . . . . 91 II 378
Diluviale Bildungen . . 90 I 316
Diluvialfrage . . . . . 93 II 535
Diluvialgeschiebe 1892 I 170, 182, 307, 344, 429, 452, 556
— Groningen . . . . 92 II 321
— Neubrandenburg . . 92 II 446
— New Jersey . . . . 92 II 322
— Schweden . . 1892 I 375, 376
Diluvialschotter, Nordschweiz . . . . . 93 I 368
Diluvialsteppe . . . . . 91 II 332
Diluvium, Aenderungen des Neckarlaufes während des . . . . . 94 I 164
— Alpenvorland . . . . 94 I 313
— Basilicata . . . BB VII *586*
— Comitat Torontál . . 93 I 368
— Gliederung und Fauna, Thiede b. Braunschweig 90 I 331

Diluvium, Göttingen . 1891 I 309
— Grossenhain . . . . 93 I 94
— Grünenthal, Holstein 91 II *228*
— Hegyes-Drócsa . . . 93 I 95
— Hessen . . . . . 93 I 90
— Holland . . . . . 94 II 333
— Innthal . . . . . 91 I 133
— Karpathen . . . . 93 II 144
— Klausenburg . . . 90 I 459
— Königswartha . . . 93 II 95
— Kötzschenbroda. . . 93 II 92
— Lappmarken . . . . 91 II 137
— Lausitz . . . 92 II 82, 83, 84
— Leinethal . . . . BB VII *277*
— Lübeck . . . . . 92 II 317
— Mähren . . . . . 94 I 155
— Magdeburger Uferrand 93 II 101
— Maros . . . . . 93 II 362
— Mecklenburg . . . 90 II 422
— Neuvorpommern . . 93 I 532
— Nordamerika . . . 94 I 163
— Norddeutschland . . 90 II *165*
— nördliches Schlesien . 90 I 324
— Piemont . . . . . 93 II 170
— Pillnitz . . . . . 93 II 92
— Prachover Felsen, Böhmen . . . . . 90 I 460
— Prossnitz . . . . . 93 I 95
— Raunheimer Schleuse 90 I *190*
— Riesa-Strehla . . . 91 II 269
— rothes, Rumänien . . 94 I *114*
— Russland . . . . . 94 II 337
— Sachsen 1891 I 75, 82, 85. II 267. 94 II 284, 286, 287, 289
— Stolpen . . . . . 93 II 90
— Spessart 1893 I 86. 94 I 310
— Theiss . . . . . 93 II 363
— Themar, Werrathal . 90 I 456
— Ungarn . . . . . 91 I 127
— vermengtes, Holland . 94 II 456
— Vogtland . . . . . 92 II 81
— Ystad . . . . . 93 I 532
Dimorpharaea . . . . 90 II 338
Dimorphastraea . . . . 90 II 337
Dimorphie, chemisches Verhalten dimorpher Mineralien . . . . . 94 II *265*
— des kohlensauren Kalkes 92 II 208
— Erklärung der . . . 92 I *207*
— im regulären System 94 II 394
Dimorphismus der Foraminiferen . . . . . 94 I 211
Dimorphoceras Brancoi . 91 I 406
Dimylus . . . . . 93 I 149
Dimyodon Argyropuli . 93 II 524
Dinarella Haueri . . . 93 II 419
Dinarites labiatus . . 1894 II 169
— ornatus . . . . . 94 II 169
Dindymene, Yorkshire . 94 II 352
Dinichthys . . . . 93 I 175, 177
Dinorthis . . . . . 93 II 204
Dinosaurier 1890 I 342. 92 II 350. 93 I 545
— Europas und Amerikas 90 II 433
— Kreide, Amerika, Eintheilung . . . . . 91 II 452
— Laramie 1890 II 435. 94 I 182
— Lombardei . . . . 93 I 164
— Trias . . . . . 93 II 192
Dinotheriidae . . . . 91 II 150
Dinotherium, Gaiceana, Rumänien . . . . 94 I *133*
Diodon sigma, Java . . 90 I 313
Dionide, Silur . . . . 94 I 121
Dioonites Carnallianus . 90 I 372
— Kotoe . . . . . 91 I 177
— longifolius . . . . 90 I 372
Diopeus leptocephalus . 93 I 392
Diopsid . 1892 II 23. 93 II 472
— Achmatowsk . . . . 93 II 261
— Alathal (Piemont) . . 90 II 215
— chemisches Verhalten 94 II *272*
— Graubünden . . . . 94 II 23
— Stellung in der Pyroxenreihe . . . . . 91 I *150*
— Taberg . . . . . 93 I 21
Diopsidreihe, optische Constanten . . . . BB VIII *169*
Dioptas . . . . . 93 II 470
— Comba . . . . . 92 II 10
— Congo . 1891 II 414. 94 I 42
— optische Structur . . 93 I 458
— Verhalten gegen Ammoniak . . . . . 93 I 231
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Dioptropora . . . . . 90 I 169
— devia . . . . . 90 I 169
Diorit 1892 I 69. 93 II 362, 365, 496
— Abukuma-Plateau . . 93 II 514
— Alaska . . . . . 93 I 506
— argentinische Cordillere 93 I 105
— Borna, Sachsen . . . 91 II 271
— Cape Ann . . . . 92 II 286
— centraler Balkan . . 90 I *266*
— Cerro de Cacheuta . 93 I 103
— Chichibu . . . . . 92 I 315
— Cornwall . . . . . 94 I 317
— Cortlandt Series . . 90 I 86
— Darmstadt . . . . 93 I 89
— Ecuador . . . . . 93 I 78
— Forest of Dean, New York . . . . . 90 I 272

Diorit, Garabal Hill . 1893 I 286
— hornblendeführend . . 90 I 87
— Jablanika . . . . . 90 I 65
— Kötzschenbroda . . . 93 II 91
— Lausitz . . . . . 82 II 84
— Leinster . . . . . 91 I 90
— Maass . . . . . 90 I 71
— Michigan . . . . . 92 I 323
— Nordargentinien . BB VIII *293*
— Odenwald 1892 II 88. 94 II 418
— östlicher Balkan . . 90 I *279*
— olivinführend, White House . . . . . 94 I 301
— Republik Colombia . 91 II 97
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Sierra Nevada . . . 93 I 100
— Stolpen . . . . . 93 II 89
— Südborneo . . . . 93 I *42*
— Tirol . . . . . 90 I *72*
— Trondhjem . . . . 93 I 96
— Umgebung von Ričan 90 I 265
— Yellowstone Park . . 91 I 105
Dioritaplit, Melibocus . 94 I 289
Dioritgabbro, Eisack . . 93 II 332
— Insel Hochland . . . 92 I 76
— Tirol . . . . . 93 II 487
Dioritgneiss, Spessart . . 91 I 252
Dioritporphyr, Livriothal 92 I 294
Dioritporphyrit, Rabbi . 92 I 522
— S. Cristóbal . . . . 92 I 522
— Tirol . . . . . 90 I *72*
— Umgebung von Ričan 90 I 265
— von Angola . . . . 93 II 58
Diospyrinae . . . . . 91 I 345
Diospyros schoeneggensis 93 I 431
— Turneri . . . . . 90 I 374
— virginiana . . . . 90 I 374
Diphenyldodekachlorid, optische Anomalie. BB VII *5*
Diphyphyllum 1890 I 474. 92 I 186
Diplacanthidae . . . . 92 II 357
Diplacanthus horridus . 94 II 350
Diplacodon . . . . . 93 I 154
Diplaspis acadica, Silur . 90 II 328
Diplocidaris decipiens . . 91 II 190
Diplocraterium-Sandstein 94 II 438
Diplocynodon 1892 II 149. 93 II 547
Diplodocus . . . . . 93 I 545
Diplodonta Speyeri . . 91 II 444
Diplodus, Keuper, Somersetshire . . . . . 91 II 456
— Moorei . . . . . 90 I 148
Diplograptus 1891 I 439. 92 I 188
— putillus . . . . . 92 II 372
Diplopodia cherbensis . . 93 I 560
— Deshayesi . . . . . 93 I 560
Diplopodia marticensis 1893 I 560
— semamensis . . . . 93 I 560
Diplotmema . . . . . 93 II 215
— bussacensis . . . . 94 II 102
Diploxylon . . . . . 94 I 403
Dipneustes aturicus . . 93 I 561
— Danien, Landes . . 94 I 392
Dipnoi 1890 I 349. 90 II 438. 92 II 357
— Old Red-Sandstone, Grossbritannien . . 90 II 327
— Zahnbau, Lebensweise 93 II 409
Dipodina . . . . . 90 II 430
Dipriodontidae . . . . 90 II 142
Diptera . . . . . 93 II 412
Dipteren im Bernstein . 92 II 459
Dipterocarpus Labuanus . 91 II 209
— Nordenskiöldi . . . 91 II 209
Dipterus brachypygopterus 91 I 152
— macrolepidotus . . . 91 I 152
— macropterus . . . . 91 I 152
— macropygopterus . . 91 I 152
— platycephalus . . . 91 I 152
— Valenciennesii . . . 91 I 152
Diptychomitra Scarabellii 91 II 464
— Taramellii . . . . . 91 II 464
Dipyr, Pyrenäen . . . 92 I 513
Discina anomala . . . . 92 II 364
— grandis . . . . . 92 II 364
— Lamarck . . . . BB VIII *81*
— scutellum . . . . . 90 II 154
— siegensis . . . . . 92 II 364
— spitzbergensis . . . 91 II 121
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Discinocaris . . . . . 92 II 359
— Dusliana 1892 II 359. 93 I 400
Discinopsis . . . . . 93 II 203
Discites hibernicus . . . 94 II 167
Discoceras . . . . . 92 I 434
Discocyclina . . . . . 92 II 374
Discocytis irregularis . . 90 I 166
Discoglossus . . . . . 92 II 455
Discoidea cylindrica . . 92 I 447
— Forgemoli . . . . . 93 I 560
Discophyllum, Untersilur, bei Oporto . . . . 94 I 475
Discorbina Vilardeboana . 90 II 344
Discordanz im Carbon, Oderthal . . . . . 94 II 308
Discosaurus . . . . . 93 I 172
— permianus . . . . 91 II 455
Discosparsa costata . . 90 I 166
Dislocationen . . . . 91 I 312
Dislocationsbeben . . . 94 I 454
Dispersionsbestimmung mittels Totalreflexion 94 II 210
Dissochilus . . . . . 90 II 151

Dissostoma . . . . . 1890 II 151
Disthen in Eklogit . . . 93 I 273
Disthenfels . . . . . 94 I 461
Ditichia mira . . . . . 91 II *104*
Ditremaria Hermitei . . 91 II 176
Ditremaster . . . . . 90 I 362
Ditriaenella . . . . . 93 II 211
Ditrochosaurus capensis . 91 I 428
Ditroite, Südnorwegen . . 92 I 298
Ditrupa javana, Java . . 90 I 313
Ditrupa-Schichten, Trinidad . . . . . 94 II 130
Dockum Beds, Texas . . 94 I 139
Dodo . . . . . 92 II 452
Dogger, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 474
— Leinethal . . . . BB VII *266*
— Marseille . . . . . 91 I 159
— Oran . . . . . 91 II 441
— unterer, bayrische Alpen . . . . . 92 II *86*
— unterer, Centralappenin 94 I 347
— Wollin . . . . . 94 II 315
Doggercrinoidenkalk, Karpathen . . . . . 93 II 148
Dolerit, Giessen . . . . 93 II 324
— Kaiserstuhl . . . . 93 II 504
— Mecca . . . . . 94 II *103*
Doleritstock von Rongstock 90 II 257
Dolerophylleen . . . . 93 I 206
Dolichopithecus ruscinensis 92 I 567
Dolichopoden im Bernstein 93 II 550
Dolichotoma . . . . . 92 I 587
— Goudini . . . . . 90 II 153
— Miocän . . . . . 93 II 199
Doliocarpus oblongifolia . 93 II 434
— serrulata . . . . . 93 II 434
Doliostrobus Sternbergii . 91 I 173
Dolomit . . . . . 91 II 339
— Aetzfiguren . . . . 91 I *141*
— Apuaner Alpen . . . 91 II 307
— biegsamer, Sunderland 93 I 288
— Bildung . . . . . 93 I 46
— Elasticität . . . . 92 I 7
— Entstehung . . . . 94 I *262*
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Mies . . . . . 93 I 12
— Mont Cenis . . . . 90 II 95
— Nyons . . . . . 93 II 265
— Rhisnes . . . . . 94 II 415
— Schottland . . . . 91 II 18
— Somma . . . . . 92 II 254
— Ursache der Tetartoëdrie . . . . . 91 II 409
— Vierwaldstädter See . 90 II 108
— Wärmeleitung . . . . 94 I 5
Dolomit, Waldshut, Baden 1890 II 378
— Zusammensetzung . . 94 II 406
Dolomitfacies des Muschelkalk . . . . . 94 II *9*
Dolomitformation, Transvaal . . . . BB VII *117, 128*
Dolomitische Zone des Muschelkalk, Deutsch-Lothringen . . . . 91 I 411
Dolomitreihe . . . . . 92 I 210
Domatoceras umbilicatum 93 I 180
Dombeyoxylon . . . . 92 I 615
Donau, Eisverhältnisse . 93 I 67
Donax Addolii . . . . . 90 II 332
— brevior . . . . . 90 II 332
— minutissimus . . . . 93 I 538
Doppelbrechung beim Beryll, Zunahme bei Temperaturänderung . BB VIII *266*
— durch elastische Deformationen hervorgerufen . . . . BB VIII *224*
— Messung derselben . . 94 II 211
— regulärer Krystalle, durch einseitigen Druck hervorgerufen . . . 90 II 367
— Zusammenfallen der Strahlen in einaxigen Krystallen . . . . . 91 I 4
Doppelfalte, Glarner . . 94 I 313
Doppelsalz von Manganchlorür u. Chlorkalium 92 II *91*
Doppelsalze und Mischkrystalle . . . . . 91 I *135*
Dorikranites . . . . . 91 II 171
Doris . . . . . 91 II 177
Dorocidaris Herthae . . . 93 II 422
Doryceras . . . . . 90 II 150
Dosinia . . 1892 II 360. 93 II 158
Drehapparate zur optischen Untersuchung von Krystallen in Medien von ähnlicher Brechbarkeit 93 I 8
Drehspiegelung . . . . 94 I *95*
Drehung der Polarisationsebene . . . . . 92 I 211
— magnetische in dilatirtem Glase . . . . 91 I 195
Drehungsvermögen des Quarz bei niedriger Temperatur . . . . . 94 II 213
— optisches, Beispiele aus dem hexagonalen System . . . . . 94 I *179*
— — Zusammenhang mit der Krystallform . . 93 II 5

Dreibeine im Wälderthon, Westfalen . . . 1894 II 113
Dreikanter, Entstehung . 94 II 280
— im Löss . . . . . 91 I 131
Dreissena . . . . . 94 II 175
— girondica . . . . . 94 II 356
— Münsteri . . . . . 94 I 388
— van Beneden . . . 94 I 517
Drepanophycus spinaeformis . . 1892 I 465. 93 II 213
Drepanophytum . . . . 93 II 213
Dreyssensia cf. Dreissena.
Drift, Central-Ontario . . 90 I 430
— Mississippi . . . . 90 I 277
— Südengland . . . . 93 I 136
Driftablagerung . . . . 94 I 153
Drifttheorie 1890 II *164*, 93 II 535. 94 I 498
Drillia . . . . . 92 I 587
— Calurii . . . . . 90 II 153
— Monterosatus . . . 90 II 153
Dromatheriidae . . . . 92 II 343
Dromatherium . . . . 92 II 343
Dromiopsis Ubaghsii . . 91 I 153
Druck, Einfluss auf die optischen Eigenschaften des Apophyllit . . 92 II *165*
— statischer und dynamischer . . . . . 91 I 61
Druckerscheinungen im Gneiss, Argentinien BB VII *323*
Druckphänomene . . 1892 I 76, 78
Druckwirkung auf gepulverte Substanzen . . 91 I 244
— im Granit von Nordargentinien . . . BB VIII *361*
Drumlins . . . . . 94 I 169
— Bodensee . . . . . 94 II 44
— Boston . . . . . 91 I 137
Druppula convoluta . . 93 II 423
Drusenräume im Buntsandstein, Waldshut, Baden . . . . . 90 II 377
Dryakconglomerat . . . 91 I 136
Dryandra . . . . . 91 I 342
Dryandroides lomatiaefolia 94 I 532
Dryolestes . . . . . 90 II 142
Dryopithecus 1892 I 157. 93 I 385
Dryornithiden, Argentinien 93 I 545
Dudgeonit . . . . . 91 I 376
Dünen . . . . . 1892 II 278, 287
— ältere, Gascogne . . 91 II 333
Dufrenit, Elba . . . . 90 II 18
Dulong'sche Formel . . 93 II 82
Dumblea symmetrica . . 94 I 371
Dumortiera Haugi . . . 94 II 356
Dumortierit . . . . . 1894 II 233
— Clip . . . . . 92 II 27
— Harlem . . . . . 92 II 27
— im Granit von Nord-Argentinien . . . BB VIII *342*
— Neues Vorkommen. Brignais (Rhône) . . . 90 I 25
Duncanella . . . . . 90 II 158
Dunit . . . . . 92 I 79
Durbachit . . . . . 92 I 281
Durchbruchthäler . . . 90 I *165*
Durchlüftbarkeit des Bodens . . . . . 90 I 133
Durdenit . . . . . 93 II 467
Durgen-Fauna, Jupilles . 90 I 117
Dyas, Alpen . . . . . 92 II 275
— Col de la Ponsonnière 93 I 97
— französische Alpen . 92 I 545
— Manchester . . . . . 91 I 166
— Montagne Noire . . 94 I 315
— obere, Manchester . . 93 II 133
— Steierdorf-Anina . . 93 I 122
— Theiss . . . . . 93 II 363
Dykes, Alderney . . . 90 II 91
Dynamo-Metamorphismus 1890 II 388. 91 I 90. 92 I 275. 91 II 422. 93 II 507
Dynamometamorphose, anogene und katogene, Hohes Gesenke . . . 93 II 125
— Gneiss, Argentinien BB VII *339*
— Penninische Alpen . . 94 II 425
Dysanalyt . . . . . 94 I 25

E.

Ebalia Fucinii . . . . 93 I 178
Ebbe und Fluth, Erosionswirkung . . . . . 91 II 261
— im Erdinnern . . . . 91 II 419
Ebenaceen . . . . . 91 I 345
Eccyliopterus alatus . . 94 I 172
Echinanthus Badinskii . 93 I 557
— subhemisphaericus 1891 I 435, 437
Echinanthus-Schicht, Eocän, Pyrenäen . . . 93 II 557
Echiniden . 1890 I 170. 92 I 446. 92 II 156, 162
— Algier . . . . . 93 I 184
— Aragonien . . . . . 91 II 368
— Eocän . . . . . 90 I 360
— — Kef Ighoud . . . 93 I 556
— — Loire inférieure und Vendée . . . . . 93 I 414
— Kreide . . . . . 93 II 209

Echiniden, Madagascar 1891 I 434
— Mexico . . . . . 91 I 162
— Nord- und Mitteldeutsches Oligocän . . . 91 I 434
— Plateau von Tunis . 93 I 557
— tertiäre, Australien 1892 I 591. 94 I 391
— unteres Tertiär . . . 94 I 203
— Verbreitung in der norddeutschen Kreide 93 II 423
— West-Pyrenäen 1890 I 472. 91 II 366
Echiniden-Kalk, St. Yves 94 II 325
Echinobrissus angustior . 93 I 559
— daglensis . . . . . 93 I 559
— djelfensis . . . . . 93 I 559
— edissensis . . . . . 93 I 559
— expansus . . . . . 93 II 209
— inflatus . . . . . 93 I 559
— Jullieni . . . . . 93 I 559
— Meslei . . . . . 93 I 559
— pseudominimus . . . 93 I 559
— rimula . . . . . 93 I 559
— rotundus . . . . . 93 I 559
— sitifensis . . . . . 93 I 559
— texanus . . . . . 93 II 209
Echinocaris Whidbornei . 91 II 460
Echinoconus . . . . . 92 I 447
— marginalis . . . . 93 I 560
— mazunensis . . . . 93 I 560
— subrotundus . . . . 94 I 392
Echinocorys Arnaudi . . 90 I 473
— carinatus . . . . . 93 I 412
— Lamberti . . . . . 93 I 558
— pyrenaicus 1890 I 473. 93 I 561
Echinocyamus australis . 92 II 365
— Böttgeri . . . . . 91 I 435
— craniolaris . . . . 92 II 365
— Dumasi . . . . . 93 I 415
— Lorioli . . . . . 92 II 365
— subglobosus . . . . 92 II 365
— Vasseuri . . . . . 93 I 415
— volva . . . . . 92 II 365
Echinocyphus . . . . . 90 II 155
Echinodermen 1890 II 136. 93 II 208, 305
— Bolivien . . . . BB VIII *83*
— Homologien . . . . 91 II 187
— Jura . . . . . 91 II 190
— Kreide, England . . 94 I 205
— Stammesgeschichte . 93 I 409
Echinodermenbreccie, Bonaduz, Schweiz . . . 94 I 296
Echinodermenfauna, unterer Kohlenkalk, Mississippi-Becken . . . . 92 I 185
Echinoidea 1891 II 187. 92 II 157
— Malta . . . . . 94 II 176
Echinolampas . . . . 92 II 464
— aintabensis . . . . 91 II 332
— Arnaudi . . . . . 93 I 561
— cepa . . . . . 93 I 560
— florescens . . . . . 93 I 557
— Goujoni . . . . . 93 I 560
— gracilis . . . . . 93 I 561
— Hauchecornei . 1891 I 435, 437
— Hovelacquei . . . . 91 II 368
— Manzoni . . . . . 94 II 178
— Morgani . . . . . 92 I 185
— Perrieri . . . . . 93 I 560
— planulatus . . 1891 I 435, 437
— posterolatus . . . . 94 II 178
— sulcatus . . . . . 93 I 557
— Wrighti . . . . . 94 II 178
Echinometra . . . . . 90 I 171
Echinometridae . . . . 92 II 162
Echinoneidae . . . . . 92 II 163
Echinopatagus . . . . 90 I 361
Echinospatangus africanus 93 I 561
Echinothuriden . . . . 90 I *85*
Echinus tongrianus . . 94 II 178
— tortonicus . . . . . 94 II 178
Eck'sches Conglomerat . 94 I 309
Eckergneissformation . . 93 I 269
Ectatomma gracile . . 94 II 469
Ectinochilus . . . . . 90 II 152
Edelmetalle . . . . . 94 I 468
Edelsteine, Eigenschaften, Vorkommen und Anwendung . . . . . 90 II 19
— Nord-Amerika 1891 II 40. 92 I 1, 492. 93 I 254
Edelsteinkunde . . . . 93 II 233
Edentata . 1892 I 411. 92 II 337
— Zahnentwickelung . . 94 I 181
Edestus . . . . . 93 I 177
Edisonit . . . . . 91 II 44
Edrioaster . . . . . 91 II 189
Ehrwaldit . . . . . 92 I 285
Eichen, Ursprung . . . 91 II 379
Eichwaldit . . . . . 92 I *201*
Einschlüsse, granitische, Gutberg bei Ebersbach 90 II 68
— — Oberfriedersdorf . 90 II 68
— — Wacheberg bei Taubenheim . . . . . 90 II 68
— in Basalt . . . . . 92 I 511
— in campanischem Tuff 93 I 280
— in Eruptivgesteinen . 92 I 67
— in skandinavischen Diabasen . . . . . 92 I 74
— in Trachyten . . . 92 I 294

Einschlüsse in Trachyten, Laacher See . . . . 1892 II 417
Einsturzbeben . . . . 94 I 454
Einsturzkessel, Puy-de-Dôme . . . . . 94 I 284
— Salles-la-Source . . . 94 I 284
Eintheilung der Krystalle 93 I 13
Einwanderungen alpiner Ammoniten n. Deutschland . . . . . 94 I 484
Eione Paretoi . . . . 90 II 153
Eis . . . . . 94 I *28*
— Krystallform . . . . 93 I 24
— Schmelzwärme und specifische Wärme . . . 94 I 287
— unter hohem Druck . 94 I 98
— Wirkung . . . . . 93 I 46
Eisberge . . . . . 93 I 46
Eisbildung im Polarmeer 94 II 249
Eiscalorimeter . . . . 92 II *127*
— die Constante derselben 94 I 287
Eisdrift, Schwedisch-Lappmark . . . . . 90 II 130
Eisen . . . . . 94 I 15
— Beresowsk . . . . 94 II 217
— metakieselsaures . . 92 I 89
— mikroskopische Structur . . . . . 91 I 46
— mikroskopischer Nachweis . . . . . 94 I 460
— Ovifak . . 1894 I 432; II 423
— terrestrisches, Beresowsk . . . . . 92 II 266
— Zwillingsbildung und orientirter Schimmer . 93 I 231
Eisenbisulfide, Isomorphismus derselben . . . 91 I *151*
Eisenchlorid . . . . . 94 I *42*
— Mischkrystalle mit Salmiak . . . 1894 II 395–397
Eisenerz, Bildung 1893 II 271, 273
— Clinton . . . . . 93 I 80
— Donetzgebiet . . . . 94 II 414
— Gellivara . . . . . 93 II 267
— Hunyadyer Comitat, Synthese . . . . . 90 I 398
— Huron, Lake Superior 94 I 90
— im Gneiss, Argentinien BB VII *305*
— im Lenneporphyr . BB VIII *586*
— lacustrische und terrestrische Bildung . . 93 II 276
— Michigan . . . . . 94 I 471
— Nordamerika . . . . 92 II 76
— Oberschlesien . . . 94 I 87
— pneumatolytisch gebildet . . . . . 93 II 69
Eisenerz, primäres und secundäres Vorkommen 1893 II 273
— Skandinavien . . . 93 II 65
— Texas . 1892 II 283. 94 I 112
— titanreiches . . . . 93 II 69
Eisenerzbergbau, Siebenbürgen . . . . . 92 II 72
Eisenerzformation, Semmering . . . . . 90 I 271
Eisenerzlager, Russland . 93 II 61
Eisenglanz 1892 II 235. 94 I *16*
— Bildung aus der Schmelzmasse . . . 94 I 96
— Bom Jesus dos Meiras, Provinz Bahia, Brasilien . . . . . 90 II 188
— Framont . . . . . 94 I 53
— im Granit von Nord-Argentinien . . . BB VIII *369*
— künstliche Bildung . 94 I 11
— Lava des Aetna . . 94 I 434
— Mexico . . . . . 94 I 57
— sublimirt, Laacher See 92 II 408
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— Südnorwegen . . . 92 I 238
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Thermoelektricität . 92 I 501
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Eisenglimmer, optische Eigenschaften . . . 90 I *193*
— Synthese . . . . . 90 II 36
Eisengymnit, Steyermark 90 II 17
Eisenkies . . . . . 93 II 460
— French Creek . . . 92 II 211
— kobalt- und nickelreich 93 II 260
— Mies . . . . . 93 I 10
— Riviera di Levante . 93 I 278
— Südnorwegen . . . 92 I 238
Eisenlager, Vermillion Lake Country, Minnesota . . . . . 90 I 275
Eisenlagerstätten, Entstehung, Elba und toscanische Küste . . . 93 II 71
Eisenmagnesiaturmalin . 90 II 202
Eisennickelkies, Skandinavien . . . . . 93 II 72
Eisenoolith, Aetzung . . 91 I 117
— Alleghanies . . . . 94 I 90
— Bonaduz, Schweiz . . 94 I 296
— Lothringen, mikroskopische Structur . . . 93 II 71
Eisenoxyd im Basalt, Marburg . . . . . 91 II *173*
Eisenoxyd-Nickel-Magnesia-Silicat . . . . . 93 II 252

Eisenoxyd-Phosphate, Entstehung derselben . 1891 I 383
Eisenoxydul . . . . . 94 I *16*
— Bestimmung in unlöslichen Silicaten . . . 91 I 38
Eisensandlager, Feuerland 93 II 70
Eisenschefferit, Långban . 94 I 272
Eisenspath, Neu-Süd-Wales . . . . . 90 II 207
— Piemont . . . . . 92 II 422
— pseudomorph nach der Glasmasse des Keratophyr, Sauerland . BB VIII *603*
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Eisensulfat, specif. Gewicht 90 I 203
Eisenturmalin . . . . 90 II 202
Eiskrystallgrotte . . . 90 II 43
Eisscheide, Norbotten . . 93 II 536
— Skandinavien . . . 90 I 130
Eisschub, Kritik der Theorie des . . . . 94 I 364
Eisstrom, baltischer, Süd-Schweden . . . 1890 I 129, *184*
Eisthätigkeit, Norwegen . 90 II 423
Eisverhältnisse der Donau 93 I 67
Eiswall, Schwedisch-Lappmark . . . . . 90 II 130
Eiswirkung, Süd-Georgien 91 II 104
Eiszeit . . . . . 91 I 52
— Alpen . . . . . 93 II 511
— Auftreten des Menschen 91 I 130
— Australien . . . . 94 II 299
— Bedeutung des baltischen Höhenrückens für dieselbe . . . . . 90 II 424
— bodengestaltende Wirkungen . . . . . 93 I 484
— in Nordamerika . . . 92 II 440
— Klima . . . . . 94 II 48
— Nordböhmen . . . . 93 II 174
— Skandinavien 1894 I 166, 169. 94 II 135
— Texas . . . . . 94 I 112
— Transvaal . . . . . 93 I 318
— Ursache . . . 1891 I 130, 419
Eiweiss, Niederschlag von Calcosphaeriten aus Chlorcalciumlösung durch . . . . . 91 II 338
Eizähne der Sauropsiden . 93 II 188
Ekdemit, Harstigen, optische Anomalien . . 90 II 227
— Pajsberg, Wermland . 90 I 231
— Sjögrube . . . . . 90 I 411
Eklogit, Adula-Massiv . 94 I 295
— Bacher Gebirge . . . 94 I 462
Eklogit in Geschieben der Sill . . . . . 1890 II 259
— Mt. Blanc . . 1894 I 463; II *425*
— untere Loire . . . . 93 I 273
— von Loch Duich . . 92 I 296
Eklogitgestein . . . . 94 I 461
Ekmanit, optische Eigenschaften . . . . . 90 II 52
Elaeagnaceen . . . . . 91 I 341
Eläolith, Brevig . . . . 91 II *208*
Eläolith-Eudialyt-Syenit . 93 II 343
Eläolith-Syenit 1893 II 340, 342, 497
— Canada . . . . . 91 I 268
— Central-Ontario . . . 92 I 523
— Contacterscheinungen, Hautes Pyrénées . . 91 I 265
— Litchfield . . . . . 93 I 502
— Montreal . . . . . 92 I *222*
— Red Hill, New Hampshire . . . . . 93 I 503
Elasipoden . . . . . 92 II 368
Elasmobranchier, 1892 I 167; II 150, 357
— Silur . . . . . 91 I 285
Elasmodectes 1893 II 548. 94 I 383
Elasmotherium . . . . 93 II 542
Elasticität der Erde . . 92 II 40
Elasticitäts-Constanten des Dolomit . . . . 92 I 7
— des Feuerstein . . . 92 I 11
— des Kalkspath . . . 92 I 3
— des Obsidian . . . . 92 I 11
— des Opal . . . . . 92 I 11
— des Turmalin . . . 92 I 8
— dichter Mineralien . 1892 I 7, 11
— isotroper Körper . . 92 I 5
Elasticitätsprobleme . . 91 II 402
Elastische Deformationen, Einfluss auf das opt. Verhalten der Krystalle 90 I 197
Elaterit, Derbyshire und Dingwall, Analyse . . 90 II 220
— Old Red Sandstone, Rossshire . . . . . 90 II 219
Elaterites . . . . . 93 II 548
Elektrische Entladung, dadurch hervorgebrachte Ellipsen auf Krystallflächen . . . . . 94 II 5
Elektromagnetische Lichttheorie . . . . . 90 I 2
Elenskelet, Höhle bei Jaszczurówka, Tatra . . 90 II 431
Eleonorit, Arkansas . . 91 II 27
Elephantenfunde, Südwestfrankreich . . . . 94 I 505

Elephantenreste, fossile, Mindanao, Sumatra und Malakka . . . . 1890 II 139
Elephantidae . . . . . 91 II 150
Elephas . 1891 II 151. 92 I 160. 93 I 183
— Algier . . . . . 93 I 544
— antiquus 1892 II 143, 333. 93 II 400
— — Gebiss und Schädelbau . . . . . 90 I 462
— — Melitae, Sicilien . 94 I 503
— — Schädel- und Zahnbildung . . . . . 93 II 400
— indicus . . . . . 94 I 178
— — Zahnbau . . . . 94 II 462
— Italien . . . . . 91 I 144
— lyrodon . . . . . 92 II 333
— meridionalis 1892 II 333. 93 II 400
— — Backenzahn, Rumänien . . . . . 94 I *169*
— — Haute-Loire . . . 94 I 179
— namadicus 1890 II 140. 92 II 143. 94 I 503
— primigenius 1890 I 462. 91 II 154. 92 II 333. 93 II 400. 94 II 288
— — var. hydruntina . 93 II 183
Eleutherodon . . . . . 92 II 338
Elfablagerungen, Norwegen 91 I 420
Elginia mirabilis . . . 94 II 348
Elgin-Sandstein . . . . 94 II 346
Eligmostoma . . . . . 90 II 151
Ellipsactinia, Griechenland 93 I 130
Ellipsocephalus . . . . 94 I 475
Ellipsometer . . 1894 I 6; II 4
Elotherium . . . . . 94 I 180
Eluviale Bildungen . . 90 I 316
Eluviallehm, Umgebung von Ričan . . . . . 90 I 264
Elvan, Dartmoor . . . 90 II 91
Emarginula Boelschei . . 91 II 444
— Kitteli . . . . . 92 II 462
Embolimus rotundata, Mount Stephens, Canada . . . . . 90 II 289
— spinosa, Mount Stephens, Canada . . . . . 90 II 289
Embothrium brachypterum 94 I 532
— leptospermum . . . 94 I 532
— microspermum . . . 94 I 532
— obliquum . . . . . 94 I 532
— parschlugianum . . . 94 I 532
— schoeneggense . . . 94 I 532
— stenopterum . . . . 94 I 532
Embryonalschale der Pelecypoden . . . . 1891 II 362
Emmelezoë, Gross-Britannien . . . . . 90 II 329
Emmenodon . . . . . 91 II 151
Emmericia Pigorinii . . 93 I 183
Emmonit, Brixlegg . . . 90 I 412
Emmonsia . . . . . 93 I 415
Empedodea repando-serrata 93 II 434
Empetraceen . . . . . 91 I 337
Emscher-Mergel, Grenze gegen das Untersenon, Harz . . . . . 90 I *176*
Emys Campani . . . . 92 II 149
— Capellini . . . . . 91 II 156
— Delabechei . . . . 91 I 151
— depressa . . . . . 92 II 149
— Dollfusii . . . . . 92 II 356
— lutraria taurica . . . 94 I 183
— parva . . . . . 92 II 149
Enallaster inflatus . . . 94 I 372
— mexicanus . . . . 91 I 162
Enargit, Cerro Blanco . 93 I 234
— Chile . . . . . 94 II 403
Encephalartos . . . . 90 I 172
— denticulatus . . . . 90 I 372
Enchodus . . . . . 94 II 349
Encrinites . . . . . 92 II 168
Encrinuridae . . . . . 90 I 151
Encrinurus aculeatus . . 94 II 141
— varicostatus . . . . 90 II 440
— Wagneri . . . . . 94 II 140
Endocarp . . . . . 93 II *90*
Endoceras crassisiphonatum 93 I 179
— hircus . . . . . 93 I 180
— Schmidti . . . . . 93 I 180
Endoceratidae . . . . . 90 I 354
Endobolus . . . . . 90 II 150
— gibbosus . . . . . 93 I 180
Endopachychilus . . . . 90 II 152
Endophyllum . . . . . 90 II 158
— feragensis . . . . . 94 I 171
Endothiodon bathystoma . 94 II 158
Ennalaster Tissoti . . . 93 I 558
Enoploclytia Edwardsi . 94 II 350
Ensigillarien . . . . . 91 II 384
Ensis belgica . . . . . 93 I 182
Enstatit, chemisches Verhalten . . . . . 94 II *270*
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— Stellung in der Pyroxenreihe . . . . . 91 I *150*
Enstatit-Dacit, Krakatoa 94 I 279
Enstatit-Dolerit, Caernarvonshire . . . . . 90 II 262
Enstatitfels, Tharandt . 94 II 281

Enstatitolivinfels, Habendorf, Schlesien . . 1890 II 244
Enstatit-Peridotite, Süd-Borneo . . . . . 93 I *42*
Enstatitporphyrit, Tyrol . 90 I *80*
Entaliopsis annulata . . . 94 II 358
Entalis striatus . . . . . 94 I 172
Entalophora gracilis . . . 94 I 519
— tergemina . . . . . 94 I 202
Enteles carnicus . . . 94 II 146
— Suessi . . . . . 94 II 146
Entelodon, Milchgebiss . 94 I 179
Entglasung, pigmentärkrystallitische . . . . 90 II 248
— sphaerolithische . . . . 90 II 249
Entglasungsproducte im Obsidian . . . . . 93 II 494
Entomella . . . . . 90 II 151
Entomis . . . . . 92 I 175
— aequilobata . . . . 94 I 514
— auricularis . . . . . 94 II 467
— flabellifera . . . . . 94 II 467
— madisonensis . . . . . 92 II 458
— obliqua . . . . . 94 II 467
— plicata . . . . . 94 II 467
— polita . . . . . 94 I 514
— quadrispina . . . . 94 II 467
— rhomboidea . . . . 91 I 334
— sigma . . . . . 91 I 430
— simplex . . . . . 94 II 467
— trilobata . . . . . 94 II 467
— waldronensis . . . . 92 II 458
Entomoconchus elongatus 94 I 514
Entomope . . . . . 90 II 151
Entomostraca, England . 94 II 165
— palaeozoisch . . . . 92 II 360
— tertiär, England . . 91 I 335
Entwickelung der Thiere in Europa und Nordamerika . . . . . 93 I 377
Eoatlanta . . . . . 90 II 152
Eoatypus Woodwardii . 91 II 357
Eocän, Algier 1892 II 439. 93 I 189
— Alpen . . . . . 93 II 369
— Balkan . . . . . 92 II *76*
— Corbières . . . . . 94 I 101
— Diablerets . . . . 93 I 527
— Eruptivgesteine, Appennin . . . . . 91 I 272
— Fauna, Alabama . . 94 I 173
— Fauna von Egerkingen 91 II 143
— Granada . . . . . 91 I 125
— — und Malaga . . . 93 I 325
— Halbinsel Krim . . . 90 II 121
— Karpathen . . . . 93 II 151
— Kef Ighoud . . . . 93 I 557
Eocän, Kleinasien 1893 II 365. 94 II 86
— Maryland . . . . . 94 II 455
— Melitopol . . . . . 91 I 283
— mittleres, Capri . . . 91 II 123
— Moutier . . . . . 92 I 552
— Mte. Maggiore . . . 93 I *59*
— Nordsyrien . . . . 91 II 331
— nordwestl. Ungarn . . 93 I 181
— Sinai . . . . . 93 I *103*
— Texas . . . . . 1894 I 112, 113
— Theiss . . . . . 93 II 363
— Tremiti-Inseln . . . 93 I 529
— Trunkey-District . . 94 I 111
— Tunis . . . . . 93 II 532
— Uebersicht . . . . . 93 I 367
— Unterbrechungen desselben, Thal der Sambre 90 II 112
— Vicentiner 1892 I 436. 94 I 157
Eocänsandstein vom Bobbiobach . . . . . 93 II 56
Eocicada microcephala 1890 II *16*. 91 I *50*
Eodiadema granulata . . 91 II 321
Eogen . . . . . 90 I 447
Eolampas buccalis . . . 90 I 362
— Gauthieri . . . . . 90 I 362
— Toucasi . . . . . 90 I 362
— Trigeri . . . . . 90 I 362
Eophyton . . . . . 91 II *100*
— explanatum . . . . 90 II 164
Eophyton-Sandstein . . 92 I *171*
— Småland . . . . . 94 II 439
Eopleurotoma . . . . . 90 II 152
Eosphargis . . . . . 91 I 151
— gigas . . . . . 92 II 149
— Scapula, Londonclay . 94 I 509
Eotetrapoda . . . . . 93 I 171
Eozoon . . . . . 92 I *170*
— canadense 1890 II 343. 91 II 309
Eozoon-Gesteine, Fichtelgebirge . . . . . 91 II *91*
Epalxis . . . . . 90 II 152
Epascocrinen . . . . . 90 II 137
Ephedra sp. . . . . 93 II 434
Epiaster Bleicheri . . . 93 I 558
— Whitei . . . . . 93 II 209
Epichlorit . . . . . 92 II 232
Epidictyon tenue . . . 90 I 164
Epidiorit, Irland . . . 91 I 92
Epidosit, Entstehung . . 90 II 90
Epidot . . . . . 94 II 26
— Absorptionsbeobachtungen . . . . . 90 I 9
— Acqua calda . . . . 90 I 209
— Affaccata . . . . . 90 I 209

Epidot, Ala . . . . 1893 I *121*
— Arendal . . . . . 93 I *118*
— Australien . . . . 93 I 252
— Brosso . . . . . 93 I *120*
— Campo a' Peri . . . 90 I 209
— Capo a Pini . . . . 90 I 209
— Catenacci . . . . . 90 I 209
— chemisches Verhalten . 94 II *269*
— Elba . . . . . 90 I 207
— gesteinsbildend . . . 93 I 240
— Haddam . . . . . 93 I *119*
— im Anorthosit, Canada BB VIII *447*
— im Granit von Nord-Argentinien BB VIII *332, 382*
— in Eklogit . . . . . 93 I 273
— isomorphe Schichtung und Stärke der Doppelbrechung . . . . . 93 I *111*
— Manitou Springs . . 93 I 260
— Mortigliano . . . . 90 I 207
— Mte. Orello . . . . 90 I 209
— Patresi . . . . . 90 I 208
— Piemont . . . . . 93 II 250
— Salzburger Tauern . . 91 I 28
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *40*
— Südnorwegen . . . . 92 I *241*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *110*
— Sulzbachthal . . . . . 93 I *114*
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Texas, Baltimore Co. 90 II 228
— Traversella . . . . 93 I *119*
— Val d'Ala . . . . . 91 II 408
— Val di Susa . . . . 91 II 407
— Zöptau . . . . . 93 I *117*
Epidotgneiss, Nassau, Sachsen . . . . . 91 II 274
Epidot-Pyroxengestein . 94 I 85
Epidotschiefer, Blue Ridge 93 I 98
Epigenit (Neotesit), Sjögrubenfeld, Örebro . 90 II 222
Epihippus . . . . . 93 I 155
Episcoposaurus haplocerus 93 I 379
Epistilbit . . . . . 91 I 233
— Krystallform . . . . 92 I *14*
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 239
— Zusammensetzung . . 92 I *29*
Epistomina elegans . . . 90 II 344
Epsomit, Stassfurt-Leopoldshall . . . . . 93 I 250
Equidae . . . . . 90 II 321
Equidengebiss . . . . . 91 I 327
Equina . . . . . 90 I 431
Equisetenmergel, Vierwaldstätter See . . . . 90 II *108*
Equisetineen . . . . . 1893 I 204
Equisetum Abiquiense . . 93 II 218
— Chalubinskii . . . . 94 II 193
— Hornii . . . . . 90 I 374
— Knowltoni . . . . 93 II 218
— Monyi . . . . . 93 I 204
— ushimarense . . . . 91 I 177
Equus . . . . . 92 I 568
— caballus . . . . . 94 II *288*
— Hautes-Pyrénées . . 93 I 539
— intermedius . . . . 90 I 138
Erato pieris . . . . . 90 II 153
Erdaxe, Lagenänderung . 94 I 225
— Stellung . . . . . 93 II 569
Erdbeben . . . . . 93 I 44
— 28. Nov. 1886 . . . 90 I 253
— 7. Juni 1891 . . . 93 II 47
— 22. Januar 1892 . . 93 II 47
— 28. Oct. 1892, Einfluss auf die magnetischen Elemente . . . . . 94 II 38
— 25. Jan. 1893 . . . 93 II 483
— Algier . . . . 1892 II 52, 53
— Apparat zur Veranschaulichung der Bewegung eines Erdpartikels . . 90 I 253
— Californien 1888 1891 II 304. 93 I 57
— Charleston . . . . 92 II 54
— Einfluss des Mondes . 94 II 248
— elektrische und magnetische Störungen . . 93 II 46
— England 1893 I 56. 94 II 248
— Fortpflanzungsgeschwindigkeit . . . . . 91 I 273
— Grenoble . . . . . 94 II 247
— Gross-Britannien 1891 94 I 282
— Guatemala . . . . . 91 II 99
— im Alterthum . . . 94 I 456
— Indexkreis . . . . . 92 II 56
— Indicator . . . . . 92 II 56
— Indus . . . . . 94 II 248
— Inverness . . . . . 93 I 56
— Ischia . . . . . 92 II 46
— Japan . 1892 II 53. 94 I 282
— Karpathen . . . . . 91 II 56
— Ligurien 1890 II 79. 91 II 261
— Liparische Inseln . . 93 II 49
— Lucano 1893 . . . 94 I 281
— Madagascar . . . . 92 I 57
— München 1511 . . . 91 II 262
— Neapel 1508—1580 . 93 II 46
— — 1857 . . . . . 92 II *108*
— Nordamerika . . . . 93 I 55
— Norwegen 1890 I 75. 91 II 55. 92 II 52. 93 II 321

Erdbeben, Oberrhein . 1894 II 247
— Pantellaria . . . . 93 I 55
— Ponza-Inseln . . . . 94 I 281
— Russland . . . . . 94 I 69
— San Francisco, Intensität 91 I 273
— Schweiz . . . . . 93 I 55
— Shanghai . . . . . 91 I 262
— Siena . . . . . 92 II 47
— Strassburg . . . . 94 II 247
— unterseeische . . . 93 II 48
— Vertheilung auf Jahreszeiten . . . . . 92 II 53
— Wernoje . . . . . 92 II 58
— Württemberg und Hohenzollern 1890 I 253. 94 I 68
— Zante . . . . . 94 I 318
Erdbebengeräusche . . . 93 I 56
— Erdbebenkunde . . . 94 I 453
Erdbebentheorie, Historisches . . . . . 93 II *46*
Erddichte, mittlere . . 94 II 35
— Zunahme nach dem Innern . . . . . 94 II 36
Erde, Alter . . . . . 94 II 241
— säculare Contraction derselben . . . . . 90 II 389
Erderschütterungen . . 91 II 56
— Centraljapan . . . . 91 II 56
— Finnland . . . . . 93 II 48
— Württemberg u. Hohenzollern . . . . . 93 II 45
Erdgeschichte Neumayr's 93 I 43
Erdinnere, Zustand desselben . . . . . 91 II 419
Erdkruste, Bewegungen derselben . . . . . 90 II 236
— Faltungen . . . . . 90 I 251
— Theorien über d. Gleichgewicht . . . . . 90 I 51
Erdmagnetische Elemente, Messungen in Schlesien 90 I 53
— — säculare Periode . 93 I 68
Erdmagnetismus, Japan . 92 II 58
Erdmannit, Südnorwegen 92 I 257
Erdoberfläche, Erhebungsverhältnisse . . . . 93 I 67
— geognostischer Aufbau 90 I 45
Erdöl (Petroleum) und seine Verwandten . . . . 90 I 57
— Entstehung . . . . 92 II 74
— Ohio und Indiana . . 92 II 75
Erdrinde, Dicke . . . . 91 II 419
— physikalische Aenderungen derselben . . 90 II 388
— Wärmeverbreitung . 93 II 320
Erdsphaeroid . . . . . 90 II 390
Erdsturz, Warwickshire 1894 II 40
Erdtemperatur im Bohrloch von Sulz . . . 92 II 39
Erdwachs, Bildung . . . 93 II 85
Erdwärme . . . . . 93 I 52
Eremopteris Vasconcellosi 94 II 102
Ergussgesteine archäischen Alters, Finnland . . 93 II 96
Erhitzungsapparat für das Eiscalorimeter . . . 92 II *127*
— für das Reflexionsgoniometer . . . . . 90 I *161*
— für mikroskopische Präparate . . . . . 94 I 245
— nach Brünnée . . . 90 II *87*
— von Fuess . . . BB VII *406*
— von Fuess für mikroskopische Untersuchungen . . . . . 91 I *65*
Erica sambiensis . . . 93 II 428
— schoeneggensis . . . 93 I 431
Ericaceen . . . . 1891 I 338, 344
Erinacei . . . . . 90 II 430
Erinaceus . . . . . 93 II 183
— Montousé . . . . . 93 I 539
Erinit, Utah . . . . . 91 II 46
Eriphyla cranulicosta . . 93 I 538
Erisocrinites . . . . . 92 II 168
Erklärungssystem . . . 93 II 458
Erosion, diffuse . . . . 93 I 484
— durch Geschiebe . . 92 II 67
— glaciale, Cape Ann . 92 II 287
— Nordschweiz . . . . 93 I 371
— trockene, Nordamerika 94 I 66
— und Denudation . . 91 I 53
— von pliocänem Sandstein, Golf von Korinth 90 II 94
Erosionserscheinungen, Charkow . . . . . 92 II 62
Erosionsschlucht, Labrador 94 I 330
Erosionsthäler, Istrien . 93 I 530
Erratische Blöcke . . . 92 II 65
— Stor-Sylen . . . . 93 I 96
Erstarrung der Erde . . 93 II 281
Eruption auf Volcano . . 91 I 266
— des Aetna 1892 . . 93 I *75*
— — — 1893 . . . . 94 I 280
— — — pliocäne . . . 94 II 415
— des Bandai-San . . . 90 II 100
— des Calbuco . . . . 94 II 415
— des Cunung Awu . . 94 II 417
— des Kilauea 1891 und 1892 . . . . . 94 I 68
— des Krakatoa . . . 94 I 278
— im Jahre 1892 . . . 94 I 67
Eruptionserscheinungen,

experimentell nachgeahmt . . . . . 1893 II 500
Eruptivgesteine, Alter und Zusammensetzung . . 91 II 57
— Cabo de Gata . . . 93 I 282
— chemische Beschaffenheit 1892 I 61, 274. 93 I 486
— Cingolina, Euganeen . 93 I *123*
— Classification 1891 I 388. II 106. 92 I 61. 93 I 70
— der älteren geologischen Perioden . . . . . 92 I 271
— in Gängen, Kötzschenbroda . . . . . 93 II 91
— Jersey . . . . . 92 II 261
— Meygal . . . . . 93 I 272
— Neu-Süd-Wales . . . 92 I 316
— Peloponnes . . . . 93 I 316
— Remigiusberg . . . 93 I *134*
— Rosita Hills, Colorado 93 I 294
— Serbiens . . . . . 94 II 422
— Stolpen . . . . . 93 II 89
— Structur . 1892 I 273. II 248
— Südborneo . . . . 93 I *39*
— Südnorwegen . . . 92 I 296
— Systematik . . . . 93 II 484
Eryma anisodactylus . . 92 II 457
— Bizeti . . . . . 90 II 146
— boloniensis . . . . 94 II 351
— Caraboeufi . . . . 90 II 146
— Corbieri . . . . . 90 II 146
— crassimanus . . . . 92 II 457
— falcifera . . . . . 90 II 146
— fossata . . . . . 92 II 457
— Leblanci . . . . . 94 II 350
— maeandrina . . . . 92 II 457
— ornata . . . . . 90 II 146
— radiata . . . . . 90 II 146
Eryon . . . . . 92 II 457
— antiquus, Lias . . . 90 I 149
— Morieri . . . . . 90 II 146
Eryops Oweni . . . . 92 I 164
Erythrozinkit . . . . . 94 I *32*
Erytrochyton grandifolium 93 II 434
Eryx . . . . . 91 II 177
Erzbergbau, Serbien . . 93 II 60
Erze, Bassick Mine, Rosita Hills . . . . . 93 I 294
— Colorado . . . . . 91 II 300
— Finnland . . . . . 93 II 107
— Pitkäranta . . . . 93 II 62
Erzgänge, Cabo de Gata 92 II 424
— Cerro de Potosi . . 92 II 77
— Himmelsfürst . . . 92 II 69
— Münsterthal, badischer Schwarzwald . . . 90 II 253
Erzgänge, Scharfenberg 1892 II 68. 93 II 91
Erzgebiet, Drinaer . . . 93 II 60
— Kapavnik . . . . . 93 II 60
— Kučevo . . . . . 93 II 60
— Nagybánya . . . . 93 II 349
— Schumadija . . . . 93 II 60
— Zaplanina . . . . . 93 II 60
Erzlager, Bassin v. Desna 94 I 325
— Bosnien . . . . . 90 II 74
— Böhmen . . . . . 92 II 89
— Chile . . . . . 93 II 80
— Grube Diepenlinchen, Rheinland . . . . . 90 I 259
— Leadville . . . . . 92 II 75
— Massa Maritima . . 94 II 433
— nördliches Norwegen . 93 II 111
— Norwegen und Schweden . . . . . 93 II 68
— Rudnik, Serbien . . 90 II 74
— Silberberg bei Bodenmais . . . . . 92 II 70
— Texas . . . . . 92 I 332
— Thüringen . . . . 91 II 264
— Ungarn . . . . . 94 I 468
Eschara congesta . . . 90 I 167
— crassipes . . . . . 90 I 167
— cylindracea . . . . 94 I 171
— exarata . . . . . 90 I 167
— gibbosa . . . . . 90 I 167
— lamellosa . . . . . 94 I 174
— lapidosa . . . . . 90 II 155
— pulvinata . . . . . 90 I 167
— rimosa . . . . . 90 I 167
Estheria . . . . 1892 I 422, 581
— Geinitzii . . . . . 94 II 164
— laxitexta 1891 II 172. 92 I 352
— Lewisii . . . . . 91 II 171
— minuta . . . . . 91 II 172
— ovata . . . . . 91 II 171
— Reinachi . . . . . 94 II 164
Estheriae, Trias . . . . 91 II 171
Estonioceras . . . . . 92 I 432
Ethmophyllum . . . . 91 II 197
Etoblattina . . . . . 91 II 357
— Peachii, Coal-measures of Kilmaurs, Ayrshire 90 II 330
Ettringit . . . . . 94 I 268
Eucharis cypricardina . . 90 II 153
Eucholoeops . . . . . 92 II 338
Euchrysalis retusa, Spezzia 90 II 297
Euclastes . . . . . 91 I 151
Eucolit . . . . . 93 II 471
Eudialyt . . . . 1893 II 464, 471
— in Nephelinsyenit, Lappland . . . . . BB VIII *722*

Eudialyt, mikrochemische Untersuchung . . 1894 I 7
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Eudidymit, Südnorwegen 92 I 263
Eudnophit, Südnorwegen 92 I 263
Euechinoidea . . . . . 92 II 157
Euelephas . . . . . 92 II 335
Eugeniacrinus caryophyllatus . . . . . 91 I 438
Eukairit, Argentinien 1891 I 24. 93 I 22
Euklas, Fluss Kamenka, Ural . . . . . 90 II 22
— Pribilew . . . . . 92 I 35
— südlicher Ural . . . 90 II 24
— Ural . . . . . 94 I 42
— Vorkommen in den Alpen . . . . . 90 I 210
Eukolit, Südnorwegen . 92 I 257
— von Arö und Magnet Cove . . . . . BB VIII *729*
Eukrasit, Südnorwegen . 92 I 243
Eukryptit, Constitution . 94 I 262
Eumyrsinen . . . . . 91 I 345
Eunaticina Guirandi . . 91 II 176
Eunicites . . . . . 92 II 372
Eunotosaurus africanus . 94 II 159
Euomphalus moniliferus . 94 I 172
Euphodit . . . . . 94 I *101*
Euphorbia . . . . . 93 II *94*
Euphorbiaceen . . . . 91 I 337
Euplectellidae, Malm, Krakau . . . . . 90 II 342
Euplectus lentiferus . . 93 I 551
— Mozarti . . . . . 93 I 551
— quadriforcatus . . . 93 I 551
Eupodosaurus longobardicus 93 I 164
Euposaurus cerinensis . . 94 I 378
— Thiollièri . . . . . 94 I 378
Euproops . . . . . 92 II 359
Euralit . . . . . 92 II 232
Eurhinodelphis Sassariensis 90 I 342
Euryarthra Münsterii . . 91 II 457
Eurycarpus Oweni . . . 91 II 344
Eurychilina aequalis . . 92 II 458
— granosa . . . . . 92 II 458
— longula . . . . . 92 II 458
— obesa . . . . . 92 II 458
— subradiata . . . . 92 II 458
Eurycormus . . . . . 91 II 455
Eurypterella ornata, Devon 90 II 329
Eurypteriden, Carbon, Schottland . . . . 90 II 146
Eurypterus Douvillei . . 94 I 189
— obesus . . . . . 94 I 189
Eurysodon . . . . . 92 II 338
Eurystomites . . . . 1892 I 432
Euspatangus Cossoni . . 93 I 560
— Meslei . . . . . 93 I 560
Euspirocrinidae . . . . 92 II 168
Eusthenopteron Foordi . 90 II 438
Eustoma jurassense . . 91 II 176
Eutemnodus americanus . 93 II 185
Evonymus pseudo-dichotomus . . . . . 93 II 433
Excentrici, Belemnitengruppe . . . . . 90 I *144*
Excipulites Neesii . . . 93 I 573
Exechestoma . . . . . 90 II 152
Exelissa Guirandi . . . 91 II 176
— papillosa . . . . . 93 I 381
Exocarp . . . . . 93 II *90*
Exogyra Benaventi . . 93 II 162
— conica . . . . . 90 I 359
— Drakei . . . . . 94 I 372
— ferox . . . . . 94 I 372
— gibbera . . . . . 91 I 159
— Hilli . . . . . 94 I 372
— medinae . . . . . 93 II 162
— ostracina . . . . . 90 I 359
— plexa . . . . . 94 I 372
Expansionstheorie der Gebirgsbildung . . . . 94 II 243
Explosionen von Schiessbaumwolle, Wirkung in durchbohrten Gesteinen 91 II 421
Explosionsgase, Versuche 93 I 84
Explosionsschachte bei vulcanischen Eruptionen 91 II 422
Explosivstoffe, mechanische Wirkungen . . . 92 II 270
Extremitäten der Säugethiere, Modificationen 91 I 143
— vordere, Vögel und Reptilien . . . . . 91 I 145

F.

Facellit (Phacelit), Monte Somma. . . . . 90 II 207
Facettirte Geschiebe, Salt Range . . . . . 91 I 91
Färbung, künstliche, von Krystallen 1893 II 5. 94 II 397
Fagophyllum Gottschei 1893 II 564. 94 I 226
Fagus-Arten, tertiäre, der südlichen Hemisphäre 93 II 435
Fagus Benthami . . . 93 II 435
— celastrifolia . . . . 93 II 436
— Etheridgei . . . . 93 II 436

Fagus ferruginea . . 1894 I 224
— Hookeri . . . . . 93 II 435
— intermedia 1893 II 566. 94 I 228
— Lendenfeldi . . . . 93 II 435
— magelhaenica . . . 93 II 434
— Muelleri . . . . . 93 II 436
— Ninnisani . . . . . 93 II 435
— Risdoniana . . . . 93 II 435
— Shagiana . . . . . 93 II 436
— ulmifolia . . . . . 93 II 436
— Wilkinsoni . . . . 93 II 435
Fahlerz . . . . . 91 II 20
— Framont . . . . . 94 I 54
— Kogel, Tyrol . . . 91 I 213
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Toscana . . . . . 94 I 85
Fahlerzputzen . . . . 93 II 350
Fairfieldit . . . . . 93 II 30
Falciferum-Zone, Central-appennin . . . . . 94 I 346
Falkenhaynit, Joachimsthal 91 I *274*
Falte der Uintaberge . . 92 II 288
Falten, Ueberkippung und Gleitung, Georgia . . 93 I 320
— unterschobene . . . 94 II 243
Faltenbildung . . . . 91 I 61
Faltungen, Afghanistan . 94 II 295
— Alpen . . . . . 93 II 372
— Appalachen . . . . 94 II 243
— Draguignan . . . . 90 II 84
— experimentell nachgeahmt . . . . . 93 II 499
— französischer Jura . . 94 I 474
— französisches Centralplateau . . . 1890 II 78, 85
— Himalaya . . . . . 94 II 296
— im Pariser Becken 1891 I 307. 94 I 315
— Provence 1890 II 83, 84. 92 II 276. 94 II 290
— Pyrenäen . . . . . 92 II 276
— Savoyen . . . . . 94 II 291
— Sistéron . . . . . 90 II 85
— Süd-Transvaal . . . 94 I 469
— Westalpen . . . . 93 I 97
Farne . . . . . 94 I 223
— Autun . . . . . 93 II 214
— Bau und Fructification 93 I 426
— Carbon . . . . . 93 I 570
— im Travertin, Sézanne 92 I 467
Faroelith (Thomsonit), Lunga . . . . . 90 II 219
Faronus porrectus . . . 93 I 551
— tritomicrus . . . . 93 I 551
Fasciolaria . . . . . 91 II 181
— moravica . . . . . 91 II 182
Fasciolaria pleurotomoides 1891 II 182
— pyrulaeformis . . . 91 II 182
Fasciolaridae, oberes Miocän . . . . . 91 II 464
Faserquarz, Schottland . 94 II 256
Faujasit, optisches Verhalten . . . . . BB VII *2*
Fauna, Berner Rauracien 92 II 136
— cambrische, Sandomir 92 I *69*
— der grauen Kalke der Südalpen . . . . . 92 I 396
— der Niagara-Schichten 92 I 154
— der Raibler Schichten Friauls . . . . . 92 I 153
— des Caspischen Meeres 90 II 116
— marine, von Mauer bei Wien . . . . . 93 I *96*
— mesozoische . . . . 92 I 558
— miocäne, Molasse von Varano . . . . . 90 II 420
— pleistocäne, von Türmitz . . . . . 94 II *278*
— Samos . . . . 1892 II 134, 135
— sarmatische . . . . 92 II 115
— Südamerika . . . . 92 II 337
— tertiäre, von Florida . 92 I 179
Favia texana . . . . . 94 I 372
Favosites . . . . . 93 I 415
— arachnoideus . . . . 94 I 171
Favositidae . . . . . 93 I 416
Favularia . 1891 II 384. 94 I 403
Fayalit . . . . . 91 I *151*
— Capucin . . . . . 92 II 216
— in Obsidian . . . . 92 I 321
— in Rhyolith . . . . 94 I 79
— künstliche Bildung . 91 II 8
— Lipari . . . . . 94 I 41
— Ougrée . . . . . 94 II 409
— Yellowstone Park . . 94 I 56
Fayette-Formation, Texas 93 I 378
Fayolia . . . . . 93 I 203
Fegonium . . . . . 92 I 613
Feinboden, Gehalt des Muschelkalkes an . . 94 I 482
Feldspäthe, opt. Eigenschaften . . . . . 92 I 30
— Mischungsgesetz der . 92 I 31
Feldspath, Basalt, Marburg 91 II *159*
— des Kugeldiorits von Corsica . . . . . 90 I 214
— im Glimmerschiefer, Argentinien . . . BB VII *353*
— im Gneiss, Argentinien BB VII *299*
— — — Zwillingsbildung BB VII *322*

Feldspath in Basalt . 1891 II *247*
— — — Insel Mull . . 90 II 383
— in Sphärolithen . 1893 I 296, 298
— klastischer, in Conglomeraten . . . . . 93 I 293
— Neubildungsproduct von Grauwacken . . . . 90 II *187*
— Pantellaria . . . . . 93 II 21
— Umbildung in Chlorit . 92 II 231
— — in Dipyr . . . . 92 II 215
— — in Schalstein . . 93 I 289
— — in Skapolith. . . 91 I 231
— — in Wernerit . . . 92 I 68
— von Kohlensäure-haltigem Wasser gelöst . 93 II 353
Feldspath-Amphibolit, Bacher Gebirge . . . 94 I 462
— Grossenhain . . . . 93 I 94
Feldspathbasalt . . . . 93 II 493
— Altenberg . . . . . 93 I 93
— Ecuador . . . . . 93 I 79
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Spessart . . . . . 93 I 87
— Stolpen . . . . . 93 II 90
Feldspatheinsprenglinge im Lenneporphyr BB VIII *556, 593*
Feldspathporphyrit, Essex 90 II 423
Feldspatic trap, Devonshire 94 I 300
Felidae . . . . . 91 II 147
Felinen, tertiäre, Italien 93 I 540
Felis . . . . . 92 I 157
— arvernensis . . . . 93 I 541
— issodoriensis . . . . 93 I 540
— leo . . . . . 94 II *288*
— leptorhina . . . . 93 I 541
— minima . . . . . 93 I 540
— propampina . . . . 93 II 185
Felsarten, gebirgsbildende 94 I 457
Felsit, Essex . . . . . 90 II 423
— perlitisch, archäisches Alter . . . . . 90 II 90
Felsitporphyr, Allier-Thal 93 II 102
— Caradoc . . . . . 92 II 265
Felsokeratophyr, Sauerland BB VIII *598, 640*
Felswüste . . . . . 92 I 59
Fenestella hexapora . . 94 I 171
— intermedia . . . . 94 I 171
Fergusonit, Ceylon . . . 94 II 229
— Llano Co. . . . . 93 I 258
Ferrocyankalium . . . 92 I *202*
Ferro-Goslarit, Jasper Co. 94 I 51
Ferro-Magnesia-Glimmer . 93 I 477
Ferronatrit . 1893 I 42. 93 II 462
— Chile . . . . . 93 I 252
Ferrostibian, Örebro 1890 I *250.* 90 II 221
Festland, adriatisches . . 93 I 530
Festländer, Alter . . . 93 I 45
Fettkohlen-Horizont, Saarbrücken . . . . . 91 II 295
Feuerkugel . . . . . 90 II 230
— Schweden . . . . . 90 I 43
Feuerstein, Elasticität . 92 I 11
— fossile Hölzer einschliessend . . . . 94 I *277*
— -Geräte, Tertiär, Mons 90 I 139
— Quartär von Vitry . 90 I 333
— Vierwaldstädter See BB VIII *213*
Feuersteingerölle im Tertiär, Belgien . . . . 93 I 523
Feuersteinknollen, Malm, Krakau . . . . . 90 II 341
— oberjurassische, Mikrofauna ders., Krakau . 90 II 341
Feuersteinschotter, Südengland . . . . . 91 II 383
Feuersteinthon . . . . 93 I 132
Fibroferrit . . . . . 90 I *64*
Fibrolith, Senouire . . . 94 II 233
Fibularia affinis . . . . 92 II 366
— alpina . . . . . 92 II 366
— altavillensis . . . . 92 II 366
— Boettgeri . . . . . 92 II 366
— campbonensis . . . 92 II 366
— complanata . . . . 92 II 366
— Costa . . . . . 92 II 366
— dacica . . . . . 92 II 366
— declivis . . . . . 92 II 366
— hispidula . . . . . 92 II 366
— inflata . . . . . 92 II 366
— Lorioli . 1892 II 366. 93 I 560
— ovata . . . . . 92 II 366
— oviformis . . . . . 92 II 366
— piriformis . . . . . 92 II 366
— placenta . . . . . 92 II 366
— pliocaenica . . . . 92 II 366
— Pomeli . . . . . 92 II 366
— pusilla . . . . . 92 II 366
— scutata . . . . . 92 II 366
— sicula . . . . . 92 II 366
— stricta . . . . . 92 II 366
— Studeri . . . . . 92 II 366
— subcaudata . . . . 92 II 366
— suffolciensis . . . . 92 II 366
— umbonata . . . . . 92 II 366
— Zitteli . . . . . 92 II 366
Fichte, Einwanderung in Schweden . . . . . 93 I 213
Fichtelit . . . . . 92 II 241
— Constitution . . . . 90 II 60

Fichtelit, Handforth, Analyse . . . . . 1890 II 220
— Shielding, Analyse . . 90 II 220
Ficoxylon . . . . . 92 I 614
Ficula crassistria . . . 91 II 180
— tenuis . . . . . 91 II 180
Ficus Andraei . . . . . 90 I 373
— Berthoudi . . . . . 90 I 373
— Ettinghauseni . . . 93 II 432
— oregoniana . . . . 90 I 374
— shastensis . . . . . 90 I 374
— styriaca . . . . . 94 I 531
— subbengalensis . . . 91 II 209
Figuren in bewegtem Schlamme . . . . . 93 I 488
Filicaceae . . . . . 93 I 425
Filisparsa fragilis . . . 90 I 165
— pulchella . . . . . 90 I 165
Fillowit . . . . . 93 II 31
Fimbria subquadrata . . 90 I 115
Findlinge, vicentinische Basalttuffe . . . . . 90 II 260
Fische, Devon, Campbelltown, Canada . . . . 90 II 438
— — Spitzbergen . . . 93 I 177
— Gosford, Hawkesbury-Schicht . . . . . 94 II 161
— oberer Jenissei . . . . 91 I 333
— oberjurassische Schichten Englands . . . 91 II 455
— Old-Red-Sandstone, Grossbritannien . . . 90 II 327
— palaeozoische, Belgien 90 I 348
— — Nordamerika . . . 93 I 174
— Perm, Friedrichsroda . 94 I 373
— Queensland . . . . . 94 II 309
— tertiäre, Dacota . . 93 II 546
— — Universität Genua 90 I 468
— Tiefseeablagerungen . 93 II 305
— Unteroolith, England . 93 II 546
— Wealden und Purbeck-Beds . . . . . 93 I 174
Fisch-Otolithe . . . . . 90 I 467
— tertiäre . . . . . 92 I 576
Fischreste, Unterdevon, Neu-Braunschweig . . . 93 II 547
Fischschuppen, Morphologie 93 I 549
Fischstufe, Kaukasus . . 94 I 362
Fissurella alveolata . . 90 I 157
— conica . . . . . 93 I 381
— excentrica . . . . . 90 I 157
— gibbosa . . . . . 93 I 381
Fistulipora incrustans . . 90 I 475
Fjorde, Bildung durch Gletscher . . . . . 94 II 42
Flabellaria parisiensis . . 91 I 174
Flabellaria Schwageri 1893 II 434
Flabellum Rhodense . . 91 II 195
Flachküsten . . . . . 93 I 65
Flachland, norddeutsches, Oberflächengestaltung 93 I 105
Fladenlava . . . . . 93 II 327
Flammen im Piperno . . 93 II 51
Flammenmergel, Leinethal BB VII *276*
Fleckengrauwacken, Lausitz . . . . . 90 II *187*
Fleckschiefer 1892 II 262, 263. 93 II 361
Flinkit, wasserhaltiges Mangan-arseniat, Pajsberg, Wermland . . 90 II 224
Flora, Carbon, Commentry 93 I 203
— des Rothliegenden im Plauen'schen Grunde . 93 I 428
— Feleh bei Klausenburg 93 I 432
— Infralias . . . . . 92 I *141*
— mesozoische, Japan . 93 II 562
— pleistocäne, Canada . 93 I 434
— prähistorische, Schweden . . . . . 93 I 211
— rhätische, polnisches Mittelgebirge . . . 93 I 430
— Schönegg, Steiermark 93 I 431
— tertiäre, Neu-Sibirien . 93 II 569
— triassische, Richmond . 93 I 210
Flosse, überzählige, bei Coccoderma . . . . . 91 II 353
Flossenskelet der Coelacanthinen . . . . . 91 II 354
Flossenstacheln . . . . . 92 I 416
Flüsse, Pennsylvanien . . 90 II 241
Flüssigkeitseinschlüsse im Feldspath von Anorthitfels . . . . . BB VIII *436*
— im Gyps . . . . . 94 I 73
— im Quarz . . . . . BB VIII *295*
Flugsand . . . . . 90 I 458
— Mainthal bei Hanau . 94 I 497
— Mörfelden . . . . . 93 I 90
— Rheinthal . . . . . 92 I *224*
Flugsanddünen, Mörfelden 93 I 90
Flugsanderscheinungen in Lössgegenden . . . 90 II *197*
Fluidalphänomene in Quarzporphyr . . . . . 92 I 280
Fluidalstructur BB VIII *596, 599, 612*
— des Basaltes, Marburg 91 II *179*
— Gneiss, Argentinien BB VII *330*
— in Zirkon . . . . BB VIII *352*
Fluocerit, Krystallform . 93 II 14
— Oesterby . . . . . 93 I 232

Fluor-Gehalt bei Turmalinen . . . . . 1890 II *151*
Fluorit, Verwendung zu Mikroskoplinsen . . 91 I 235
Flussbette, Baer'sches Gesetz . . . . . 90 II 240
Flussläufe, Verlegung derselben . . . . . 93 I 46
Flussspath, Aetzversuche 92 I 217
— Cornwall . . . . . 92 I 229
— elast. Deform., opt. Verhalten . . . . . 90 I 198
— Härtecurve . . . . . 91 II 9
— Härte und Plasticität 93 II 3
— im Granit, Ortasee . 94 I 446
— im Marmor, Carrara . 94 I 434
— im Porphyr, Oberhof . 93 II 14
— Llano Co. . . . . 93 I 259
— Mies . . . . . 93 I 11
— optische Anomalie . . BB VII *3*
— Rabenstein, Tyrol . . 93 II 14
— Sarnthal . . . . . 94 I 4
— — bei Rabenstein . . 90 II 18
— St. Lawrence Co. . . 93 I 256
— Südnorwegen . . . 92 I 239
— Südwest-Afrika . . . 90 I *108*
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
— zu optischen Instrumenten . . . . . 92 I 223
Flussthäler . . . . . 92 II 67
Flustrina Ficheuri . . . 94 I 174
Flysch, Alpen . . . . 93 II 510
— Alter . . . . . 91 I 124
— Conglomerate und Breccien, Schweiz . . BB VIII *180*
— Karpathen . . . . . 93 II 141
— Ligurien . . . . . 94 I 363
— Peloponnes . . . . . 93 I 312
— Piemont . . . . . 91 I 124
Flysch-Conglomerate, Peloponnes . . . . . 93 I 312
Foetopterus, Argentinien 93 I 545
Foetorius lutreola . . . 90 I 459
— putorius . . . . . 94 II *286*
Folliculites carinatus Pot. 93 II *86*
— Kaltennordheimensis Zenker . . . . . 93 II *86*
Foraminiferen 1893 II 212, 304, 389, 423, 559, 560, 561. 94 I 211
— Agram . . . . . 94 II 476
— aus Cenoman von Kamajk und Gangberg . 94 I 524
— aus Lias vom Seeberg 92 I 463
— Badener Tegel . . . 91 II 371
— Bujtur . . . . . 92 I 189
Foraminiferen, Corniferous limestone des unteren Devons . . . . 1890 I 372
— der Priesener Schichten 94 I 524
— Gault, Folkestone 1893 I 566. 94 I 525
— Grojec . . . . . 92 I 596
— Java . . . . . 92 II 373
— Kreide, Gavarno . . 93 I 202
— — von Aachen . . . 92 II 174
— — — Greifswald und Wollin . . . . . 92 II 465
— — — Manitoba . . 92 II 175
— — — Moltzow . . . 92 II 466
— — — Revahl . . . 91 I 165
— London-Thon . . . 93 I 566
— — Insel Sheppey 1890 I 371. 92 I 462
— Mergel von Messina . 94 II 477
— Miocän, Angola . . 92 I 462
— — Hermannstadt . . 94 I 394
— — Mähr.-Trübau . . 92 II 177
— — Modena . . . . 94 II 185
— Montegibio . . . . 92 I 190
— Niobara-Schichten, Manitoba . . . . . 94 I 395
— Pantono . . . . . 92 I 597
— Pliocän, Cà di Roggio 93 I 203
— — Nizzardo . . . . 94 II 477
— Ponticello . . . . . 92 I 600
— Romhány . . . . . 93 I 527
— Saint-Sulpice . . . 92 I 191
— Tertiär, Bruderndorf . 93 I 201
— — Kis-Györ . . . . 92 II 176
— Tiefsee . . . . . 94 II 367
Foraminiferenfauna . . 90 II 135
— des norddeutschen Miocäns . . . . . 94 I 522
— Kieseliger Kalk von Nieder-Hollabrunn . . 90 II 344
— Kreide von New Jersey 90 II 447
— Melettamergel, Bruderndorf, Nieder-Österreich . . . . . 90 II 344
— Miocän von Petersburg (Virginia) . . . . . 90 II 447
— Pliocän, Savona . . 90 II 447
— Postpliocän, Santa Barbara, Californien . . 90 II 447
Foraminiferengestein, Grenadine-Gruppe . . . 94 II 478
Foraminiferenkalk, Barbados . . . . . 93 II 174
— Peloponnes . . . . 93 I 316
Foraminiferenmergel, Kettösmezö . . . . . 93 II 168

Fordhamgneiss, New York 1893 I 332
Forest Beach, Nord-Amerika . . . . . 94 I 65
Formationskunde . . . 92 II 37
Fornax ledensis . . . . 93 II 549
Forsterit . . . . . 91 I *151*
Fossa magna, Japan . BB VII *133*
Fossanien, Umgebung von Bra . . . . . 90 II 124
Fossanulus paulensis . . 94 II 356
Fouquéite, Ceylon . . . 93 II 250
Fourchit . . . . 1893 II 341, 344
Fowlerit . . . . . 93 II 475
Foyait, Brasilien 1890 I *166*. 91 II 304. 92 I 522; II *146*. 94 I 90
— Südnorwegen . . . 92 I 298
Fraasia . . . . . 91 II 127
Franckeit, Bolivia . . . 93 II 114
Frangulineen . . . . . 91 I 337
Fredericksburg Division, Texas . . . . . 94 I 151
Freieslebenit, Colorado . 91 II 51
Fresnel'sche Gesetze bei Mischkrystallen . . BB VIII *139*
Freyalith, Südnorwegen . 92 I 243
Fridelit, Analyse . . . 93 II 9
— chem. Zusammensetzung 90 II 52
— Schweden . . . . . 93 II 249
— Wermland . . . . 94 II 225
Frondicularia revoluta . 94 II 476
— Rovasendae . . . . 94 II 476
— rugosiformis . . . . 94 II 476
— scolopendraria . . . 91 II 175
— Zinolae . . . . . 90 II 447
Frondicularien, Calabrien 94 II 185
Fruchtschiefer . . . . 94 I 71
— Sachsen . . . . . 93 II 501
Frullania . . . . . 92 II 378
Fuchsit, Habersham Co. . 94 II 240
— Montgomery County, Maryland . . . . . 90 I 409
Fucoidenschichten, Schottland . . . . . 93 I 115
Fulgurit, Monte Viso . . 90 II 89
— Ribnitzer Heide . . 94 I 257
Fumarolen auf Lipari . . 92 II 260
Fungidae . . . . . 90 II 337
Furchen im Boden . 1892 II 65, 66
Fussspuren, Bedingungen und Fossilisation ders. 90 II 79
Fusulina Moelleri . . . 94 I 171
Fusulinenkalk, karnischer 94 II 144
— Palermo . . . . . 90 II 148
— Weitensteiner Gebirge 91 II 120
Fusus . . . . . 91 II 181
Fusus austriacus . . 1891 II 182
— crassistria . . . . 91 II 180
— crispoides . . . . . 91 II 182
— crispus . . . . . 91 II 182
— fuscocingulatus . . . 91 II 182
— Grundensis . . . . 91 II 182
— Haueri . . . . . 91 II 182
— hecticus . . . . . 91 II 180
— Hössii . . . . . 91 II 182
— labratulus . . . . . 91 II 180
— Lattorfensis . . . . 91 II 180
— Mittereri . . . . . 92 II 462
— multipunctatus . . . 91 II 180
— pergracilis . . . . 91 II 180
— praetenuis . . . . 91 II 180
— recticosta . . . . . 91 II 180
— semiaratus . . . . 91 II 180
— subnodosus . . . . 91 II 182
— subterebralis . . . . 91 II 180
— transylvanicus . . . 91 II 182
— unisulcatus . . . . 91 II 180
— Vindobonensis . . . 91 II 182

G.

Gabbro amphibolisirt, Caernarvonshire . . . . 90 II 263
— Chablais . . . . . 93 I 495
— Chichibu . . . . . 92 I 315
— Cornwall . . . . . 94 I 317
— Cortlandt Series . . 90 I 86
— Cypern . . . . . 93 II 59
— Darmstadt . . . . 93 I 89
— Delaware . . . . . 92 I 79
— Jablanika . . . . . 90 I 65
— Jotunfjeld . . . . . 92 I 339
— Kleinasien . . . . 93 II 365
— metamorph . . . . . 93 II 496
— Michigan . . . . . 92 I 323
— Minnesota . 1893 I 292, 504, 505
— Mte. Diablo . . . . 93 I 100
— Peloponnes . . . . 93 I 316
— Radauthal . . . . . 92 II 411
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Riviera di Levante . 93 I 277
— Rosswein, Sachsen . . 91 I 73
— Routivare . . . . . 94 I 88
— Sestri Levante . . . 93 I 277
— Sinnithal, Basilicata . 93 I 279
— Südborneo . . . . . 93 I *42*
— Tiberthal . . . . . 93 II 490
— Transvaal . . . . BB VII *124*
— Tyrol . . . . . 90 I *77*
— Wolhynien . . . . 94 I 324
Gabbroaplit, Odenwald . 94 I 290

Gabbroconglomerat . . 1893 II 355
Gabbrodiorit . . . . . 93 II 496
Gabbrophyr, Odenwald . 94 I 290
Gadolinit, Alt-Kårafvet . 93 I 244
— Analyse . . . . . 91 I 372
— Bluffton . . . . . 93 I 245
— Broddbo . . . . . 93 I 243
— Finbo . . . . . 93 I 243
— Hitterö . . . . . 93 I 241
— Itterby . . . . . 93 I 241
— Karlberg . . . . . 93 I 244
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Malö . . . . . 93 I 245
— Neu-Kårafvet . . . 93 I 244
— Schweden . . . . . 94 I 433
— St. Skedevi . . . . 93 I 245
— Svärdsjö . . . . . 93 I 245
— Texas . . . . . 93 I 260
— Torsåker . . . . . 93 I 244
Gänge, aplitische, Elbthalgebirge . . . . . 94 I 71
— miarolithische . . . 93 II 340
Gahnit. Delaware County 90 I 409
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
Gaisasystem, nördliches Norwegen . . . . . 93 II 109
Galaktit, Co. Antrim . . 91 I 400
Galeaster Bertrandi . . 91 II 367
Galenit, Mont Cénis . . 90 II 95
— neue Form . . . . . 93 II 14
Galeocerdo javanus, Java 90 I 313
Galeraster Australiae . . 92 I 185
Galesaurus . . . . . 91 II 344
Galestry, Florenz . . . 93 II 170
Galmei, Sardinien . . . 94 I 83
— Toscana . . . . . 94 I 85
Galmeilagerstätten, Ursprung . . . . . 93 I 80
Gamopetalen . . . . . 93 I 431
Ganggranite, Alaska . . 93 I 291
— Grosssachsen . . . . 91 II 280
— Kötzschenbroda . . . 93 II 90
Gangvorkommen des Granit, Nordargentinien BB VIII *288*
Ganoiden . . . . . 92 II 357
— Carbon von Commentry 92 I 419
— Devon, Canada . . . 90 II 438
— Entwickelungsgeschichte . . . . . 94 I 501
— Mainzer Becken . . 93 II 547
— Old-Red-Sandstone, Grossbritannien . . . 90 II 327
Ganomalit . . . . . 90 I 231
Ganophyllit, Harstigen . 92 II 234
Garumnien, Spanien . . 93 II 161
Gas, natürliches, Ohio . 90 I 275
Gas, natürliches, Pennsylvanien . . . . . 1890 I 279
Gasbildung in Bergwerken 91 II 96
Gase, mechanische Wirkungen bei hohen Temperaturen . . . . . 92 II 269
Gasgeysir . . . . . 93 II *19*
Gasquellen, Wels . . . 93 II 352
Gastornis . . . . . 93 II 544
Gastrioceras . . . . . 90 II 150
— compressum . . . . 93 I 180
Gastrochaena cursa . . 90 II 332
— flora . . . . . 91 II 176
— valfinensis . . . . . 91 II 176
Gastropoden 1891 II 178. 93 II 305
— Bolivien . . . . BB VIII *39*
— Cambrium, Manitoba . 93 II 554
— der rothen Schlernschichten . . . . . 92 II *25*
— Devon, England . . 94 II 172
— Gaumenfalten . . . 94 I 195
— Häring . . . . . 92 II 461
— Hercyn, Nordamerika 93 I 118
— holostome, Eocän, Paris 90 II 151
— kalkhaltiger Alluvialbildungen Norddeutschlands . . . . . 90 II 128
— Kreide, Syrien . . . 94 I 190
— Mediterranstufe, Oesterreich-Ungarn . . . . 91 II 181
— Mitteloligocän, Etampes 93 II 554
— paleocäne Schichten von Mons . . . . . 90 I 357
— Raritanschichten, New Jersey . . . . . 94 I 514
— Untersilur, Minnesota 93 I 116
Gaudrya trivalvis . . . 94 I 220
Gaudryina colligera . . 94 II 367
Gault, Algier . . . . . 93 I 522
— Bakony . . . . . 92 II 275
— Devizes . . . . . 94 II 320
— erste Kette des Jura . 94 I 473
— Gliesmarode b. Braunschweig . . . . . 33 I 360
— Lüneburg . . . . . 94 II 114
— Montagne de Lure . 90 II 284
— Südspanien . . . . 91 I 118
Gausapatus . . . . . 91 II 176
— crispicaus . . . . . 91 II 176
— derasus . . . . . 91 II 176
Gavial, Senon von Annetorp bei Malmö . . . 90 II *275*
Gavialinum Rhodani . . 94 I 378
Gazella capricornis . . 93 II 398
Gebietstheilungen des Raumes, reguläre . . . . 93 I 1

Gebirge, Entstehung und Bau . . . . . 1890 II 232
Gebirgsbildung 1891 II 419. 93 I 44, 49. 94 II 242, 446
— Einfluss der spannungslosen Erdschicht . . 91 II 261
— in Europa . . . . . 91 II 263
— neue Theorie . . . 90 I 46
Gebirgsdruck als Ursache des Eindringens von Quarz in Feldspath BB VIII *309*
Gebirgsmagnetismus . . 90 I 53
Gebirgsmagnetometer . . 90 II 237
Gebirgstypen . . . . . 90 II 236
Gedinnien, Taunus . . . 91 I 114
Gedrit, Grönland . . . 91 II 24
Gefälle der Ströme . . 91 I 54
Gehirn von Triceratops flabellatus . . . . 92 II *71*
Gehlenit, Hochofenschlacke 92 II 28
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Synthese . . . . . 92 I 90
Gehörknochen der Fische 92 I 576
Geikia elginensis . . . 94 II 546
Gekrösegyps, Klausenburg 92 I 39
Gelbbleierz, Semipalatinsk 94 II 234
Gellivaraerze, Entstehung 93 I 19
Geneseeschiefer 1891 I *162*. 92 II 98
Gennetotheria . . . . 91 II 345
Genota Stephaniae . . . 93 II 199
— Valeriae . . . . . 93 II 199
Gentianaceen . . . . . 91 I 346
Geobarometer . . . . 91 II 55
Geoden in Tuff, Campanien 91 II *313*
Geodenschicht . . . . 93 II 375
Geodiden, Yorkshire . . 91 II 370
Geodromicus stiricidii . . 93 II 549
Geograph f. topographische Aufnahmen . . . . 90 II 103
Geoïd . . . . . 92 I 53
— Normalsphäroid, regionale Abweichungen vom 1891 I 245. II 259
Geologie, Beziehung zur Landwirthschaft . . 93 I 47
— von Böhmen . . . . 92 II 89
Geonomites graminifolius 90 I 373
Geosaurinae . . . . . 90 II 143
Gephyrura concentrica . 93 II 546
Gerablattina balteata . . 91 II 357
Gerhardtit, Synthese . . 92 I 19
Germanium in Niobaten und Tantalaten . . . 94 II 229
Geröllablagerung, Rheinthal . . . . . 94 II 307
Geröllablagerung, Sundgau . . . . . 1894 I 312
Gerölle in Pechkohle . . 93 II 388
— krystalline, Unteritalien 91 II *51*
— mit Eindrücken . . . 90 I *92*
— pleistocäner Sand, Wiesbaden . . . . . 90 I *273*
— Umgebung von Issoire 90 II 309
— Vicentin . . . . . 93 II 168
Gerölllthonschiefer, Culm, Frankenwald . . . . 94 II 54
Geroneura Wilsoni . . 90 II 328
Gersdorffit, Leogang . . 93 I 14
Gervillia . . . . . 90 I 437
— borneensis . . . . 90 II 416
— Goldfussi . . . . . 90 I 360
— Murchisoni . . . . 90 II 407
— obesa . . . . . 93 I 537
— perobesa . . . . . 93 I 537
— Stoppanii . . . . . 90 I 114
— trapezoidalis . . . . 93 I 537
Geschiebe, Kreide, Nordfrankreich . . . . . 94 II 119
— Neu-Vorpommern und Rügen . . . . . 93 I 142
Geschiebeformation, Canada 93 I 434
Geschiebelehm 1892 I 146. 93 II 501
— Meissen . . . . . 91 I 85
— Tanneberg . . . . 91 I 78
— West-Drenthe . . . 94 II 334
Geschiebemergel, Norddeutschland . . . . 91 II 136
— Sandeinlagerung . . 93 II 391
Geschiebethon, Lihus . . 91 I 120
Geschwindigkeitskegel des Lichtes bei doppeltbrechenden Krystallen 94 I 246
Gesomyrmex corniger . . 94 II 469
Gesteine, Zersetzung durch Pflanzenwurzeln . . 93 I 488
Gesteinsmagnetismus . . 92 I 56
Gewässer Russlands . . 92 II 61
Geysir . . . . . 93 II 354
— Island . . . . . 93 I 45
— künstliche Nachahmung 93 II *1*
— verschiedene Typen . 93 II *12*
Gezeiten, Höhe derselben 91 I 388
Gibbaster . . . . . 91 II 367
— Munieri . . . . . 91 II 367
Gibberulina . . . . . 92 II 361
Gibbsit . . . . . 93 II 463
Gibbula . . . . . 92 II 361
Gieser, Strassgräbchen, Sachsen . . . . . 94 II 289
Gigantostylinae . . . . 93 I 198
Gigantostylis epigonus . 93 I 198

Gigantotermes . . . . 1890 II *13*
— excelsus . . . . . 91 I *50*
Gilbertina . . . . . 92 I 181
— inopinata . . . . . 94 I 387
Gingko, palaeozoischer Baumtypus . . . . 91 II 375
— rotundata . . . . . 94 I 172
Gingkodium Nathorsti . 91 I 177
Gingkophyllum minus 1891 I 168. 93 II 131
Giordanella . . . . . 93 II 128
Giraffa attica . . . . 93 I 542
— biturigum . . . . . 93 I 542
— microdon . . . . . 93 I 542
— parva . . . . . 93 I 542
— sivalensis . . . . . 93 I 542
— vetusta. . . . . 93 I 542
Girvanella . 1891 II 200. 92 I 598
— problematica 1891 I 89. 93 I 577. II *140*, *145*. 94 I *110*
Gismondin, Hohenberg . 92 I 505
Gitolampas . . . . . 93 I 560
Glacialablagerungen, erste Kette des Jura . . . 94 I 473
— Flamborough Head . 93 I 60
— Glen Fruin . . . . 92 II 317
— Manitoba . . . . . 92 II 319
— Minnesota . . . . 92 II 318
— Mississippibecken . . 93 I 372
— New Jersey . . . . 92 II 322
— Nordböhmen . . . . 93 I 368
— Norddeutschland 1892 II 316, 317
— Nordschweiz . . . . 93 I 368
— Pennsylvanien . . . 93 I 141
Glacialbildungen, Finnland 1892 I 376, 378
— Gouv. Nishny-Nowgorod 92 I 379
— Hamarstift . . . . 92 I 556
— Ins. Martha's Vineyard 92 I 99
— Ins. Mount Desert. . 92 I 102
— Magdeburg . . . . 92 I 145
— Mono Lake Basin . . 92 I 385
— Nordamerika. 1892 I 388, 392
Glacialerscheinungen, Canada . . . . . 91 II 91
— Dollerthal . . . . 90 II 127
Glacialgrus, nördliches Norwegen . . . . . 93 II 109
Glacialschliffe, Lausitz . 91 I *214*
Glacialschotter, Ostalpen 94 I 367
Glacialschrammung. . . 93 II 390
Glacialspuren bei Bozen . 91 II 139
— Dollerthal. . . . . 91 II 138
— Lappmarken . . . . 91 II 137
— Theiss . . . . . 93 II 363
Glacialtheorie . . . . 94 II 336
Glacialthon, Schweden 1891 I 132
Glandulina cuspidata . . 94 II 476
Glanzkohle, Sachsen . . 91 II 275
Glanzschiefer, Alpen . . 92 II 275
— Queyras . . . . . 93 I 97
Glas, elastische Deformation, opt. Verhalten 90 I 202
— fibroides . . . . . 90 II 248
— globulitisches . . . 90 II 248
— Härte und Sprödigkeit 93 II 3
— im Basalt, Marburg . 91 II *174*
— natürliches, Umwandlung . . . . . 93 II 12
— vulcanisches . . . . 93 II 308
— Zersetzung durch Wasser 94 I 97
Glaseinschlüsse in Tonalit BB VII *474*
Glaserit, Douglashall bei Westeregeln . . . . 90 I 29
— Tafel- und Pyramidenform . . . . . 91 I *277*
Glasfluss . . . . . 90 II 381
Glasmasse, Vesuvlava BB VII *423*
Glauberit . . . . . 93 II 36
Glaubersalz, Sibirien . . 94 I 92
Glaucolith, Baikalsee . . 90 I 15
Glauconia Frechi 1891 II 129. 93 I 538
Glaukodot . . . . . 91 I *152*
Glaukonit, Bildung und optische Eigenschaften 94 I 36
Glaukonitsand . 1893 II 300, 316
— Russland . . . . . 91 I 306
Glaukophan . . . . . 93 II 495
— in Basalt, Marburg . 91 II *252*
— Insel Groix, Bretagne 90 I 212
— Rhodus . . . . . 94 I 74
Glaukophan-Amphibolit, Vanoise . . . . . 93 I 301
Glaukophanglimmerschiefer, Lanzathal . . . . 93 II 56
Glaukophangneiss, Pontevedra . . . . . 94 I 102
Glaukophanschiefer, Samos 93 II 495
— Südborneo . . . . 93 I *39*
Gleitfaltung . . . . . 93 I 51
Gleitflächen, Gyps . . . 90 II *148*
— Steinsalz . . . . . 94 I 51
Gleitflächenbildung, Versuche . . . . . 93 I *137*
Gleitung von Falten, Provence . . . . . 90 II 82
Gleitungstheorie der Gebirgsbildung . . . . 94 II 243
Gletscher, Alpen und Kaukasus . . . . . 90 I 128
— Bewegungen 1890 II *161*. 93 I 46

Gletscher, Delphinat . 1893 I 376
— Himalaya . . . . . 92 II 281
— Kashmir . . . . . 91 II 105
— Kaukasus . . . . . 92 II 62
— künstliche . . . . . 94 II 279
— Mono Valley . . . . 92 I 385
— Pelvoux . . . . . 93 I 60
— Skandinavien . . . 93 I 59
— transportirende u. erodirende Wirkung . . 93 I 46
— Val di Tanaro . . . 94 I 102
Gletscherablagerungen, Cape Ann . . . . 92 II 287
Gletschererosion. . . . 91 I 420
— Norwegen . . . . . 90 I 128
Gletscherschrammen, Saltrange . . . . . 93 II 118
Gletscherseeausbruch, St. Gervais . . . . . 94 I 457
Gletschertöpfe, Riesengebirge . . . . . 94 II 133
Glimmer . . . . . 91 I 39
— Analysen . . . . . 91 I 8
— Bestandtheil des Kryokonit . . . BB VIII *153*, *168*
— chemische Natur 1890 II 34. 93 I 475. 94 I 439
— chromhaltig . . . . 90 I 69
— Dielektricitätsconstante 92 I 502
— Einwirkung von wässeriger u. gasförmiger H Cl. . . . . 94 I 30
— im Gneiss von Freiberg 92 I 41
— im Lenneporphyr BB VIII *558*, *566*, *594*
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— Krystallform . . . . 92 I 226
— mit grossem Axenwinkel . . . . . 94 II *226*
— Neubildungsproduct v. Grauwacken . . . . 90 II *187*
— Object des Bergbaus 90 II 22
— rothbraun, Rom . . 94 I 442
— See von Vico . . . 91 I 13
— Südnorwegen . . . 92 I 245
— Synthese . . . . . 90 II 34
— Umbildung in Chlorit 92 II 231
— Val di Susa . . . . 91 II 407
Glimmerandesit, Froschberg im Siebengebirge 93 I 270
— Rambla des Esparto . 93 I 284
Glimmercombination, rechtwinkelige, von Nörrem-berg . . . . . 92 II *198*
Glimmerdiabase v. Steinach am Brenner Joch . 90 I 63
Glimmerdiorit, Cortlandt Series . . . . . 1890 I 88
— Tirol . . . . . 90 I *76*
Glimmergabbro, Cortlandt Series . . . . . 90 I 87
Glimmerhornblendediorit, Cortlandt Series . . 90 I 88
Glimmernorit, Cortlandt Series . . . . . 90 I 87
Glimmerporphyrit . . . 93 II 494
— Grossenhain . . . . 93 I 94
— Dippoldiswalde . . . 91 I 68
— Thüringer Wald 1891 I 65. II 277
Glimmersandstein, Passineri 93 II 56
Glimmerschiefer 1892 I 66, 289. II 290, 292
— Abukumaplateau . . 93 II 514
— Alpen . . . . . 92 II 275
— Argentinien . . . BB VII *353*
— Bacher Gebirge . . . 94 I 462
— Brives, Plateau Central 90 II 397
— Centralplateau, Frankreich . . . . . 93 I 299
— chloritischer, Mt. Pilat 90 II 393
— Contact mit Glimmerdiorit . . . . . 90 I 88
— Dargothal . . . . 93 II 348
— deutsches Schutzgebiet, Südwestafrika . . . 90 I *103*
— Hohes Gesenke . . . 93 II 124
— Kleinasien 1893 II 364. 94 II 86
— lago d'Orta . . . . . 93 II 57
— Ligurien . . . . . 91 II 428
— Meissen . . . . . 91 II 306
— Mt. Blanc. . . . . 94 I 463
— Murau . . . . . 93 I 112
— New York. . . . . 93 I 332
— Niedere Tauern. . . 93 I 337
— permischer, Massa Maritima . . . . . 94 II 432
— Rosswein, Sachsen . . 91 I 72
— Samos . 1893 II 495. 94 II 431
— Schneekoppe . . . . 93 I 270
— Schweiz . . . . . 94 I 295
— Skandinavien . . . 94 I 100
— Spessart 1891 I 253. 93 I 85. 94 I 307
— Südborneo. . . . . 93 I *41*
— Tromsö . . . . . 90 II 263
— Westcordilleren. . . 94 I 465
Glimmersyenit, Durbach . 92 I 281
— Niederschlesien . . . 90 I *226*
Glimmersyenitporphyr, Elsässer Belchen . . . 93 I 489
Glimmertrachyt, Synthese 92 II 270
Glives . . . . . 90 II 430

Globiconcha altispira . 1893 I 538
— gazellensis . . . . 93 I 538
— triplicata . . . . . 93 I 538
Globigerina glutinata . 94 II 368
— hastata . . . . . 94 II 368
— Limestone, Malta . . 91 II 132
— radians . . . . . 94 II 368
— sphaeroides . . . . 94 II 368
Globigerina-Schale . . . 91 II 338
Globigerinen, Löslichkeit 91 II 404
Globigerinenerde, Tiefsee 93 II 295
Globigerinenkalk, Barbados 93 II 174
— Peloponnes . . . . 93 I 317
Globigerinenmergel, Messina . . . . . 93 I 424
— Oran . . . . . 93 II 389
Globigerinenschlamm 1894 II 118, 368
— Rumänien . . . . . 94 I *115*
— Tiefsee . . . . . 93 II 286
Globulipora Africana . . 94 I 174
Glossifungites saxicava . 94 II 378
Glossoceras . . . . . 91 II 358
Glossophoren . . . . . 90 II 150
Glossopteris-Flora . . . 90 I 176
Glycimeris Dalli . . . 92 II 155
— Geinitzii . . . . . 93 I 182
— landeniens . . . . 94 I 388
Glyphaea . 1892 II 457. 94 II 112
— tantalus . . . . . 94 II 143
Glyphioceras . . . . . 90 II 150
— Barroisi . . . . . 91 I 406
Glyphocyphus . . . . 90 II 155
Glypticus Algarbiensis . 91 II 192
Glyptodontia . . . . . 92 II 338
Glyptolepis microlepidotus 90 II 438
— Quebecensis . . . . 90 II 438
Glyptopomus . . . . . 93 I 177
Glyptops ornatus . . . 92 II 150
Gmelinit . . . . . 93 II 27
— Nova Scotia . . . . 94 I 46
Gneiss . . . . 1892 I 292. II 289
— Aar-Massiv . . . . 94 I 294
— Adula-Massiv . . . 94 I 294
— Afrika . . . . . 92 II 425
— Allier-Thal . . . . 93 II 101
— Altenberg . . . . . 93 I 92
— Antigorio . . . . . 94 II 61
— Argentinien . . . BB VII *299*
— Bacher Gebirge . . . 94 I 462
— Bergsträsser, Melibocus 94 I 289
— bituminöser . . . . 92 I *175*
— Canada . . BB VIII *421*, *472*
— Centralalpen, Salzburg 94 II 94
— Ceylon . . . . . 90 II 99
— Chialamberto . . . . 94 II 437
— Chichibu . . . . . 92 I 315
Gneiss, Darmstadt . . . 1893 I 89
— Deutsch-Südwestafrika 90 I *103*
— District de Salem, Madras . . . . . 90 II 99
— Frankreich . . . . 93 I 299
— Freiburg . . . . . 92 I 539
— glimmerarmer, centraler Balkan . . . . 90 I *271*
— Gouverneur N. Y. . . 94 I 109
— granatführend, Ceylon 90 II 99
— granulitischer, Centralplateau, Frankreich . 93 I 299
— Grossenhain . . . . 93 I 93
— Halbinsel Kola . . . 91 I 97
— Hirschburg bei Leutershausen . . . . . 90 II 62
— Hohes Gesenke . . . 93 II 124
— Insel Hochland . . . 92 I 76
— Insel Sark . . . . 93 I 285
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Lago d'Orta . . . . 93 II 57
— laurentischer . . . . 94 I 110
— — Labrador . . . BB VIII *476*
— Mähren . . . . . 92 II 272
— Malabar . . . . . 94 II 297
— Malvern-Kette . . . 90 II 91
— Meissen . . . . . 91 I 79
— Mt. Pilat . . . . . 90 II 393
— Murau . . . . . 93 I 112
— Niedere Tauern 1893 I 337. II 361
— Niesen, Schweiz . BB VIII *192*
— nordöstl. Minnesota . 90 I 275
— Odenwald 1892 II 251. 94 I 306
— Ormonds, Schweiz . BB VIII *188*
— Piemont . . . . . 92 II 421
— Pontevedra . . . . 94 I 102
— Rosaliengebirge . . . 93 I 113
— Saalekinnen . . . . 93 I 114
— Sachsen 1891 I 83. II 274. 92 I 94, 95
— — Berggiesshübel . . 91 II 270
— — Dippoldiswalde . . 91 I 67
— — Glashütte . . . 91 I 69
— — Tanneberg . . . 91 I 75
— — Tharandt . . . . 94 II 280
— Salzbrunn . . . . . 94 II 74
— Schwarzawa . . . . 94 II 91
— Schwarzwald . . . . 93 II 373
— Semmering . . . . 90 I 270
— Spessart 1891 I 252. 93 I 85
— — Eintheilung . . . 94 I 307
— Structur . . . . . 90 II 81
— Ungarn . . . . . 94 II 92
— Vierwaldstätter See BB VIII *213*
— Weissenberg . . . . 91 I *211*
— West-Cordilleren . . . 94 I 465

Gneiss, Wolhynien . . 1894 I 324
— zweiglimmeriger, Habkern, Schweiz . . BB VIII *209*
Gneissconglomerat . . . 93 II 355
Gneiss-Dunit, Contactbildungen, Corundum Hill, Nord-Carolino . . . 90 I 36
Gneissfacies des Granitit 93 II 359
Gneissformation, Entstehung . . . . . 91 II 264
Gneissglimmerschiefer, Abukuma-Plateau . . 93 II 514
Gneissgranit . . . . . 92 I 76
— Pitkäranta . . . . 93 II 61
— Structurabänderungen 90 I 255
Gnetaceae . . . . . 93 I 426
Gnetopsis cristata . . . 94 I 220
— hexagona . . . . . 93 I 207
— plumosa . . . . . 93 I 207
— trigona . . . . . 93 I 207
Goeppertia ovalifolia . . 93 II 434
— spectabilis . . . . . 93 II 434
Goethit, Canada . . . 91 I 241
— Steyermark . . . . . 90 II 17
— St. Just . . . . . 92 I 229
Gold . . . . 1893 II 80, 109, 460
— Australien . . . . 90 II 376
— Banat . . . . . 92 I 83
— Baschkirien . . . . 91 II 11
— Corea . . . . . 91 II 294
— Csebe (Hunyader Comitat) . . . . . 90 I 397
— in Alluvionen, British Columbia . . . . . 90 II 384
— in Arsenkies . . . . 90 II 206
— in Breunnerit, Pregratten . . . . . 94 I 438
— in Kalkspath . . . 93 II 13
— in Orthoklas, Ural . 91 II 10
— Löslichkeit . . . . 94 I 504
— mit Schwefelantimon und Schwefelarsen . 90 II 206
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 206
— Persien . . . . . 91 II 415
— Quebec . . . . . 90 II 383
— Südwest-Afrika . . . 90 I *104*
— Treadwell Mine, Alaska 90 I 428
— Tumbarumba . . . . 94 I 162
— Umgebung von Brád . 94 I 252
— Verespatak 1890 I 397. 91 II 72
— Witim . . . . . 92 II 279
Goldablagerung, Bildung derselben . . . . . 94 II 218
Goldbergbau in Siebenbürgen . . . . . 92 II 72
Goldbergbau, Lungau. 1893 II 80
Goldbergwerke, Böhmen . 91 II 293
— Siebenbürgen . . . 91 II 294
Goldblättchen mit Blende und Bleiglanz, Vulkój 90 I 397
Golddistrict, Michigan . 94 I 471
Goldfelder, Ost-Sibirien . 91 II 335
— Transvaal 1891 II 299 94 I 469
Goldführende Adern, Californien. . . . . 1894 II 90, 429
Goldgewinnung der Alten 93 II 349
Goldlager, Entstehung durch Thermen, Queensland. . . . . 94 I 87
— Goldtauern . . . . 93 II 79
— Mount-Morgan-Mine . 93 II 350
— Oesterr.-Schlesien . . 94 I 86
— Ural . . . . . 94 I 86
Goldproduction, Transvaal i. J. 1889 . . . . 91 I *215*
Goldquarz, Gibbsland . . 91 II 100
Gomphia firmifolia . . . 93 II 434
Gomphoceras, Saskatchewan . . . . . 93 I 380
Gomphoceratidae . . . . 90 I 354
Gomphostrobus bifidus . 93 I 573
Gondwana-System, Tasmanien . . . . . 90 I 177
Goniastraea crassisepta . 90 II 335
— favulus . . . . . 90 II 335
Goniatites clavilobus . . 90 II 149
— intumescens . . . . 92 II 98
— tetragonus . . . . 90 II 441
Goniatites-intumescens-Fauna . . . . . 91 I *161*
Gonioceras Lambii . . . 93 I 180
Goniocora . . . . . 90 II 337
Goniodus . . . . . 93 I 176
Goniograptus Selwyni . . 92 II 174
— Thureani . . . . . 92 II 173
Goniolina . . . . . 92 I 468
Goniometer . 1890 I 35. 92 II 4. 93 I 7. 94 II 215
— Beleuchtungsapparat . 94 II *92*
— Hilfsapparate . . . 93 II 457
Goniomya . . . . . 93 II 158
— Canavarii . . . . . 94 II 314
— farnetina . . . . . 94 II 314
Goniopygus Brossardi . . 93 I 560
— Peroni . . . . . 93 I 560
— royanus . . . . . 93 I 560
— Zitteli . . . . . 93 II 209
Gordait, Caracoles . . . 91 II 20
Gordonia Duffiana . . . 94 II 346
— Huxleyana . . . . 94 II 346
— Juddiana . . . . . 94 II 346

Gordonia Traquairi . 1894 II 346
Gorgonopsiden . . . . 94 II 156
Gosaubildungen, Einöd bei Baden . . . . . 94 II 122
Gosauformation, Brandenberg. . . . . 93 I 521
Gosauschichten . . . . 92 I 127
Gosaustufe . . . . . 93 II 556
Gosfordia truncata. . . 94 II 161
Gosiute-Fauna . . . . 93 II 550
Goslarit, Mies . . . . 93 I 13
Gosseletia . . . . . 93 I 404
— australis . . . . . 94 I 517
Gouatteria tenuinervis . 93 II 434
Gouldia. . . . . 93 I 538
Gozaischo-Schicht . . . 93 II 514
Graben von Korinth . . 93 I 308
Grabenversenkung, Ost-Afrika . . . . . 94 I 104
Grabowiecer-Schicht, Karpathen . . . . . 93 II 144
Grammatit im Speckstein-lager bei Göpfersgrün 92 I *68*
— in Ophicalcit . . . 91 II *90*
Grammatopteris Rigolloti 94 II 482
Grammoceras. . . . . 94 II 112
Grammysia, Beyrichi . . 91 II 184
— Stadtfeld . . . . . 90 I *184*
Granat . . . . 1893 II 460, 479, 480
— Analysen . . . . . 94 I 436
— Berg Blagodat . . . . 90 II 20
— Bestandtheil des Kryokonit . . . . . BB VII *170*
— Canada . . . . . 91 I 241
— Colorado . . . . . 90 I 224
— Cortlandt Series . . . 90 I 88
— Glimmerschiefer, Argentinien . . . . BB VII *354*
— in Anorthitfels, Canada BB VIII *447*
— in Dacit, Siebenbürgen 94 I 293
— in Elaeolithsyenit . . 92 I *222*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *306*
— in Granit von Nordargentinien . . . BB *335*, *383*
— in Pegmatit, Argentinien BB VII *400*
— — Comersee . . . . 91 II 31
— in Sanukit, Japan . BB VII *145*
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— Kaukasien . . . . 91 I *272*
— metamorph . . . . 91 I 375
— Monzoni, Tyrol. . . 91 I 216
— Nordamerika. . . . 92 I 499
— Oberer See, Pseudomorphosen . . . . 90 I 223
— oktaëdrischer, Elba . 93 II 74
Granat, optische Anomalien BB VII *3*. 1892 I *217*
— Pyrenäen 1893 I 239. 94 I 264
— Rothenkopf, Tyrol. . 91 I 213
— See von Vico . . . 91 I 12
— südafrikanische Diamantfelder . . . 90 I 393
— Süd-Borneo . . . . 93 I *40*
— Südnorwegen . . . 92 I 243
— Südwest-Afrika . . . 90 I *112*
— Synthese . . . . . 92 I 92
— Taberg. . . . . 93 I 21
— titanhaltig . . . . 93 II 461
— Umbildung in Chlorit 92 II 231
— Umwandlung in Pyroxen und Hornblende . 94 I 461
— Ural . . . . . 91 II 11
— Verwitterung . . BB VII *345*
Granat-Amphibolit, Bacher Gebirge . . . . . 94 I 462
Granatfels. . . . . 94 I 461
— durch Contact entstanden . . . . . 91 II 273
Granatgneiss (Kinzigit), Gadernheim, Odenwald 90 II 63
Granatgranulit, Tyrol. . 93 I 490
Granatgruppe . . . . 92 I 25
Granatporphyrit, Ulten . 90 I *78*
Granat-Zoisit-Hornfels, Schweiz . . . . . 94 I 295
Grand-Gulf-Thone, Alabama . . . . . 94 II 455
Grandipatula. . . . . 90 II 152
Granit . . . . . 92 I 66
— Abukuma-Plateau . . 93 II 514
— Afrika . . . . . 92 II 425
— als Muttergestein von Gold, Lappland. . . 94 I 470
— Altenberg . . . . . 93 I 92
— archaeischer, Nord-Argentinien . . . BB VIII *277*, *286*
— argentinische Cordillere 93 I 104
— Bacher Gebirge 1894 I 462. II 80
— Baveno . . . . . 93 II 37
— Berra, Schweiz . . BB VIII *197*
— Black Hills . . . . 93 I 332
— Bornholm . . . . . 90 II 92
— Brixen, Tirol . . . 90 I *72*
— Canada . . . . . 91 II 91
— Cape Ann. . . . . 92 II 286
— centraler Balkan . . 90 I *263*
— Cerro de Cacheuta . 93 I 103
— Cima d'Asta, Tirol . 90 I *73*
— Colombia . . . . . 91 II 97
— Darmstadt . . . . 93 I 90

Granit, deutsches Schutzgebiet, Südwest-Afrika 1890 I *103*
— Ecuador . . . . . 93 I 78
— Elba . . . . 1893 I 278. II 489
— — Alter . . . . . 94 I *99*
— Elsässer Belchen . . 93 I 488
— Entstehungsweise . . 94 I 288
— erratisch, Unteritalien 91 II *49*
— Essex . . . . . 90 II 423
— Fichtelgebirge . . . 90 I 261
— Fleyher, Sachsen . . . 91 II 275
— gequetschter, in Sachsen . . . . . 92 II 250
— Gotthard . . . . . 91 I 398
— Gouverneur N. Y. . . 94 I 109
— Gurnigel, Schweiz . BB VIII *200*
— Habkern, Schweiz BB VIII *200, 207*
— Hirschburg bei Leutershausen . . . . . 90 II 61
— Hohe Tatra . . . . . 94 I 72
— holl. Guyana. . . . . 90 II 277
— Huelgoat . . . . . 94 I *90*
— in Nephelinbasalt, Oberlausitz . . . . 94 I 70
— Insel Hochland . . . 92 I 76
— Lago d'Orto . . . . 93 II 488
— Lappland . . . . . 94 I 470
— Lausitz 1892 I 533. 1892 II 81, 82, 83, 84. 93 II 89. 94 I 70
— Lauterbach-Bergen im Vogtlande. . . . . 92 II 70
— Luz. . . . . 94 I 101
— Madagascar . . . . . 90 II 96
— Malvern Hills, Entstehung d. Schieferung 94 I 299
— Markersbach, Sachsen 91 II 271
— Meall Breac . . . . . 93 I 286
— Meissen . . . . . 91 I 80
— Melibocus 1892 II 418. 94 I 289
— Ménerville . . . . . 90 II 403
— Michigan . . . . . 92 I 324
— Minnesota. . . . . 93 II 516
— Montagne Noire . . 91 II 285
— Montana . . . . . 91 I 100
— Mt. Blanc . . . . . 94 I 463
— Mt. Pilat . . . . . 90 II 394
— Mühlberg, Odenwald . 94 II 418
— Nedroma . . . . . 90 II 405
— Niesen, Schweiz. . BB VIII *192*
— Nord-Argentinien . BB VIII *287*
— nordöstl. Minnesota . 90 I 275
— östlicher Balkan . . 90 I *279*
— Omeo . . . . . 91 II 101
— palaeozoischer, Nord-Argentinien . . . BB VIII *291*
Granit, Predazzo, Tirol 1890 I *72*
— Provinz Kai . . . . . 90 I 135
— Puy de Montaudau . 94 II 424
— Rhode Island . . . . 94 II 263
— Saalekinnen . . . . 93 I 114
— Sachsen, Glashütte . 91 I 69
— — Kötzschenbroda . 93 II 90
— — Marienstern. . . . 94 II 287
— — Meissen . . . . 91 I 83
— — Oschatz-Wellerswalde . . . . . 91 II 266
— Sardinien . . . . . 93 I 304
— Schwarzwald. . . . 93 II 373
— Shap Fell. . . . . 92 II 263
— Sierra Nevada . . . . 93 I 100
— Spaltbarkeit, Cape Ann 94 I 76
— Structur, Lausitz . . 90 II *189*
— Tan-y-Grisian . . . 92 II 262
— Tirol . . . . . 90 I *72*
— Trondhjem . . . . 93 I 96
— Umgebung von Ričan 90 I 264
— Valsesia . . . . . 92 I 71
— Vogesen . . . . . 91 II 138
— von Bornholm, Geschiebe. . . . . 93 I 143
— von Dalarne, Geschiebe 93 I 143
— Wrangel Island . . 93 I 291
Granitapophysen, Dartmoor 94 II 260
— Ross of Mull . . . . 94 I 301
Granit-Einschlüsse Craftsbury, Vermont . 90 I 278
— im Basalt, Rollberg bei Niemes in Böhmen . 90 I 65
Granitgänge im Kinzigthal 92 II 85
Granitgneiss, centraler Balkan. . . . . 90 I *270*
— Madagascar . . . . . 90 II 96
— Plateau Central . . . 90 II 396
— Schottland . . . . 94 II 256
— Spessart . . . . . 91 I 251
Granitisirung. . . . . 90 II 394
Granitit, Amariner-Thal . 93 II 355
— centraler Balkan . . 90 I *264*
— Corsica. . . . . 91 II 289
— Durbach . . . . . 92 I 281
— Madagascar . . . . . 90 II 96
— Markersbacher . . . 94 I 71
— Maros . . . . . 93 II 362
— Montagne Noire . . 91 II 285
— Nord-Argentinien . BB VIII *287*
— Sachsen, Meissen . . 91 I 83
— — Stolpen . . . . . 93 II 89
— — Strassgräbchen. . 94 II 288
— Südnorwegen . . . 92 I 300
— Tetschen . . . . . 93 II 355
— Tirol . . . . . 90 I *72*

Granitit, Umwandlungserscheinungen, Umgebung von Ričan . 1890 I 267
— Wolhynien . . . . 94 I 324
— Yabanda, Congo . . 94 I 302
Granitporphyr, Altenberg 93 I 92
— Berra, Schweiz . . BB VIII *197*
— Caernarvonshire . . 90 II 262
— Elsässer Belchen . . 93 I 89
— Finnland . . . . . 92 I 309
— Michigan . . . . . 92 I 324
— Oberramstadt . . . 90 II 62
— Odenwald . . . . . 92 II 252
— Sachsen, Dippoldiswalde . . . . . 91 I 68
— — Glashütte . . . 91 I 70
— — Nassau . . . . 91 II 276
— Transvaal . . . BB VII *120*
— Umgebung von Ričan 90 I 265
— Unteritalien . . . . 91 II *54*
Granitschiefer, Blue Ridge 93 I 98
Granitstöcke des Morbihan, endomorphe Modificationen . . . . . 90 II 81
Granit-Syenit-Massiv, Grossenhain . . . . 93 I 94
— Meissener, Kötzschenbroda . . . . . 93 II 90
Granophyr, Caernarvonshire . . . . . 90 II 262
— grüner, Niesen, Schweiz BB VIII *192*
— Island . . . . . 93 I 499
— Meissen . . . . . 91 I 80
— Nord-Argentinien . BB VIII *314*
— Sachsen, Dippoldiswalde . . . . . 91 I 68
— — Meissen . . . . 91 I 83
— Unteritalien . . . . 91 II *54*
Granulit, Afrika . . . 92 II 425
— Allierthal . . . . . 93 II 102
— Bacher Gebirge. . . 94 I 462
— Brives Plateau Central 90 II 397
— Essex . . . . . 90 II 423
— Iglawafluss in Mähren 94 II 421
— Morbihan, Modificationen durch Contact . 90 II 86
— New York . . . . . 93 I 331
— Sachsen, Rosswein. . 91 I 72
Granulitgänge in Protogin, Mont Blanc . . 93 I 496
— Mont Pilat . . . . 90 II 394
Granulitgneisse, Pescarabach . . . . . 93 I 490
Granulitisirung . . . . 90 II 394
Granulolabium . . . . 90 II 152
Graphiocrinites . . . . 92 II 168
Graphit . . . . 1893 II 241, 245
— Bagoutalberge in Sibirien . . . . . 90 II 375
— Bildung bei Contactmetamorphose . . . 91 II *28*
— im Archaicum, Erklärung . . . . . 91 I 350
— im Gneiss, Canada BB VIII *422*
— im granitartigen Gestein, Volhynien . . 90 II 392
— im Grundgebirge . . 92 I *175*
— in zersetztem Gneiss, Ceylon . . . . . 90 II 277
— Kötsch, Steyermark . 90 II 17
— künstliche Darstellung 93 II 242
— Nikolajewka . . . . 94 II 415
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Zomzaub, Südwest-Afrika . . . . . 90 I *104*
Graphitit . . . . . 93 II 241
Graphititoxyd . . . . 93 II 243
Graphitoid. . . . . 93 II 241
— Sachsen, Nassau . . 91 II 274
Graphitquarz . . . . . 94 I 71
Graphitschiefer . . . . 92 II 87
— Chichibu . . . . . 92 I 314
— Gadernheim, Odenwald 90 II 63
Graphiurus . . . . . 91 II 353
Graphularia belgica . . 93 II 559
Graptolithen 1892 I 186. 94 I 118, 124
— Belgien . . . . . 92 I 594
— des Siljangebietes . . 92 II 174
— Frankreich . . . . 94 I 205
— Gausdal . . . . . 92 I 343
— Gotland . . . . . 92 I 457
— Huy. . . . . 92 I 113
— in Schiefern von Trondhjem . . . . 91 II 437
— Unter-Silur, Maine . 91 I 439
Graptolithengestein . . 92 I 452
Graptolithenschiefer, Arkansas . . . . . 93 I 334
— Böhmen . . . . . 93 II 518
— Dalarne . . . . . 94 I 476
— Fichtelgebirge . . . 91 II 119
— Haute-Garonne . . . 93 II 523
— Schonen . . . . . 93 I 200
Graptolithenzone, Seengebiet, Nordamerika . 94 II 100
Grauwacke, Amariner-Thal . . . . . 93 II 355
— Böhmen . . . . . 93 II 518
— conglomeratartige, Lennegebiet . . . BB VIII *678*
— Dollernthal . . . . 93 I 488
— Lausitz 1890 II *187*. 92 II 82

Grauwacke, Leipzig . 1893 II 95
— Lennegebiet . . . BB VIII *625*
— Magdeburg . . . . 94 II 101
— Nord-Sachsen . . . 91 I *211*
— Nordvogesen . . . . 93 II 328
— Přibram . . . . . 90 II 70
— Rio Sicasica . . . BB VIII *99*
— Sachsen, Marienstern . 94 II 286
— — Oschatz-Wellerswalde . . . . . 91 II 266
— — Strassgräbchen . . 94 II 288
— Seifen . . . . . 93 I *1*
— Siegen . . . . . 92 II 364
Grauwackensandstein, Leckwitz, Sachsen . . 91 II 268
Grauwackenschiefer, Amariner-Thal . . . . 93 II 355
— Tetschen . . . . . 93 II 357
Grauwackenzone, nordsächsische, Königswartha . . . . . 93 II 94
Gravigrada . . . . . 92 II 337
Greenockit, Mies, Böhmen 94 II 32
Greensand, Devizes . . 94 II 321
— Malta . . . . . 91 II 132
Greisen, Mount Wills-Kette 91 II 100
Grengesit . . . . . 92 II 232
Grenville-Stufe, Canada BB VIII *422*
Grenzgesteine, porphyrische . . . . . 93 II 340
Grenzlinie zwischen Seichtwasser und Tiefsee . 93 II 288
Grès Armoricain, Fauna . 94 I 174
Grewiopsis . . . . . 93 II 221
Greys conciliator . . . 93 I 551
Grezzoni, Apuaner Alpen 91 II 307
Griffelschiefer, Fichtelgebirge . . . . . 91 II 119
— Lennegebiet . . . BB VIII *626*
Griffithsia pliocenica . . 91 I 445
Grochauit, Tampadel . . 94 II 412
Grösse, maximale, der Krystalle . . . . . 94 I 250
Grorudite, Südnorwegen . 92 I 300
Grossoolith, Basel . . . 93 I 380
Grossular, Le Selle, Tirol 91 I 216
Grüne Schiefer von Bornholm, Geschiebe . . 93 I 143
Grünerit, Michigan . . 94 I 58
Grünstein, Ashpringston . 91 I 93
— Cap Lizard . . . . 91 I 92
Grumileophyllum attenuatum . . . . . 91 II 209
Grundgebirge, Darmstadt 93 I 89
— Insel Bornholm . . 90 II 92
— Organismen im . . . 92 I *169*
Grundgebirge, praetertiäres, Piemont . 1890 II 311
— Spessart . . . . . 93 I 85
Grundmoräne bei Magdeburg . . . . . 91 II 446
— des Inlandeises, Nord-Ostsee-Canal . . 1891 II *73, 84*
— Halbinsel Kola . . . 91 I 97
— Kritik der Theorie der 94 I 364
Grundwasser . . . . . 93 I 45
— Ammoniak und Chloride enthaltend . . . . 93 II 352
— Ost-Holstein . . . . 94 II 131
Grundwasserstau . . . 93 II 322
Grundwasserstrom, Ergiebigkeit . . . . . 93 II 322
Grus melitensis . . . . 93 I 391
Gryphaea Pitcheri . . . 93 II 156
Gryphaea-Schichten, Steierdorf-Anina . . 93 I 123
Gryphit, S. Dacota . . . 94 I 48
Guanajuatit . . . . . 93 II 465
Guanidin, kohlensaures BB VII *26*
Guarinit . . . . . 90 I 218
Gürtelthiere im Tertiär von Argentinien . . 92 I 566
Guettaria Angladei . . 91 I 434
— Rocardi . . . . . 91 I 434
Guilfordia acanthochila . 94 II 470
Guilielmites permianus . 91 I 166
Gummi, Doppelbrechung . 91 II 7
Gummit, Llano Co. . . 93 I 259
Gummizusatz zu krystallisirenden Lösungen . . 90 II *145*
Gymnites acutus . . . 94 II 171
— falcatus . . . . . 94 II 171
Gymnodiadema Choffati . 91 II 192
Gymnospermen . . . . 94 I 223
— Ursprung . . . . . 91 II 376
Gynerium, Nord-Patagonien . . . . . 93 I *27*
Gyps . . 1893 II 34, 267, 377, 504
— Afghanistan . . . . 94 II 295
— Ain-Nouissy . . . . 90 II 405
— Bildung durch Contactmetamorphose . . . 94 I 72
— Blaubeuren . . . . 90 I 396
— Bolivia . . . . . 94 I 59
— Ersatz durch kieselige Gesteine . . . . . 90 II 306
— fulvus . . . . . 91 I 331
— Gams bei Hiflau, Steyermark . . . . 90 II 17
— Girgenti . . . . . 94 I 57
— Gouv. Poltawa . . . 94 I 51
— Grajische Alpen . . 94 II 292

Gyps, Idria . . . . 1893 I 464
— im Neogen Italiens . 92 II 74
— im Silur von New York 92 I 345
— Leogang . . . . . 93 I 19
— melitensis . . . . . 93 I 391
— Mies . . . . . 93 I 13
— Mont Cenis . . . . 90 II 95
— Ober-Elsass . . . . 91 I 370
— Ost-Galizien . . . . 93 I 527
— Pliocän, Basilicata BB VII *580*
— regelmässige Verwachsung mit Kalkspath . 94 I 60
— Röth im Leinethal BB VII *257*, *284*
— Rolle desselben bei Entstehung von Erosionsformen . . . . . 90 II 95
— Salzgebirge, Kalusz . 94 I 472
— Salzsümpfe von Batz . 90 I 34
— San Bernardo-Brücke, Cherasca-Thal . . . 90 I 426
— Sicilien . . . . . 94 I 73
— — Flüssigkeitseinschlüsse . . . . . 94 II 30
— Südwest-Afrika . . . 90 I *109*
— Texas . . . . . 92 II 33
— Thal des Sabato, Unteritalien . . . . . 91 II *42*
— Untereocän des Pariser Beckens . . . . . 90 II 306
— Utah . . . . . 94 I 268
— Vanoise . . . . . 93 I 301
— Verhalten gegen Salzsäure . . . . . 93 I 231
— Württemberg . . . 91 II 230
— Zimmersheim . . . 90 I 451
Gypsblättchen zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung . 91 II *22*
Gypsformation, Rumänien 94 I *129*
Gypskeuper, Göttingen . 93 II 134
— Leinethal . . . . BB VII *266*
Gypsstöcke, Vierwaldstätter See . . . . 90 II *102*
Gyracanthus incurvus . . 90 II 439
— rectus . . . . . 92 II 456
Gyratolina carbonaria . . 94 I 172
Gyroceras 1890 II 147. 93 I 180
Gyrolepidotus Schmidti . 91 I 333
Gyrolith . . . . . 91 I 232
— Fladda . . . . . 90 II 219
— Lunga . . . . . 90 II 219
— New Almaden . . . 93 I 247
— Schottland . . . . 94 I 46
— über Faroelith, Cairn a Burgh More . . . 90 II 219
Gyropleura laevis . . . 93 I 182
Gyroscala Stueri . . 1894 I 195
Gyrosteus . . . . . 92 I *419*

H.

Haareinschlüsse, thierische, im baltischen Bernstein 91 II 340
Habkern-Granite, Schweiz BB VIII *181*, *200*, *205*
Hadrosaurus breviceps 1890 II 434. 91 II 452
— Foulkii . . . . . 90 II 434
— paucidens . . . . . 90 II 434
Hälleflinta, Kierunavaara 93 II 270
— Sachsen, Berggiesshübel . . . . . 91 II 270
— Skandinavien . . . 93 II 66
— Småland . . . . . 93 II 335
Hälleflintgneiss, centraler Balkan . . . . . 90 I *271*
Haemadictyon tenuifolium 93 II 434
Hämapophysen, entwickelungsgeschichtliche Stellung . . . . . 94 I 501
Hämatit, in Pegmatit, Argentinien . . . BB VII *400*
— künstlicher . . . . 92 I 225
— pseudomorph nach Pyrit . . . . . 91 I 231
— Pseudomorphose nach Dolomit . . . . . 91 II 408
— Stromboli . . . . . 91 I 15
— Sublimationsproduct . 93 II 263
— Val di Susa . . . . 91 II 407
— Zwillingsgesetze . . 91 I 15
Hämatostibiit, Gouvernement Oerebro . . . 94 I 270
Härte der Gesteine . . 93 I 81
Härtebestimmung der Metalle . . . . . 94 II 278
Härtecurven, inverse, regulärer Krystalle . . 91 II 9
Härtemessung . . . . 93 II 2
Hagnometopias pater . . 93 I 551
Haidingerit, optische Eigenschaften . . . 90 I 216
Halbschattenpolarisator BB VII *72*
Halichondrites . . . . 92 I 459
— graphitiferus 1891 II 300. 93 II *60*
Halicoridae . . . . . 91 I 331
Haliseritenschiefer . . . 90 II *215*
Haliserites Dechenianus 1891 II *103*. 93 II 213
Halitheriidae . . . . . 91 I 331

Halitherium veronense 1894 I 181
Hallia . . . . . 90 II 158
Halliella retifera . . . 92 II 459
— sculptitis . . . . . 92 II 458
Hallit, Chester Co. . . . 94 I 33
Hallopoda . . . . . 91 II 155
Hallstätter Kalke 1892 I 125. 93 I 191. 94 II 310
Halobia Neumayri . . . 93 II 137
— occidentalis . . . . 91 II 170
— rugosa . . . . . 90 I 176
Halobienkalk, Rotti . . 94 I 332
Halodon . . . . . 90 II 142
Halometra gigantea . . 91 I *49*
Halonia distans . . . . 93 I 206
— Dittmarschi . . . . 92 I 195
Halopyra alpina . . . . 94 II 142
— carinata . . . . . 94 II 142
Haloraghidaceen . . . . 91 I 340
Halotrichit, Colorado . . 94 I 52
— Tierra amarilla bei Copiapó in Chile . . 90 II 218
Hamamelidaceen . . . 91 I 339
Hambergit, Südnorwegen 92 I 239
Hamilton group, Bolivien BB VIII *108*
Hamites phaleratus . . 91 I 158
— tropicalis, Albien, West-Afrika . . . . 90 II 416
— virgatus, Albien, West-Afrika . . . . 90 II 416
Hamlinit, Stoneham . . 93 II 28
Hammatoceras anacanthum . . . . . 93 II 382
Hanksit . . . . . 93 I 260
— Borax-See . . . . . 91 II 247
Hapalops . . . . . 92 II 338
Haplistia . . . . . 92 II 358
Haploceras Beudanti . . 90 II 415
— montanus . . . . . 91 II *137*
— Parandieri . . . . 90 II 415
Haploconus corniculatus . 90 I 335
Haplomeryx . . . . . 93 I 148
Haplophragmium Fornasini . . . . . 94 II 477
Haploporella fasciculata . 91 I *285*
Hardgrave-Sandstein, Californien . . . . 94 II 111
Harmotom, Krystallform . 92 I *17*
— Ontario . . . . . 94 I 47
— Südnorwegen. . . . 92 I 265
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 239
Harpoceras 1893 II 382. 94 II 354
— capillatum . . . . 94 I 193
— Kobelli, Jura . . . 90 I *150*
Harpoceras Mathayense 1892 I 425
— variabile . . . . . 93 I 536
— Zancleanum . . . . 92 I 426
Hartlaubius Madagascariensis . . . . . 92 II 148
Hartsubstanzgewebe, Geschichte . . . . . 93 I 549
Harze, Neu-Sibirien . . 93 II 565
— Nordamerika. . . . 91 I *208*
Hathliacynus cultridens . 93 I 389
— Fischeri . . . . . 93 I 389
— Kobyi . . . . . 93 I 389
— Lynchi . . . . . 93 I 389
— Rolleri . . . . . 93 I 389
Hauchecornit . . . . . 93 I 466
Hauerit, Sicilien. . . . 91 II 235
Hauptbrechungsexponenten, Bestimmung nach der Methode von Soret 90 II *189*
Hauptbruchzone des Peloponnes . . . . . 93 I 317
Hauptconglomerat, Pfälzer 94 II 99
Hauptdolomit 1892 I 126. 93 II 525
— Basilicata. . . . . 94 II 447
— Massa Maritima . . 94 II 433
— Salerno . . . 1894 II 107, 312
Hauptquarzit, Unterharz 91 I 286
Hausmannit, Bildung aus Schmelzmasse . . . 94 I 95
— in Trachyt . . . . 92 II 255
— Zusammensetzung . . 94 II 405
Hausmanniterze, Schweden 90 I 232
Hautefeuillit, Bamle, Norwegen . . . . . 94 II 29
Hauterivien, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 473
— Savoyen . . . . . 94 I 348
Hauyn . . . . . 1892 I 27, 32
— chemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Constitution . . . . 94 I 262
— Cronkley . . . . . 93 I 289
— in Bimsteinsanden, Marburg . . . . . 93 I 270
— Laven des Mt. Vulture BB VII *582*, *593*
— Synthese 1892 II *139*, 93 II *42*
H Cl-Gas, Anwendung zur Bestimmung von Mg . 94 I 440
Hebertella . . . . . 93 II 205
Hebungen . . . . . 92 II 41, 42
— Finnmarken . . . . 93 II 110
— Himalaya . . . . . 92 II 280
— Insel Palmarola . . 92 II *83*
— Nord-Amerika . . . 92 II 320
— postglaciale . . . . 92 I 151

Hebungen, Skandinavien 1894 I 166
— Ural . . . . . 92 II 280
— Vereinigte Staaten 1894 I 63, 162
Hebungen und Senkungen, Paros . . . . . 94 I 457
Hecticoceras . . . . . 94 II 471
Hedekalk . . . . . 92 I 337
Hedenbergit . . . . . 92 II 24
Hedera aquamara . . . 93 II 221
Hedyphan, Harstigen 1894 I 272. 94 II 235
Heimia . . . . . 91 II 366
Heinzit . . 1892 II 18. 94 I 19
Heizwerth der Kohle . . 93 II 82
Helaletes . . . . . 93 I 153
Helcion tectula . . . . 90 I 157
— valfinensis . . . . 91 II 176
Heliastraea . . . . . 90 II 336
— Livoniana . . . . . 91 II 332
Helicoceras hystericulum. 90 I 359
— indicum . . . . . 93 I 555
Helictoxylon luzonense . 94 I 533
Heliolites concentricus . 94 I 171
Heliophyllit, Paisberg. . 90 I 23
Heliophyllum yassense . 94 II 364
Heliothrips . . . . . 91 II 356
Helix . . . . . 93 I 539
— Barbeyana . . . . 94 II 432
— Brochoni . . . . . 94 II 356
— Cairensis . . . . . 91 I 128
— Heckeli . . . . . 93 I 554
— hirsutiformis . . . . 93 I 554
— involuta . . . . . 93 I 554
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— labiata . . . . . 93 I 554
— manca . . . . . 93 I 554
— minima . . . . . 93 I 554
— obesula . . . . . 93 I 554
— obtusecarinata . . . 93 I 554
— ornata . . . . . 93 I 554
— osculum . . . . . 93 I 554
— palaeocastrensis. . . 94 II 432
— papillifera . . . . 93 I 554
— perfecta . . . . . 93 I 554
— rarissima . . . . . 93 I 554
— Sprattiana . . . . 94 II 432
— tenuis . . . . . 93 I 554
— Wärzensis . . . . 93 I 554
Helladotherium . . . . 93 I 543
Helodermatoidea . . . 92 I 576
Helohyus . . . . . 93 II 396
Helvêtien . . . . . 94 I 491
Helvin . . . . . 93 II *72*
— Ilmengebirge. . . . 90 II 19
— Südnorwegen . . . 92 I 244
Helvingruppe . . . . 1892 I 26
Hemerobius priscus . . 91 I *52*
Hemiaster . . . . . 94 I 204
— africanus . . . . . 93 I 559
— apicalis . . . . . 90 I 363
— Archiaci . . . . . 90 I 363
— Auberti . . . . . 93 I 559
— batnensis . . . . . 93 I 558
— Bigoneti . . . . . 90 I 171
— Bowerbanki . . . . 90 I 363
— Branderianus . . . 90 I 363
— californicus . . . . 93 II 209
— carinatus . . . . . 90 I 363
— cavernosus . . . . 90 I 363
— Chauveneti . . . . 93 I 558
— consobrinus . . . . 93 I 559
— Dalli . . . . . 93 II 209
— decipiens . . . . . 90 I 363
— digonus . . . . . 90 I 363
— elongatus . . . . . 90 I 363
— enormis . . . . . 93 I 559
— galantigensis . . . 93 II 208
— gibbosus . . . . . 90 I 363
— Heberti . . . 1893 I 558, 559
— incrassatus . . . . 93 II 208
— latigrunda 1892 I 185. 93 I 559
— Meslei . . . . . 93 I 558
— nobilis . . . . . 90 I 363
— oblique-truncatus . . 93 I 559
— Prestwichi . . . . 90 I 363
— princeps . . . . . 90 I 363
— pseudo-Fourneli . . . 93 I 558
— Rollandi . . . . . 93 I 559
— vadosus . . . . . 94 II 178
— zonatus . . . . . 90 I 363
Hemicardium meludicum . 90 I 157
Hemicidaridae . . . . 92 II 160
Hemicidaris . . . . . 93 I 412
— Alemquerensis . . . 91 II 191
— Apollo . . . . . 91 II 191
— Arrabidensis . . . . 91 II 191
— Cesaredensis . . . . 91 II 191
— lusitanicus . . . . 91 II 191
— Mondegoensis . . . 91 II 191
Hemiconus . . . . . 90 II 152
Hemictenodus . . . . 92 I 579
Hemidiorit, Cortlandt Series 90 I 88
Hemiëdrie, des rhombischen Systems BB VIII *501, 525*
— trapezoëdrische im hexagonalen System 1891 II 401. 94 I *249*
Hemifusus . . . . . 91 II 180
Hemimorphie des monoklinen Systems BB VII *432*. VIII *500*

Hemipedina . . . . . 1890 I *85*
Hemipleurotoma . . . . 90 II 152
Hemipneustes africanus . 93 I 558
— Arnaudi . . . . . 94 I 520
— Cotteaui . . . . . 94 I 520
— Delettrei . . . . . 93 I 558
— oculatus . . . . . 93 I 415
Hemipteren, Oligocän, Amerika . . . . . 93 I 551
Hemipterenflügel, unterer Graptolithenschiefer . 93 I 551
Hénisien . . . . . 94 II 327
Heptastylis stromatoporoides . . . . . 93 I 197
Heptastylopsis ramosa . 93 I 197
Hercyn . . . . . 93 I 116
— Rhein . . . . . 90 I 433
Hercynit, Bildung . . . 94 I 95
— Veltlin . . . . . 94 II 21
Herderit . . . . . 90 II 25
— Maine . . . . . 94 II 228
Herderitkrystall, Nord-Carolina . . . . . 90 I 220
Hermatoblattina . . . . 91 II 357
Herpestiden . . . . . 91 II 147
Hesperiella limata . . . 91 I 406
— minor . . . . . 91 I 406
Hesperornis . . 1892 I 161. II 452
— Kreide . . . . . 94 I 508
Hessit, Mexico . . . . 94 II 31
Hessleite . . . . . 92 I *141*
Heteracanthus . . . . 93 I 176
Heteractinellidae . . . 90 II 164
Heterangium Grievii . . 94 II 370
Heteraster oblongus . . 93 I 558
Heterastrididae . . . . 93 I 199
Heterastridium pachystylum . . . . . 93 I 199
Hetereuplectus retrorsus . 93 I 551
Heteroceras . . . . . 90 I 356
— Girandi . . . . . 90 II 286
— Leenhardti . . . . 90 II 286
— Tardieui . . . . . 90 II 286
Heteroclypeus hemisphaericus . . . . . 94 II 178
— subpentagonalis. . . 94 II 178
Heterocrinidae . . . . 92 II 168
Heterodiadema libycum . 93 I 560
Heterodontus . . . . . 94 I 188
Heterolampas Maresi . . 93 I 559
Heteromyarier, Stammesgeschichte. . . . . 93 I 404
Heteropoden . . . . . 93 II 305
Heteropora decipiens . . 94 I 174
— glandiformis . . . . 94 I 202
— reticulata . . . . . 90 I 164
Heterorthis . . . . 1893 II 205
Heterostegina assilinoides 91 II 332
Heterostraca . . . . . 92 II 357
Heulandit, Constitution . 90 I *130*
— Krystallform . . . . 92 I *13*
— Löslichkeit . . . . 90 I *129*
— Montecchio Maggiore . 92 I 233
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— New Jersey . . . . 94 I 268
— optisches Verhalten . BB VII *2*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *116*
— Synthese . . . . . 90 I *128*
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 239
— Zusammensetzung . . 92 I *21*
Hexactinellidae 1890 II 163. 91 II 196. 93 II 211
Hexagonocarpus crassus . 93 I 207
— inaequalis. . . . . 93 I 207
— piriformis . . . . . 93 I 207
Hexasterophora, Malm, Krakau . . . . . 90 II 342
Hiddenit, Nord-Carolina . 90 I 219
Hierlatz-Facies . . . . 91 I 160
Hildalmas-Schichten . . 93 II 168
Hilsthon, Leinethal . BB VII *274*
Himalaya, geologisches Alter . . . . 1893 I 318, 319
— recente Hebung . . 93 I 319
Hinchman-Tuff, Californien 94 II 112
Hindia parva. . . . . 92 II 372
Hinnites bifrons, Pliocänkalk, Insel Pianosa . 90 II 421
— Ombonii . . . . . 90 I 114
— scepsidicus . . . . 93 II 136
— Zlatarskii . . . . . 94 II 448
Hintzeït . 1892 II 19. 94 I 19
Hiortdahlit, Südnorwegen 92 I 251
Hipparion . . . . . 90 I 341
— crassum . . . . . 94 II 153
— Huf . . . . . 94 I 375
— Russland . . . . . 91 I 328
Hippidium . . . . . 92 I 568
Hippocrateaceen. . . . 91 I 337
Hipponyx . . . . . 93 II 554
Hippophaë dispersa . . 93 II *88*
— striata . . . . . 93 II *88*
Hippopotamida . . . . 90 II 431
Hippopotamus major . . 93 I 183
Hippothoa aggregata . . 90 I 169
— dispersa . . . . . 90 I 169
Hippuriten, Nabresina. . 94 II 473
Hippuritenkalke, Mte. Maggiore . . . . . 93 I *59*
Hippurites cedrorum . . 91 II 129
— corbaricus. . . . . 91 II 465

Hippurites cornu-vaccinum 1891 II 465
— flabellifer . . . . . 94 I 372
— giganteus . . . . . 91 II 465
— organisans . . . . 91 II 465
— plicatus . . . . . 91 II 129
— socialis . . . . . 91 II 465
— striata . . . . . 91 II 464
— sulcata . . . . . 91 II 464
— vier Gruppen . . . 93 II 162
Histionotus angularis 1891 I 152. 92 I 420
Hochgebirgsquarzit . . 92 I 339
Hochterrasse, Nordschweiz 93 I 369
Höganäsgruppe, mesozoische Ablagerungen Schwedens . . . . 90 II 297
Höhlen, Entstehung . . 92 II 66
— Siebenbürgen . . . 92 II 275
Höhlenlehm . . . . . 93 II 499
Hölzer, dicotyle . . . . 92 I 611
— fossile, Ost-Asien und Aegypten . . . . . 91 I 351
— Jura, Spitzbergen . . 91 II 384
— monocotyle . . . . 92 I 609
Hörsandstein, im Diluvium Norddeutschlands . . 91 I 314
— mesozoische Ablagerungen Schwedens . . 90 II 297
Hoffmannia . . . . . 90 II 149
— protogaea . . . . . 93 II 434
Hohlräume unter den Continenten . . . . . 94 II 244
Hohmannit . 1890 I *56.* 90 II *269*
— Caracoles . . . . . 91 II 19
Holaster rotundus, obere Kreide, Lincolnshire . 90 II 412
Holasteriden . . . . . 93 I 558
Holcodiscus algirus . . 93 II 198
— astieriformis . . . . 93 II 198
— Druentiacus . . . . 90 I 356
— menglonense . . . . 93 II 198
— Morleti . . . . . 90 I 356
— Seunesi . . . . . 90 I 356
— Sophonisba . . . . 93 II 198
Holcopneustes . . . . 91 II 368
Holcostephanus gratianopolitensis . . . . . 93 II 552
Holectypoida . . . . . 92 II 162
Holectypus Castilloi . . 91 I 162
— cenomanensis. . . . 93 I 560
— corona . . . . . 93 I 560
— crassus . . . . . 93 I 560
— excisus . . . . . 93 I 560
— Jullieni . . . . . 93 I 560
— serialis . . . . . 93 I 560
Holectypus turonensis 1893 I 560
Holmia . . . . . 91 II 115
Holocephalen . . . . . 92 II 357
Hologyra . . . . . 92 II *26*
Holonema . . . . . 93 I 176
Holopleura intermedia 1892 I *126, 128*
— Victoria . . . 1892 I *114, 128*
Holopocriniden . . . . 94 II 181
Holoptychiidae . . . . 92 II 358
Holoptychius . . . . . 93 I 177
Holoptychius-Schuppen . 93 II 195
Holothurien 1891 II 187. 92 II 367
Holz, verkieseltes, Essex. 90 II 423
— — Tunis . . . . . 90 II 96
Holzachat, Nord-Amerika 93 I 255
Holzkohle . . . . . 93 II 245
Homacanthus gracilis . . 90 II 439
Homacodon . . . . . 93 I 153
Homalonoten, Hypostomata derselben . . . 94 II 351
Homalonotus crassicauda, Schwanzschild, in westfälischem Schiefer BB VIII *541, 642*
— gigas . . . . . 90 II *217*
— Kalkfauna vom St. Malo . . . . . 90 II 293
— Silur, Normandie . . 91 II 459
Homalostega biforis . . 90 I 169
— exsculpta . . . . . 90 I 169
— suffulta . . . . . 90 I 169
— vincularoides. . . . 90 I 169
Homilit, Analyse . . . 91 I 372
— Südnorwegen . . . 92 I 243
Homo . . . . . 93 I 377
Homoeosaurus . . . . 92 I 575
Homomya Bodenbenderi . 93 I 125
— profunda . . . . . 90 I 359
Homosteus . . . . . 91 I 333
— Milleri . 1891 I 333 93 I 550
Homotoma . . . . . 92 I 588
— fusoides . . . . . 91 II 464
Hoplites angulatiformis . 93 I 126
— biassalensis, Neocom, Krim . . . . . 90 II 415
— canadensis . . . . 93 II 414
— cryptoceras . . . . 90 II *81*
— Desori . . . . . 90 II 415
— eudoxus . . . . . 90 II *77*
— Haidaquensis . . . 94 II 470
— heteroptychus . . . 93 I 354
— Inostranzewi. . . . 90 II 415
— Lamoricieri . . . . 93 II 198
— Lurensis . . . . . 90 I 356
— Mc. Conelli . . . . 93 II 414
— mendozanus . . . . 93 I 125

Hoplites Mörickeanus, Jura . . . . . 1890 I *152*
— neocomiensis . . . . 93 II 553
— Neumayri . . . . . 93 I 126
— Nolani . . . . . 90 I 356
— noricus . . . . . 90 II *81*
— protractus . . . . . 93 I 125
— regalis . . . . . 93 I 354
— Thurmanni . . . . 93 II 552
— ziczac . . . . . 90 II 415
Hoplomytilus . . . . . 93 I 404
Hoplophoridae . . . . 92 II 338
Hoplopteryx lundensis . 94 II 349
— minor . . . . . 94 II 349
Horiopleura Lamberti . . 93 I 408
Hornblende, basaltische . 93 I 30
— Bestandtheil des Kryokonit . . . . . BB VII *168*
— chemische Zusammensetzung . . . . . 92 II 404
— Durbach . . . . . 92 I 282
— im Anorthitfels, Canada . . . . BB VIII *443*
— im Gneiss, Argentinien BB VII *304*
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *330, 382*
— in Andesit, Japan . BB VII *139*
— in Basalttuff, Giessen 92 II 419
— in Tonalit . . . . BB VII *472*
— künstliche Darstellung 91 II *87*
— St. Lawrence-County . 93 II 24
— sublimirt, Laacher See 92 II 408
— unter Einwirkung von kohlensäurehaltigem Wasser . . . . . 93 II 353
— Veränderung durch Glühen . . . . . 91 I *291*
— Vesuvlava . . . . BB VII *425*
Hornblende-Andesit, Anden 90 I 91
— Cabo de Gata . . . 93 I 283
— Hohe Eifel . . . . . 91 II 65
— Rosita Hills . . . . 93 I 294
Hornblende-Ankerit-Schiefer . . . . . 92 II 292
Hornblende-Basalt, Madagascar . . . . . 90 II 96
Hornblende-Biotit, Dusky Sound, Neu-Seeland . 90 II 90
Hornblende-Diorit, Tirol . 90 I *76*
Hornblende-Glimmer-Diorit, Cortlandt Series . . . . . 90 I 88
Hornblende-Gneiss . . . 93 II 496
— New York . . . . . 93 I 331
Hornblende-Granit, Alderney . . . . . 90 II 91
Hornblende-Granitit, Coast ranges, Brit. Columbia 1893 I 291
Hornblende-Granitit, Nord-Argentinien . . . BB VIII *287*
Hornblende-Melaphyr, Roda . . . . . 90 I *79*
Hornblende-Norit, Cortlandt Series . . . . 90 I 87
— Säben, Tirol . . . . . 90 I *80*
Hornblende-Olivin-Basalt, Madagascar . . . . . 90 II 96
Hornblende-Peridotit (Cortlandtit), Cortlandt Series . . . . . 90 I 87
Hornblendeporphyr, Tirol 90 I *79*
Hornblendeporphyrit, Alaska . . . . . 93 I 506
— Ecuador . . . . . 93 I 78
— Lausitz . . . . . 92 II 411
— Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
Hornblendeschiefer 1893 II 501, 514
— Altenberg . . . . . 93 I 92
— Insel Sark . . . . 93 I 285
— Nassau, Sachsen . . 91 II 274
— Niedere Tauern . . 93 I 338
— Rhode Island . . . 94 II 263
Hornblendetrachyt, Arienzo, Campanien . . 91 II *312*
— von Dogali . . . . 93 II 55
Hornblendit, Cortlandt Series . . . . . 90 I 87
Hornfels . . . . . 92 II 87
— Darmstadt . . . . 93 I 89
— Leuben . . . . . 93 II 501
— streifiger . . . . . 93 II 361
— Tan-y-Grisian . . . 92 II 262
Hornfluh-Breccie, Schweiz BB VIII *181, 193*
Hornschiefer, Sachsen, Berggiesshübel . . . 91 II 270
Hornsilber, pseudomorph nach Rothgiltigerz . 90 II 46
Hornstein, chemische Zusammensetzung . . . 91 II 200
— Irland, Südengland, Belgien . . . . . 91 II 200
— mikroskopische Untersuchung . . . . . 90 II 242
— Tertiär, Adelaide . . 93 I 422
Hornsteinkalkfacies, Karpathen . . . . . 93 II 149
Hornsteinschiefer, Provinz Kai . . . . . 90 I 136
Horsetownschichten, Mte. Diablo . . . . . 93 I 100
Horste, Theorie von Suess 91 II 262

Horstnatur des Schwarzwaldes . . . . . 1892 II 85
Hosselkus-Kalkstein, Californien . . . . . 94 II 111
Houzeanina . . . . . 91 II 370
Hoveniphyllum Thunbergi 93 II 567
Huamampampa-Sandstein BB VIII *92, 98*
Hudson River Group . . 92 II 296
Hudson River-Schiefer . 93 I 334
Hübnerit, Nordamerika . 94 II 30
Huminit . . . . . 92 I *175*
— Nullaberg . . . . . 93 I 497
Humit, Nordmarken 1894 I 265. 94 II 235
Hummocks, Canada . . 92 II 293
Humussäure, natürliche Bildung . . . . . 94 I 269
Hunsrückschiefer, Lorch . 94 II 305
Hureaulit . . . . . 93 II 29
Huron . . . . . 90 I 273
— Canada . . . . . 91 II 311
— shales, Ontario-See . 94 I 110
Huronian . 1893 II 126, 516, 517
Huronische Gruppe, Lappland . . . . . 93 II 108
Huronische Schichten, 1891 I 101. 94 II 95
Hyaemoschus Peneckei . 94 II 343
Hyaena . . . . . 91 I 326
— crocuta . . . . . 91 I 326
— robusta . . . . . 91 I 326
— spelaea 1894 I 178. 94 II *288*
— — Irpfelhöhle, Württemberg . . . . 94 I 504
— striata, Tertiär, Val d'Arno . . . . . 90 II 431
— Topariensis . . . . 91 I 326
Hyänen, Eichel . . . . 93 II 394
— pliocäne . . . . . 92 II 141
— Stammesgeschichte . 94 II 150
Hyaenidae . . . . . 91 II 147
Hyaenina . . . . . 90 II 430
Hyaenodon Cayluxi . . 93 I 149
— Schlosseri . . . . . 93 I 149
Hyalinia bohemica . . . 93 I 554
— Ihli . . . . . 93 I 554
— vetusta . . . . . 93 I 554
Hyalit, Hornerberg bei Karlsbad . . . . . 90 II 18
— im Granit, Ortasee . 94 I 446
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Nord-Amerika . . . 93 I 255
Hyalophan in Buntsandstein . . . . . 92 I *67*
Hyalostelia fasciculus . . 90 II 164
Hyalostelia robusta, Malm, Krakau . . . . 1890 II 342
Hyattoceras . . . . . 90 II 149
Hybocrinidae . . . . . 92 II 168
Hybodus . . . . . 92 I 417
— basanus . . . . . 94 I 187
— keuperinus . . . . . 90 I 148
— — England . . . . 91 II 456
— Kopfstacheln . . . 90 II 144
— Symphysenzahn, Oxford-Clay . . . . . 91 II 456
— vestitus . . . . . 91 II 166
Hydaspitherium . . . . 90 II 432
— megacephalum . . . 93 I 543
Hydnophora astraeoides . 91 II *222*
Hydrargillit . . . . . 92 I 277
— Südnorwegen . . . . 92 I 238
Hydraspis Leithii . . . 91 II 342
Hydrobia Andreaei . . 94 II 356
— girondica . . . . . 94 II 356
— Gouvernement Kasan 94 I 322
— laminato-carinata . . 90 II 121
— Melii . . . . . 93 I 183
— Ossovinarium . . . 90 II 121
— particapaea . . . . 90 II 121
— striato-carinata . . . 90 II 121
— trochus . . . . . 90 II 121
Hydrobiidae . . . . . 93 II 417
Hydrobiotit im Jacupirangit 92 II *146*
Hydroborazit, Tarapacá in Chile . . . . . 90 II 276
Hydrocalcit, Wolmsdorf . 94 I 260
Hydrodolomit, St. Lawrence Co. . . . . 93 I 256
Hydrographische Karte von Württemberg . . 94 II 67
Hydrolith, Oregon . . . 93 I 255
Hydro-Metamorphismus . 90 II 388
Hydronephelit, Südnorwegen . . . . . 92 I 265
Hydrophan, Colorado 1891 I 231, 235
Hydroplumbit . . . . 91 I 377
Hydrorhodonit, Gouvernement Oerebro . . . 90 I *259*
Hydrosaurus lesinensis . 94 I 510
— paucidens . . . . . 91 I 149
Hylaeochampsa . . . . 90 II 324
Hylesinites electricus . . 91 II 356
Hylobiites cretaceus . . 93 II 548
Hylonomus 1891 II 454. 93 I 172
— Geinitzi . . . . . 91 II 454
— Lyelli . . . . . 94 I 380
— Wildi . . . . . 92 II 356
Hymenophyllites germanica 91 I 440
Hymenophyllum . . . . 91 I 440
Hymenocaris Salteri . . 93 II 196

Hymenoptera . . . . 1893 II 412
Hymenopteren im Bernstein . . . . . 92 II 459
Hymenotheca . . . . 91 I 440
— Beyschlagi . . . . 91 I 440
— Dathei . . . . . 91 I 440
Hyocrinus . . . . . 94 II 362
Hyolithen in silurischen Geschieben . . . . 92 II 363
Hyolithes acutus . . . 92 II 363
— erraticus . . . . . 92 II 363
— esthonus . . . . . 92 II 363
— latissimus . . . . 92 II 363
— Schencki . . . . BB VIII *37*
— striatus . . . . . 92 II 363
— vaginati . . . . . 92 II 363
Hyolithiden, Böhmen . . 94 I 195
Hyolithus-Sandstein, Holland . . . . . 93 I 376
Hyopotamus Gresslyi 1893 I 148. 94 I 179
— Picteti . . . . . 94 I 179
Hyopsodus . . . . . 91 II 144
— gracilis . . . . . 93 I 152
— jurensis 1893 I 149. 94 II *101*
Hyoserites minor . . . 93 I 431
Hypascocrinen . . . . 90 II 137
Hyperammina contorta . 93 II 560
Hyperlioceras discites . . 90 I 470
Hypersthen in Andesit . 94 I 466
— in Diabas, Virginia . 92 II 427
— Rocher du Capucin . 92 I 229
Hypersthen-Andesit, Japan . . . BB VII *136, 140*
— Mexico . . . . . 90 II 275
— östlicher Balkan . . 90 I *280*
Hypersthen-Augit-Andesit, Alboran . . . . . 93 I 284
— Japan . . BB VII *134, 142, 144*
Hypersthen-Diabas, quarzführender, New Jersey 93 I 505
Hypersthen-Glimmer-Diorit, Cortlandt Series 90 I 88
Hypersthen-Hornblende-Andesit, Japan BB VII *134, 143*
Hypersthen-Peridotite, Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
Hypersthenite, Süd-Borneo 93 I *42*
Hypnum miocenum . . 93 II 432
Hypocrinus pyriformis . 94 II 103
Hypodonchus amalthei . 93 I 536
Hypoplesion Fritschi . . 91 II 454
Hypopomyrmex Bombicii 94 II 469
Hypopygurus Gaudryi . 93 I 559
Hypsipleura . . . . . 92 II *32*
— cathedralis . . . . 94 II 142
Hypsocormus . . . . 1891 II 455
Hypsopatagus . . . . 90 I 361
Hyrachyus . . . . . 93 I 155
— obliquidens . . . . 90 I 339
Hyracodon . . . . . 93 I 155
Hyracodontidae . . . . 90 II 319
Hyracops . . . . . 93 II 403
Hyracotherium Quercyi . 93 I 148
— siderolithicum . . . 93 I 148
Hysteriopsis subopegraphoides . . . . . 91 II 209
Hysterophytae . . . . 91 I 343
Hystrichina . . . . . 90 II 430
Hystricomorphen . . . 92 II *240*
Hystrix . . . . . 92 II 141

I.

Ibergiceras . . . . . 90 II 441
Ibex alpinus . . . . . 91 II *137*
— fossilis . . . . . 91 II *133*
— Pallasii . . . . . 91 II *137*
Ichniotherium Cottae, Fussspur . . . . 94 I 372
Ichthyerpetum hibernicum 94 I 512
Ichthyocrinacea . . . . 90 II 137
Ichthyodectes polymicrodus . . . . . 94 I 380
Ichthyodectidae . . . . 94 I 380
Ichthyodorulithe 1891 II 167, 1892 I *145*, 416. 92 II 357
Ichthyopterigia . . . . 90 I 342
— Classification derselben 90 I 142
Ichthyosarcolithes . . . 93 II 158
— anguis . . . . . 90 I 360
Ichthyosaurier . . 1892 I *161*, 164
— in Trias und Jura Süddeutschlands . . . 93 I 166
Ichthyosaurus acutirostris 1891 I 151. 93 I 170
— arietis . . . . . 93 I 168
— australis . . . . . 90 I 143
— Ceram . . . . . 90 I 143
— communis . . . . . 92 II 355
— crassicostatus . . . 93 I 168
— Cuvieri . . . . . 92 II 355
— Finne desselben . . 90 I 348
— hexagonus . . . . 93 I 168
— ingens . . . . . 93 I 168
— integer . . . . . 93 I 168
— intermedius . . . . 90 I 348
— lacunosae . . . . . 93 I 170
— leptospondylus . . . 93 I 170
— longifrons . . . . 91 I 151
— longirostris . . . . 93 I 170

Ichthyosaurus macrophthalmus . . . . . 1893 I 168
— marathonensis . . . 90 II 327
— mesozoisches Gestein, Australien . . . . 90 II 326
— Normanniae . . . . 92 II 355
— numismalis . . . . 93 I 170
— planartus . . . . . 93 I 170
— posthumus . . . . 93 I 170
— psilonoti . . . . . 93 I 168
— quadriscissus 1891 I 152. 93 I 168
— — in Württemberg . 92 II *87*
— rhaeticus . . . . . 93 I 167
— Schwanzflosse . . . 94 I 185
— tenuirostris 1890 I 142. 94 I 509
— torulosi . . . . . 93 I 170
— trigonodon . . . . 93 I 170
— zetlandicus . . . . 91 I 151
— Zollerianus . . . . 93 I 170
Ichthyotomi 1891 II 166. 92 I 167
Icla-Schiefer, Bolivien BB VIII *91*
Iddingsit, Californien . . 94 II 269
— Carmelo Bai . . . 94 I 267
Idmonea bialternata . . 94 I 202
— commutata . . . . 90 I 165
— insignis . . . . . 90 I 165
— laticosta . . . . . 90 I 165
— seriatopora . . . . 94 I 202
— serpens . . . . . 94 I 519
— striolata . . . . . 90 I 165
Idokras . . . . . 90 II 33
— Alathal, Piemont . . 91 I *22*
— Mte. Somma . . . . 93 I 251
— Septimer . . . . . 93 II 252
— Wärmeleitung . . . 94 I 6
Idrialit . . . . . 93 II 75
Idrizit, Idria . . . . . 93 I 464
Iglesiasit, Radzionkau . 94 II 412
Iguanavus teres . . . 93 II 191
Iguanodon, Clavikeln . . 90 II 323
— Fittoni . . . . . 92 I 413
— Hilli . . . . . 93 I 549
— Hollingtoniensis . . 92 I 414
Iguanodon-Becken . . . 92 II 354
Iguanodontia . . . . . 93 I 546
Ijolith, Finnland . . . 92 I 307
Ilex Hibschi . . . . . 93 II 431
— subtilinervis . . . . 93 II 434
Ilfracombe-Schichten, Nord-Devon . . . . 94 I 123
Ilia pliocenica 1891 II 458. 93 I 178
Illaenidae . . . . . 90 I 151
Ilmenit, Canada. . . BB VIII *470*
— im Anorthosit, Canada BB VIII *444*
Ilmenit im Basalt, Marburg . . . . . 1891 II *173*
— im Erz des Routivare 94 I 89
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *358*, *386*
— im Jacupirangit . . 92 II *145*
— in Fleckschiefer . . 92 II 264
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— Ural . . . . . 91 II 14
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Ilmenorutil, Ural . . . 93 II 246
Ilsenburgmergel, Flora desselben . . . . . 91 I 444
Ilvaite, Br.-Columbia . . 94 I 42
Imperator europaeum . . 90 II 153
Incompressibilität des Lichtäthers . . . . 91 I 197
Indexellipsoid bei Mischkrystallen . . . . BB VIII *141*
Indexkreis eines Erdbebens 92 II 56
Indicator eines Erdbebens 92 II 56
Indicolit, Harlem . . . 91 I 234
Inesit, Dillenburg . . . 90 I 19
— Gouvernement Oerebro 90 I *259*
Infralias, Agy . . . . 93 I 345
— Unterfranken . . . 92 I *141*
— Westalpen . . . . 92 II 92
Infra-Tongrien, Gironde 1891 II 328. 94 II 453
— Umgebung von Puy . 90 II 309
— Vicentin . . . . . 94 I 159
Iniopsis caucasicus . . . 94 I 507
Inlandeis, Bewegung desselben . . . . . 90 II *163*
— Grönland . . . . . 94 I 169
— — Grund des Schmelzens . . . . . 94 II 46
— Norddeutschland . . 90 I 322
Inoceramen-Schichten, Italien und Wiener Sandstein . . . . . 91 I 415
— Karpathen . . . . 93 II 140
Inoceramus Cumminsi. . 94 I 372
— gervillioides . . . . 94 II 111
— involutus, Emscher Mergel, Harz . . . 90 I *178*
— Koeneni, Lohofsberg . 90 I *180*
— Lynchi . 93 I 537. 94 I 190
— Naumanni . . . . 91 II 174
— percostatus . . . . 90 I *180*
— Wienersandstein . . 93 II *81*
— Winkholdi . . . . 90 I *179*
Inoceramus-labiatus-Schichten, Lille . . 94 II 117
Insecten, Carbon, M. Pisano . . . . . 92 II 460

Insecten, Fairplay . . 1892 I 582
— im Bernstein eingeschlossen . . . . . 91 II 356
— Jura . . . . . 91 I *40*
— — Ostsibiriens . . . 91 II 357
— Mazon creek . 1892 I 584, 585
— mesozoisch-tertiär, Neu-Süd-Wales . . . . 91 II 356
— Mitteloligocän . . . 93 II 412
— nordamerikanische 1892 I 582, 585
— Palaeontologie derselben . . . . . 90 II *1*
— plattiger Steinmergel von Brunnstatt . . 91 II 356
— Tertiär, Colorado . . 93 II 549
- tertiäre, British Columbia . . . . . 92 I 424
— Torflager von Klinge 94 II 468
Insectivora . . . . . 90 II 430
— Europäisches Tertiär . 91 II 146
Interferenz durch circulare Doppelbrechung . 92 I 211
Interferenzerscheinungen an Zwillingsplatten einaxiger Krystalle . 91 II 223
Interglacial, England . . 93 II 401
— Gouvernement Moskau 93 II 391
— Westpreussen . . . 93 II 390
Interglacialzeit . . . . 91 I 134
— Gegend des Nord-Ostsee-Canales . . 1891 II *75, 83*
— Nordamerika . . . 94 I 368
Interspinalia der Coelacanthinen . . . . 91 II 354
Intrusivgänge . . . . 93 II 336
Intrusivgestein, dynamometamorph, Hohes Gesenke . . . . . 93 II 125
Intrusive Granitmassen, Verhältnisse bei der Abkühlung . . . . 91 II 261
Intumescens-Zone, New York . . . . . 93 I 120
Inuus Florentinus . . . 91 II 149
— suevicus . . . . . 91 I *176*
— Valdarno . . . . . 93 I 386
Inversion, krystallographische Bedeutung . . 94 I *94*
Invertebraten, Süd-Tunis 94 I 173
— Trinity Division, Texas 94 I 370
Inverted-saddles . . . . 93 II 352
Inwood Limestone, New York . . . . . 93 I 332
Isanabasen . . . . . 94 I 167
Isastraea . . . . . 90 II 336
— austriaca . . . . . 93 I 194
Isastraea eucystis . . 1893 I 194
— norica . . . . . 93 I 194
— oligocystis . . . . 93 I 194
Ischia, Erdbeben vom Jahr 1883 . . . . . 92 II 46
Ischiadites Königi . . . 93 I *45*
Ischnacanthidae . . . . 92 II 357
Ischnodactylus . . . . 90 II 152
Ischyodus Egertoni . . 93 II 408
— emarginatus . . . . 93 II 546
— Johnsoni . . . . . 91 I 430
Isectolophus . . . . . 93 I 154
— annectens . . . . . 90 I 339
Iser-Schichten, Böhmen . 93 I 521
Isoarca cracoviensis . . 94 I 488
Isocardia . . . . . 93 II 158
— Abichi . . . . . 94 I 172
— Eichwaldi . . . . . 94 I 172
— Justiniensis . . . . 94 I 388
— Zitteli . . . . . 93 I 182
Isochilina amiana . . . 92 II 458
— ampla . . . . . 92 II 458
— canaliculata . . . . 94 II 467
— canaliculata-Fauna, Alter . . . . . 94 I 383
— erratica . . . . . 93 II 411
— fabacea . . . . . 91 I 335
— Kentuckyensis . . . 92 II 458
— labrosa . . . . . 91 I 154
— lineata . . . . . 91 I 335
— rectangularis . . . 92 II 458
— Saffordi . . . . . 92 II 458
— subnodosa . . . . . 92 II 458
Isodimorphe Reihen . . 91 I *135*
Isodimorphie . . . . . 92 I *213*
Isoëder . . . . . 94 I *197*
— typische . . . . . 94 II *86*
Isogone . . . . . 94 I *197*
Isogonismus an Quarz und Feldspath . . . . . 91 II 8
Isograptus . . . . . 93 I 200
— gibberulus . . . . 93 I 201
Isohypsen des Scheldethales . . . . . 91 I 422
Isomorphe Mischungen, Abhängigkeit der physikalischen Eigenschaften von den Mischungsverhältnissen BB VIII *117, 120*
— specifisches Gewicht . 90 I 203
— Veränderung der Krystallform . . . . . 90 II 39
Isomorphe Reihen, Lücken derselben . . . . . 91 I *134*
Isomorphie 1892 II 6, 1894 I 9, 249, 425

Isomorphie der Ferrate mit den Sulfaten, Seleniaten etc. . . . . 1894 II 397
— der Molybdate, Wolframate und Sulfate . 94 I *186*
— der Tellurate mit den Osmiaten . . . . . 94 II 397
— in der Dolomitreihe 1891 I *132*. 92 I *210*
Isopneustes aturicus . . 90 I 472
— Gindrei . . . . . 90 I 472
— Héberti . . . . . 93 II 162
— Munieri . . . . . 90 I 472
Isopoden . 1890 II 146. 92 I 421
Isoraphinia gibbosa . . 94 I 210
— simplicissima . . . 93 I 566
Isostasie im Golf von Mexico. . . . . 94 I 65
Isotelus-Kalk. . . . . 90 I 76
Isotelus-Schiefer . . . 90 I 76
Isotheïnae. . . . . 93 II 551
Isothermen, Erzeugung von . . . . . 93 II 457
— Japan . . . . . 94 I 225
Isotrope Körper, Elasticität . . . . . 92 I 5
Isotypie . . . . . 94 I *55*
Itacolumit. . . . . 93 I 288
Ittnerit, Canada . . . 91 I 241
Ixorophyllum abnorme . 91 II 209
— anceps. . . . . 91 II 209
— primaevum . . . . . 91 II 209

J.

Jaboncillo, Bolêo, Californien. . . . . 93 II 74
Jacobsit, Gouv. Oerebro . 90 I *260*
Jacupirangit . . . . . 92 II *141*
Jadeit . . . . . 93 II 25
— Nicaragua . . . . . 90 II 104
— Oberbirma . . . . 94 II 407
— Parma . . . . . 93 II 248
— Umwandlung in Nephrit 94 II 26
Jamesonischichten, Herford 90 I 116
Jamesonit, Leogang . . . 93 I 15
— Semipalatinsk . . . . 94 II 234
Jania . . . . . 91 II 180
Janismus . . . . . 94 I 99
Jarösit, Utah . . . . . 93 II 34
Jaspilit, Michigan . . . 94 I 471
Jeanpaulia palmata, Australien . .1890 II 328, 448
Jefferisit, Einwirkung von HCl . . . . . 94 I 31
Jerea caulis . . . . 1894 I 210
— clavata . . . . . 94 I 210
Jereica permira . . . . 94 I 210
Jeremejewit . . . . . 92 I *201*
— optische und thermische Eigenschaften . . . 91 I *85*
Jeronia pyrenaica . . . . 90 I 473
Jewreinowit, Frugård. . 90 II 33
Jiwaarit, Finnland 1892 I 307, 308
Jodal, specifisches Gewicht 94 II 3
Jodblei . . . . . 91 II 20
Jodcadmium . . . . . 94 I *39*
Jodchromate, Chile. . . . 93 I 263
Jodkalium-Lösung, Form und Anordnung der sich bildenden Krystalle . 94 I 3
Jodsilber . . . . . 94 I *39*
— optisches Verhalten . BB VII *2*
— Wandern der Ionen . . 91 II 4
Johannian . . . . . 92 I 112
Johnstrupit, Südnorwegen 92 I 240
Jonesella crassa. . . . . 92 II 458
— digitata . . . . . 92 II 458
— pedigera . . . . . 92 II 458
Jordania . . . . . 92 I 615
Jordanit, Binnenthal 1893 I 467, 470
— Zwilling . . . . . 94 II 19
Josephinit, Oregon 1893 II 278. 94 I 433
Jouannetia cochlearella . 93 II 555
Juglandinium . . . . 92 I 614
Juglans Triebelii . . . 93 II 429
Jungermannia . . . . 92 II 378
Jura. . . . . 92 II 107
— Alençon . . . . . 93 II 380
— Algier . 1892 II 304. 93 I 184, 349. 94 I 142.
— Alpen . . . .1893 II 369, 509
— Andalusien . . . . . 92 II 429
— argentinische Cordillere . . . . . 93 I 104
— Australien und Neu-Seeland . . . . . 91 I 444
— badisches Oberland . 94 I 140
— Basses-Pyrénées . . 91 I 413
— Bellême . . . . . 93 II 381
— brauner, Russisch-Polen . . . . . 93 I 347
— — Sehnde bei Lehrte 91 I *126*
— — Vierwaldstätter See 90 II *113*
— Californien . 1894 I 110. II 112
— Centralappenin . . . 94 I 346
— Centralasien . . . . . 90 II *273*
— England . . . . . 94 II 108
— erste Kette des. . . . 94 I 473
— Fuetzen . . . . . 92 II 103

Jura, Gebirge von Fanis, Südtirol . . . . 1890 I 301
— Granada und Malaga 93 I 321
— Grand-Galibier . . . . 92 I 360
— Greben . . . . . 92 I 358
— Grenoble . . . . . 94 I 350
— Hannover . . . . . 90 II *97*
— Haute-Savoie . . . 91 II 282
— Hermsdorf bei Berlin. 93 I 344
— Japan, Flora . . . . 91 I 175
— Karpathen . . . . 93 II 148
— Karwendelgebirge . . 92 I 97
— Kiew . . . . . 92 I 360
— Leinethal . . . . BB VII *288*
— lithauisch-kurischer 1894 II *207, 217*
— Lyon . . . . 1892 I 130, 132
— Massiv von Zaghouan (Tunis) . . . . . 90 II 110
— Maurienne . . . . 93 I 97
— Mexico 1890 II *273*. 92 II 107
— mittlerer, Argentinien 93 I 125
— Montagne de Lure . 90 II 278
— Montbéliard . . . . 92 II 106
— M. San Giuliano . . 92 I 547
— nördl. Norwegen . . 93 II 109
— Nola, Campanien . . 90 I *95*
— oberer, Grand-Galibier 93 I 520
— — Polen . . . . . 94 I 487
— — Südtyrol . . . . 94 I 486
— östl. Balkan . . . . 90 I *279*
— Persien . . . . . 92 I 133
— Polen . 1891 I 298. 92 I 116
— polnisches Mittelgebirge . . . . . 93 I 348
— Portugal . . . . . 94 I 141
— Saratow . . . . . 90 II 110
— savoyische Alpen . . 92 I 129
— Sofia . . . . . 94 II 447
— Stowe-Nine-Churches . 93 I 519
— subalpine Ketten . . 94 I 314
— Südamerika . . . . 90 II *191*
— Süd-Frankreich . . . 91 II 322
— südwestliches Frankreich 92 II 106
— Taormina . . . . . 93 I 305
— Teutoburger Wald . 91 II 324
— Tunis . 1891 II 441. 93 I 318. 93 II 513
— tunisischer Atlas . . 93 II *37*
— Urmiah-See . . . . 92 II 434
— Varbuche . . . . . 92 I 546
— Verbreitung . . . . 90 I *140*
— Vicentin . . . . . 94 I 156
— von Popilány . . . 91 II 325
— weisser, Vierwaldstätter See . . . . 90 II *117*
Jura, weisser, Württemberg . . . . . 1894 II 316
— Wendelsteingebiet . . 92 II 92
Juragestein, Nufenenpass 94 II 425
Jurakalk, Hetzlas . . . 91 II 305
Jurameer, Balkanländer . 94 I 317
— europäisches . . . . 94 I 144
Jurameerströmungen . . 94 II 318
Jurensis-Zone, Centralappenin . . . . . 94 I 346
Juvavella, alpine Trias . 90 II 333
Juvavische Stufe . . . 93 II 378

K.

Kabait . . . . . 90 II 230
Kadaliosaurus 1891 II 454. 93 I 171
— priscus . 1890 II 436. 93 I 549
Käfer im Bernstein 1892 I 424. 92 II 459
Kämmererit . . . . . 92 II 226
— Tampadel 1893 II 27. 94 II 411
Kågerödsgruppe, mesozoische Ablagerungen Schwedens . . . 90 II 297
Kainit . . . . . 93 II 389
— Douglashall b. Westeregeln . . . . . 90 I 29
— Kalusz . . . . . 94 I 472
— Synthese . . . . . 94 I 12
Kakoklasit, Wakefield . 93 I 261
Kalialaun, Aenderung des optischen Verhaltens durch einseitig. Druck BB VIII *227*
— spec. Gewicht . . . 90 I 203
Kaliborit . 1891 I 237. 94 I 19
Kalibrechweinstein, Doppelsalze mit Nitraten BB VIII *523*
— salpetersaures Natron, Krystallform . . . BB VIII *506*
Kalifeldspath im Granit, Nord-Argentinien . BB VIII *297*
— Structurformel . . . 94 II 9
Kaliglimmer, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *343*
— Synthese . . . . . 90 II 35
— unter Einwirkung von kohlensäurehaltigem Wasser . . . . . 93 II 353
Kalisalz, Kalusz . . . 94 I 472
Kaliumbichromat, optische Constanten . . . . 92 I 12
Kaliumchlorat, farbige Reflexion . . . . . 91 II 2

Kaliumlithiummolybdat 1894 I *192*
Kaliumlithiumselenat . . 94 I *179*
Kaliumlithiumsulfat 1892 II *58*, 207. 94 I *172*
Kalium-Natrium-Sulfat, Doppelsalz . . . . . 91 I *139*
Kaliumnitrat, spec. Gewicht . . . . . 90 I 203
Kalium-Silber-Nitrat, Doppelsalz . . . . . 91 I *137*
Kaliumsulfat, spec. Gewicht . . . . . 90 I 202
Kaliumsulfat-Lithiumchromat . . . . . 94 I *182*
Kalk. . . . . 92 I 293
— Analyse . . . . . 94 I 481
— Anthracit enthaltend . 94 I 257
— Aqui . . . . . 92 II 313
— Behandlung mit Oxalsäure . . . . . 94 I 7
— bituminöser BB VIII *199*. 92 I 39
— Brasilien . . . . . 91 II 304
— dicht . . . . . 1893 II 364, 375
— Fayat . . . . . 90 II 112
— feldspathführend, Rhodus. . . . . 94 I 74
— in Basalt, Marburg . 91 II *231*
— in Tuff, Campanien . 91 II *315*
— jurassischer, Grenoble 94 I 351
— Karniowice 1893 II 130. 94 II 374
— Kleinasien . . . . 94 II 86
— körniger . . . . . 93 II 359
— krystallinischer . . . 92 II 292
— — Canada . . . BB VIII *428*
— — Peloponnes . . . 93 I 312
— — Pyrenäen. . . . 91 II 284
— Ligurien . . . . . 91 II 428
— marine Bildung. . . . 90 II *53*
— Massa Maritima . . 94 II 433
— organogen, Waulsort . 91 I 408
— Périgord und Agenais 90 I 121
— Pylos . . . . . 93 I 306
— Russland . . . . . 93 II 61
— Semmeringgebiet . . 90 I 270
— Stromberg . . . . 91 I 115
— Trias, Val di Tanaro 94 I 102
— — Vanoise . . . . . 93 I 301
— Ventenac . . . . . 90 II 113
Kalkalgen . . . . . 93 II 304
— fossile . . . . . 93 I 577
Kalkausscheidungen im Meere . . . . . 92 II 248
Kalkbildung durch Foraminiferen . . . . . 93 I 46
Kalkbreccien, I. di Giannutri . . . . . 1892 II 422
Kalk-Colonie im unteren Silur, Prag . . . . . 94 I 478
Kalkeinlagerung in Grauwacke, Böhmen. . . . 94 I 290
Kalkfauna, Erbray, Dép. Loire-inférieure. . . 90 I 286
Kalkgehalt, Tiefsee . . . 93 II 288
Kalkknollen . . . . 1893 II 518, 523
Kalkkruste des Löss . . 90 II *195*
Kalkmergel, glaukonitische, in böhmischer Kreide 92 II 306
— Siebenbürgen . . . . 90 II 115
Kalknadeln . . . . . 90 II 165
Kalkphyllit, Murau . . 93 I 112
— Murthal . . . . . 93 II 512
— Niedere Tauern. . . . 93 I 338
— Rosaliengebirge. . . 93 I 113
— Salzburg . . . . . 94 II 92
— Schweiz . . . . . 94 I 295
— Ungarn . . . . . 94 II 92
— Vanoise . . . . . 93 I 300
Kalkschiefer . . . . . 93 II 359
— Niedere Tauern. . . . 93 I 338
Kalkschwämme, Bau der Skelettheile derselben 90 I 370
Kalksilicat, hexagonales . 92 I 89
Kalksilicatfels . . . . . 93 II 364
Kalksilicathornfels . . . . 94 I 71
Kalkspath . . . . . 94 I 60
— Aetzversuche. . . . . 92 I 236
— Afrika . . . . . 92 II 426
— Allmendingen . . . 90 I 395
— Anorthosit, Canada BB VIII *446*
— Baden . . . . . 92 II 20
— Blaubeuren . . . . . 90 I 396
— Egremont, Cumberland 90 II 381
— Einfluss der Temperatur auf die opt. Eigenschaften . . . . . 92 II 396
— Elasticität . . . . . 92 I 3
— Elsass-Lothringen . . 94 I 20
— Engis . . . . . 91 I 383
— Gleitflächen 1890 II 380. 91 I 379. 92 I 5
— Gouv. Wiatka . . . . 91 II 13
— Härte . . . . . 93 II 4
— Härtecurve . . . . . 91 II 9
— Hauptmuschelkalk von Marbach . . . . . 90 I 396
— im Granit, Nord-Argentinien . . . BB VIII *360*, *386*
— — — Ortasee . . . . 94 I 447
— in Diabas. . . . . 92 II *1*
— Island . . . . . 92 I 222

Kalkspath, künstliche Darstellung . . . . . 1891 I *143*
— Lösungsgeschwindigkeit . . . . . 1892 I 220—222
— Marburg, Steyermark . 90 II 171
— Mexico . . . . . 94 I 22
— Mies . . . . . 93 I 11
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Mont Cenis . . . . . 90 II 95
— Neuberg, Steyermark . 90 II 17
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Nieder-Rabenstein . . 94 I 258
— Norberg . . . . . 94 I 259
— Port Henry . . . . . 91 II 245
— Pseudomorphosen nach Aragonit . . . . . 90 I 14
— Rauris . . . . . 94 I 4
— Reflexion des Lichtes . 90 I 12
— Rothenzechau . . . . 92 I 511
— See von Vico . . . 91 I 13
— Skandinavien . . . 91 I 21
— Spaltbarkeit . . . . . 92 I *219*
— Steierdorf . . . . . 94 I 3
— Südnorwegen . . . . 92 I 265
— Südwest-Afrika . . . 90 I *108*
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Tavetsch . . . . . 90 I 14
— Thalfingen bei Ulm . 90 I 396
— Tirol . . . . . 92 I 235
— Villers en Fagne . . . 94 II 415
— Vorarlberg . . . . . 93 I 28
— Wärmeleitung . . . . 94 I 5
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
— Zwillinge . . . . . 90 II 382
Kalkspathknollen . . . . 90 II 51
Kalkstein, Altenberg . . 93 I 92
— biegsamer, Jefferson City 93 I 290
— des Grundgebirges . 92 I *174*
— Devonshire . . . . 94 II 303
— dunkler, Ormonds, Schweiz . . . . . BB VIII *189*
— Egypten . . . . . 91 I 401
— Essex . . . . . 90 II 423
— Gouverneur . . . . 94 I 109
— Jura . . . . . 92 II 265
— Kertsch . . . . . 90 II 120
— Lias, Tonkin . . . . 94 I 303
— Nord-Borneo . . . . 90 I 129
— oolithischer, Eupatorisches Plateau . . . 90 II 123
— — Hirnant-Thal . . 93 I 287
— schwarzer, Niesen, Schweiz . . . . BB VIII *192*
— tuffartiger, Eupatorisches Plateau . . . 90 II 123
Kalkstein, Vavaugruppe 1892 II 282
— Wenlock-Gruppe . . 94 II 303
Kalksteinbildung in verwittertem Dolerit . . 93 II *75*
Kalkthonphyllit . . . . 92 II 291
Kalktuff, Folx les Caves, geol. Alter . . . . 90 I 311
— Mono Lake . . . . . 92 I 385
— pflanzenreich, Dauvres 91 I 122
— Robschütz, Sachsen . 91 I 83
— Tutschin . . . . . 92 I 434
Kallilith . . . . . 92 II 406
Kalomel, Wärmeleitung . 94 I 5
Kamazit . . . . 1892 I 269. II 245
— im Nickeleisen . . . . 90 I 41
Kaninaschicht, Karpathen 93 II 142
Kantengeschiebe, Gebiet der Rheinebene . . . . 90 II *89*
— Holland . . . . . 93 I 376
Kaolin . . . . . 92 II 14
— Colorado . . . . . 91 II 415
— Constitutionsformel . 94 I 38
— Dep. Allier . . . . . 91 II 285
— des chinesischen Porzellans . . . . . 91 I 267
— Dichte . . . . . 93 II *149*
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *361, 386*
— Parva (Szolnok-Naszóder Com.) . . . . . 90 I 398
— Roccastrada . . . . 93 I 279
— Südnorwegen . . . 92 I 245
— zweierlei Arten von Partikelchen . . . . . 93 II *152*
Kaolinbildung . . . . 93 II 11
Kaolinlager, Bornholm . 90 II 93
Kaolinthon, Sachsen, Marienstern . . . . . 94 II 287
Karlseisfeld, Schwinden desselben . . . . . 93 I 374
Karooformation, Altersbestimmung der unteren Grenze . . . . . 90 I *283*
— Glacialerscheinungen . . 91 I 136
Karpathensandstein, Siebenbürgen . . . . . 91 II 72
Karphosiderit, Mâçon . . 91 I 6
Karrenfelder im Schweizer Jura . . . . . 93 I 483
Karreria . . . . . 93 I 201
Karstbildungen . . . . . 93 I 45
Karsterscheinungen 1894 I *115, 116*
Karten, geologische (vergl. S. 197).
— — Sachsen . . 1892 I 93, 523
— — Elsass-Lothringen . 92 I 532

Karten, geologische, Russland . . . . . 1892 I 329
— topographische . . . 93 I 99
Karyocerit, Südnorwegen 92 I 257
Karyopilit . . . . . 92 II 236
— Pajsberg, Wermland . 90 II 52
Kaspische Serie . . . . 93 II 88
— Stufe, Apscheron . . 94 I 326
Kataklasstructur, Feldspath, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *369*
— Gneiss, Argentinien BB VII *329*
Katalog der Mineralien von Canada . . . . 94 I 244
— von Iowa . . . . . 94 I 244
Katapleit . . . . . 91 I 376
— Südnorwegen . . . 92 I 254
Katosira . . . . . 92 II *31*
— abbreviata . . . . . 94 II 143
— fragilis . . . . . 94 II 143
Kayserella . . . . . 93 II 206
Keewatin . . . . . 93 II 516
— Ontario . . . . . 94 II 94
Keewatin-Reihe, Canada . 91 II 90
Keewatin-Schichten . . 92 II 294
Keirognathus cordylus . 90 I 466
Kelestoma elongatum . . 90 I 169
Kellia peregrina . . . 90 II 153
Kelloway, in ostpreussischen Geschieben 1891. II. 326. 94 II 209
— Kaukasus . . . . . 93 II 384
— Umgegend von Saratow 90 II 111
— westliches Frankreich 92 II 303
Kelloway-Schichten, Popilany . . . . . 92 I 128
Kelyphit, Zuátek . . . 94 II 420
Keokuk-Schichten . . . 93 II 375
Kepernikgneiss, Hohes Gesenke . . . . . 93 II 126
Kepplerites . . . . . 93 II 382
Keramohalit . . . . . 91 II 20
— Teneriffa . . . . . 93 I 41
Keratophyr, durch Quarz porphyrisch, Pigeon Point . . . . . 91 I 106
— Irland . . . . . 91 I 88
Kerne der Eruptivgesteine 92 I 63
Kerrit, Einwirkung v. HCl 94 I 31
Kerr'sches Phänomen BB VII *204*, *224*
Kersantit, Habachthal . 93 I 490
— Montagne Noire . . 91 II 285
— Plauen'scher Grund bei Dresden . . . . . 91 II 63
— Sulz . . . . . 93 II 522
— Thüringer Wald 1891 I 65. II 277
Kersanton, Pyrenäen . 1891 I 266
Ketten- u. Massengebirge 90 I 249
Kettengebirge, Bildung . 93 I 482
Kettenjura, Nordschweiz . 93 I 108
Keuper, Eisenach . . . 94 I 480
— Erlangen, chem. Constitution . . . . . 90 I 261
— Fichtelgebirge . . . 94 II 271
— Fuetzen . . . . . 92 II 103
— Leinethal . . . . BB VII *265*
— Liverpool . . . . . 91 II 122
— nördliches Franken . 92 I 351
— Schonen . . . . . 94 I 343
— untere Grenze in den Alpen . . . . . 90 I 102
Keuperbecken, Vierwaldstätter See . . . . . 90 II *99*
Keweenaw-Serie . . . 93 II 517
Kiemenbogen, rudimentärer, der Coelacanthinen 91 II 353
Kies mit Geröllelagen, Umgebung von Issoire . 90 II 309
Kieselablagerungen, Themse . . . . . 93 I 136
Kieselhölzer, Arkansas . 92 II 468
— Potomac-Formation . 93 II 218
Kieseloolith, Pennsylvanien 94 I 464
Kieselsäure in Erzen . . 93 II 275
— Neubildung im Buntsandstein, Marburg . 90 II *190*
Kieselschiefer, Merzdorf, Sachsen . . . . . 91 II 268
— Pirna, Sachsen . . . 94 II 284
Kieselschwämme . . . 90 II 164
— Yorkshire . . . . 91 II 370
Kieselsinter, Bildung 1891 II 94. 92 I 523
— mit goldhaltigem Eisenglanz, Queensland . . 94 I 14
Kieselskelet in der Phosphorsalzperle . . . 91 II 234
Kieselzinkerz, Missouri . 93 I 475
— Oberschlesien . . . 94 II 413
— Rezbanya . . . . 90 I 396
— Schottland . . . . 91 II 18
— Semipalatinsk . . . 94 II 234
Kieswüste . . . . . 92 I 59
Kimberley-Gruben . . . 92 II 268
Kimberlit, Pike Co., Arkansas . . . . . 93 I 501
Kimmeridge . . . . . 92 II 354
— erste Kette des Jura . 94 I 474
— Polen . . . . . 91 I 298
— Savoyen . . . . . 94 I 348
Kirkbya Lindahli . . . 92 II 459
— parallela . . . . . 92 II 459

Kirkbya semimuralis . 1892 II 459
— subquadrata . . . . 92 II 459
— venosa . . . . . 92 II 459
Kir-Lager . . . . . 93 II 88
Klärfähigkeit und Leitfähigkeit . . . . . 93 II *165*
Klärung reiner Kaolinlösungen . . . . . 93 II *151*
— unter Einfluss von Zusätzen . . . . . 93 II *154*
— von Pochtrüben . . 93 II *166*
Klastische Gesteine. Bildungsweise und Classification . . . . . 90 I 55
Klaus-Schichten, Alpen . 91 I 299
Klementit . . . . . 92 II 229
Klima, Aenderungen . . 92 I 57
— Skandinavien . . . 94 II 332
Klimaschwankungen . . 91 I 51
— Einfluss auf d. geolog. Bildungen . . . . 90 I 245
Klingstein, Japan . . BB VII *146*
Klinochlor . . . . . 92 II 219
— Constitution . . . . 94 I 441
— Krystallform . . . . 92 I 226
— Russland . . . . . 90 II 22
— Tampadel . . . . . 94 II 412
Klinohumit, Nordmarken 1894 I 266. 94 II 236
Klinoklas, Utah . . . . 91 II 48
Klippen, Karpathen . . 93 II 146
Klippenhülle, Karpathen 93 II 150
Kloedenia globosa . . . 91 I 430
— Kiesowi . . . . . 93 II 411
— notata . . . . . 91 I 334
— pennsylvanica . . . 91 I 335
— simplex . . . . . 91 I 335
Knochen, fossiler Fluorgehalt . . . . . 93 I 539
Knochenbreccien, Heppenloch . . . . . 91 I *171*
— La Spezia . . . . 92 I 152
Knochenconglomerat, Gourbesville . . . . 91 II 329
Knochenfische, mittlere Kreide, Kansas . . . 94 I 380
Knochenfunde, Höhlen bei Rübeland . . . . . 92 I 152
Knollen, versteinerungsführend . . . . . 93 II 118
Knollenkalk, Culm, Herborn 91 I 405
Knorria . . . . . 94 I 528
— imbricata . . . . . 92 I 196
— mirabilis . . . . . 93 I 206
Knotengrauwacken, Königswartha . . . 93 II 94
Knotengrauwacken, Lausitz . . . . . 1890 II *187*
Knotenschiefer 1893 II 361. 94 I 71
— Canitz, Sachsen . . 91 II 269
— Rhode Island . . . 94 II 263
Knotenthonschiefer . . . 92 I 286
Knoxvilleschichten, Mont Diablo . . . . . 93 I 100
Knoxvillit . . . . . 92 I 50
Kobalt, Trennung von Nickel . . . . . 92 II 210
Kobaltblüthe, Leogang . 93 I 19
Kobaltgänge, Bieber . . 93 I 87
Kobaltglanz, Zwillinge, Siegen . . . . . 93 II 260
Kobalthaltige Mineralien, Verhalten gegen Wasserglas . . . . . 93 I 231
Kobellit, Ouray . . . . 91 II 233
Kochia capuliformis 1893 I *13*, 403
Kochiinae . . . . . 93 I 403
Kössener Schichten . . 92 I 126
— Ostalpen . . . . . 94 II *46*
— Schwarzau . . . . 94 II 444
Kohle, Andöen . . . . 93 II 110
— British Columbia . . 90 II 384
— mit pflanzl. Structur . 93 I 207
— New South Wales . . 93 I 512
— Pennsylvanien . . . 90 I 279
— Piemont . . . . . 92 I 141
— Queensland . . . . 93 I 513
— Süd-Afrika . . . . 91 II 315
— Tasmanien . . . . 93 I 514
— Toscana . . . . . 92 I 87
— Victoria . . . . . 93 I 514
Kohlenbecken, französisches Centralplateau . 91 II 313
— von Carmaux Albi . 93 II 83
Kohlenbergbau in Siebenbürgen . . . . . 92 II 73
Kohlendistrict, Pittsburg 90 I 279
— Rio Grande . . . . 90 I 447
Kohlenfeld, Gondwána . 94 I 126
— Khasi Hills . . . . 94 II 330
— Lancashire . . . . 94 II 478
— Montana . . . . . 94 II 451
Kohlenflötze . . . . . 90 I 255
— Afghanistan . . . . 94 II 295
— Dore-Fluss . . . . 94 II 110
— Dover . . . . . 94 II 431
— Montana . . . . . 94 II 123
— Neusüdwales . . . . 94 II 309
— Saltrange . . . . . 93 II 124
— triassisch, Alpen . . 94 II *39*
— Vorketten d. Himalaya 94 I 494

Kohlenformation, Kärnten 1894 II 430
— Maurienne . . . . 93 I 97
— Posen . . . . . 94 II 324
— Schlesien . . . . 94 II 324
Kohlengebirge von Commentry . . . . . 93 I 211
Kohlenkalk, ägyptisch-arabische Wüste . . . 93 II 520
— Fauna, Timor . . . 94 I 331
— Ille-et-Vilaine . . . 91 I 407
— Mongolei . . . . . 91 II 462
— oberer, Armenien . . 91 I 278
— Pennsylvanien . . . 94 I 125
— Timangebiet . . . . 94 I 323
— Visé . . . . . 93 I 511
Kohlenlager, Süd-Ussuri-Gebiet . . . . . 94 I 128
Kohlensäure, Ausströmungen von, Süd-Persien 93 II 86
— Einwirkung auf Suspensionen . . . 1893 II *162*, *168*
— Wasser gesättigt mit . 93 II 353
Kohlensandstein, Becken von Brive . . . . 94 I 340
Kohlenstoff, amorph . . 93 II 244
— Oxydation in Meteoriten . . . . . 94 I 275
Kohlenwasserstoff, fossiler, Spanien . . . . . 91 II 296
Kokkolith . . . . . 90 I *231*
Koninckella . . . . . 91 II 465
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Koninckina . . . . . 91 II 465
— Aquoniae . . . . . 94 II 460
— Leonhardi . . . . 94 II 311
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Koninckiniden . . . . 92 I 441
Konit . . . . . 91 I *146*
Korallen. . . 90 II 135 93 II 305
— Jura, Schweiz . . . 90 II 334
— Löslichkeit . . . . 91 II 404
— Magnesiagehalt. . . 94 I *268*
— palaeozoische . . . 92 I 183
— pliocäne, Rhodus . . 91 II 195
— recente, Navassa . . 93 I 501
— Trias . . . . . 93 I 191
— Wachsthum derselben 91 II 195
Korallenbildung bei Krakatau . . . . . 91 II 193
Korallenerz, Istrien . . 93 II 75
Koralleninseln 1892 II 169. 93 I 46
Korallenkalk, Barbados . 93 I 101
— Belledalle . . . . . 91 II 440
— Dép. Basses-Alpes . . 91 I 118
— Pyrenäen . . . . . 93 I 407
Korallenkalk, Süd-Devon 1994 I 300
— tertiär, Timor . . . 94 I 331
— Venetianer Alpen . . 94 I 149
Korallenriffe . . . 1892 II 169, 248
— Fernando de Noronha 94 I 69
— Halbinsel Florida . . 92 I 101
— Hawaii . . . . . 92 I 592
— Javasee und Branntweinsbai . . . . . 91 II 193
— Sinaihalbinsel 1891 II 450. 93 I *104*
— West-Australien . . 92 I 595
Korallenriffkalk der Tonion . . . . . 92 I 126
Korallenrifftheorie, Alpen 94 II *21*
Korallenschlamm . . . 93 II 302
Koralligene Bildungen, Jura von Doubs . . 90 II 108
Kornerupin, Grönland . . 91 II 24
Koroder Schichten . . . 93 II 168
Korund 1893 II 16, 265. 94 I *17*
— Bildung aus Schmelzmassen . . . . . 94 I 96
— Ceylon . . . . . 90 II 386
— im Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *358*, *386*
— künstlich . . . . . 94 I 12
— Laacher See . . . . 92 I 230
— Nord-Amerika . . . 92 I 498
— optische Anomalien BB VII *2*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Umwandlung . . . 93 II 12
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Korundophilit . . . . 92 II 222
Korynit . . . . . 91 I *154*
— Siegen . . . . . 92 II 406
Kotschubeyit . . . . . 92 II 225
— Arcadelphia, Arkansas 90 II 417
— Californien . . . . 92 I 50
— physikal. Eigenschaften 90 II 218
— Russland . . . . . 90 II 22
Krabben, Pliocän, Spicchio 93 I 178
Krater des Kilauea, Vermessungen . . . . 94 II 415
— Kilimandscharo . . . 94 I 104
Kraterbildungen, basaltische, Giessen . . . 93 II 324
Kratere des Mondes . . 94 II 39
Kraterseen, Eifel . . . 93 I 82
Krebsfauna, Monte Mario 91 II 458
Krebsscheerenkalke, Württemberg . . . . . 94 II 316
Kreide, ältere, British Columbia . . . . . 91 I 158
— Alabama 1892 I 373. 93 II 387
— Algier . . . . . 93 I 522

Kreide, Alicante und Süd-Valencia . . . . . 1893 II 159
— Alpen . . . . . 93 II 510
— Anne Arundel u. Prince George Counties, Maryland . . . . . 90 I 120
— Arriège und Aude . . 90 II 413
— Aspe-Thal . . . . 92 II 307
— Balkanländer 1890 I *278*. 92 II *76*. 94 I 318
— Basse-Provence . . . 93 I 361
— Basses-Pyrénées . . 91 I 413
— böhm. Mittelgebirge . 93 II 531
— Böhmen . . . . 1893 I 129, 521
— Borneo . . . . . 90 II 415
— Bou Thaleb-Massiv, Constantine . . . . 94 I 489
— Brasilien . . . . . 92 I 134
— Californien . . . . 92 I 550
— Canada . . . . . 94 II 124
— Centralrussland . . . 92 I 549
— Chaberton . . . . 93 I 97
— Chartres . . . . . 94 I 489
— Corbières 1893 I 361. 1894 I 101. II 450
— Devizes . . . . . 94 II 320
— Drôme . . . . . 91 II 441
— erste Kette des Jura . 94 I 473
— Fischfauna, Skandinavien . . . . . 94 II 348
— Frankreich . . . . 92 II 307
— Friaul . . . . . 93 II 531
— Granada und Malaga 93 I 323
— Hannover . . . . . 90 II *97*
— Harz, Nordrand . . . . 90 I *177*
— Hemmoor in Hannover 92 II 111
— Herve . . . . . 93 I 128
— Hinterpommern . . . 91 I 300
— Japan . . . . . 91 II 172
— Jesso . . . . . 94 I 304
— jüngere, Schonen . . 91 I *209*
— Karpathen . . . . 93 II 150
— Karwendelgebirge . . 92 I 97
— Klein-Asien . . . . 93 II 365
— Kristianstad . . . . 90 II 300
— Leinethal . . . . BB VII *288*
— Lincolnshire . . . . 90 II 412
— Lyon . . . . . 92 I 131
— Maas . . . . . 94 I 146
— Madagaskar . . . . 90 I *4*
— Maestricht . . . . 90 I 310
— Malmö . . . . . 90 II 300
— Melitopol . . . . . 91 I 283
— mesozoische Ablagerungen Schwedens . . 90 II 300
— Mexico . . . . . 92 II 107
Kreide, mittlere, Karpathen . . . . 1893 II 140, 362
— Montagne de Lur . . 90 II 280
— Moulineaux . . . . 91 II 328
— Nord-Amerika . . . 90 I 446
— Nord-Frankreich . . 91 I 264
— — terrigener Ursprung 94 II 118
— Nord-Texas . . . . 90 I 441
— obere, Aquitanisches Becken. . . . . 94 I 490
— — Frankreich . . . 92 II 306
— — Harz . . . . . 90 I 307
— — Hesbaye . . . . 90 I 310
— — Tunis . . . . . 93 II 513
— — West-Suffolk u. Norfolk . . . . . 90 I 306
— Oldenburg in Holstein 91 II 327
— Oran . . . . . 91 II 443
— Persien . . . . . 92 I 133
— Pflanzen, Martha Vinegard . . . . . 93 II 568
— — Niederschöna . . 93 I 575
— Plateau von Arib . . 91 II 327
— Podolien . . . . . 94 I 145
— Provence . . . . . 91 II 442
— Pyrenäen . . . . . 92 I 549
— Raudnitz . . 1894 I 488. II 317
— Renaix . . . . . 92 II 438
— Sachsen . 1891 I 82. 92 I 96
— — Pillnitz . . . . 93 II 92
— — Stolpen . . . . 93 II 89
— Sacramento . . . . 93 II 387
— Schleswig-Holstein . . 92 II 436
— Schonen . . . . . 90 II 409
— Schweden . . . . . 90 II 410
— Seealpen . . . . . 92 II 302
— Shikoku . . . . . 93 I 554
— Siegsdorf in Oberbayern 92 II 108
— Staten Island . . . 94 II 139
— Süd-Russland . . . 94 I 354
— Südwesten v. Arkansas 90 II 301
— südwestl. Frankreich . 92 II 106
— Surrey . . . . . 90 II 165
— Syrien . 1891 II 127. 93 I 537
— Tektonik, Cambrai . 94 II 116
— Tetschen . . . . . 93 II 361
— Texas 1890 I 360, 448. II 305, 417. 92 II 283. 93 II 111. 94 I 116, 150
— Theiss . . . . . 93 II 363
— Tiaret und Frenda . 90 II 112
— Tiefseefacies, Hannover 90 II 409
— Torres-Vedras . . . 93 II 159
— Touraine . . . . . 92 I 134
— transkaspische Niederung . . . . . 92 II 276

Kreide, Tremiti-Inseln 1893 I 529
— Tunis . 1893 II 157. 94 I 173
— untere, Middle Rio Grande . . . . . 94 I 355
— — Montagne de Lure 90 II 278
— — Rhônemündung . . 91 II 326
— — Wardour . . . . . 94 I 146
— Venetianer Alpen 1893 II 555. 94 I 148
— Vereinigte Staaten . 90 I 445
— Vicentin . . . . . 94 I 156
— Ystad . . . . . 90 II 300
— Zaghouan . . . . . 93 II *32*
Kreidekalk, Mte. Maggiore 93 I *54*
— Peloponnes . . . . . 93 I 312
— Subiaco . . . . . 92 II 74
Kreittonit, Bodenmais . . 91 I 17
Krennerit, Nagyag. . . . 92 I 44
Krokoït, Synthese 1893 I 266. 94 II 230
Krokydolith . . . . . 91 I 6
— Cumberland . . . . 91 I 37
— Michigan . . . . . 94 I 59
Kryokonit . . . . . 91 II 61
— Grönland . . . . . BB VII *152*
Kryolith, Zwillinge . . 92 II 401
Kryptoperthit, Süd-Norwegen . . . . . 92 I 259
Krystall, Definition . . 93 I 455
— Projection auf eine andere als die normale Ebene . . . . . 93 I 455
Krystallanalyse . . . . . 93 I 459
Krystallberechnung . . . 94 I 429
Krystalle, flüssige . . . 91 II 5
Krystallform, Umdeutung auf niedere Symmetrie 93 I 455
— Zusammenhang mit der chemischen Zusammensetzung . . . . . 93 II 459
Krystallisation, sphärolithische . . . . . 93 I 297
— thermodynamisch behandelt . . . . . 91 I 369
— unter Druck . . . . . 91 I 60
Krystallisations-Erscheinungen feurig-flüssiger Magmen . . . . . 90 I 53
Krystallisations-Mikroskop 91 II 225
Krystallite . . . . . 93 II 459
Krystallkanten, Winkel in dünnen Schnitten . . 93 I 68
Krystallkörper, reguläre . 93 I 1
Krystallographie, geometrische 1892 II 207. 1893 I 227, 456. 94 I 430
Krystallrefractometer nach Abbe . . . BB VII *175*
— vereinfachte Form . 1892 I *209*
Krystallschliffe, Apparat zur Herstellung . . 91 II 401
Krystallstructur . . 1893 I 1. II 235
Krystallzeichnen . . . . 93 I 455
Küenlün, geologischer Aufbau . . . . . 93 I 319
Kügelchenchondrit, Misshof . . . . . 92 I *89*
Küsten des Atlantischen und Stillen Oceans, Veränderungen . . . 93 I 57
Küstenbildungen, Flysch, Schweiz . . . . . BB VIII *214*
Küstenformen, Rügen. . 94 II 41
Küstenströmung von der Pomündung gegen SSO. 93 II 50
Kugelbasalt, Californien . 94 II 268
Kugelgranit, Finnland . 94 I 75
Kugelpechstein, Sachsen, Tharandt . . . . . 94 II 282
Kugelporphyr, Jersey . . 92 I 68
— Sauerland . . BB VIII *615*, *634*
Kunthia . . . . . 90 II 156
Kupfer . . 1890 II 384 92 I 83
— elektrolytisch gebildete Krystalle . . . . . 90 I 230
— gediegen, Gouvernement Jeniseisk . . . 90 I 17
— Lake superior . . . 90 I 228
— Pseudomorphose nach Azurit . . . . . 93 I 460
— Pseudomorphosen nach Rothkupfererz . . . 90 I 206
— South Mountain . . 94 I 77
Kupferantimonglanz, Wolfsberg . . . . 92 II 409
Kupferbergbau in Siebenbürgen . . . . . 92 II 72
Kupfererze, Canada . . . 93 II 73
— Donetzgebiet . . . 94 I 470
— Granada . . . . . 93 II 73
— Huelva . . . . . 92 I 84
— Montaione, Provinz Florenz . . . . . 92 II 73
— Montecastelli, Provinz Pisa . . . . . 92 II 73
— Pitkäranta, Finnland. 94 I 470
— Russland . . . . . 93 II 61
— Zusammenstellung der wichtigsten Vorkommnisse . . . . . 94 II 61
Kupferglanz . . . . . 94 I *32*
— Leogang . . . . . 93 I 15

Kupferglanz mit Arsengehalt, Winnweiler, Pfalz 1890 I *99*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Turjinsk . . . . . 92 I 37
Kupferkies 1891 II 406. 94 I *34*
— British Columbia . . 90 II 384
— Chester Co. . . . . 94 I 18
— Cuba . . . . . 92 I 513
— Finnland . . . . . 94 I 470
— haarförmig u. gestrickt 93 II 258
— künstliche Darstellung 92 II 399
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Mies . . . . . 93 I 11
— Riviera di Levante . 93 I 278
— silberhaltig, Serbien . 90 II 75
— St. Lawrence Co. . . 93 I 256
— Süd-Norwegen . . . 92 I 238
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Toscana . . . . . 94 I 85
— Val di Susa . . . . 91 II 407
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
Kupferlagerstätten, Michigan . . . . . 94 I 471
Kupferlasur, Donetzgebiet 94 II 414
— Mies . . . . . 93 I 12
— Südwest-Afrika . . . 90 I *109*
Kupferminen von Boléo . 93 II 73
Kupferpecherz, Südwest-Afrika . . . . . 90 I *108*
Kupferschlacken, Farbenerscheinungen . . . 90 II 242
Kupfersulfat, specifisches Gewicht . . . . . 90 I 203
Kupfervitriol . . . . . 91 II 20
Kupferwismutherz, künstliche Darstellung . . 92 II 399
Kupferwismuthglanz, künstliche Darstellung 92 II 398
Kurremöllagruppe, mesozoische Ablagerungen Schwedens . . . . 90 II 297
Kurtodon . . . . . 92 II 340
Kurtodontidae . . . . . 92 II 344
Kvetnica-Schichten, Tischnowitz . . . . . 93 I 120
Kylindrit, Bolivia . . . 93 II *125*

L.

Labiatus-Stufe, Böhmen . 93 I 521
Labradorfels, Norwegen BB VIII *489*
— Russland . . . . BB VIII *490*
— Sinnithal, Basilicata . 93 I 279
Labradorit als faseriger Saum . . . . . 94 I 78
Labradorit Martinique 1892 I 318
— Verbreitung in Labrador . . . . . BB VIII *475*
— Volhynien . . . . . 90 I 81
Labradorporphyr, Elsässer Belchen . . . . . 93 I 488
— Insel Hochland . . . 92 I 76
Labradorporphyrit, Siebenbürgisches Erzgebirge 94 I 292
Labyrinthodonten, Muschelkalk, Oberschlesien . 94 I 379
— Schwäbische Trias . . 91 II 158
Laccolithe, Montana . . 94 II 88
Lacuna macromphalus . 91 II 463
— scalariformis . . . . 91 II 463
— stilpna . . . . . 93 II 554
Lacunoptyxis . . . . . 90 II 151
Lacunosa-Gruppe der Rhynchonellen . . . 91 I 162
Laekenien . . . . . 93 I 524
Laelaps incrassatus . . . 93 I 165
Längen- und Breitenmessungen, Nordamerika . 91 I 246
Laetia transversonervis . 93 II 434
Laevidentalium . . . . 90 II 151
Lafayette-Formation . . 93 II 535
Laganidae . . . . . 92 II 163
Laganum decagonale . . 94 I 519
— Kamaranense . . . 90 I 171
Lagena bicornuta . . . 94 II 368
— compressa . . . . . 94 II 368
— costulata . . . . . 94 II 368
— Gottschei . . . . . 91 II 175
— incerta . . . . . 94 II 476
— tortilis . . . . . 94 II 368
— tubulifera . . . . . 94 II 368
— ungula . . . . . 94 II 368
Lageniden, Pliocän, Calabrien . . . . . 94 II 184
Lagergang, Remigiusberg 93 I *134*
Lagodiopsis . . . . . 90 I 169
Lagopterus, Argentinien 93 I 545
Lamellibranchiata, Bolivien BB VIII *42*
— Devon, England . . . 94 II 172
— Hercyn, Nordamerika . 93 I 118
— Miocän . . . . . 93 II 200
— Rheinisches Unterdevon 91 II 183
— Tiefsee . . . . . 93 II 305
— Untersilur, Minnesota 93 I 116
Lampodaster Grandidieri 91 I 434
Lamprite, Heraletz . . 93 II 266
Lamprophyr, Cross Fell Julier . . . . . 93 I 96
— dioritischer, Tirol . . 90 I *79*
— Grossenhain . . . . . 93 I 94

Lamprophyr, Meissen . 1891 I 80
— Nord-England . . . 93 I 289
— Pfalz . . . . . 93 II 328
— Plauen'scher Grund bei Dresden . . . . . 91 II 62
— Spessart . . . . . 91 II 71
— Tetschen . . . . . 93 II 360
Lanarkit, Schottland . . . 91 II 17
Landeis, Bewegung . . . 92 II 65
Landénien . . . . . 92 II 307
— Belgien . . . . . 93 I 523
— Mosel . . . . . 91 II 130
— Nord-Frankreich . . 94 I 356
— oberes, Frankreich . . 91 I 307
Landlöss, Elsass . . . . 91 I 131
Landscap-Marble, Bristol 93 I 287
Landschneckenfauna, Mte. Gargano . . . . . 93 I 531
Landthiere, Entstehung . 93 II 176
Längbanit . . 1893 I 471, 473, 474
— Långbangrube . . . 94 II 236
— Sjögrube . . . . . 90 I 232
Langhien . . . . . 94 II *295*
Langhino . . . . . 92 II 313
Langonin . . . . . 94 II 328
Lanistes noricus . . . 91 II 444
Lansfordit . . . . . 93 II 19
Lapisinische Seen, Entstehung . . . . . 93 I 483
Laramie-Formation, Amerika . . . . . 93 II 173
— Colorado . . . . . 94 I 495
— Wyoming . . . . . 94 II 322
Laramie-Gruppe, Flora 1890 I 278. 93 II 219
Laramie-Schichten . . . 91 I 415
Lasiothrix . . . . . 92 I 459
Lasurstein . . . . . 92 I 28
Lasurit, Hirscheggalp, Steyermark . . . . 90 II 17
Lateralsecretion, Bildung von Silbergängen . . 91 I 101
Lateralsecretions-Theorie und ihre Bedeutung für das Přibramer Ganggebiet . . . . . 90 II 233
Laterit, Borneo 1891 I 282. II 102
— Entstehung . . . . 91 II 306
— Malabar . . . . . 94 II 297
Lateritbildung . . . . 90 II *196*
Latimaeandra Amedei . 90 II 336
— brevivallis . . . . 90 II 336
— contorta . . . . . 90 II 336
— curtata . . . . . 90 II 336
— Davidsoni . . . . . 90 II 336
— Fringeliana . . . . 90 II 336
Latimaeandra Germaini 1890 II 336
— Goldfussi . . . . . 90 II 336
— Greppini . . . . . 90 II 336
— Gresslyi . . . . . 90 II 336
— Heimi . . . . . 90 II 336
— lotharingica . . . . . 90 II 336
— rastelliniformis . . . 90 II 336
Latirius elatus . . . . . 91 II 180
Latirofusus . . . . . 90 II 152
Latirulus . . . . . 90 II 152
Lattorfon . . . . . 94 II 327
Laubeocrinus . . . . . 93 II 518
Laumontit . . . . . 90 I *132*
— Floite, Tyrol . . . . 91 I 215
— in Dacit, Kis-Sebes . 90 I 397
— in Granit, Ortasee . 94 I 447
— Neu-Süd-Wales . . . . 90 II 207
— Rezbanya . . . . . 90 I 396
— Toroczkó . . . . . 90 I 397
Laurdalite, Südnorwegen 92 I 297
Laurentian . . . . . 93 II 516
— Canada BB VIII *419*. 1891 II 89, 311. 94 II 267
— Lappland . . . . . 93 II 108
Laurillardia Munieri . . 92 II 148
— Parisiensis . . . . 92 II 148
Laurineen, Ursprung . . 91 II 381
Laurinium . . . . . 92 I 614
Laurinoxylon Branneri . 92 II 468
— Lesquereuxiana . . . 92 II 469
Lauriphyllum actinodaphnoides . . . . . 93 II 434
— Gaudini 1893 II 565. 94 I 227
Laurus biseriata . . . 93 II 429
— persoides . . . . . 93 II 429
— triseriata . . . . . 93 II 429
Laurvikite, Südnorwegen 92 I 297
Lausitzgranit, Königswartha . . . . . 93 II 94
— Pillnitz . . . . . 93 II 92
Lautarit, Chile . . . . 93 I 262
Laven . . . . . 90 I 417
— antike und moderne, Vulcano . . . . . 93 II 52
— Californien . . . . 93 II 338
— submarine, Lennegebiet BB VIII *623*
Låvenit in Phonolith, Haute-Loire . . . . 92 II 216
— Südnorwegen . . . 92 I 250
Lavignon . . . . . 93 II 158
Leadhillit, optisches Verhalten . . . . . BB VII *2*
— Sardinien . . . . . 91 II 29
— Schottland . . . . 91 II 16
Lebina relicta . . . . 91 II 356

Lecythis neriifolia . . 1893 II 434
Leda, Bolivien . . . BB VIII *45*
— curvirostris . . . . 93 II 200
— Harveyi . . . . . 94 I 370
— mira . . . . . 91 II *104*
— subelliptica . . . . 90 I 114
— subrostrata . . . . 93 II 200
— Tirolensis . . . . . 90 I 107
Leda-Thon, Canada . . . 93 I 435
Ledien . . . . . 93 I 524
Leedsichthys . . . . . 91 II 455
Leguminosae . . . . . 91 I 343
Leguminosites capaiferaeoides . . . . . 93 II 434
— cretaceus . . . . . 93 I 576
— erythroides . . . . 93 II 434
— Tobischi . . . . . 93 II 433
Lehm, mikroskopische Untersuchung . . . . 92 I 77
Lehmwüste . . . . . 92 I 60
Leiocidaris bellula . . . 93 II 209
— Hilsii . . . . . 93 II 421
— tumidula . . . . . 93 II 209
Leiodermarien 1891 II 384. 94 I 397
Leiosoma . . . . . 90 I 171
— Gourdoni . . . . . 91 II 368
Leithakalk, Brünn . . . 93 I 525
— Rumänien. . . . . 94 I *157*
Lejeunia . . . . . 92 II 378
Lekythoglena ampullacea 90 I 169
— effigurata . . . . . 90 I 169
Lemminge und andere Nager, Themsethal . 91 II 340
Lemuren, Europäisches Tertiär . . . . . 91 II 146
Lenneporphyr, Westfalen BB VIII *535*
Lepas aquitanica, Miocän, Bordeaux . . . . . 90 II 330
— Orbignyi, Miocän, Bordeaux . . . . . 90 II 330
Leperditia . . 1892 II 359, 360, 372
— aequilatera . . . . . 94 II 164
— appressa . . . . . 92 II 458
— baltica. 1890 II *255*. 92 II 360
— Claypolei . . . . . 91 I 335
— conspersa . . . . . 92 II 359
— dorsicornis . . . . 94 II 164
— Eichwaldi. . . . . 92 II 360
— fimbriata . . . . . 94 II 164
— frontalis . . . . . 91 II 461
— germana . . . . . 94 II 164
— granilabiata . . . . 94 II 164
— gregaria . . . . . 92 II 359
— hudsonica . . . . . 91 I 335
— inflata . . . . . 94 II 164
— Keyserlingi . . . . . 92 II 360
Leperditia Linneyi . . 1892 II 458
— millepunctata . . . . 94 II 164
— mundula . . . . . 94 II 164
— Nicklesi . . . . . 92 II 459
— Okeni . . . . . 92 II 360
— pennsylvanica . . . . 91 I 335
— phaseolus . . . . . 92 II 360
— Seneca . . . . . 91 I 335
— sinuata . . . . . 91 I 335
— subrotunda . . . . . 92 II 458
— timanica . . . . . 94 I 123
— tumida . . . . . 94 II 164
— tumidula . . . . . 92 II 458
Lepidocyclina . . . . . 92 II 374
Lepidodendreen . . . . 93 I 206
— Carbon. . . . . 94 II 186
Lepidodendron aculeatum 90 I 173
— Bolivien . . . . . BB VIII *85*
— confluens . . . . . 90 I 173
— dilatum . . . . . 94 I 219
— frondosum . . . . . 90 I 173
— Gaudryi . . . . . 93 I 206
— mundum . . . . . 94 II 187
— parvulum . . . . . 94 II 187
— pulvinatum . . . . . 93 II 424
— Rothliegendes . . . . 90 I 173
— Spenceri . . . . . 94 II 187
— tetragonum . . . . . 92 I 196
— Veltheimianum 1891 II 204. 92 I 197
— Wortheni . . . . . 90 I 173
Lepidolith, Formel . . . . 93 I 476
— Japan . . . . . 94 II 240
— Süd-Californien . . . 94 I 43
Lepidopteren im Bernstein 92 II 459
Lepidopterus crassus . . 94 I 373
Lepidosaurier, Eintheilung 94 I 512
Lepidosteus . . . . . 93 II 547
— suessoniense . . . . 93 II 194
Lepidostrobus brevi-quammatus . . . . 94 I 219
— Fischeri . . . . . 93 I 206
— Gaudryi . . . . . 93 I 206
— Meunieri . . . . . 93 I 206
Lepidotus Lennieri. . . 94 II 465
— maximus . . . . . 92 I 420
— sibiricus . . . . . 93 II 194
— unguiculatus . . . . 93 II 546
Leporina . . . . . 90 II 430
Lepralia Bericensis. . . 94 I 519
— Lonsdalei . . . . . 94 I 202
— Lotensis . . . . . 94 I 519
Leptaena dilatata . . . BB VIII *662*
Leptaena-Kalk . . . . . 91 II 193
— Dalarne 1893 I 116. 94 I 476. 94 II 98

Leptaena-Kalk, Kiel . 1893 II *136*
— Ostsee . . . . . 94 I *109*
Leptaenisca . . . . . 91 II 465
Leptauchenia . . . . . 93 II 397
Leptechinus . . . . . 93 I 561
Leptella . . . . . 93 II 206
Leptochirus . . . . . 92 II 457
Leptochlorite . . . 1892 II 228, 230
Leptocladus . . . . . 92 II 340
Leptocoelia flabellites. BB VIII *60*
Leptomeria Benthami . . 94 I 532
— tenuissima . . . . 94 I 532
Leptomyrmex Maravignae 94 II 469
Leptophyllia . . . . . 90 II 337
Leptoplastus . . . . . 94 II 300
— Cambrium. . . . . 91 II 459
— latus . . . . . 94 II 352
Leptotragulus . . . . 93 I 152
Leptynit, Centralplateau, Frankreich . . . . 93 I 299
— granatführend, Colombo 93 I 501
Lepus, Montousé . . . . 93 I 539
Leskiidae . . . . . 92 II 165
Lesleya simplicinervis. . 94 I 220
Lesleyit, Nord-Argentinien BB VIII *343*
Lettenkohle, Fuetzen . . 92 II 103
— Göttingen. . . . . 90 I 299
Lettenkohlen-Gruppe, Schaben . . . . . 91 II 159
— Mosbach, Neckarthal . 94 I 342
Lettsomit . . . . . 93 II 461
Leucandra, Kalkschwamm, Mittlerer Lias, Northamptonshire . . . . . 90 II 165
Leuchtenbergit . . . . . 92 II 222
— Constitution . . . . . 94 I 441
— Einwirkung von HCl 94 I 28
Leucit, Constitution . . 94 I 261
— in Plagioklasbasalt, Mont Dore . . . . . 92 II 261
— Mont Dore . . . . . 93 II 265
— Mt. Vulture . . . . BB VII *596*
— optische Anomalien BB VII *1*
— Synthese 1893 I 266. 94 I 12
— Vesuvlava BB VII *418*, *422*, *427*
Leucitbasalt, Altenberg . 93 I 93
— Neu-Süd-Wales . . . 92 I 316
Leucitbasanit 1892 II *156*. 93 II 330
— Kilimandscharo . . . 91 II 89
Leucitgesteine, Brasilien 92 II *141*
— Klein-Asien . . . . 91 I 267
— Tunguska . . . . . 91 II *224*
Leucitophyr . . . . . 93 II 491
— Laacher See . . . . 91 II 68
— Serra de Tingua . . 92 II *146*
Leucit-Orthoklas-Gesteine, Brasilien . . . . . 1892 II *146*
Leucitphonolith . . . . 93 II 487
— Laacher See . . . . . 92 II 414
Leucitphonolith-Bimsteine 92 II 414
Leucitphonolith-Tuffe . . 92 II 414
Leucit-Plagioklas-Gesteine in Brasilien . . . . 92 II *150*
Leucit-Pseudokrystalle 1892 II *146*, *158*
— im Phonolith, Brasilien 90 I *166*
Leucit-Tephrit, Brasilien. 92 II *151*
— Giessen . . . . . 92 I 95
— Kleinasien . . . . 92 II 267
— thyrrhenischer Vulcane 91 I 271
Leucit-Tinguait . . . . . 93 II 344
Leucitit, Insel Rachgoun 90 II 405
— Kleinasien . . . . . 92 II 267
— Serra de Caldas 1892 II *148*, *156*
Leucititfuff . . . . . 92 II *157*
Leucocyclit . . . 1892 II *176*, *204*
Leuconia elegans . . . . 94 II 356
Leukophan, Südnorwegen 92 I 247
Leukophyllit . . . . . 92 II 289
Leverrierit . . . . . 92 I 512
— neuer Phyllit . . . 90 II 37
Leythakalk, Siebenbürgen 90 II 115
Lherzolith, Baldissaro . 92 II 253
— im Contact mit Liaskalk, Ariège . . 1894 I 73, 299
— in Basalt, Marburg . 91 II *200*
— Maryland . . . . . 91 II 92
— Mt. Diablo . . . . . 93 I 99
— Toscana . . . . . 92 I 288
Lias, Allgäu . . . . . 93 II 379
— Alpen . . . . . 92 II 362
— Alpen und Schwaben. 94 I 483
— Alpenkette . . . . . 90 I 117
— argentinische Cordillere 1893 I 104, 124
— Banat . . . . . 92 I 357
— Bornholm . . . . . 93 I 143
— Chile . . . . . 94 II *91*
— Cosenza 1893 II 528. 94 II 312
— Deutsch-Lothringen . 94 I 344
— Dorsetshire . . . . 93 I 518
— Elsass . . . . . 92 II 88
— Fauna . . . . . 92 II 363
— Fischfauna, Vassy . . 94 II 348
— Gozzano . . . . . 94 II 460
— Helmstedt. . . . . 94 II 340
— Herford in Westfalen 90 I 115
— Jupilles, Dep. d. Sarthe 90 I 117
— Karpathische Klippen 93 II 148
— Kaukasus . . . . . 93 II 383
— Leicestershire . . . . 91 II 320

Lias, Leinethal . . . BB VII *266*
— Ligurien . . . . 1893 II 539
— Madagascar . . . . 90 I *3*
— Marseille . . . . . 91 I 159
— mittlerer, Dobbertin . 92 I *166*
— Montagne de Lure . 90 II 280
— Monte di Canino . . 90 I 119
— Mt. San Giuliano . . 94 II 341
— Norddeutschland . . 93 I 345
— oberer, Centralappenin 94 I 346
— — in den bayerischen Alpen . . . . . 92 II *86*
— Oestringen . . . . 92 II 153
— Rgotina . . . . . 90 I 440
— Seealpen . . . . . 92 II 301
— Sicilien . . . . . 93 II 527
— St.-Béant . . . . . 93 I 122
— Steierdorf-Anina . . 93 I 122
— Taormina . . . . . 93 I 305
— Timor und Rotti 1894 I 144, 331
— unterer, Lombardei . 90 I 438
— — Saltrio . . . . . 92 I 560
— Valle di Bolognola . 93 I 346
— Vierwaldstätter See . 90 II *110*
— Westalpen 1892 II 93. 94 I 314
Liasbreccie, Südtyrol . . 94 I 485
Libitina . . . . . 93 II 158
Libys Polypterus . . . 91 II 351
— superbus . . . . . 91 II 351
Libytherium maurusium, Pleistocän, Oran . . 93 I 544
Licaphrium arenarum . . 93 I 388
Lichas Héberti . . . . 94 I 188
— hirsuta . . . . . 90 II 328
— illaeniformis . . . . 90 I 150
— nasuta . . . . . 90 I 150
— palmata, Australien . 90 II 328
— Ribeiroi . . . . . 94 I 188
— sinuata, Australien . 90 II 327
Lichtbrechung, Mittel zur Bestimmung der Mineralien . . . . . 94 II 49
Lichtdrucktechnik . . . 90 II 390
Lichttheorie . . . 1893 II 4, 458
Liebeneritporphyr, Tirol . 90 I *75*
Liëvrit, Herbornseelbach, Nassau . . . . . 90 I *31*
Lignit . . . . . 1894 I 112, 114
— Arkansas . . . . . 92 II 468
— Florenz . . . . . 94 II 128
— Gouvernement Irkutsk 94 I 327
— Potomac-Formation . 93 II 218
— Steinheim . . . . . 93 II 326
— Zovencedo . . . . 94 I 493
Lignitformation, Languedoc . . . . . 90 II 113
Ligurien . 1890 I 312. 94 I 363
— Aegypten . . . . . 94 II 327
— Piemont . . . . . 90 II 312
Lillia . . . . . 92 I 614
— Kialagvikensis . . . 92 II 155
Lima . . . . . 93 II 382
— acuta . . . . . 94 II 111
— Baliana . . . . . 93 II 136
— Bassaniana . . . . 90 I 114
— Böttgeri . . . . . 92 II *160*
— brignolensis . . . . 91 I 159
— caucasica . . . . . 93 II 382
— elytracea . . . . . 94 I 171
— Kobyi . . . . . 93 I 381
— lirata . . . . . 91 I 159
— mysica . . . . . 93 II 136
— nuda . . . . . 90 I 114
— oolithica . . . . . 91 I 159
— ponderosa . . . . . 91 II 177
— Targioni . . . . . 90 II 153
— tenuitesta . . . . . 93 I 537
— triangula . . . . . 94 I 388
— undata . . . . . 93 I 537
Limatula Böttgeri . 1891 I 20, 431
— rhenana . . . . . 91 I 119
Limbata-Kalk, Bottnisches Meer . . . . . 94 II 98
Limburgit, Afrika . . . 92 II 426
— Armenien . . . . . 92 II 267
— Bendigo . . . . . 94 II 271
— Cassel . . . . . 92 I 277
— centraler Balkan . . 90 I *269*
— Eifel . . . . . 92 II 415
— Giessen . . . . . 92 I 95
— Hessen . . . . . 91 II 278
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Madagascar . . . . 90 II 96
— Umgebung d. Habichtswaldes . . . . . 90 II 245
Limea circularis . . . 93 I 182
Limerickit . . . . . 91 I 45
Limnaea Böttgeri . . . 94 II 356
— croatica . . . . . 91 II 131
— extensa . . . . . 91 II 131
— Tournouëri . . . . 94 II 356
Limnaeiden . . . . . 93 II 417
Limnaeus Hoffmanni . . 91 II 444
Limnocardien . . . . 93 II 417
Limnocyon vetus . . . 91 II 148
Limnofelis ferox . . . 91 II 148
Limnohyops . . . . . 92 II 142
Limon supérieur, Nord-Frankreich . . . . 94 II 457
Limonit, Mies . . . . 93 I 11
— New York . . . . . 92 II 75
— östliches Finnland . . 93 II 106

Limonit, pseudomorph nach Pyrit, Rockbridge Co., Virginia . . . . 1890 II *199*
— Pseudomorphosen nach Eisenkies . . . . . 90 I 221
— Texas . . . . . 92 II 18
Limonius impunctus . . 93 II 548
Limopsis lamellata. . . 93 II 200
— Mülleri. . . . . 93 I 182
Limoptera . . . . . 93 I 403
Limopteraschiefer, Nassau 90 I 293
Linarit . . . . . 91 I 233
— Bisch-Tscheku . . . 93 I 40
— Schottland . . . . 91 II 17
— Semipalatinsk . . . 94 I 55
Lindströmella . . . . 93 II 204
Linearia valfinensis . . 91 II 176
Linearprojection. . . . 93 I 456
Lingula . . . . . 92 I 590
— attenuata . . . . BB VIII *7*
— Christomani . . . . 93 II 526
— Coheni . . . . . BB VIII *82*
— Gornensis . . . . . 90 I 115
— Münsteri . . . . BB VIII *7*
— Suessi . . . . . 90 II 154
Lingulosmilia . . . . 90 II 339
Linosa, vulcanischer Ursprung . . . . . 93 I 497
Linthia arthonensis . . 93 I 414
— Hovelacquei . . . . 91 II 368
— Laubei . . . . . 93 II 208
— Payeni . . . . . 93 I 559
— Poblae . . . . . 91 II 368
— tumidula . . . . . 93 II 209
Liodon compressidens . . 94 II 347
Liopatagus . . . . . 90 I 361
Lipari . . . . . 92 II 50
— Thätigkeit 1888, 1889 92 II 259
Liparit, Almeria . . . 90 II 268
— Appennin . . . . . 91 I 272
— Cabo de Gata 1892 II 423. 93 I 282
— Cap Matifou. . . . 90 II 404
— Charput . . . . . 90 I 82
— Chenoua . . . . . 90 II 404
— Cypern. . . . 1893 II 59, 79
— Island . . . . . 93 I 498
— Kars . . . . . 90 I 82
— L'Edough. . . . . 90 II 404
— Vicentin . . . . . 94 I 160
— Zurich-el-Affroun . . 90 II 404
Liparitgläser. . . . . 91 I 282
Liparitschmelze . . . . 93 II *47*
Lippmann'sches Gesetz BB VII *229*. VIII *407*
Listriodon . . . . . 92 I 159
Listriodon splendens . 1892 II 332
Listvjanit, Ural . . . . 94 I 86
Litchfieldit . . . . . 93 I 503
Lithion-Eisenglimmer . . 90 II 37
Lithionglimmer, Synthese 90 II 35
— Tröstau . . . . . 92 II *41*
Lithionturmalin . . . . 90 II 202
Lithiotis problematica 1891 I 433. 1892 II 364. 93 II 200
Lithistidae 1890 II 163. 1891 II 197. 93 II 211
Lithiumglimmer . . . . 90 I 225
Lithiumsulfat. . . . . 92 II *66*
Lithocampe fusiformis . 94 I 526
Lithocyclia discus . . . 93 II 423
— exilis . . . . . 94 I 525
Lithodendron, Arizona . 90 I 179
Lithodomus cuneiformis . 91 I 159
— dactylus . . . . . 94 II 359
— isilensis . . . . . 94 II 357
— valfinensis . . . . 91 II 177
Lithographischer Kalk, Benevent . . . . . 94 II 122
Lithoidit, Obsidian Cliff . 93 I 297
Lithomylacris . . . . 91 II 357
Lithophaga platensis . . 94 I 370
Lithophysen in Obsidian von Lipari . . . . 94 I 293
Lithoseris . . . . . 90 II 337
Lithostrotion . . . . . 90 I 474
— campanulatum . . . 94 I 171
— ramosum . . . . . 94 I 171
— recurvum . . . . . 94 I 171
Lithothamniscum amphiroaeformis . . . . 93 I 578
— racemus . . . . . 93 I 578
— suganum . . . . . 93 I 578
Lithothamnium cenomanicum . . . . . 93 I 578
— gosaviense . . . . 93 I 578
— Magnesiagehalt . . . 94 I *271*
— Mte. Maggiore . . . 93 I *60*
— nummuliticum . . . 93 I 578
— suganum . . . . . 93 I 578
— turonicum. . . . . 93 I 578
Lithothamnium-Facies, Peloponnes . . . . 93 I 317
Lithothamnium-Knollen . 92 II 315
Litorina praepontica . . 90 II 121
Lituiten 1892 I 428, 430, 431, 433
Lituites, discors. . . . 93 II 417
— Mündung . . . . . 93 II 416
— praecurrens . . . . 93 II 417
Lituitidae 1891 II 360. 92 I 433
— Obersilur, Gotland . 91 II 358
Lituolides, Jura, Schweiz 94 II 364

Livistona macrophylla 1892 II 377. 94 I 230
Lizard-Serpentin . . . 94 II 260
Llicteria . . . . . 93 II *118*
Lobites . . . . . 90 II 149
Localmoränen, Rheinthal 94 I 366
Lochseiten-Kalk, Schweiz 94 I 294
Löllingit . . . . . 94 II 239
— Südnorwegen . . . 92 I 238
Löslichkeit der Mineralien 92 I 503
— verschied. Substanzen in Meereswasser 1890 II 188. 91 I 62
Löss 1890 I 261. II *194*. 93 II 500, 502, 504. 94 II 333
— Alter desselben . . . 91 I 311
— Argentinien . . . . 91 II 134
— badisches Oberland . 94 I 365
— bayerische Pfalz . . 90 II 425
— Canton Bern . . . 91 II 139
— Chiemsee . . . . . 90 II 313
— Conchylienfauna . . 94 II 134
— Eintheilung . . . . 91 I *104*
— Freiburg i. Br. . . . 92 II 124
— Heidelberg . . . . 94 II 419
— Iowa . . . . . 90 II 423
— Lüttich . . . . . 91 II 447
— Mähren . . . . . 94 I 155
— Magdeburg . . . . . 91 II 446
— Mainthal bei Hanau . 94 I 497
— Norddeutschland . . 91 I 130
— Nordschweiz u. Baden 94 I 367
— Rheinthal 1890 II *92*. 91 I 421
— Rumänien . . . . . 94 I *114*
— Saltrange . . . . . 93 II 112
— Schichtenfolge i. Grossherzogthum Hessen . 91 I *105*
— Schweiz . . . . . 90 II 129
— Spessart . . . . . 94 I 310
— Süd-Russland . . . 94 I 368
— Sundgau . . . . . 94 I 312
— Turkestan . . . . 93 I 137
— Wolhynien . . . . 94 I 325
Lösslehm, Kasan . . . 94 I 322
Lössperiode, Central-Europa . . . . . 90 II 424
Lösungsflächen am Augit 92 I 505
Lösungsgenossen, Einfluss derselben auf die Bildung von Calciumcarbonat . . . . . 94 II 5
Lösungsgeschwindigkeit . 92 I 221
Lösungsoberfläche . . . 92 I 219
Lösungswiderstand . . . 92 I 220
— der Krystalle . . . 92 II 236
Löthrohrbeschläge . . . 94 II 9
Loganit . . . . . 1892 II 231
Logan Sills, Lake Superior 94 II 267
Loliginites Zitteli . . . 90 I 469
Lomatophloios crassilepis 93 I 206
— macrolepidotus . . . 92 II 466
Lonchodomas . . . . . 94 I 189
Londinien, Appenzell . . 91 I 123
Lonsdaleia . . . . . 94 II 184
Lophiodon . . . . . 93 I 155
— annectens . . . . . 93 I 148
— buxovillanus . . . . 93 I 148
— Cartieri . . . . . 93 I 148
— isselensis . . . . . 93 I 148
— medius . . . . . 93 I 148
— parisiensis . . . . . 93 I 148
— rhinocerodes . . . . 93 I 148
— tapiroides . . . . . 93 I 148
Lophiodontidae . . . . . 90 II 318
Lophiotherium cervulus . 93 I 148
— elegans . . . . . 93 I 148
Lophocolea . . . . . 92 II 378
Lopholepis foveolata . . 90 I 166
Lophophyllum turanicum 94 I 171
Loranthaceen . . . . . 91 I 343
Loricula canadensis . . 91 I 159
Lothungen zur Tiefseeforschung . . . . . 93 II 284
Loukasteine, zwischen Ruditz und Ollomutschan 94 I 435
Lower Calcareous Grit, Yorkshire, Bildung durch Spongien . . . 91 II 370
Loxodon . . . . . 92 II 335
Loxomylus angustidens . 93 II 185
Loxonema . 1890 II 151. 92 II *29*
— acutissima . . . . . 90 I 114
— aequale . . . . . 94 II 142
— binodosa . . . . . 90 I 108
— Bolivien . . . . . BB VIII *39*
— brevis . . . . . 90 I 114
— lineatum . . . . . 94 II 142
— naticoides . . . . . 91 I 406
— oblique-arcuatum . . 90 II *238*
— pygmaeum . . . . . 91 I 406
— pyrgula . . . . . 94 II 142
— Stoppaniana . . . . . 90 I 114
Loxopteria . . . . . 93 I 403
Lucasit, Varietät des Vermiculit . . . . . 90 I 225
Luciit, Melibocus . . . . 94 I 290
Lucina . . 1893 I 537. 94 II 329
— aquensis . . . . . 93 I 182
— argentina . . . . . 93 I 126
— Girardoti . . . . . 91 II 176
— Gornensis . . . . . 90 I 115
— laevigata . . . . . 93 I 381

Lucina percancellata . 1893 I 538
— peronaiensis . . . . 91 II 175
— Perrandoi . . . . . 94 I 388
— pseudo-nivea . . . . 90 II 121
— rhomboidalis . . . . 93 I 381
— Sallomacensis . . . 90 I 158
— subalpina . . . . . 90 I 157
— symmetrica . . . . 94 I 370
Ludwigit, Banat . . . 91 I 44
Lumachellen, Muschelkalk, Jena . . . . . 91 I 296
Lunensis, Spezzia . . . 90 II 297
Lunulites patelliformis . 90 I 168
— salebrosa . . . . . 90 I 168
— sella . . . . . 90 I 168
— transiens . . . . . 94 I 202
Lupus japonicus . . . 90 II *51*
— pallipes . . . . . 90 II *50*
— vulgaris . . . . . 90 II *50*
Lurchfische . . . . . 90 I 349
Lussatit, neue Form von Kieselsäure . . . . 91 I 212
Lutecit . . . 1891 I 207. 94 I *26*
— faserige Structur . . 94 I 254
— Modification der Kieselsäure . . . . . 90 II 306
Lutra hessica . . . . 91 I 423
Lutraria Graeffei . . . 90 II 332
— Paeteli . . . . . 90 II 332
Luzonit, Argentinien . . 93 I 23
Lycopodiaceae . . . . 93 I 425
Lycopodien, Carbon . . 91 II 204
Lycopodineen . . . . . 93 I 574
Lycorus nemesianus . . 90 II *48*
Lyctoceras . . . . . 91 II 360
Lyginodendron . . . . 90 I 172
— Oldhamium . . . . 94 II 369
Lygodites spatulatus . . 91 I 444
Lykopodin, salzsaures, optische Anomalie . BB VII *5*
Lynx, Montousé . . . . 93 I 539
Lyria . . . . . 91 I 432
Lyssacina, Malm, Krakau 90 II 342
Lystrosaurus . . . . . 91 II 343
Lytoceras . . . . . 93 II 197
— apertum . . . . . 94 II 356
— Depéreti . . . . . 93 II 551
— fimbriatum . . . . 90 I *2*
— Fuggeri . . . . . 94 II 356
— oblique strangulatum . 90 II 286
— ovimontanum . . . . 94 II 356
— stephanense . . . . 93 II 551
— Sutneri . . . . . 94 II 356
Lytoloma cantabrigiensis 91 I 151

M.

Maar, Randeck, schwäbische Alp . . . . 1890 II 256
Maare, Eifel . . . . . 93 I 82
Macacus tolosanus . . . 92 II 450
— trarensis, Algier . . 93 I 540
Macellognathus . . . . 93 I 547
Machaeracanthus . . . 93 I 175
— sulcatus . . . . . 93 I 175
Machairodus 1892 II 141. 93 II 183
— crenatidens . . . . 91 I 423
— cultridens . . . . . 91 I 423
— Nestianus . . . . . 91 I 424
— orientalis . . . . . 90 I 341
Macignosandsteine, Vellano 93 II 56
Macignoschiefer, Elba . . 94 I *100*
Maclurea . . . . . 90 II 147
Macrauchenia . . . . 92 I 569
Macraucheniidae . . . 90 II 317
Macrocephalites macrocephalus . . . . . 90 I *2*
— Herveyi . . . . . 90 I *2*
Macrocheilus . . . . . 90 II 151
Macrochilina aperta . . 93 II 521
— Comottii . . . . . 90 I 114
Macrocypris concinna . . 94 II 165
— subcylindrica . . . 91 II 461
Macrodon . . . . . 94 II *215*
— subalpinum . . . . . 90 I 114
— Taramellii . . . . 90 I 114
Macromerium Gümbeli . 93 II 407
— scoticum . . . . . 92 I 164
Macropetalichthys . . . 93 I 175
Macropneustes compressus, Czereczeler Schlier . 90 II 116
— decipiens . . . . . 94 I 519
— integer . . . . . 93 II 209
— Trutati . . . . . 91 II 368
Macroscaphites . . . . 93 II 197
Macrostachia crassicaulis 93 I 204
— egregia . . . . . 93 I 204
Macrotaeniopteris marginata . . . . . 93 II 563
Macrotherium . . . . 94 II 345
Mactra bonariensis . . . 94 I 370
— Forbesi . . . . . 91 I 128
— olivensis . . . . . 93 I 538
Mactra-Kalkstein, Eupatorisches Plateau . . . 90 II 123
Madrepora cribripora . . 90 I 369
Madreporaria perforata . 93 I 418
Maeandraraea . . . . . 90 II 338
Maeandrograptus Schmalenseei . . . . . 93 I 200
Maeandrostylis irregularis 93 I 19

Maeotidia bucculenta . 1890 II 121
Maeotische Stufe, Krim . 90 II 123
— Melitopol . . . . . 91 I 284
Maestrichtensis . . . . . 93 II 422
Magmen, gesättigte und ungesättigte . . . . . 93 II 485
Magnesia-Eisenglimmer, Synthese . . . . . 90 II 36
Magnesiaglimmer, Synthese 92 I 90
Magnesian sandstone group, Saltrange . . . . . 93 II 116
Magnesioferrit . . . . . 93 II 246
Magnesit, Steiermark . . 90 II 17
— Texas, Baltimore Co. 90 II 229
— Wärmeleitung . . . . 94 I 5
Magnesium . . . . . 94 I 8
— metakieselsaures . . 92 I 89
— und Calcium-Carbonat, Mengenverhältniss, Gletscherschlamm, Schweden 91 I 132
Magnesiumfluorid . . . . 94 I *42*
Magnesiumoxyd . . . . . 94 I *9*
— künstliches, Stassfurt 94 II 33
Magnesiumsulfat, specif. Gewicht . . . . . 90 I 202
Magnesiumtypus d. Metalle 94 I *4*
Magnetit 1893 II 17, 345. 94 I *16*
— Agua suja . . . . . 94 II *299*
— Alpen . . . . . 90 I 232
— Andesit, Japan . . BB VII *137*
— Bildung aus d. Schmelzmasse . . . . . 94 I 95
— Brasilien . . . . . 94 I 90
— British Columbia . . 90 II 384
— Catalão . . . . . 94 II *297*
— Contactmetamorphose. 94 I 72
— Fassathal . . . . . 90 I 233
— Finnland . . . . . 94 I 470
— Greiner . . . . . 91 I 213
— in Anorthosit, Canada BB VIII *444*
— in Basalt, Marburg . 91 II *172*
— in Granit von Nord-Argentinien . . BB VIII *358, 386*
— künstliche Bildung . 94 I 11
— Lava des Mt. Vulture BB VII *597*
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Magnet Cove . . . . 92 I 32
— Mangan u. Magnesium enthaltend . . . . 90 II 219
— Mineville 1891 II 246. 93 I 235
— Moravicza, permanenter Magnetismus . . 93 II 457
— Moriah Mine . . . . . 92 I 32
— New York . . . . . 93 I 331
— Oberhollerbachthal. . 90 I 233
— Piemont . . . . . 92 II 422
Magnetit, Pitkäranta . 1893 II 62
— pseudomorph nach Pyrit 91 I 234
— Rothenkopf . . . . . 90 I 233
— See von Vico . . . . 91 I 11
— Siberberg . . . . . 92 II 70
— sublimirt, Laacher See 92 II 408
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *41*
— Süd-Norwegen . . . . 92 I 239
— Südwest-Afrika . . . 90 I *108*
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Traversella . . . . . 90 I 232
— Wildkreuzjoch . . . 90 I 233
— Wyssokaja . . . . 93 I 24
— zinnhaltig, Hirschberg 90 II *269*
Magnetismus der Gesteine 92 I 55
Magnetit-Pyroxen-Gestein 94 I 90
Magnetit-Spinellit, Routivare . . . . . 94 I 88
Magnetkies im Chondrit von Misshof . . . . . 92 I *96*
— künstliche Darstellung 94 I 14
— Kupferberg, Fichtelgebirge . . . . . 90 I 260
— Lappland, finnisches . 94 I 470
— nickelhaltig, Canada . 93 II 72
— Silberberg . . . . . 92 II 70
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Magnetnadel, Abweichungszone im Rapakiwigebiet 93 II 51
Magnolia laxa . . . . 93 II 428
Magnosia nodulosa . . . 91 II 192
Magura-Sandstein . . . . 93 I 576
— Karpathen . . . . 93 II 143
Mahuidas, Nord-Patagonien 93 I *26*
Makrocephalenzone, Leinethal . . . . . BB VII *272*
Malachit, Kishorn, Analyse 90 II 220
— Leogang . . . . . 93 I 17
— Mies . . . . . 93 I 12
— Südwest-Afrika . . . 90 I *109*
Malchit . . . . . 1892 II 88, 252
— Darmstadt . . . . . 93 I 90
— Melibocus . . . . . 94 I 289
Mallotus platanoides . . . 93 II 434
Malm, Kaukasus . . . . 93 II 384
— Portugal . . . . . 94 I 142
— Steierdorf-Anina . . 93 I 123
— Wendelsteingebiet . . 92 II 92
Mammalia, Reste . . . 93 II 305
— Uinta-Formation . . 93 I 151
Mammuth . . . . . 94 I 178
— Grund des Aussterbens 94 II 339
— postglaciales Vorkommen . . . . . 94 II 456
— Stosszahn, Quartär von Vitry . . . . . 90 I 333

Mammuth, Wien . . . 1890 II 138
Mammuthfund, Schweiz . 93 II 544
Mammuthfunde, Alter derselben in Grossbritannien . . . . . 94 I 365
Mammuthreste, Niederland 92 I 45
Manatidae . . . . . 91 I 331
Mandelräume der Diabase, Connecticut . . . . 91 I 403
Mangan . . . . . 94 I *20*
— in Limoniten . . . . 93 II 276
Mangancolumbit . . . 93 II 482
Manganepidot, Pennsylvania . . . . . 94 II 262
Manganerzbergbau, Cevljanvič, Bosnien . . . 90 II 74
Manganerze . . . . . 92 I 83
— Dillenburg . . . . 90 I 19
— Verhalten gegen Schwefelsäure . . . . . 93 I 231
Manganit, Grettenich, Saarbrücken . . . . . 90 II 386
— Zusammensetzung . . 94 II 405
Manganitkrystalle, Harzgerode . . . . . 94 I 19
Manganknollen 1893 II 288, 311, 312
Manganophyll, Långban . 92 II 232
— Pajsberg . . . . . 92 II 233
Manganosit . . . . . 94 I *20*
Manganspath, Arzberg . 92 II *38*
— Colorado . . . . . 91 I 234
— Klein-Asien . . . . 94 II 33
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Scharfenberg . . . . 92 II 69
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Mangelia . . . . . 92 I 588
— obsoleta . . . . . 91 II 464
— solitaria . . . . . 93 I 538
Mangilia consobrina . . 92 II 462
Manhattanschiefer, New York . . . . . 93 I 332
Manicina areolata . . . 90 I 369
Manospondylus gigas . . 94 I 182
Maretia grignonensis . . 91 I 436
— Martensii . . . . . 91 I 437
Margarit, Formel . . . 93 I 478
Margarita funiculata . . 91 II 175
— triassica . . . . . 91 II 170
Margaritus-Zone, Schafberg . . . . . 94 II 355
Margarodit, Epprechtstein 92 II *39*
Margerit . . . . . 93 II 17
Marginella 1891 I 432. 92 I 589
— abnormis . . . . . 91 II 464
— Barreti . . . . . 91 II 464
— Cossmanni . . . . . 91 II 464
Marginulina dentaliniformis . . . . . 1890 II 447
— marginata . . . . 90 II 447
— parva . . . . . 93 II 212
Markasit . 1891 I *151*. 94 I *35*
— auf Eisenkies, Bredelar 92 II 14
— chemisches Verhalten 94 II *273*
— Littmitz . . . . . 90 II 205
— morphologische Studien 90 II 204
— Neubildung . . . . 94 II *275*
— Pseudomorphose, Ural 94 II 232
— pseudoparamorph nach Pyrit . . . . . 91 I *218*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
Marmolatakalk . . 1894 II *25*, 106
Marmor, Benevent . . . 94 II 122
— Bergstrasse . . . . . 91 I 257
— Griechenland . . . 92 II 260
— Maryland . . . . . 92 II 283
— Russland . . . . . 93 II 61
— Samos . . . . . 94 II 432
— schwarzer, Malta . . 94 II 325
— St. Béant . . . . . 93 I 122
— (Trias), Vanoise . . 93 I 301
— Vanescha, Schweiz . 94 I 295
Marsupialia . . . . . 92 I 411
— europäisches Tertiär . 91 II 146
Marsupites testudinarius . 92 I 449
Martes delphinensis . . 94 II 344
Martinia Frechi . . . . 94 II 146
— nucula . . . . . 94 II 103
Martinsburg-shale, Blue Ridge . . . . . 93 I 98
Martit . . 1890 II 38. 91 II 20
— Ilmengebirge . . . . 90 II 19
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Puy-de-Dôme . . . 93 II 246
— Ypanema . . . . . 90 I *91*
Masonit, Pregratten . . 94 I 58
Massanuttensandstein, Blue Ridge . . . . . 93 I 98
Massendefecte unter Hochgebirgen 1892 I 53, 54. 93 I 481
Massengesteine, Eintheilung . . . . . 93 I 46
— Entstehung . . . . 93 I 46
— krystallinische, östl. Balkan . . . . . 90 I *279*
— tabellarische Uebersicht 93 I 69
Massenpunkte, Anordnung in den Flächen regulärer Krystalle . . . 93 I 1
Massenüberschüsse in den Ebenen . . . . . 93 I 481
Massospondylus Rawesi . 91 II 342

Mastigocrinus loreus . 1893 II 558
Mastodon 1891 II 151. 92 I 568. II 335
— aff. longirostris . . . 92 I 151
— americanus 1891 II 154. 94 I 375
— angustidens 1893 II 184. 94 I 180
— Arvernensis 1892 II 333. 93 II 542
— Borsoni . . . . . 94 I 180
Mastodonsaurus acuminatus 91 II 160
— giganteus . . . . . 91 II 159
— granulosus . . . . 91 II 160
— keuperinus . . . . 91 II 160
— robustus, Trias, Cockatoo Island, Port Jackson . . . . . 90 II 106
— silesiacus . . . . . 94 I 379
Matlockit . . . . . 90 II 220
— Wärmeleitung . . . 94 I 6
Maytenus araucensis . . 93 II 434
— magnoliaefolia . . . 93 II 434
Mazapilit . . . . . 91 II 26
Mazodus . . . . . 93 I 177
Mecochirus . . . . . 92 II 457
Mediterran-Formation, Czinkota . . . . . 94 II 453
Mediterranschichten, Siebenbürgen . . . 91 II 72
Mediterranstufe, erste . 94 I 491
— Mähren . . . . . 94 I 154
— Melitopol . . . . . 91 I 283
— miocäne . . . . . 92 I 434
— Rumänien . . . . 94 I *160*
Medlicottia . . 1890 II 149, 441
Medoriopsis . . . . . 90 II 151
Medullosa Leuckarti . . 90 I 172
— Ludwigii . . . . . 90 I 172
— Solmsii . . . . . 90 I 172
— stellata . . . . . 90 I 172
— Sturii . . . . . 90 I 172
Medusen, Perm, Friedrichsroda . . . . . 94 I 373
Medusites atavus . . . 94 I 373
Meer, zerstörende Wirkung 93 I 46
Meereskunde, allgemeine 94 I 452
Meeresniveau bei Kronstadt . . . . . 94 II 336
Meeresoberfläche, Störung durch Continente . . 91 I 246
Meeresspiegel, Veränderlichkeit . . . . . 93 I 45
Meereswasser, Bestandtheile . . . . . 90 II *53*
Meereswellen, seismische, bei der Eruption des Krakatoa . . . . 1894 I 279
Meerschaum, aus Gabbro, Bosnien . . . . . 94 I 442
— Hrubschitz . . . . 94 II 420
Megaceros, Ariège . . . 94 I 178
— hibernicus, Schädelfragment . . . . . 91 II 341
Megaliesbergformation . 93 I 318
Megalithista, Malm, Krakau . . . . . 90 II 342
Megalodon . . . . . 94 II 174
— pumilus . . . . . 93 I 556
Megalodonten . . . . 92 II 363
Megalomus-Bänke, Gotland 90 II *256*
Megalonychidae . . . . 92 II 338
Megalopteryx . . . . 94 I 382
Megalosaurus . . . . . 93 I 546
— insignis . . . . . 92 II 355
Megalostomina . . . . 93 I 201
Megaphytum didymogramma . . . . . 94 I 220
Megatherium, Schädel . 91 II 341
Megatyloma . . . . . 90 II 151
Megistopodes, Nottuln . 94 II *228*
Meiocardia quadrata . . 90 II 153
Meiolania . . . . . 92 I 162
Mejonit, Vesuv . . . . 92 I 49
Melampyrum arvense . . 93 II *94*
Melanglanz . . . . . 91 I 376
Melania Escheri . . . 94 II 432
— multistriata . . . . 90 I 108
Melaniaden, Gaumenfalten 94 II 472
Melaniidae . . . . . 93 II 417
Melanit, Lava des Mte. Vulture . . . . BB VII *599*
— Oberrothweil . . . . 93 I 239
— Synthese . . . . . 94 II 13
Melanocerit, Südnorwegen 92 I 257
Melanolith . . . . . 92 II 232
Melanophlogit 1890 I 34. 1891 I 19. II 211. 1893 I 26, 27, 282. 94 I *253*
— hexagonal und tetragonal . . . . . 91 I 201
Melanopsis austriaca, Leobersdorf, Tertiärbecken von Wien . . . . 90 II 331
— avellana . . . . . 90 II 332
— Böttgeri . . . . . 93 I 554
— Bouëi . . . . . 90 II 331
— Martiniana . . . . 90 II 331
— vindobonensis . . . 90 II 331
Melanosteira . . . . . 93 II 172
Melanostibian, Oerebro, Schweden . . . . . 94 II 29

Melanterit, Berks . . 1894 I 51
— Mies . . . . . 93 I 13
Melaphyr . . . 1893 II 326, 494
— argentinische Cordillere . . . . . 93 I 104
— Brasilien . . . . . 91 II 304
— Caradoc . . . . . 92 II 265
— Cerro de Cacheuta 1893 I 103, 104
— Devonshire . . . . 94 I 300
— Falcade . . . . . 91 II 425
— I. of Man . . . . 92 II 264
— Kärpfstock-Gruppe, Schweiz . . . . . 94 I 294
— mit Bronzit, Figeac . 90 II 80
— Plauen'scher Grund bei Dresden . . . . . 91 II 62
— Republik Colombia . 91 II 98
— Saar-Nahe-Gebiet . . 92 I 276
— Siebenbürgen . . . 91 II 72
— South Trap Range, Michigan 1893 I 501. 94 I 329
— Systematik . . . . 90 II 249
— Thüringen . . . . 91 II 277
Melastomaceen . . . . 91 I 340
Meles Maraghanus . . . 90 I 341
— Polacki . . . . . 90 I 341
— taxus . . . . . 90 II *35*
Melicertites squamata . 90 I 166
Melilith, Copiapó . . . 94 I 60
— Entstehung beim Brennen von Portland-Cement . . . . . 92 I 53
— Lava des Mte. Vulture BB VII *598*
— New York . . . . 94 II 262
— See von Vico . . . 91 I 12
— Synthese . . . . . 92 I 90
— Thera . . . . . 91 II 415
— Zusammensetzung 1892 II *73*. 93 I *15*
Melilithbasalt . . . . 93 II 487
Melinophan, Südnorwegen 92 I 248
Membranipora buski . . 94 I 202
— crassomuralis . . . 94 I 202
— declivis . . . . . 90 I 167
— disjuncta . . . . . 94 I 202
— gaultina . . . . . 91 II 369
— monocera . . . . . 90 I 167
— munita . . . . . 90 I 167
— regularis . . . . . 94 I 519
— reticulum . . . . . 90 II 155
— seriata . . . . . 90 I 167
— tenuimuralis . . . . 94 I 202
— trigonopora . . . . 90 I 167
— vestitens . . . . . 94 I 174
— virguliformis . . . . 94 I 202
Menaspis . . . . . 92 II 150
Meneghinella . . . . . 1893 II 128
Menestho craticulata . . 90 II 153
Menilitschiefer, Karpathen 93 II 141
Meniscodon . . . . . 91 II 146
— Picteti . . . . . 94 II *101*
Meniscopora bigibbera . 94 I 202
Meniscotherium . . . . 93 II 403
Mennige, Rock Mine . . 93 I 474
— Synthese . . . . . 92 I 19
Menodus rumelicus . . . 94 II 462
Mensch, älteste Spuren, Norddeutschland . . 90 I 138
— diluvialer, Böhmen . 92 II 317
— Interglacial . . . . . 94 I 178
— Irpfelhöhle, Württemberg . . . . . 94 I 505
— Spuren im Pliocän Californiens . . . . . 92 I 392
— — Süd-Amerikas . . 92 I 565
— tertiäres Alter . . . 90 I 139
— Veränderungen desselben im Laufe der geologischen Zeiten . 90 II 427
Menschengeschlecht, Herkunft . . . . . 92 II 138
Meretrix . . . . . 93 II 158
Mergel, bituminöse, Odenwald . . . . . 90 I *102*
— Garrucha . . . . . 93 I 423
— marin, Rumänien . . 94 I *157*
— Pliocän, Basilicata BB VII *582*
— sandige, Montpellier . 90 II 307
— Pillnitz . . . . . 93 II 94
— St. Egydi . . . . . 93 I 133
Mergelkrystalle, Pseudomorphosen, Kornthal . 90 I 396
Meristella 1891 II 186. 93 II 374
— Riskowskyi . . . . BB VIII *64*
Meristina . . . . . 91 II 186
— nitida . . . . . 91 II 186
Merites . . . . . 91 II 189
Merychyus . . . . . 93 II 397
Merycochoerus . . . . 93 II 397
Merycodon Damesi . . . 93 I 388
— rusticus . . . . . 93 I 388
Merycopotamus . . . . 94 I 180
Mesacanthus Mitchelli . 90 II 327
— Peachii . . . . . 90 II 327
— pusillus . . . . . 90 II 327
Mesalia gazellensis . . 93 I 538
Mesitinspath, Wärmeleitung . . . . . 94 I 5
Mesodactylen . . . . . 93 II 403
Mesodiadema Marconissae 90 I *85*
Mesodon cretaceus . . . 91 I 153
— Daviesi . . . . . 93 I 174

Mesodon rugulosus . . 1893 II 546
Mesolepis . . . . . 92 II 456
Mesoleptos Zendrini . . 94 I 510
Mesolith in Tufflagen, Fladda . . . . . 90 II 219
Mesonyx uintensis . . . 93 I 152
Mesophyllum . . . . . 90 II 159
Mesopoma . . . . . 92 II 456
Mesosaurier, Süd-Afrika . 94 II 159
Mesosaurus pleurogaster . 94 II 159
Mesosialis . . 90 II *21.* 91 I *52*
Mesosiderit, Doña Inez . 92 II 34
— Llano del Inca . . . 92 II 34
Mesotyp . . . . . 92 I 223
— Puy-de-Dôme 1893 I 247. II 265. 94 II 233
Mesozoische Ablagerungen Schwedens . . . . 90 II 297
— Formation, nördlich Appennin . . . . . 93 I 100
— Schichten Neu-Mexicos 92 I 329
Mespilodaphne longifolia . 93 II 434
Messelit, Hessen . . . 91 II 22
Messinien, Umgebung von Bra . . . . . 90 II 124
Messung ebener Winkel mit dem Mikroskop . 93 I 228
Metachlorit . . . . . 92 II 229
Metacinnabarit . . . . 93 II 75
— Bildung . . . . . 93 I 465
— Californien . . . . 94 II 239
— Idria . . . . . 93 I 461
— Knoxville . . . . . 92 I 49
— rhomboëdrisch . . . 94 I 16
Metacoceras dubium . . 93 I 180
— Hayi . . . . . 93 I 180
— inconspicuum . . . 93 I 180
— Walcotti . . . . . 93 I 180
Metacypris consobrina . . 94 I 383
— cuneiformis . . . . 94 I 383
— simplex . . . . . 94 I 383
— subcordata . . . . 94 I 383
Metagen . . . . . 90 I 447
Metalia melitensis . . . 94 II 179
Metallatomzahl eines Gesteins . . . . . 92 I 62
Metalle, mikroskopisches Gefüge . . . . . 94 II 277
— optische Constanten . 92 II 391
— und ihre Oxyde . . 94 I *3*
Metallreflexion, Theorieen von Cauchy und Voigt 90 I 2
Metamorphische Gesteine, Omeo-District, Gippsland . . . . . 90 I 432
Metamorphismus im Gebiet des Massivs der Vanoise . . . . . 1893 I 301
Metamorphose, Barranca Blanca . . . . . 90 II 231
— Cachiyuyal . . . . 90 II 231
— der Tuffe des Lennegebietes . . . . BB VIII *704*
— dynamische . . . . 90 II 389
— mechanische, italienischer Gesteine . . . 91 II 289
— statische . . . . . 90 II 389
— triassisch-carbonischer Sedimente, Aiguilles rouges . . . . . 93 I 495
Metamorphosirte Gesteine, Cornwallis . . . . 91 I 89
Metamynodon . . . . 93 I 154
Metanocerin . . . . . 92 I *221*
Metastibnit, Californien . 91 I 34
Metazeolithe . . . . . 92 II 240
Meteore in Schweden . . 92 II 244
Meteoreisen 1891 II 418. 1892 II 244. 93 I 478
— Arizona . . . . . 92 I 513
— Arkansas . . . . . 91 II 51
— Augustinowka . . . 94 I 449
— Bald Eagle Mountain 93 I 479
— Cañon Diablo . . . 94 I 448
— El Chañaralino . . . 92 II 36
— Floyd Mountain . . 92 II 243
— Garrett Co. . . . . 92 II 244
— Grand Rapids, Kent . 90 I 41
— Hamilton Co. . . . . 92 II 34
— Haniet-el-Beguel, Algier . . . . . 90 I 42
— Indian Valley Township . . . . . 92 II 36
— Jamestown . . . . 92 I 266
— Kentucky . . . . . 93 II 279
— Magura, Ungarn . . 91 I 384
— Nord-Carolina . . . 91 I 242
— Puquios . . . . . 92 II 34
— Rutherford Co. . . . 92 I 267
— San Francisco do Sul 93 I 480
— Sierra de la Ternera . 92 II 243
— Tonganoxie . . . . 92 II 36
— Tucson . . . . . 91 I 242
— Turgaisk . . . . . 92 I 51
— Welland 1892 I 269. 92 II 34
Meteorischer Staub, Cordilleren Chiles . . . 90 II 230
Meteoriten 1892 I 269. 93 II 279
— Algier . . . . . 94 I 275
— Analyse . . . . . 91 I 46
— Anordnung des Nickeleisens . . . . . 94 I 274

Meteoriten, Barntrup . 1891 I 48
— Bath . . . . . 94 I 274
— Beuste (Basses-Pyrénées) . . . . . 90 I 42
— Brasilien . . . . . 91 I 243
— Cañon Diablo . . . 94 I 448
— Carcot . . . . . 91 I 50
— Chartres . . . . . 90 II 59
— Collescipoli (Terni) . 90 II 387
— Copiapo . . . . . 90 II 231
— Darstellung auf antiken Münzen . . . 90 I 413
— De Cewsville . . . 92 II 34
— Ensisheim . . . . . 92 I 270
— Entstehung . . 1894 I 448, 449
— Farmington, Washington Co., Kansas 1892 II 242, 244
— Fayette Co., Texas . 90 I 42
— Ferguson . . . . . 92 I 267
— Imilac . . . 1890 II 230, 231
— Japan . . . . . 94 I 273
— Jelica, Serbien . . . 91 II 51
— Joel Eisen . . . . 90 II 231
— Juncal . . . . . 90 II 231
— Kansas . . . . . 91 I 385
— Kiowa . . . . . 94 I 448
— Knyahinya . . . . 94 I 274
— Kröpelin . . . . . 91 I 49
— Lundgård, Schonen 1890 I 414. 92 I *138*
— Lutschaunig . . . . 90 II 230
— Magura, Ungarn, chem. Constitution . . . . 90 II 57
— Mejillones . . . . . 90 II 231
— Mexico 1891 I 49. II 239, 418
— Migheï (Russland) Analyse . . . . . 90 II 229
— Misshof . . . . . 92 I *71*
— Mount Hicks . . . 90 II 231
— Ochansk . . . . . 91 I 47
— Pipe Creek . . . . 91 I 50
— Polanco Eisen . . . 90 II 231
— Queensland . . . . 91 I 47
— San Emig dio Range, Californien 1890 I 413. 91 II 417
— San Francisco del Mezquital . . . . . 90 II 59
— Schweden 1890 I 43. 91 I 49, 243
— Serbien . . . . . 91 I 48
— Terni . . . . . 91 II 238
— Travis Co., Texas . . 92 II 242
— Vaca Muerta . . . 90 II 230
— Varas . . . . . 90 II 231
— Wüste Atacama und Umgegend . . . . 90 II 250
Meteoritenkunde . . . 1893 I 44
Meteoritensammlung, Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin . . 90 I 413
Meteoritenschwärme, kosmogenetische Theorieen 90 I 43
Methode der kleinsten Quadrate bei Krystallberechnung . . . . . 93 II 2
Methylbenzyhydroxamsäure, optische Anomalien . BB VII *5*
Methylcytisinplatinchlorid 94 II *139*
Methylenjodid . . . . 92 I 61
— Anwendung bei opt. Untersuchungen . . . 91 I *72*
Metopoporina . . . . . 90 I 162
Metriophyllum . . . . 90 II 158
Metriorhynchus . . . . 92 I 164
— acutus . . . . . 92 II 356
— hastifer . . . . . 92 II 355
Mezöseger Schichten . . 93 II *168*
Miacis . . . . . 93 I 152
Michel-Lévyt . . . . . 91 I *250*
— Quebeck . . . . . 91 I 380
Michelinia convexa . . . 93 I 416
— Winnei . . . . . 94 I 171
Micraster breviporus 1892 I 366. 94 I 147
— cor-testudinarium 1892 I 366. 94 I 147
— Gourdoni . . . . . 91 II 368
— integer . . . . . 90 I 472
— Villacarli . . . . . 91 II 368
Micraster-Kreide, Nordfrankreich . . . . . 94 II 118
Microbrachium . . . . 92 II 358
Microceras inornatum . . 92 II 372
Microconodon . . . . . 92 II 343
Microdon Dumbelii . . . 93 I 378
Microlestes . . . . . 92 II 341
Micromelania aberrans . 90 II 121
— bosphorana . . . . . 90 II 121
— carinata . . . . . 90 II 121
— striata . . . . 1890 II 121, 131
— turritissima . . . . 90 II 121
Micropedina olisiponensis 93 I 560
Micropeltis Kunckeli . . 90 I 170
— Tournoueri . . . . 90 I 170
Microphycus . . . . . 91 I 285
Micropora articulata . . 94 I 519
— cribriformis . . . . 94 I 202
Micropsis . . . . . 94 I 204
— Frossardi . . . . . 91 II 369
Microsmilia . . . . . 90 II 338
Microsolena . . . . . 90 II 338
Microtaphrus . . . . . 90 II 151

Microzoen, Phosphorkalk, Taplow . . . . 1894 I 393
Midfordsand . . . . . 90 I 118
Miemit, Analyse. . . . 94 I 257
Miesit, Mies . . . . . 93 I 13
Mietniower Sandstein . . 93 II 167
Migrations- und Isolirungshypothese . . . 90 II 134
Mijakit . . . . . 92 I 312
Mikrochemische Methoden 92 II 7
Mikroexsiccator . . . . 94 II 395
Mikrofelsit . . . . . 93 I 295
Mikrogranit, Berthelsdorf, Sachsen . . . . . 91 II 271
— Cross Fell Julier . . 93 I 96
— I. of Man. . . . . 92 II 264
— Montagne Noire . . 91 II 285
— Ortasee . . . . . 91 II 427
— Pelvoux . . . . . 94 I 298
— West-Pyrenäen . . . 91 I 265
Mikroklin . . . . . 92 I *199*
— chemisches Verhalten. 94 II *269*
— einfacher, Meissen . . 92 I 224
— in Granit, Nord-Argentinien . . . BB VIII *289*, *298*
— in Pegmatit, Argentinien BB VII *367*
— klastischer, Massachusetts . . . . . 93 I 293
— Südnorwegen . . . 92 I 262
— Südwest-Afrika . . . 90 I *115*
— Val di Susa . . . . 91 II 407
Mikroklingneiss, Ceylon 1890 II 99. 93 I 507
Mikroklingneissgranit, Finnland . . . . . 93 II 96
Mikroklinstructur . . . 90 II *66*
Mikrolithe in Kupferschlacken, Annaberg, Niederösterreich . . 90 II 242
Mikropegmatit, Alaska . 93 I 506
— in Olivindiabas, Walamo 93 I 498
Mikroperthit, Südnorwegen 92 I 261
Mikropoikilitische Structur 94 II 51
Mikroskop, Anwendung bei Winkelmessungen . . 94 I 245
— für krystallographische Untersuchungen . . BB VII *55*
— Uebergang vom parallelen zum convergenten Licht . . . . . 94 II 214
— Verbesserungen. . . . 90 II 383
— von Carl Zeiss . BB VII *497*
— zu Beobachtungen bei hohen Temperaturen . 94 I 6
— zu Demonstrationszwecken . . . . . 94 II *94*
Mikroskopische Methoden in der Palaeontologie 1891 I *178*
Milarit . . . . . 94 I *253*
— optische Anomalien BB VII *6*, *39*
— Zusammensetzung . . 92 I *167*
Milchgebiss der Säugethiere . 1891 I 142. 93 II 539
Milchzucker, Krystallform BB VII *430*
Milioliden, Miocän, Molassesandstein, Siebenbürgen 94 I 394
Milliolina cylindrica . . 94 II 367
— maculina . . . . . 94 II 367
— pellucida . . . . . 94 II 367
— porrecta . . . . . 94 II 367
— tubulifera . . . . . 94 II 367
Millericrinus . . . . . 90 I *94*
— gemmatus. . . . . 94 II 461
Millerit . . 1893 II 259. 94 I *33*
— Morro-Velho . . . . 92 I 30
Mimesie . 1892 II 227. 93 I 459
Mimetesit, Sjögrube . . 90 I 411
Mimosa. . . . . 91 II 382
Mimosaceen . . . . . 91 I 343
Mimusops ballotaeoides . 93 I 576
Mineralien, accessorische, Pegmatitgänge Südnorwegens . . . . 92 I 304
— Canada . . . . . 93 I 261
— Chile . . . . . 93 I 262
— Frankreich und seine Colonien . . . . . 93 I 224
— gesteinsbildende . . 92 I 209
— Index der Krystallformen. . . . . 92 I 209
— Nord-Carolina . . . 93 I 261
— Siebenbürgen . . . 92 I 39
— Unterfranken und Aschaffenburg . . . 93 I 254
Mineraliencabinet, Universität Helsingfors . 93 I 480
Mineralindustrie, Griechenland . . . . . 94 I 447
Mineralquellen, Bosnien . 91 II 75
— Oberengadin . . . . 94 I 99
— Vereinigte Staaten . 90 II 103
Mineralsynthese . . . . 92 I 19
Mineralwässer, chemische Constitution . . . . 92 I 526
— Chile . . . . . 92 II 76
— Galizien . . . . . 92 I 527
— Gouvernement Irkutsk 94 I 327
— Ungarn . 1892 I 529, 530, 531
Mineralwolle, Colorado . 91 II 50
Minervit, Dép. Hérault . 94 II 28
Minette, Odenwald 1892 II 252. 94 I 290

Minette, Plauen'scher Grund bei Dresden . . . 1891 II 63
— Rhode Island . . . 94 II 263
Minettegang, Hirschburg 90 II 61
Minimumproblem . . . 94 I *56*
Minimus-Thon, Gliesmarode bei Braunschweig 93 I 360
Miocän, Agenais und Périgord . . . . . 90 I 454
— Algier 1892 II 439, 440. 1893 I 190. 94 I 364, 494
— Armagnac . . . . 94 I 492
— Balkan. . . . . 92 II *76*
— Brünn . . . . . 93 I 525
— Bucht von Gaden . . 90 I 452
— Cucuron . . . . . 91 I 122
— Dép. der Gironde . . 90 I 121
— erste Kette des Jura. 94 I 473
— Florida. 1890 I 316. 94 I 161
— Gironde . . . . . 94 II 356
— Granada . . . . . 91 I 125
— Granada und Malaga 93 I 326
— Haute-Savoie . . . 91 II 282
— Italien. . . . . 91 I 269
— Karpathen . 1893 II 139, 144
— Lassen Peak-Bezirk . 91 I 108
— Mähren 1893 I 526. 94 II 126
— Ostgalizien . . . . 91 II 445
— Panama-Canal . . . 91 II 446
— Prerau . . . . . 92 I 140
— Prossnitz . . . . . 93 I 95
— Sardinien . . . . . 94 II 357
— Sinai . . . . . 93 I *103*
— Süsswasserablagerung, Kärnthen . . . . . 91 II 444
— Syrien 1892 II 118. 94 II 293
— Texas . . . . . 1894 I 112, 113
— Tremiti-Inseln . . . 93 I 529
— Tüffer . . . . . 92 I 139
— Turin . . . . . 92 I 143
— Umgebung von Issoire 90 II 310
— untere Loire . . . . 91 I 309
— Vicentin . . . . . 94 I 159
— Walbersdorf . . . . 91 II 444
Mioclaenus . . . . . 91 II 144
— filholianus . . . . . 90 I 334
— flowerianus . . . . 90 I 334
— gaudrianus . . . . 90 I 334
— lydekkerianus . . . 90 I 334
— turgidunculus . . . 90 I 334
— zittelianus . . . . 90 I 334
Mioplocus multidentatus. 93 II 546
Mirabilit, Arizona . . . 93 II 36
Mirbelites . . . . . 92 I 614
Mischkrystalle . 1894 II 395—398
Mischkrystalle, aus Bittersalz und Zinksulfat BB VIII *153*
— von Alaunen. . . 1894 I *204*
— von Blei- und Baryumnitrat . . . . 1892 I *200*, *204*
— von Blei- u. Strontiumhyposulfat. . . . BB VIII *145*
— von $C_6H_2(NO_2)_2CH_3NH_2$ und $C_9H_{10}N_4O_6$ BB VII *4*
— von Chlor- und Brom-Zimmtaldehyd, Axenwinkel . . . . . BB VIII *164*
— von Eisen- und Manganpikrat, Axenwinkel BB VIII *161*
— von Kali- und Thalliumalaun. . . . . 90 I 204
— von Kalium- und Ammoniumsulfat BB VIII *154*. 90 I 204
— von Kaliumsulfat und Kaliumchromat . . BB VIII *159*
— von Kalium- und Thalliumalaun BB VIII *144*. 90 I 204
— von Traubenzucker-, Brom- u. Chlornatrium BB VIII *521*
Mischung von $NiSO_4 + 7H_2O$ und $MgSO_4 + 7H_2O$ BB VIII *149*
Mischungen, morphotrope 94 I 425
Mischungsanomalien . . 94 II 396
Mischungshypothese Bunsen's . . . . . 91 II 58
Misspickel, ged. Silber begleitend, Altai . . . . 90 II 20
Mitra . . . . 1892 I 589. II 361
— Basteroti . . . . . 92 II 462
— Borzolensis . . . . 94 II 128
— cochlearella . . . . 92 II 462
— facilis . . . . . 92 II 462
— multistriata . . . . 92 II 462
— Paulensis . . . . . 92 II 462
— praenigra. . . . . 92 II 462
— praescrobiculata . . 91 II 464
— Sallomacensis . . . 92 II 462
— striatula . . . . . 92 II 462
— zibinica . . . . . 91 II 464
Mitridae, Oberes Miocän 91 II 464
Mittelländisches Meer, Sondirungen . . . . 93 I 66
Mixit, Utah . . . . . 91 II 49
Mixosaurus . . . . . 90 I 142
— atavus . . . . . 93 I 167
Mixtotherium Gresslyi . 93 I 148
Moa, Queensland . . . 94 I 182
Mocansa-Conglomerate, Schweiz . . BB VIII *181*, *193*
Modiola . . . . . 92 II 361

Modiola amalthei . . 1893 I 536
— Böhmi . . . . . 93 II 526
— Branneri . . . . . 94 I 370
— elegans . . . . . 94 II 314
— fabacea . . . . . 93 I 182
— lepida . . . . . 94 I 370
— platensis . . . . . 94 I 370
— triquetraeformis . . 94 II 111
— valfinensis . . . . 91 II 177
— Zujovici . . . . . 90 I 441
Modiolopsis . . . . . 91 II 363
— Bolivien . . . . . BB VIII *49*
Modiomorpha rotundata . 91 II 183
Modotheca. . . . . 92 II 378
Mörtelstructur, Gneiss, Argentinien . . . BB VII *329*
Mohrensternia carinata . 90 II 121
— subangulata . . . . 90 II 121
— subinflata . . . . . 90 II 121
Moira Koeneni . . . . 91 I 438
Molaren, menschliche, Entstehung und Formveränderungen . . . . 93 I 383
Molasse, Fronsadais, Gironde . . . . . 94 II 453
— Miocän von Varano . 90 II 420
— St.-Symphorien . . . 94 II 453
— Untersberg . . . . 91 I 124
Moldavit, Radomilie, Böhmen . . 1890 I 61. 94 I 266
Molecularstructur der Krystalle . . . . . 92 I 15
Mollevillia . . . . . 90 II 152
Mollusken, Aachener Kreide . . . . . 93 I 182
— Eocän . . . . . 93 I 147
— Glacialzeit, Neu-Mexico 94 I 500
— im Bernstein . . . 92 II 460
— im Quartär . . . . 92 II 360
— Jura, Valfin . . . . 91 II 176
— Landes. . . . . 91 I 419
— Miocän. . . . . 92 I 435
— — New Jersey 1890 I 357. 90 II 332
— New Guinea . . . . . 92 I 177
— Oligocän . . . . . 93 I 147
— Piemont 1891 I 432. 94 II 173
— Pliocän, Siena . . . 90 II 152
— Texas . . . . . 93 I 538
— Unter-Oligocän 1891 II 177. 92 I 586
— Venetianische Alpen . 94 I 492
— von der pacifischen Küste . . . . . 92 II 155
Molybdänglanz, British Columbia . . . . . 90 II 384
Molybdänglanz, Euganeen 1892 I 233
— im Basalt, Cyklopeninseln . . . . . 94 I 434
— künstliche Darstellung 90 II 223
— Llano Co.. . . . . 93 I 259
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 206
— Süd-Norwegen . . . 92 I 238
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Synthese . . . . . 94 I 13
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Zwillingskrystall . . 90 I 221
Molybdänsäure im Scheelit 93 II 33
— Trennung von der Wolframsäure im Scheelit BB VII *232*
Molybdate, Isomorphie . 92 I 56
Molybdit, Llano Co. . . 93 I 259
Monactinellidae 1890 II 163, 342. 93 II 210
Monadites . . . . . 91 I 286
Monazit, accessorischer Gemengtheil von Granit 94 I 79
— Alexander Co. . . . 91 II 243
— Canada . . . . . 91 I 38
— Holma . . . . . 92 I 46
— Kårarfvet. . . . . 92 I 45
— Nil-St. Vincent . . . 92 II 403
— Pisek . . . . . 90 II 56
— Schüttenhofen . . . 90 II 25
— Ural . . . . . 92 I 44
— Villeneuve Mica Mine 93 I 261
— Zwillinge . . . . . 90 I 220
Monchiquit 1892 I 321. 93 II 341
— Bendigo . . . . . 94 II 271
Monfortia ligustica . . 94 II 128
Monian systeme 1891 II 430. 93 I 330
Monilites jurensis, Krakau 90 II 342
Monoceros Gallicum . . 91 I 432
Monocirsus . . . . . 90 II 152
Monoclonius 1890 II 435. 93 I 547
Monodiadema. . . . . 91 II 191
Monodonta antiqua . . 93 I 538
Monograptus . . . . . 92 I 187
— Becki . . . . . 94 I 209
— crassus. . . . . 94 I 209
— cygneus . . . . . 93 I 564
— flagellaris. . . . . 93 I 565
— limatulus . . . . . 93 I 564
— pala . . . . . 94 I 393
— singularis. . . . . 93 I 565
— vomerinus. . . . . 94 I 209
Monohydro-Fergusonit, Llano Co.. . . . . 93 I 258
Monokline Krystalle, Absorption des Lichtes . 90 I 2
Monokotylen, Ursprung . 91 II 376

Monophorus Bartalinii 1890 II 153
Monopleura marcida . . 90 I 360
— pinguiscula . . . . 90 I 360
Monosulfide, Bildung aus Schmelzmassen . . . 94 I 96
Monotis im Hallstatter Kalke . . . . . 92 II 299
— ovalis . . . . . 91 II 170
— salinaria, Niederösterreich . . . . . 90 I 101
Monotis-Bett, Californien 94 II 111
Monotis-Kalke, Mürzthal 90 I 101
Monotremata . . . . . 92 I 411
Monticellit 1891 I *151.* 93 II 345, 464
Monticulipora . . . . . 92 II 372
— aspera . . . . . 94 I 171
Montlivaltia Fritschi . . 93 I 195
— gosaviensis . . . . 93 I 195
— marmorea . . . . . 93 I 195
— norica . . . . . 93 I 195
— tirolensis, Cardita-Schichten . . . . . 90 I 107
Monyx spiculatus . . . 93 I 551
Monzonit, Tirol . . . . 90 I *75*
Moore in Schleswig-Holstein . . . . . 92 II 130
Moorea bicornuta . . . 92 II 459
— granosa . . . . . 92 II 459
— Kirkbyi . . . . . 91 II 460
Moränen, baltische, Joachimsthal. . . . 90 I 317
— Chiemsee . . . . . 90 II 313
— Comersee . . . . . 93 I 532
— Dollerthal . . . . 90 II 128
— Eriesee . . . . . 93 II 174
— Glen Fruin . . . . 92 II 317
— Haute-Savoie . . . 91 II 282
— Manitoba . . . . . 92 II 319
— Minnesota. . . . . 92 II 318
— Mono Lake Basin . . 92 I 386
— Mte. Sirino, Basilicata 94 I 101
— New Jersey . . . . 92 II 322
— Norddeutschland 1892 I 145, 146. II 316
— Nord-Ural. . . . . 91 I 316
— Schwarzwald . . . 93 II 537
— Thal des Astico . . 91 I 135
— Umgebung Schwerins. 90 II 422
— Weichselgebiet . . . 90 I 319
Moränenconglomerat, Finmarken . . . . . 92 I 341
Moränenkreide . . . . 91 II 139
Moränenlandschaft, Friesland . . . . . 94 II 458
— Hinterpommern. . . 91 I 313
— West-Drenthe . . . 94 II 334
Moränenzone, Schweizer Jura . . . . . 1893 I 372
Mordellina inclusa . . . 91 II 356
Mordenit . . . 1894 I 47. II 224
Morinit, Montebras. . . 93 I 248
Mormon-Sandstein, Californien. . . . . 94 II 112
Morosaurus agilis . . . 90 II 434
— grandis . . . . . 90 II 434
— lentus . . . . . 90 II 434
Morphotropie 1891 I *159.* 1892 II 4. 94 I 425
— in der Dolomitreihe . 91 I *146*
Mosaikquarz im Lenneporphyr . . . . BB VIII *594*
Mosasauridae. . . . . 92 I 576
Mosasaurier von Mastricht 92 I 414
Mosasaurus gracilis . . 91 I 429
— Lemonnieri . . . . 91 II 157
— Oberes Senon . . . 91 II 157
Moschoxylon falcatum . 93 II 434
— tenuinerve . . . . 93 II 434
Mottramit, Mexico . . . 90 II 40
Mucronatenschichten, Königslutter, Braunschweig . . . . . 91 I 155
Mucronella angustooecium 94 I 202
Mühlsteinkieselgestein, Beaumont. . . . . 90 II 307
Müttrich'sche Formel . 93 I 229
Multitubercular-Typus . 92 I 156
Multituberculata 1892 II 341. 93 II 395
Murchisonae-Schicht, Karpathen . . . . . 93 II 148
— Mt. Grappa . . . . 94 I 506
Murchisonia . . . . . 93 II 376
Murex . . . . . 92 II *160*
— Baudoni . . . . . 91 II 463
— Beyrichi . . . . . 91 II 179
— Dannebergi . . . . 91 II 179
— Deshayesi. . . . . 91 II 179
— detritus . . . . . 91 II 179
— elatior . . . . . 91 II 179
— fascistria . . . . . 91 II 179
— fusiformis . . . . . 91 II 179
— Guembeli . . . . . 92 II 462
— inornatus . . . . . 91 II 179
— pereger . . . . . 91 II 179
— Sandbergeri . . . . 91 II 179
— Shilohensis . . . . 90 II 332
— subrudis . . . . . 91 II 179
— tenuispira. . . . . 91 II 179
— trialatus . . . . . 91 II 179
Muricidae . . . . . 91 II 177
— Oberes Miocän . . . 91 II 464

Murina . . . . . 1890 II 430
Muschelkalk 1890 II 408. 92 I 125
— agronomische Untersuchung . . . . . 94 I 482
— Beausset (Var.) . . . 90 II 82
— Eisenach . . . . . 94 I 480
— Gliederung . . . . . 91 I 116
— Göttingen . . . . . 94 I 480
— Grajische Alpen . . . 94 II 292
— Jena . 1891 I 295. 94 II 140
— Leinethal . . . . BB VII *257*
— NO. Lothringen . . 91 I 408
— Nordtirol . . . . . 93 II 524
— oberer, Innsbruck . . 90 I 102
— Odenwald . . . . . 94 I 481
— Thüringen und Hessen 90 I 297
— Trauchbach . . . . 94 II 444
— unterer, Odenwald . 90 I *102*
— Wendelsteingebiet . . 92 II 91
Muscheln, fossile, Oberes Tertiär. . . . . 90 II 332
— Löslichkeit . . . . 91 II 404
— Tertiär, Savona. . . 94 I 388
Muschelsandstein, Mobile Bay . . . . . 92 II 318
Muscovit . . . . . 93 II 17
— Auburn Me. . . . . 94 I 36
— Formel . . . . . 93 I 476
— in Amphibolschiefern, Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— in Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *326*, *381*
— in Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *396*
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Neubildungsproduct von Grauwacken . . 90 II *187*
— optische Axen . . . 94 I 273
— Südwest-Afrika . . . 90 I *113*
Muscovitbiotitgranit, Tirol 90 I *72*
Muscovitgneiss, Altenberg 93 I 92
— Argentinien . . . BB VII *351*
— Ormonds, Schweiz . BB VIII *188*
— Unteritalien . . . . 91 II *55*
Muscovitgranit, Corsica . 91 II 289
— Nord-Argentinien . BB VIII *287*
Musophyllum styriacum . 94 I 531
Mustelina . . . . . 90 II 430
Mya . . . . . 92 II 361
— arenaria . . . . . 91 II 461
— cimmeria . . . . . 90 II 121
— truncata . . . . . 91 II 461
Myacites bisinuosus . . 90 I 359
— refugium . . . . . 90 I 359
Myaliinae . . . . . 93 I 404
Myalina crassitesta . . 93 I *13*
Myalina de Geeri . . 1891 II 122
— solida . . . . . 90 II *225*
Myalina-Schiefer, Spitzbergen . . . . . 91 II 121
Myalinoptera . . . . . 93 I 404
Mycelites ossifragus . . 92 II 188
Mycetophaetus intermedius 93 II 549
Myelopteris . . . . . 90 I 172
Myeloxylon . . . . . 90 I 172
Mylostomatidae . . . . 92 II 358
Myoconcha Acquatensis . 90 I 114
— minima . . . . . 93 I 381
— parvula . . . . . 94 II 141
— reticulata . . . . . 94 II 314
Myophoria fissidentata . 90 I 107
— Goldfussi . . . . . 92 I 351
— Haueri . . . . . 90 I 114
— Kefersteini . . . . 90 I 114
— micrasiatica . . . . 93 II 137
— plana . . . . . 94 II 141
— Raibliana . . . . . 92 I 352
Myophoricardium lineatum 90 I 108
Myophorienbank, Mosbach, Neckarthal . . . . 94 I 341
Myoporiphyllum angustum 93 I 431
Myorhynchus laticeps . . 91 II 343
Myoxina . . . . . 90 II 430
Myrcia costatoides . . . 93 II 434
— deltoidea . . . . . 93 II 434
— ladowiciensis . . . 93 II 433
— nitens . . . . . 93 II 434
— reticulato venosa . . 93 II 434
Myrciaria acuminata . . 93 II 434
Myrciophyllum ambiguacoides . . . . . 93 II 434
Myriacanthidae 1891 I 429. 92 II 357
Myriacanthus granulatus 91 I 430
— paradoxus. . . . . 91 I 430
Myrica cretacea . . . . 91 I 443
— elaenoides. . . . . 90 I 374
— lignitum . . . . . 92 II 377
Myricophyllum asplenioides 94 II 194
Myriolepis hibernica . . 94 I 173
— latus . . . . . 94 II 161
Myristica fossilis . . . 93 II 434
Myristicophyllum majus . 91 II 209
— minus . . . . . 91 II 209
Myrmidium Heeri . . . 90 II *32*
Myrsinaceen . . . . . 91 I 345
Myrsinophyllum Felekiensis 93 I 432
Myrtaceen . . . . . 91 I 340
Myrtiflorae . . . . . 91 I 340
Mysidia orientalis . . . 93 II 137
Mysticeti . . . . . 92 II 145
Mytilus brignolensis . . 91 I 159
— Maurini . . . . . 91 I 159

Mytilus rectus . . . 1890 I 114
— regio lutteranus . . 91 I 157
— vulgatissimus . . . 90 I 157

N.

Nagelfluh am Chiemsee . 90 II 313
— Züricher See. . . . 91 II 139
Nagelfluhgesteine, Schweiz BB VIII *182*
Nager . . . . . 92 II *239*
— Brick-Earth bei Crayford 93 II 540
— südamerikanische . . 92 II 337
Nahan-Sandstein, Sub-Himalaya . . . . . 94 II 435
Najadites, Perm, Russland 94 I 198
Nanomys . . . . . 90 II 142
Naparima-Schichten, Trinidad . . . . . 94 II 129
Naphta, Halbinsel Apscheron . . . . . 94 I 325
— Sachalin . . . . . 91 II 14
— Timangebiet . . . . 94 I 323
Naphta-Berg, Transkaspien 90 II 287
Naphta-Steine . . . . 93 II 88
Naples beds . . . . . 92 II 99
Naples-Fauna, New York 91 I *164*
Nasellaria, Malm, Krakau 90 II 342
Nassa . . . . . 92 II 361
— aequistriata . . . . 90 I 157
— Bellardii . . . . . 94 II 128
— controversa . . . . 91 II 464
— ecostata . . . . . 90 II 153
— Libassi. . . . . 90 II 153
— Rideli . . . . . 90 I 157
— solitaria . . . . . 90 I 157
— Tournouëri . . . . 90 II 153
— velutina . . . . . 91 II 464
Nasturan, Přibram . . . 94 I 91
Natica . . . . . 92 II 361
— babylonica . . . . 90 I 157
— Bubendorfensis . . . 93 I 381
— Dumblei . . . . . 93 I 538
— ezoënsis . . . . . 91 II 175
— fluctuoides . . . . 93 I 538
— formosa . . . . . 93 I 381
— gabonensis, Albien, West-Afrika . . . . 90 II 417
— Geinitzi . . . . . 92 II 362
— humilis. . . . . 94 I 372
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— minima . . . . . 93 I 538
— orientalis 1893 I 538. 94 I 190
— Pantanelli . . . . 90 II 153
— pisum . . . . . 90 II 332
— Rouaulti . . . . . 90 I 157
Natica scalaris . . . 1893 I 538
— valfinensis . . . . . 91 II 176
Naticopsis . 1890 II 151. 93 II 376
— desertorum . . . . . 93 II 521
Natriumchlorat, Drehung der Polarisationsebene 91 II 403
— elektrooptisches Verhalten . . . . . 94 II *244*
Natrium-Lithium-Salze, isomorphe Reihe . . 94 I *191*
Natriumlithiumsulfat . . 92 II *62*
Natriummetaphosphat. . 94 II *160*
Natriumnitrat, spec. Gewicht . . . . . 90 I 203
Natriumorthoklas, in Rhyolith . . . . . 94 I 79
Natrolith 1890 I *134*. II *73*. 91 II 230
— Arkansas . . . . . 94 II 31
— Arö . . . . . 92 I 232
— Bologna . . . . . 91 I 10
— Formeln . . . . . 90 I *136*
— in Diabas. . . . . 92 II *1*
— Italien . . . . . 92 I 231
— Mt. Vulture . BB VII *596*, *600*
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Neu-Titschein . . . 93 II 252
— optische Anomalien BB VII *2*
— Südnorwegen. . . . 92 I 264
— Synthese . . . . . 90 I *134*
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 237
Natroncarbonat der Vesuvlava von 1859 . . . 90 II 208
Natronglimmer, Synthese 90 II 35
Natrongranit, Minnesota . 94 II 264
— Südnorwegen . . . 92 I 300
Natronliparite, Island . . 93 I 499
Natrophilit . . . . . 93 II 29
Natroxonotlit. . . . . 93 II 345
Naucleoxylon spectabile . 91 II 208
Naumann'sche Flächenzeichen. . . . . 94 I 245
Nautileen, Carbon, Texas 92 II 283
— Fusulinenkalk, Palermo 90 II 150
— jurassisch und carbonisch . . . . . 91 I 336
— mit Eindruck des Haftringes . . . . . 91 I 336
Nautiloidea 1890 I 354. 92 I 427
Nautilus . . . . . 92 II 152
— Allioni . . . . . 90 I 140
— Bayfieldi . . . . . 92 II 152
— Bosniense . . . . . 94 II 169
— Cassianus . . . . . 92 II 152
— Deslongchampsianus . 93 I 552
— elegans . . . . . 93 I 401

Nautilus hunstantonensis 1892 II 152
— indifferens . . . . 94 II 169
— leiotropis, Emscher-Mergel . . . . . 90 I *180*
— Liardensis . . . . 91 II 170
— libanoticus . . . . 92 II 152
— lineolatus . . . . . 92 II 152
— neocomiensis . . . . 93 I 552
— Neubergicus, Emscher-Mergel . . . . . 90 I *180*
— Oberösterreichische Tertiärablagerungen . 90 I 140
— obliquatus . . . . 92 I 600
— polygonius . . . . 94 II 169
— portlandicus . . . . 92 II 152
— restrictus . . . . . 91 I 158
— rhenanus . . . . . 91 I 406
— subtuberculatus . . . 91 I 431
— Tommasii . . . . . 90 I 114
— Trichonopolitensis, Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
Navit . . . . . 93 II 332
Neaera-Schichten, Steier-dorf-Anina . . . . 93 I 123
Necrastus, Queensland . 94 I 182
Necroclemur antiquus . . 93 I 149
— Cartieri . . . . . 93 I 149
— Zitteli . . . . . 93 I 149
Nectandra Hofmeyeri . . 93 II 432
Nectandrophyllum α et β 93 II 434
Negundo decurrens. . . 90 I 373
Nehrungen, Bildung von 93 II *167*
Nematheridae . . . . 92 II 338
Nematherium. . . . . 92 II 338
Nematurella etrusca . . 90 II 153
Nemertilites Strozzi . . 94 II 484
Neocän, am Pacifischen Ocean, Nord-Amerika 94 I 358
Neochrysolith, Krystallform 90 II 57
Neocom. . . . . 91 II 125
— Algier . . . . . 93 I 185
— Alpen . . . . . 93 II 510
— Amerika . . . . . 93 II 156
— Andalusien . . . . 92 II 430
— argentinische Cordillere 93 I 104
— Chaîne de Raye . . . 93 II 530
— erste Kette des Jura. 94 I 473
— Gliederung, Isère . . 93 II 553
— Karpathen . . 1893 II 140, 148
— Krim . 1890 II 415. 93 I 351
— Madagascar . . . . 90 I *4*
— mittleres, Argentinien 93 I 126
— Mt. Diablo . . . . 93 I 99
— Nola . . . . . 90 I *96*
— Polen . . . . . 92 I 116
Neocom, Puezalpe, Südtirol. . . . . 1890 I 305
— Rumänien. . . . . 92 II 305
— Spanien . . . . . 93 II 160
— Tunis . . . . . 92 II 74
— Vierwaldstätter See BB VIII *210*
— Worobiewo . . . . . 93 II 386
Neogen . . . . . 90 I 447
— Gouvernement Poltawa 90 I 126
— Griechenland . . . 93 II 170
— Halbinsel Apscheron, Kaukasus . . . . . 90 I 125
— Karpathen . . . . 93 II 362
— Klein-Asien . . . . . 93 II 365
— Oesterreich-Ungarn . 90 I 451
— Semmering . . . . 90 I 272
— Süd-Ungarn . . . . 93 II 533
— unteres, Eintheilung . 94 I 357
Neoplagiaulax 1892 II 342. 93 I 150
Neotesit, Gouv. Oerebro . 90 I *257*
Neotremata 1892 I 193. 94 I 200
Neozoicum, Südwesten von Arkansas . . . . . 90 II 302
Nephelin, Constitution . 94 I 261
— in brasilianischem Leucitophyr . . . . . 92 II *149*
— in Ijolith . . . 1892 I 307, 308
— Krystallform. . . . 93 I 29
— krystallographische Untersuchung . . . 94 I 13
— Mt. Vulture . . . BB VII *596*
— sublimirt, Laacher See 92 II 408
— Südnorwegen . . . 92 I 246
— Synthese 1891 I 240. 94 I 12. 94 II 13
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Nephelinbasalt, Altenberg 93 I 93
— Breitfirst . . . . . 92 I 279
— Cassel . . . . . 92 I 278
— centraler Balkan . . 90 I *269*
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Lausitz . . . . . 92 II 82
— Leilenkopf . . . . 93 I 488
— Oberleinleiter . . . 90 II 65
— Odenwald. . . . . 92 II 252
— Paraguay. . . . . 93 I 506
— Sachsen, Nassau . . 91 II 276
— — Pirna . . . . . 94 II 285
— — Tharandt. . . . 94 II 284
— Schreckenstein . . . 92 I 284
— Serranía de Cuenca . 90 I 80
— Texas . . . . . 91 II 435
Nephelinbasanit, Carthagena . . . . . 93 I 285
— Grossdehsaer Berg. . 90 II 68
— Kilimandscharo . . . 91 II 88

Nephelinit, Afrika . . 1892 II 426
— Insel Rachgoun . . . 90 II 405
— Plateau central . . . 94 II 424
— Schreckenstein . . . 92 I 284
Nephelin-Leucitbasalt, Eifel . . . . . 92 II 415
Nephelinphonolith . . . 93 II 487
Nephelinsyenit, Halbinsel Kola . . 1891 I 98. 93 II 108. 94 I 464
— Minas-Geraës . . . . 90 I 93
— Südnorwegen . . . . 92 I 296
Nephelintephrit, östlicher Balkan . . . . . 90 I *282*
Nephrit . . . . . 93 II 25
— Alaska, Artefacta aus demselben . . . . . 90 II 103
— anstehend, Jade Mountains (Alaska) . . . 90 II 104
— Kuenlungebirge . . . 94 II 24
— Neu-Guinea . . . . 94 II 408
— Sicilien . . . . . 94 II 408
— Steiermark . . . . 90 II 28
Nephropora elegans . . 90 I 168
Neptunea . . . . . 92 II 361
Nereitenschichten, Ostthüringen . . . . . 91 II 119
Nerinea abeihensis . . . 91 II 129
— berytensis . . . . . 91 II 129
— biconus . . . . . 91 II 123
— biplicata . . . . . 91 II 123
— cedrorum . . . . . 91 II 129
— hicoriensis . . . . . 94 I 372
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— Lüttikei . . . . . 91 II 129
— minima . . . . . 91 II 129
— pellucida . . . . . 94 I 372
— Rhamdunensis . . . 94 I 190
— subgigantea . . . . 91 II 129
— uniplicata . . . . . 91 II 129
— volana . . . . . 94 I 372
Nerinea-Reste im Tuff des Lennegebietes . . BB VIII *645*
Nerineen . . . . 1890 I 96, 360
Nerineenkalk, Caserta . . 91 I 412
— jurassische, Madagascar . . . . . 90 I *1*
— Mte. Maggiore . . . 93 I *59*
Nerita . . . . . 90 II 151
— abeihensis . . . . . 93 I 538
— bidens . . . . . 93 I 538
— Ombonii . . . . . 94 I 150
— pagoda . . . . . 93 I 538
Neritaceen . . . . . 92 II *25*
Neritaria . . . . . 92 II *26*
Neritaria similis . . 1894 II 142
Neritidae . . . . . 93 II 417
Neritina Isseli . . . . 93 I 183
Neritinium angustifolium 93 I 431
— minus . . . . . 93 I 431
Neritodonta simulans . . 90 II 121
Neritopsis . . . . . 92 II *27*
— Costai . . . . . 94 II 312
— pauciornata . . . . 90 I 108
Nesodon . . . . . 93 II 185
— Oweni . . . . . 93 I 387
— Rütimeyeri . . . . . 93 I 387
— typicus . . . . . 93 I 387
Nesotherium argentinum . 93 I 387
— Burmeisteri . . . . 93 I 387
— carinatum . . . . . 93 I 387
— elegans . . . . . 93 I 387
— Nehringi . . . . . 93 I 387
— rufum . . . . . 93 I 387
— rutilum . . . . . 93 I 387
— Studeri . . . . . 93 I 387
— turgidum . . . . . 93 I 387
Nesquehonit . . . . . 93 II 19
— La Mure . . . . . 92 II 403
Neurapophysen, entwickelungsgeschichtliche Stellung . . . . . 94 I 502
Neurogymnurus . . . . 93 I 149
Neuropora conuligera . . 94 II 359
Neuropteren . . . . . 90 II *23*
— im Bernstein . . . 92 II 459
Neuropteris gigantea . . 93 II 426
— Guardinis . . . . . 94 I 220
— plicata . . . . . 90 I 173
— rectinervis . . . . 90 I 173
— Zelleri . . . . . 94 II 102
Neusina Agassizi . . . 94 II 475
Nevadit, Cabo de Gata 1892 II 424. 93 I 284
— Torniella . . . . . 93 I 280
Nevado-canadisches Meer während des Tacon . 91 II 114
Neverita patula . . . . 93 I 538
Nevropteris Raymondi . 93 II 216
Newark-System . . . . 93 I 505
— Ursprung . . . . . 91 II 434
Newberria . . . . . 92 II 155
Newtonit, Newton Co., Arkansas . . . . . 94 I 38
Nexö-Sandstein von Bornholm, Geschiebe . . 93 I 143
Nickel . . . 1892 I 83. 94 I *19*
— Canada . . . . . 93 II 15
— Frankenstein, Schlesien 1894 II 63, 66
— im Elvo-Fluss . . . 92 I 513

Nickel, mikrochemische Auffindung . . . 1894 II 394
— Oregon . . . . . 94 II 62
— Production . . . . 93 II 72
— rheinisches Schiefergebirge . . . . 1894 II 61, 274
— Schluckenau, Böhmen 94 II 65
— Trennung von Kobalt 92 II 210
Nickelblüthe, Leogang . 93 I 19
Nickeleisen, Oregon . . 93 II 278
— 1729 nach Holland gebracht . . . . . 93 II 72
Nickelerz . . . . . 93 II 72
— Canada . . . . . 93 II 73
— Frankenstein . . . 92 I 83
— Gosenbach, Kreis Siegen . . . . . 90 I 206
— Oregon. . . . . 91 I 382
— Ural . . . . . 94 I 89
Nickelhaltiger Magnetkies, Canada . . . . . 94 II 65
Nickelkies bei Markt Redwitz . . . . . 90 I *99*
Nickelsilicate. . . . . 94 II 64
Nickel-Skutterudit, N.-Mexico. . . . . 94 I 17
Nickelspeise . . . . . 94 I *19*
Nickelvitriol, Zermatt . 93 II 252
Nickelwismuthglanz, Kirchen . . . . . 92 II 408
Nicolia . . . . . 92 I 614
— aegyptiaca . . . . 93 II 430
— Owenii. . . . . 93 II 430
Nicoria trijuga . . . . 91 II 156
Niederterrassen, Nordschweiz . . . . . 93 I 369
Nigrin . . . . . 91 I *220*
— Oláhpian . . . . . 92 I 40
Nilssonia nipponensis . . 91 I 177
— ozoana. . . . . 91 I 177
Niremont-Berra-Zone, Flysch, Schweiz . BB VIII *195*
Nitophyllum Beaumontianum . . . . . 91 I 174
Nitrification des Bodens durch kleine Lebewesen 94 I 458
Nitroglauberit, Chile . . 93 I 262
Niveau der Oceane . . 91 II 99
Niveauänderung, des Tanganyika-See . . . . 94 I 287
— Gotland . . . . . 90 I 326
— Nord-Amerika . 1894 I 162, 169
— Quartär . . . . . 93 I 57
— schnelle, des Meeres . 94 I 284
— Skandinavien . 1894 I 167, 169
Nivenit, Llano Co. . . . 93 I 258
Nocerin. . . . . 1892 I *221*
Nodelea propinqua . . . 90 I 166
Nodosaria bilocularis . . 93 II 212
— callidula . . . . . 91 I 165
— commemorabile . . . 91 I 165
— corporosa . . . . . 94 II 476
— depressa . . . . . 93 II 212
— egregia . . . . . 91 I 165
— facile . . . . . 91 I 165
— herculea . . . . . 90 II 166
— inmutilata . . . . 94 II 476
— liasica . . . . . 93 II 212
— Mayeri. . . . . 94 I 524
— obliqua. . . . . 94 II 185
— scabra . . . . . 94 II 477
— Schwageri . . . . 90 II 344
Nodosaurus . . . . . 91 II 452
Nodular Rhyolithes . . 90 II 261
Noeggerathia Graffini. . 94 I 220
— palmaeformis . . . 93 I 206
Noeggerathiopsis sarwadensis . . . . . 94 I 171
Nomismoceras spiratissimum . . . . . 91 I 406
Nonesit, Tirol . . . . 90 I *80*
Nordenskjöldin, Südnorwegen . . . . . 92 I 239
Nordmarkite, Südnorwegen 92 I 299
Nordseefauna. . . . . 90 II 125
Norian, Canada . . . BB VIII *419*
Norische Schichten. . . 94 II 104
Norit, Cortlandt Series . 90 I 87
— Gellivararterritorium . 93 II 64
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Sinnithal, Basilicata . 93 I 279
— Tirol . . . . 1890 I *72, 80*
Norit-Diorit . . . . . 93 II 332
Norites . . . . . 90 II 149
Noritporphyrit, Tirol . 1890 I *72, 80*
Normaldolomit . . . . 91 I *133*
Nosean . . . . . 92 I 27
— Cronkley . . . . . 93 I 289
— in Eläolithsyenit . . 92 I *222*
— See von Vico . . . 91 I 13
Noseanphonolith . . . 93 II 487
Nosotetocus Marcovi . . 93 II 549
Notomya elongata . . . 90 II 448
Notonecten, Braunkohle . 93 II 413
Notothyris Smithii . . BB VIII *68*
Nubecularia depressa . . 93 I 567
— nodulosa . . . . . 93 I 567
— Jonesiana 1893 II 560. 94 I 393
Nucaculus calcitrans . . 93 I 551
Nucinella . . . . . 91 II 328
Nucleatula, alpine Trias. 90 II 333
Nucleospiridae . . . . 92 I 440

Nucula . . 1892 II 361. 94 I *215*
— cornuta . . . . . 90 II *238*
— crebrilineata . . . . 93 I 537
— glans triticea . . . 93 I 537
— Kruegeri . . . . BB VIII *48*
— Milnei . . . . . 91 II 175
— perobliquata . . . . 93 I 537
— peronaica . . . . . 91 II 175
— picturata . . . . . 91 II 175
— Telleri . . . . . 90 I 107
— vox . . . . . 91 II 175
Nuculina Dobergensis . . 91 II 444
Nuculites acuminatus . . 94 I 176
— Beneckei . . . . BB VIII *46*
Nugator strictocollis . . 93 I 551
Nulliporenkalk, Malta . 91 II 133
Numismalis-Mergel, Deutsch-Lothringen . 94 I 345
Nummuliten . . . . . 94 I 211
— Bordeaux . . . . . 92 I 461
— Ecuador . . . . . 92 I 191
— Italien . . . . . 92 II 373
— Java . . . . . 92 I *65*
— Majella . . . . . 92 II 313
— Moulis . . . . . 94 II 366
— Radstadt . . . . . 90 I 456
— Singhe là . . . . . 92 I 190
— Thessalien . . . . 94 I 319
— Untereocän, Algerien . 91 II 372
— westliches Oberitalien 92 I 462
Nummulitenbildung, Isère 94 I 491
Nummulitengebirge, Varbuche . . . . . 92 I 546
Nummulitengestein, Biarritz . . . . . 90 II 306
Nummulitenkalk, Basilicata . . . . . BB VII *562*
— Cap Oriambre . . . 90 I 81
— Dép. Hérault . . . 94 II 27
— Griechenland . . . 93 I 307
— Madagascar . . . . 90 I *4*
— Stockerau . . . . . 93 I 554
— Syrien . . . . . 91 II 331
— Vierwaldstätter See BB VIII *213*
Nummulitenschichten, Aegypten . . . . . 91 I 159
— Cheval Noir . . . . 93 I 97
— Südost-Frankreich . . 94 II 366
Nummulites Biarritzensis 91 II 372
— budensis . . . . . 90 II 166
— contorta d'Arch. . . 93 II *85*
— Gizehensis . . . . 91 II 372
— irregularis . . . . 91 II 372
— planulata 1891 II 372. 94 II 366
— striata d'Orb. . . . 93 II *85*
Nuphar dubium . . . . 91 I 175
Nuthetes destructur, Zahn 1894 II 158
Nymphaea Dumasii, fossiles Rhizomstück . . 91 I 444
Nymphaeaceen, interglaciale 92 I *114*
Nymphaster . . . . . 94 I 205
Nysa . . . . . 91 II 176
Nyssa aspera . . . . . 93 II *88*
— Buddiana . . . . . 93 II 220
Nyssidium geminatum . 93 II 569
— spicatum . . . . . 93 II 569
Nythosaurus larvatus . . 91 II 344

O.

Obeliscus bilineatum . . 93 I 538
Obercarbon, Oppenau . . 93 II 132
— Sulz . . . . . 93 II 132
Oberflächenphänomene bei Quarzporphyr . . . 92 I 280
Oberflächenschichten . . 90 I 2
Obermiocän, Velay . . . 93 II 103
Ober-Rothliegendes . . . 92 II *78*
Obolus . . . . . 92 I 182
Obsidian, Campanien . . 91 II *311*
— Elasticität . . . . 92 I 11
— Gough's Island . . . 94 II 263
— Kars . . . . . 90 I 82
— Mexico . . . . . 92 II 428
— mit Sphaerulithen . . 91 II 435
— Mono Lake . . . . 92 I 387
Obsidianbomben, Australien . . . . . 94 II 269
Obsidianklippe, Yellowstone National Park . 90 II 270
Obsoleta-Gruppe der Rhynchonellen . . . 91 I 162
Ocadia Oweni . . . . 92 II 455
Ockerkalk, Fichtelgebirge 91 II 119
Ocnerites macroceraticus 1890 II *24*. 91 I *52*
Octactinellidae . . . . 90 II 163
Octonaria bifasciata . . 94 II 468
— clavigera . . . . . 92 II 459
— curta . . . . . 92 II 459
— elliptica . . . . . 93 II 411
— Linnarssoni . . . . 91 II 460
— ovata . . . . . 92 II 459
— stigmata . . . . . 92 II 459
Ocularmikrometer . . . 91 I 199
Odinit, Odenwald . . . 94 I 290
Odontoceti . . . . . 92 II 145
Odontofusus Slacki . . . 94 I 514
Odontogenese bei Ungulaten . . . . . 93 I 381
Odontopteris . . . . . 93 II 217

Odontopteris obtusa 1892 I 466. 94 II 376
Odontostoma nematurella 91 II 463
Odontostomia Lamberti . 93 II 554
Odontostomopsis abeihensis 93 I 538
Odontoturbo . . . . . 91 II 177
— delicatulum . . . . 91 II 176
Odostomopsis, Kreide, Syrien . . . . . 94 I 190
Oehlertella . . . . . 93 II 204
Oejediabas, Geschiebe . . 93 I 143
Oel, Pennsylvanien . . 90 I 279
Oelandicus-Zone, Nerike . 94 II 97
Oelindustrie, Appalachen 94 I 472
Offaster cuneatus . . . 91 II 366
— Munieri . . . . . 91 II 366
Offretit, Montbrison . . 92 II 29
Ogygia Klotzi, Mount Stephens, Canada . . 90 II 289
— serrata, Mount Stephens, Canada . . . . . 90 II 289
Okenit . . . . . 90 I *123*
Olcodiscus Andrussowi, Neocom, Krim . . . 90 II 415
Olcostephanus Deansii . 94 II 470
— desmotus . . . . . 90 II *77*
— Groteanus, Jura . . 90 I *150*
— phanoides . . . . . 90 II *76*
— repastinatus . . . . 90 II *78*
— Spitiensis, Jura . . . 90 I *152*
— Stanleyi, Jura . . . 90 I *152*
— thermarum . . . . . 90 II *76*
— trimerus . . . . . 90 II *76*
Old red, Schottland . . 93 I 511
Oleaceen . . . . . 91 I 346
Oleacina neglecta . . . 93 I 554
Olenellus Callavei . . . 92 I 541
— Lundgreni . . . . . 94 I 332
— Mickwitzi . . . . . 90 II 439
— Schottland . . . . 92 I 541
— Torrelli . . . . . 94 I 332
— Wales . . . . . 92 I 541
Olenelluszone . . . . . 91 II 198
— Fauna . . . . . 92 II 328
— Nordamerika 1891 I 334. II 108, 112
— Schottland 1893 I 115. 94 II 97
— Skandinavien . . . . 94 I 332
Olenidian, Montagne Noire 90 I 96
Olenopsis . . . . . 93 II 128
Oligobunis argentina . . 93 II 285
Oligocän, Basilicata . BB VII *574*
— Belgien . . . . . 92 II 308
— Coudrai bei Nemours . 90 II 112
— Dép. der Gironde 1890 I 121. 94 II 356
Oligocän, Doberg . . 1891 II 443
— Elsass . . . . . 91 II 328
— Grossenhain . . . . 93 I 94
— Halbinsel Krim . . . 90 II 121
— Heppenheim . . . . 92 I 367
— Jekaterinoslaw . . . 94 II 139
— Kleinasien . . . . 93 II 365
— Melitopol . . . . . 91 I 283
— Narbonne . . . . . 90 II 113
— Pariser Becken . . . 92 I 437
— Pflanzenreste, Piano . 90 II 170
— Sachsen . . . . . 91 II 267
— — Meissen . . . 1891 I 82, 84
— — Riesa . . . . . 91 II 269
— — Rosswein . . . . 91 I 75
— Südrussland . . . . 92 I 370
— Theiss . . . . . 93 II 363
— Umgebung von Puy . 90 II 309
— unteres, Norddeutschland . . . . . 91 II 177
— — Südrussland . . . 92 II *85*
— Velay . . . . . 93 II 102
— Vicentin . . . . . 94 I 159
Oligocarpia Kliveri . . 91 I 440
Oligodon, Geinitzi . . . 94 I 198
— Kingi . . . . . 94 I 198
— Perm, Russland . . . 94 I 198
— Zitteli . . . . . 94 I 198
Oligoklas . . . . . 91 II 43
— abgerundeter, in Gneiss, Forfarshire . . . . 93 I 287
— Bakersville . . . . 91 II 243
— Einfluss der Temperatur auf die optischen Eigenschaften . . . 92 II 397
— Neubildung auf Contacten von Gneiss . . 90 II 81
— Südwest-Afrika . . . 90 I *116*
Oligoklasalbit in Felsokeratophyr, Lennegebiet . . . . . BB VIII *600*
Oligoklasporphyrit vom M. Visello . . . . 93 II 58
Oligoplarchus squamipennis 93 II 546
Oligopleurus vectensis . 93 I 174
Oligopygus costulatus . . 93 I 561
Oligotoma, Miocän . . . 93 II 199
— Uziellii . . . . . 91 II 464
Oliva platensis . . . . 94 I 370
Olivenit, Utah . . . . 91 II 46
Olividae, Oberes Miocän . 91 II 464
Olivin, Cingolina bei Padua 93 I *127*
— Einwirkung von gasiger und wässeriger HCl 94 I 26
— in Amphibolandesiten, Chaine des Puys . . 91 I 265

Olivin in Andesit, Japan BB VII *140*
— in Anorthosit, Canada BB VIII *465*
— in Basalt, Marburg 1891 II 165
— in Chondrit, Lundsgården . . . . . 92 I *139*
— — Misshof . . 1892 I *89*, *97*
— in Liparit, Island . . 93 I 498
— Lava des Mt. Vulture BB VII *598*
— Monzonigebirge . . . 90 I *78*
— Nordamerika . . . . 92 I 500
— Pike Co., Arkansas . 93 I 501
— See von Vico . . . 91 I 12
— sublimirt, Laacher See 92 II 408
— Synthese . . . . . 92 I 88
— Vesuvlava . . BB VII *420*, *422*
Olivinbasalt, Madagascar 90 II 96
Olivindiabas 1892 I 68. 93 II 498
— Anglesey . . . . . 91 I 87
— Cingolina . . . . . 93 I *127*
— Contacterscheinungen, Schottland . . . . 90 I 73
— Insel Bornholm . . . 90 II 94
— See von Alleghe . . 91 II 424
— Silur, Bergmassiv von Menez-Hom . . . . 90 II 397
— Walamo . . . . . 93 I 498
Olivin-Diabas-Porphyrit, Insel Bornholm . . . 90 II 94
Olivin-Feldspath-Basalt, Monte Baldo. . . . 90 I *82*
Olivinfels, Gabbrogebiet des Harzes . . . . 90 II 244
— Habendorf, Schlesien . 90 II 243
Olivingabbro, Alaska . . 93 I 506
— Gellivaraterritorium . 93 II 64
— Harzburg . . . . . 93 I 269
— Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
Olivingruppe, Isomorphismus in derselben . . 91 I *150*
Olivinknollen in Basalt, Westfalen . . . . 94 II 55
Olivinnorit, Madagascar . 90 II 96
Olivinskelett, Lava des Vesuv . . . . . 91 II *272*
Olivintholeyit . . . . 93 II 332
Olivinweisselbergit . . . 93 II 332
Olonos-Kalk, Morea . . 93 I 307
— Peloponnes . . . . 93 I 312
Omorika-Fichte . . . . 93 I 577
Omosaurus . . . . . 93 I 548
Omphacitfels . . . . . 94 I 461
Omphalea ficiformis . . 93 II 434
Omphalopteryx bohemica 93 I 554
Onagraceen . . . . . 91 I 340
Oncoceras . . . . . 90 II 147
Oncophora dubiosa . . . 93 II 555
Oncophora socialis . . 1893 II 555
Oncophora-Schicht . . . 93 II 555
Oncophoren-Sand, Mähren 1893 I 526. 94 II 126
Onisima ornata . . . . 91 II 207
Ontario-System . . . . 92 II 293
Onustus Muttensis . . . 93 I 381
Onychienquarzit, Nassau . 90 I 292
Onychocella magnoaperta 94 I 202
Onychodectes tisonensis . 90 I 334
Onychodontidae . . . . 92 II 358
Onychodus. . . . . 93 I 175
— anglicus, Devon . . 91 II 456
— arcticus, Devon, Spitzbergen . . . . . 91 II 456
— scoticus . . . . . 93 I 550
Onychoteuthidae. . . . 92 I 179
Oolith aus Kieselsäure . 92 I 321
Oolithe, Bildung . . . 92 I 598
— linsenförmige, im Keratophyr-Tuff . . . BB VIII *653*
— mikroskopische Structur 93 I 276
Oolithkörner im Muschelkalk von Thüringen und Hessen. . . . . 90 I 297
Oonia exilis . . . . . 91 II 176
— Guirandi . . . . . 91 II 176
Oonocarcinus anceps . . 94 I 513
— Geinitzi . . . . . 94 I 513
— insignis . . . . . 94 I 513
Opal, Elasticität . . . 92 I 11
— in Lenneporphyr . BB VIII *561*
— Mies . . . . . 93 I 11
— Neusüdwales. . . . 94 II 221
— Nord-Amerika . . . 93 I 255
— Oregon. . . . . 93 I 256
— Südnorwegen . . . 92 I 238
Opalia videns . . . . 90 II 153
Opalinus-Schichten, Karpathen . . . . . 93 II 148
— Mt. Grappa . . . . 94 I 506
— Südtirol . . . . . 91 II 321
Opeas corrupta . . . . 93 I 554
Operculina complanata . 91 II 194
Opetionella, Malm, Krakau 90 II 342
Ophicalcit, Fichtelgebirge 91 II *90*
— Thurman, New York . 91 II 301
Ophidioceras rota . . . 91 II 360
Ophiocten ferrugineum . 90 I 474
— Kelheimense . . . . 90 I 474
Ophioderma Hauchecornei 90 I 171
— squamosa . . . . . 90 I 171
Ophioglossum . . . . 90 I 180
Ophioglypha granulata . 94 II 474
Ophiolepis Damesi . . . 90 I 171
— ulmensis . . . . . 90 I 474

Ophiolithische Bildungen 1894 I 363
— innerhalb des Ligurien, Piemont . . . . . 90 II 312
Ophiomusium ferrugineum 90 I 474
Ophit . . . . . 92 I 69
— Andalusien . . . . 91 II 286
— Cap Noé . . . . . 90 II 405
— Msirda . . . . . 90 II 406
— Oran . . . . . 90 II 405
— Pseudomorphose nach Grammatit . . . . 91 II *90*
— Pyrenäen . . . . 91 II 287
— Tonkin . . . . . 94 I 303
— Trias, Ariège . 1894 I 72, 298
— Tunis . . . . . 92 II 268
Ophiuriden, Trias . . . 90 I 171
Ophiura . . . . . 90 I 473
— Dorae . . . . . 90 I 171
— prisca . . . . . 90 I 171
Ophthalmosaurus cantabrigiensis . . . . . 90 I 142
Opiliones . . . . 1892 I 176, 177
Opis gracilis . . . . . 90 I 115
— marvimensis . . . . 90 I 359
— megambona . . . . 93 I 537
— subavirostris . . . . 94 I 488
— ungula . . . . . 91 I 157
Opisoma Sarthacensis, Jupilles, Dep. d. Sarthe 90 I 117
Opisopneustes Cossoni . . 93 I 558
Opisthobranchiaten, paleocäne Schichten, Mons 90 I 357
Oppelia . . . . . 90 I *144*
— balkanensis . . . . 94 II 448
— bulgarica . . . . . 94 II 448
— tenuilobata . . . . 94 II 448
Opponitzer Kalke . . . 92 II 301
— Schwarzau . . . . 94 II 445
Opsigonus gracilis . . . 93 II 194
Optische Untersuchung der Krystalle in Flüssigkeiten gleicher Brechbarkeit . . . . . 91 I *70*
Oracanthus Bochumensis . 93 II 196
Oracodon . . . . . 90 II 143
— conulus . . . . . 93 I 390
Orangesande . . . . . 92 II 121
— Mississippibecken . . 93 I 373
Orangit, Südnorwegen . 92 I 242
Orbipecten . . . . . 93 I 403
Orbipora furcillata . . . 94 I 171
— seriata . . . . . 94 I 171
Orbit, Melibocus . . . 94 I 289
Orbitoiden, Java . . . 92 I *65*
Orbitoidenkalksandsteine, Balkan . . . . . 92 II 76
Orbitoides . . . . . 1892 II 374
— stellata . . . . . 90 II 166
Orbitoides-Schichten, Basilicata . . . . . BB VII *564*
— Trinidad . . . . . 94 II 130
Orbitolina Andreaei, Santander . . . . . 91 I *58*
— concava . . . . . 90 II 446
— lenticularis . . . . 90 II 446
— — Mte. Maggiore . . 93 I *55*
Orbulina-Schale . . . . 91 II 338
Ordovician Series . . . 93 I 334
Oreodaphne bohemica . . 93 II 431
— litsaeaeformis . . . 90 I 374
Oreodontidae 1892 I 406. 93 II 395
Oreomeryx proprius . . 93 I 388
— Rütimeyeri . . . . 93 I 388
— superbus . . . . . 93 I 388
Oreopithecus Bambolii . 91 II 149
Organismen im Grundgebirge . . . . 92 I *169*, 172
Orhomalus . . . . . 92 II 457
Orinosaurus capensis . . 92 I 413
Oriolampas Lorioli . . . 91 II 368
Oriskany-Fauna, Nord-Amerika . . . . . 93 I 119
Oriskany-Sandstein 1893 II 520. 94 II 440
— Bolivien . . . . BB VIII *108*
Ormonds-Breccie . . . BB VIII *183*
Ormonds-Zone, Schweiz BB VIII *181*
Ornatenkalk, brauner Jura, Lithauen . . . . . 90 I *171*
Ornithomimus sedens . . 93 II 191
— velox . . . . . 91 I 150
Ornithopoda . . . . . 90 II 434
Ornithopsis 1890 I 347. 91 I 151
Ornithosauria 1890 I 342. 92 II 452
Ornithosaurier-Becken . . 92 II 354
Ornithosaurier-Knochen, Weymouth . . . . 94 I 379
Orthacanthus . . . . . 91 II 167
— plicatus . . . . . 91 II 168
Orthaspidotherium . . . 92 II *238*
Orthechinus tunetanus . 93 I 560
Orthidium . . . . . 93 II 206
Orthis . . . . . 93 II 204
— Aymara . . . . BB VIII *61*
— biloba, Entwickelungsgeschichte . . . . 94 I 389
— Bolivien . . . . BB VIII *76*
— dorsoplana . . . . 90 II *229*
— dorsoplicata . . . . 93 I 408
— elegantula . . . . 91 II 184
— hipparionyx . . . . 92 II 364
— hybrida . . . . . 91 II 184

Orthis musischura . . 1893 I 408
— occulta . . . . . 93 I *6, 9*
— palmata . . . . . 91 I *273*
— papilio . . . . . 93 I *11*
— personata . . . . . 92 II 364
— provulvaria . . . . . 93 I *6, 7*
— testudinaria . . . . 92 II 372
— Tuff des Lennegebietes BB VIII *645, 662*
Orthit, Elsässer Belchen . 93 I 489
— in Granit, Nord-Argentinien . . . . BB VIII *334*
— Südnorwegen . . . 92 I 241
Orthoceras . . . . . 90 II 150
— Bolivien . . . . BB VIII *39*
— cinctum . . . . . 91 I 406
— planiseptatum . . . 90 II *237*
— Selkirkense . . . . 93 I 179
— semiplanatum . . . 93 I 179
— triangulare . . . . 90 II *237*
— ulbense . . . . . 93 II 374
— Winnipegense . . . 93 I 179
Orthoceras-Schiefer, Nassau 90 I 293
— rheinisches Devon . . 90 II *231*
Orthoceratidae . . . . 90 I 354
Orthoceratiten, Trenton-Kalk, Winnipeg . . 93 I 179
Orthoceratites vaginatus. 91 I *211*
Orthoceren-Kalk, Oeland 91 II 311
Orthochetus . . . . . 90 II 152
Orthochilus . . . . . 90 II 152
Orthochlorite . . . 1892 II 218, 229
Orthoklas, Berg Blagodat 90 II 20
— chemisches Verhalten . 94 II *269*
— Durbach . . . . . 92 I 282
— einen Pyroxen einschliessend . . . . 94 I 273
— Fichtelgebirge . . . 90 II *88*
— in Granit, Ortasee . 94 I 446
— in Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *364*
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Niederschlesien . . . 90 I *228*
— See von Vico . . . 91 I 13
— Südwest-Afrika . . . 90 I *114*
— Synthese 1891 I 240. II *90*. 92 II 270
— Val di Susa . . . . 91 II 407
— Vigezzothal . . . . 91 I 14
— Zwilling . . . . . 90 II 25
Orthoklasnevadit . . . 93 I 280
Orthoklaszwillinge, Verwachsungen . . . . 90 I 216
Orthomalus morinicus. . 94 II 350
Orthophyr, Allierthal . . 93 II 102
— Pelvoux . . . . . 94 I 298
Orthophyrit, quarzführend, Forez . . . . . 1890 II 81
Orthopis miliaris . . . 93 I 560
— occidentalis . . . . 94 I 372
Orthoptera . . . . . 93 II 412
— in Bernstein . . . 92 II 459
Orthoptychus striatus . . 94 I 150
Orthotheca . . . . . 94 I 196
Orthotherium. . . . . 92 II 337
Orthothetes, Bolivien . BB VIII *75*
Orthotichia . . . . . 93 II 205
Ortlerit, Tirol . . . . 90 I *79*
Orvillia. . . . . 90 I 359
Orycteropus Gaudryi, Maragha . . . . . 94 I 508
Orygoceras Brusinai . . 91 II 131
— levis . . . . . 91 II 131
Orygoceratidae . . . . 93 II 417
Osmeroides pectinolepsis . 94 I 171
Osmunda microcarpa . . 94 II 193
— Sturii . . . . . 94 II 193
Osteolepidae . . . . . 92 II 358
Osteolepis Tscherskyi . . 91 I 334
Osteophorus papyraceus . 94 I 370
Osteostraca . . . . . 92 II 357
Ostracoden 1892 I 422, 423; II 359, 457
— Bear-River-Formation, Wyoming . . . . . 94 I 383
— Devon und Silur . . 91 II 460
— Gault, Folkestone . . 94 II 164
— Kreide von Moltzow . 92 II 466
— märkisches Silur . . 94 II 467
— Manitoba . . . . . 90 II 334
— Mongolei . . . . . 92 II 360
— palaeozoisch . . . . 91 I 334
— — Pennsylvanien . . 91 I 335
— Silur . . . . . 93 II 410
— untersilurisches Geschiebe. . . . . 91 I 430
— Weald Clay, Isle of Wight . . . . . 90 I 152
— Westmoreland . . . 94 II 468
Ostracodenbank, Brünn . 93 I 525
Ostracodermi. . . . . 92 II 357
Ostrea . . . 1892 I 437, 589, 590
— aegyptica . . . . . 91 I 159
— agglutinans . . . . 94 I 370
— alifera . . . . . 94 I 372
— Aschersoni . . . . 91 I 159
— associata . . . . . 94 I 370
— aviola . . . . . 91 I 159
— Bravardi . . . . . 94 I 370
— Burmeisteri . . . . 94 I 370
— Caillaudi . . . . . 91 I 159
— Camelina . . . . . 94 I 372

Ostrea carica . . . . 1894 I 372
— chicaensis . . . . . 91 I 126
— crassissima als Leitfossil . . . . . 94 I 494
— curvirostris . . . . 91 I 156
— Dieneri . . . . . 91 II 129
— directa . . . . . 91 II 129
— flabelluliformis . . . 91 I 159
— fluctuosa . . . . . 91 I 159
— fragilissima . . . . 94 II 341
— Franklini . . . . . 94 I 370
— frondiformis . . . . 91 I 159
— Goldfussi . . . . . 93 I 182
— Ismaeli . . . . . 91 I 159
— Livingstoni . . . . 91 I 159
— longa . . . . . 94 I 370
— longirostriformis . . 90 II 289
— Maresi . . . . . 91 I 126
— Martapoerensis, Kreide v. Martapoera (Borneo) 90 II 416
— mediocostata . . . . 90 I 107
— Offreti . . . . . 91 I 126
— Pedemontana . . . 90 II 332
— perversa . . . . . 94 I 372
— protracta . . . . . 91 I 159
— queruniana . . . . 91 I 159
— ramosa . . . . . 91 I 159
— regalis . . . . . 91 I 159
— restans . . . . . 91 I 159
— Sapphonis . . . . . 91 I 159
— sororcula . . . . . 91 I 159
— Stanleyi . . . . . 91 I 159
— subelmina . . . . . 91 I 156
— tihana . . . . . 91 I 159
— Velaini . . . . . 91 I 126
— ventilabrulum . . . 91 I 159
— vermicostata, Cardita-Schichten . . . . . 90 I 107
— Wegmanniana . . . 90 I 359
Ostronella prima . . . 94 I 171
Ostsee, scheinbares Auslaufen derselben . . 91 II 100
Ostseegranite . . . . 92 I 307
Ostseekalk, Magnesiagehalt . . . . . 94 I *264*
Oterognathus Houzeaui . 91 II 157
Otolithus . . . . . 92 I 578
Otozamites linguiformis . 90 I 372
Ottawa-Gneiss, Canada BB VIII *422*
Ottrelit, Cornwall . . . 91 I 89
Ottrelit-Schiefer, Vermont 94 II 95
Ottweiler Schichten, Saalthal . . . . . 91 I 290
Ouachitit . . . . . 93 II 344
Ovaloid, Fresnel'sches BB VIII *121*, *224*
Ovaloid, Fresnel'sches, bei hexagonalen Krystallen . . . . . BB VIII *255*
Ovibos fossilis . . . 1894 I 178
— moschatus . . . . 91 II 340
Ovis antiqua . . . . . 91 II *150*
— argali . . . . . 91 II *125*
— argaloides . . . . 91 II *116*
— aries . . . . . 91 II *125*
— Clavicula-Knochen . . 93 I 541
— montana . . . . . 91 II *125*
— musmon . . . . . 91 II *125*
— nivicola . . . . . 91 II *125*
— Polii . . . . . 91 II *134*
Ovula Capellinii . . . 90 II 153
Oryctoblattina Arndti . 91 II 355
Owenornithiden, Argentinien . . . . . 93 I 545
Oxford, Baden . . . . 94 I 140
Oxford-Geschiebe, ostpreussische . . . . 94 II *211*
Oxford-Schiefer, Bonaduz, Schweiz . . . . . 94 I 296
Oxford-Stufe von Brienz . 93 II 528
Oxyacrum . . . . . 90 II 152
Oxydation von Schwefelmetallen durch den elektrischen Strom . 93 II 7
Oxyde, Löslichkeit . . . 92 I 503
Oxygnathus ornatus . . 92 II 456
Oxynoten-Fauna, Argentinien . . . . . 93 I 124
Oxynoticeras leptodiscus . 93 I 125
Oxyrhina Lundgreni . . 94 II 349

P.

Pachycormis insignis . . 94 II 465
Pachydera grandis . . . 90 I 170
Pachydiscus Naumanni . 91 II 174
Pachydomella . . . . 92 II 458
— tumida . . . . . 92 II 459
Pachyerisma . . . . . 93 I 555
Pachymegalodon 1892 I 397. II 363 93 I 555
Pachymylus Leedsi 1893 II 547. 94 I 383
Pachynodon . . . . . 93 II 186
Pachynolophus Duvalii . 93 I 148
— Prevosti . . . . . 93 I 148
Pachyornis Rothschildi . 94 I 376
Pachypora pusilla . . . 94 II 103
Pachypoterion cupulare 1893 I 565, 566
Pachypteria . . . . . 93 I 404

Pachyrhizodus . . . 1891 I 429
Pagrus, Melbourne . . . 93 II 194
Painterit . . . . . 94 I 35
Palackya philippinensis . 94 I 533
Palaeaspis . . . . . 92 II 358
— Flossen . . . . . 94 II 466
Palaeastacus . . . . . 92 II 457
Palaëchinus, Belgien . . 94 I 479
— elegans . . . . . 90 I *84*
— sphaericus . . . . 90 I *84*
Palaeechiniden . . . . 90 II 445
Palaeechinoidea . . . . 92 II 157
Palaega M'Coyi . . . . 90 II 146
— Sismondai . . . . 91 II 458
Palaeo-Avena stipaeformis 94 I 531
Palaeobates 1891 I *183*. 92 I 418
Palaeociconia australis, Argentinien . . . . 93 I 545
— cristata, Argentinien . 93 I 545
Palaeoconchen . . . . 93 I 407
Palaeocossus jurassicus . 91 I *41*
Palaeocryptonyx Donnezani 94 II 345
Palaeohatteria 1890 II 421, 431, 454. 1893 I 171, 547. 93 II 405
— longicaudata . . . . 90 I 144
Palaeolycus problematicus 91 II 356
Palaeomutela, Perm, Russland . . . . . 94 I 198
Palaeomylus . . . . . 92 II 357
Palaeonautilus . . . . 92 I 430
Palaeoneilo . . . . . 91 II 184
— Forbesi . . . . BB VIII *42*
Palaeonictis, Amerika . . 94 II 461
Palaeoniscidae . . . . . 92 I 420
Palaeoniscinotus . . . 93 II 194
Palaeoniscus Maacki . . 91 I 333
— sibiricus . . . . . 91 I 333
Palaeoniso Chrysalis, Spezzia . . . . . 90 II 297
Palaeontina . . . . . 90 II *14*
— oolitica . . . . . 91 I *41*
Palaeopemphyx affinis . 94 I 513
— Meyeri . . . . . 94 I 513
— sosiensis . . . . . 94 I 513
Palaeophis typhaeus . . 90 II 325
Palaeophycus Beverleyensis 91 II *103*
Palaeopinna . . . . . 93 I 404
Palaeoporella variabilis . 93 II *138*
Palaeoporellen . . . . 94 I *109*
Palaeoprionodon . . . . 91 II 146
Palaeosaccus Dawsoni . 94 I 522
Palaeoscincus costatus . 93 I 164
Palaeosilpha Fraasii . . 92 I 176
Palaeospheniscus, Argentinien . . . . . 93 I 545
Palaeospinax . . . . 1894 I 188
Palaeospondylus Gunnii 1892 II 456. 93 II 546
Palaeospongia prisca . . 91 II *92*
Palaeosyops . . . . . 92 II 141
Palaeotermes Ellisii . . 94 II 166
Palaeotherium crassum . 93 I 148
— curtum . . . . . 93 I 148
— latum . . . . . 93 I 148
— magnum . . . . . 93 I 148
— medium . . . . . 93 I 148
Palaeotragus . . . . . 93 I 543
Palaeoxyris . . . . . 93 I 203
Palaeozoicum . . . . . 93 II 115
— Balkanländer . . . 94 I 317
— Mächtigkeit der Ablagerungen, New York 94 I 335
— nördliches Appennin . 93 I 109
— Südwesten von Arkansas . . . . . 90 II 302
Palaeozoische Flora, Seealpen . . . . . 90 II 289
Palagonit . . . . . 93 II 308
Palaplotherium annectens 93 I 148
— codicense . . . . . 93 I 148
— magnum . . . . . 93 I 148
— minus . . . . . 93 I 148
Paleocän, Argentinien 1892 I 564. 93 I 104
Paliurus coloradensis . . 90 I 373
Pallasit, Eagle Station . 90 I 41
— Kiowa Co. . 1892 I 266. II 241
Palmacites annulatus . . 91 I 174
— dubius . . . . . 93 II 429
— flabellata . . . . . 91 II 208
Palmatopteris . . . . 93 II 425
— furcata . . . . . 93 II 425
Palmen . . . . . 92 I 609
Palmocarpon lineatum . 90 I 373
Palmoxylon cellulosum . 90 I 180
Paloestrus oligocenus . . 93 II 549
Paludina diluviana . . . 91 I 315
Paludinenschichten, Croatien . . . . . 94 I 359
— Rumänien . . . . . 94 I *113*
Palygorskit . . . . . 93 I 33
Pammiges spectrum . . 93 I 551
Pampas-Fauna . . . . 92 II 337
Pampas-Formation, Argentinien . . . . . 91 II 134
— Córdoba . . . . . 92 I 393
— Nord-Patagonien . . 93 I *22*
Pandanus lutetianus . . 91 I 174
— Nordenskiöldi . . . . 91 II 209
Pandermit, Schwarzes Meer 91 I 43
Pandora inaequivalvis . 90 I 357

Panenka . . . . . 1893 I 184
Panopaea . . . . . 92 II 361
— Nomenclatur . . . . 94 I 388
Pantobatrisus cursor . . 93 I 551
Pantolestes . . . . . 93 I 153
Papilionaceen . . . . . 91 I 343
Paposit 1890 I *53*. II *269*. 91 II 20
Papyrotheca contraria . 94 II 358
— mirabilis . . . . . 94 II 358
— pseudogyra . . . . 94 II 358
Parabrissus pseudoprenaster 94 I 203
Paraceltites . . . . . 90 II 150
Paradoxides-Schiefer, Böhmen . . . . . 94 II 96
— Languedoc . . . . . 94 II 299
Paradoxides-Zone, Skandinavien . . . . . 91 II 108
Paradoxidian, Montagne-Noire . . . . . 90 I 96
Paradoxocarpus . . . . 93 II *104*
Paragonit, Chloritschiefer 93 II 348
Paramelaphyr, Thüringen 94 I 459
Paramorphose von Rutil nach Brookit . . . . 91 I *217*
Parapecopteris neuropteridis . . . . . 94 I 220
Parapronorites . 1890 II 149, 441
Paraprosopon Reussi . . 94 I 513
Parapygus cassiduloides . 93 I 559
Parasalenia Fontannesi . 90 I 171
— graciosa . . . . . 90 I 171
— prisca . . . . . 90 I 171
Parasuchia . . . . . 94 II 157
Parathrissops Milloti . . 94 II 348
Pareiosaurus . . . . . 91 II 344
— bombidens . . . . 90 I 348
— Südafrika . . . . . 93 II 190
Pargasit, Grönland . . 91 II 24
Parisien, Piemont . . . 90 II 311
Parisit, Neugranada . . 90 II 57
— Südnorwegen . . . 92 I 265
Parkeria, Erhaltungszustand und Structur 90 II 340
Parkeridae . . . . . 93 I 199
Parkinsonia Parkinsoni . 90 I *2*
Parkinsonierzone, Leinethal . . . . . BB VII *271*
Parmacella unguiformis . 91 I 432
Paroniceras . . . . . 94 I 346
Partnachmergel, Ennsthal 93 II 138
Partnachschichten . . . 93 II 524
— im Wendelsteingebiet 92 II 91
— Wien . . . . . 94 II 310
Parvisipho . . . . . 90 II 152
Patella protea . . . . 90 I 157
Paterina . 1892 I *181*. 94 I 200
Patrisia eocenica . . 1893 II 434
Patula alata . . . . . 93 I 554
— densestriata . . . . 93 I 554
— Friči . . . . . 93 I 554
Paucituberculata . . . 93 II 395
$Pb(SbO)_2(C_4H_4O_6)_2 + 4H_2O$, Krystallform BB VIII *499*
Peace Creek beds, Florida 93 I 134
Pechbasalt, Kaiserstuhl . 93 II 504
Pechkohle . . . . . 93 II 388
Pechstein, Sachsen, Meissen 91 I 81
— Silvercliff, Rosita Hills 93 I 295
Pechsteinporphyr, Arran . 94 II 422
Pecopteris . . . . . 93 II 216
— Beyrichi . . . . . 94 II 376
— Buhsei . . . . . 93 II 434
— Choffati . . . . . 94 II 102
— cuspidata . . . . . 91 I 443
— Delgadoi . . . . . 94 II 102
— densa . . . . . 93 II 424
— ellipticifolia . . . . 94 I 220
— Geyleriana . . . . 93 II 502
— gracillima . . . . . 94 I 219
— Kidstoni . . . . . 94 II 102
— osmundacea . . . . 91 I 443
— Saportai . . . . . 94 II 102
Pecten . . 1892 II 360. 93 I 403
— aculeatus . . . . . 93 II 200
— aeolicus . . . . . 93 II 137
— bandolensis . . . . 91 I 159
— Bodenbenderi . . . 93 I 125
— Bosniasckii . . . . 90 II 153
— Carrhyensis . . . . 91 I 418
— Deeckei . . . . . 90 I 114
— fulminifer . . . . . 93 I 182
— Gabrieli . . . . . 91 I 159
— Guesfalicus . . . . 93 II 200
— Hallensis . . . . . 90 I 107
— Hosiusi . . . . . 93 II 200
— Humphreysi . . . . 90 II 332
— inaequialternans . . 90 I 114
— inexpectans . . . . 94 I 111
— Lias . . . . . 94 II 315
— Livoniani . . . . . 91 II 332
— Meissonieri . . . . 94 I 388
— mysicus . . . . . 93 II 136
— Neitheaeformis . . . 91 I 418
— Nordenskiöldi . . . 91 II 122
— oblongus . . . . . 94 I 370
— pradoanus . . . . 94 II *91*
— pusillulus . . . . . 91 I 157
— pyxidatus . . . . . 90 II 152
— quinquepartitus . . . 91 II 332
— Raouli . . . . . 90 I 157
— Roemeri . . . . . 90 I 360

Pecten Saccoi . . . 1890 I 114
— Saussetensis . . . . 91 I 418
— Schlosseri . . . . . 90 I 107
— Stantoni . . . . . 94 I 370
— subspinosus . . . . 91 I 159
— Tommasi . . . . . 90 I 114
— Valoniensis, Rhät, Luxemburg . . . . 90 I 299
— Woolmanni . . . . 90 II 332
Pectunculus-Schichten, Ungarn . . . . . 94 I *157*
Pediomys . . . . . 90 II 142
Pedipalpi . . . . . 92 I 177
Pegmatit . 1892 II 290. 93 II 328
— Argentinien BB VII *363*. VIII *277*
— Forfarshire . . . . 93 I 287
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Lappland . . . . BB VIII *723*
— Lausitz . . . . 92 II 81, 84
Pegmatitgänge, Echivara-Erzfelder . . . . . 93 II 65
Pektolith . . . . . 90 I *124*
— Disco-Insel . . . . 90 II 46
— Monzoni, Tirol . . . 91 I 216
Pelanechinus . . . . . 90 I *85*
Pelecanus Cautleyi . . . 93 II 545
Pelecyphorus . . . . . 94 I 382
Pelecypoden, Russland . 94 I 196
— Silur, West-Frankreich 91 II 363
— Stammbaum . . . . 91 II 361
— Tunis . . . . . 94 I 174
Pelmatozoen . . . . . 91 II 187
Peloponnes, Gebirgsbau . 93 I 306
— Geologische Karte . . 93 I 306
Pelosina spiculotesta . . 94 II 367
Peltastes Wrighti . . . 94 I 392
Peltephilus Clarazianus . 93 I 389
— grandis . . . . . 93 I 389
— Heusseri . . . . . 93 I 389
— pumilus . . . . . 93 I 389
— strepens . . . . . 94 I 389
Peltocaris Salteriana . . 94 II 352
Peltoceras Ruprechti, Jura 90 I *151*
Peltopleurus dubius . . 94 II 162
Pelycodus . . . . . 91 II 144
— helveticus 1893 I 149. 94 II *101*
Pendelbeobachtungen in den Vereinigt. Staaten 94 I 63
Penfieldit, Laurion . . . 94 II 219
Peniretepora carinata . . 94 I 171
Pennatulien, Eocän, Belgien . . . . . 93 II 559
Pennin . . . . . 92 II 225
— Texas . . . . . 94 I 57
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Pentacrinacea . . . . 90 II 137
Pentacrinusbank, Deutsch-Lothringen . . . 1891 I 411
Penta-Erythrit . . . . BB VII *18*
Pentameriden Australiens 94 II 441
Pentamerus borealis, Geschiebe bei Storchberg 91 II 447
— conchidium . . . . 90 II *257*
— Gotland . . . . . 94 I 335
— gotlandicus . . . . 94 I 123
— Hercynicus . . . . 90 I 437
— in Tuff des Lennegebietes . . . . BB VIII *645*
— Sascatchewan . . . 93 I 380
— Schmidti . . . . . 94 I 123
— solus, Prag . . . . 91 II 366
Pentremites, Ambulacren 94 II *79*
— pyriformis . . . . 94 II *82*
Peralestes . . . . . 92 II 340
Peralestidae . . . . . 92 II 344
Peramus . . . . . 92 II 340
Peraspalax . . . . . 92 II 340
Percylit, Atacama . . . 91 I 229
Pereiraïa Gervaisii . . . 93 I 364
Pereiraïa-Schichten, Krain 94 II 341
Pergamidia Attalea . . 93 II 136
Periaster Charmesi . . . 93 I 559
— Fischeri . . . . . 93 I 559
— minor . . . . . 93 I 559
Pericosmus coranguinum . 94 II 178
— Nicaisei . . . . . 93 I 557
— subaequipetalus . . . 93 I 557
Pericyclus Hauchecornei . 91 I 406
— subglaber . . . . . 91 I 406
Peridotit, Colorado . . . 90 I 84
— Cortlandt Series . . 90 I 87
— Elliott Co. . . . . 92 II 28
— Ithaca, N. Y. . . . 94 I 77
— Kentucky . . . . . 94 I 78
— Loch Lomond . . . 93 I 286
— Minnesota . . . . 93 I 292
— Neu-Seeland . . . . 92 I 318
— Penstscot Bay, Maine 90 II 268
— Pike Co., Arkansas . 93 I 500
Periklas . . . . . 94 I *9*
— ein Product der Magnesiumindustrie . . . 94 II 14
Periklin, Pfitschthal . . 91 II *1*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *116*
Periplaneta orientalis fossilis . . . . . 94 II 468
Periptychus . . . . . 91 II 146
— brabensis . . . . . 90 I 335
Perisphinctes . . 1894 II *213*, 448
— Abichi . . . . . 93 II 383
— biplex, Jura . . . . 90 I *153*
— caucasicus . . . . 93 II 383

Perisphinctes cimericus 1890 II *76*
— crussoliensis . . . . 90 II *76*
— Deeckei . . . . . 90 II 286
— Dunikowskii . . . . 90 II *76*
— eudichotomus, Jura . 90 I *153*
— frequens, Jura . . . 90 I *150*
— indogermanus . . . 90 I *175*
— Jubar, Jura . . . . 90 I *151*
— Kokeni . . . . . 93 I 125
— mniownikensis . . . 90 II *78*
— mosquensis 1890 I 142. 91 I 299
— obliqueradiatus . . . 91 I 300
— polygyratus . . . . 90 I *2*
— Sabineanus, Jura . . 90 I *151*
— seminudus . . . . 91 I 299
Perissodactyla 1890 II 431. 93 I 153
— Amerika . . . . . 90 II 315
Perlitische Risse in Canadabalsam . . . . . 90 II 390
Perm, Alpen 1893 II 369, 508. 94 II *4*
— Aveyron . . . . . 91 II 439
— Blanzy . . . . . 93 I 302
— Böhmen . . . 1891 II 166, 168
— Dep. Allier . . . . 91 II 315
— Devonshire . . . . 92 II 433
— Fallowfield . . . . 93 II 523
— französisches Centralplateau . . . . . 94 I 338
— Herault . . . . . 91 II 317
— Kasan . . . . . 94 I 321
— Leicestershire . . . 92 I 350
— N.-S.-Wales . . . . 90 II 107
— Nishny-Nowgorod . . 94 I 197
— Polen . . . . . 92 I 116
— Portugal . . . . . 92 I 351
— Spitzbergen . . . . 91 II 121
— Strettathal . . . . 93 II 523
— Texas . . 1890 I 98. 92 II 283, 298. 93 I 120. 94 I 117
— Timor und Rotti 1894 I 144, 331. 94 II 102
— Umgebung von Ričan 90 I 264
— vallée du Cher . . . 93 II 106
— Vanoise . . . . . 93 I 300
— Vlašim . . . . . 93 II 376
Permo-Carbon-Ablagerungen, Russland . . . 94 I 319
— NW.-Australien. . . 93 II 129
Perna Palestina . . . . 93 I 537
Peronella cylindrica . . 91 I 159
— striata . . . . . 91 I 159
Perowskit . . . . . 93 II 345
— Agua suja . . . . 94 II *300*
— auf Peridotit . . . 91 I 113
— Catalão . . . . . 94 II *297*
Perowskit in Jacupirangit 1892 II *145*
— Magnet Cove . . . 94 I 25
— optische Anomalie . BB VII *2*
— Pike Co., Arkansas . 93 I 501
— Pseudomorphose . . 94 II 232
— Südnorwegen . . . . 92 I 258
— Verwachsung mit Titaneisen, Ural . . . . 91 II 14
Persea Dilleri . . . . . 90 I 374
— macrophylloides. . . 93 II 434
— microphylla . . . . 93 II 434
— punctulata . . . . . 90 I 374
Personatus-Sandstein, Hetzlas . . . . . 91 II 305
Perthitstructur . . . . . 90 II 90
— der Kalifeldspäthe . BB VIII *300*
Petalit, Maine . . . . 91 II 415
Petchorien. . . . . 93 I 353
Petraselenodon Kowalewskii . . . . . 93 I 148
Petrobates. 1891 II 454. 93 I 172
— truncatus . . . . . 91 II 454
Petrodus patelliformis. . 90 I 349
Petroleum, Afghanistan . 94 II 296
— Apscheron . . . . . 92 I 370
— Elsass . . . . . 94 II 245
— Ohio und Indiana . . 92 I 87
Petroleumquellen, Mendoza 93 I 103
Pexidella thecidium . . 93 II 420
Pferd, Abstammung . . 94 I 374
— der Pampasformation. 92 I 568
— Pleistocän, Russland . 91 I 330
Pflanzen, arktische, südlich der Ostsee . . . 92 II 322
— — Suffolk . . . . 90 I 476
— Carbon, Argentinien . 94 I 527
— — Yorkshire . . . 93 I 424
— fossile, Comer-See . . 92 II 467
— — geographische Verbreitung . . . . . 94 I 526
— in Verrucano, Mte. Pisano . . . . . 93 I 574
— Kentucky . . . . . 90 I 373
— Kohlenkalk . . . . 92 I 194
— Laramie-Flora . . . 90 I 373
— Louisiana . . . . . 90 I 373
— Middle Coal Measures 92 I 192
— Radács bei Eperjes . 93 I 576
— Süsswasserkalk von Simeyrols . . . . . 92 I 466
— Travertin von Asoli . 92 I 467
Pflanzenfossilien, Oligocän, Monte Piano, Vicenza 90 II 170
— Rhät, Honduras . . 90 I 372
Pflasterstructur durch Contactmetamorphose . . 94 I 72

Phacelith, Constitution 1894 I 262
Phacidium myrtiphylli . 93 I 575
Phacoceras Dumbli . . 93 I 180
Phacochoerus, Algier . . 93 I 544
Phacopidae . . . . . 90 I 150
Phacops acuticeps . . . 91 II 172
— altaicus . . . . . 93 II 374
— batracheus . . . . 90 I 152
— Dagincourti . . . BB VIII *23*
— fecundus . . . . . 90 II *244*
— latifrons . . . . BB VIII *662*
— Potieri, Kalkfauna von St. Malo . . . . . 90 II 293
Phaëtonellus . . . . . 92 I 173
Phakolith, Giessen . . . 91 I 18
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— optische Structur . . 91 I *96*
Phalacrocorax pampeanus, Argentinien . . . . 93 I 545
Phaneropleuron . . . . 92 I 579
— curtum 1890 II 438. 94 I 187
Pharetronen der Kalkschwämme . . . . 91 I *281*
Pharmakolith, Leogang . 93 I 19
— optische Constanten . 90 I 215
— Steyermark . . . . 90 II 17
Pharmakosiderit, Elba . 90 II 18
— optische Eigenschaften 92 I *201*
— Pisek . . . . . 90 II 56
Phascolestes . . . . . 92 II 340
Phascolomys, Zahnentwickelung. . . . . 94 II 464
Phascolonus . . . . . 94 I 181
— gigas . . . . . 93 I 540
Phascolotherium. . . . 92 II 339
Phasianella abeihensis 1891 II 129. 94 I 190
— lariana. . . . . 90 I 114
— oolithica . . . . . 93 I 381
Phenacodus 1891 II 150. 93 I 155
— europaeus 1891 II 146. 94 II *101*
— minor . . . . . 91 II 146
Phenakit . 1891 II 43. 93 II 469
— Colorado . 1891 I 34. 91 II 242
— Dauphinée . . . . 94 II 225
— Florisant, Colorado . 90 I 221
— Mt. Antero . . . . 92 II 27
— Nord-Amerika . . . 92 I 500
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Philine patula . . . . 93 I 538
— scabra . . . . . 90 I 357
Phillipsastraea Currani . 94 II 364
— radiata. . . . . 90 I 474
— tuberosa . . . . . 90 I 474
— Walli . . . . . 94 II 364
Phillipsia glabra . . . 91 I 407
Phillipsia granulifera . 1891 I 407
— nitida . . . . . 91 I 407
— subaequalis . . . . 91 I 407
— trimeroides . . . . 91 I 407
Phillipsit . . . . . 93 II 28
— Krystallform . . . . 92 I *17*
— Lava des Mt. Vulture BB VII *600*
— optische Anomalien BB VII *2*
— Tiefsee. . 1893 II 288, 311, 319
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 238
Philomedes acanthoides . 94 I 514
Philoxene laevis . . . 91 II 172
Phlocothrips Pohligi . . 91 II 356
Phlogopit, Formel . . . 93 I 477
— in Cipolin. . . . . 93 I 275
— St. Lawrence Co. . . 91 II 244
Phlyctaenia . . . . . 90 II 152
Phlyctaenius acadicus. . 90 II 439
Phoca Grönlandica, Dordogne . . . . . 91 II 150
Phocina . . . . . 90 II 430
Phoebe Capelliniana . . 91 I 445
— elliptica . . . . . 93 II 434
— lanceolata . . . . 93 II 434
Phoenicochroït . . . . 94 II 230
— Synthese . . . . . 93 I 266
Pholadidea Brocchii . . 90 II 153
— papyracea. . . . . 93 II 555
— rugosa . . . . . 90 II 153
Pholadomya . . . . . 93 II 158
— anomala . . . . . 93 II 382
— Canavarii . . . . . 90 I 160
— consentina . . . . 94 II 314
— galloprovincialis . . 91 I 159
— hubertina . . . . . 91 I 159
— Knowltoni . . . . 94 I 371
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— Lerchi . . . . . 94 I 370
— ligeriensis. . . . . 93 I 537
— tyrrhena, Pliocänkalk, Insel Pianosa . . . 90 II 421
Pholadomyocardia Jelskii 90 I 160
Pholidolit, Taberg . . . 93 I 20
Pholidophorus germanicus 94 I 512
— gregarius . . . . . 94 II 162
— Maacki. . . . . 93 II 194
Pholidurus . . . . . 92 I 419
Phonolith, Afrika . . . 92 II 426
— Brasilien . . . . . 92 II 146
— Capverden . . . . 91 I 402
— Colorado . . . . . 90 I 427
— Contact mit Thon, Saint-Pierre-Eynac. . . . 93 I 272
— Garlton Hills . . . 93 I 288

Phonolith, Hegau . . 1893 II 487
— Heldburg bei Coburg. 90 I *99*
— Hohe Eifel . . . . 91 II 67
— Kaiserstuhl . . 1893 II 504, 506
— Meygal. . . . . 93 I 272
— Mt. Vulture . . . BB VII *602*
— Pik von Tingua . . 92 I 522
— Vélay . . . . . 91 I 264
Phormonotos gracilis . . 90 I 165
Phormopora irregularis . 90 I 165
Phormosella . . . . . 90 II 163
Phormosoma . . . . . 90 I *85*
Phosgenit . . . . . 94 I 6
— Monteponi . . . . 94 II 14
Phosphatconcretionen, Tiefsee. . . . . 93 II 317
Phosphate, Eintheilung . 91 II 431
— Florida . . . . . 94 I 161
— Kreide, Vicardi. . . 93 I 277
— linkes Maasufer. . . 94 I 147
— Navassa . . . . . 93 I 501
— Nordfrankreich . . . 94 I 147
— S. Dacota. . . . . 94 I 48
— Tunis . . . . . 94 I 160
Phosphor, starke Lichtbrechung . . . . . 93 II *130*
Phosphorit, Algier . . . 92 I 526
— Algier und Tunis . . 90 II 97
— Cap Leuca . . . . 90 II 221
— Ciply und Beauval, Entstehung . . . . . 90 II 86
— Dekma, Tunis . . . . 91 I 268
— Doullens . . . . . 92 I 367
— Frankreich . . . . 93 II 540
— Lias, Lothringen 1894 I 344, 485
— Montay und Forest . 90 II 86
— Picardie . . . . . 92 I 367
— Tunis . . . . . 92 II 268
Phosphoritenkreide . . . 94 I 352
Phosphoritsand, Tertiär, Russland . . . . . 94 I 361
Phosphorjodür . . . . 94 I *42*
Phosphorochalcit, Semipalatinsk . . . . . 94 II 234
Phosphorosaurus Ortliebi 91 II 157
Phosphorpentachlorid . . 94 I *43*
Phosphorsäure in Erzen . 93 II 276
— Unterscheidung von Arsensäure . . . . 94 I 7
Phosphosiderit . . . . 92 I 230
Phragmatoecites . . . 90 II *15*
— Damesi. . . . . 91 I *41*
Phragmicoma. . . . . 92 II 378
Phragmoceras . . . . 90 II 147
Phryganeen-Larven . . 94 II 166
— in Hohlräumen von Tuff 93 II 550
Phthanit, Belgien . . 1891 II 202
— Californien . . . . 94 II 268
— Mte. Diablo . . . . 93 I 100
Phycodella . . . . . 91 I 285
Phyllacanthus javana, Java 90 I 313
— sundaica, Java . . . 90 I 313
— tirsiger, Golfo della Rotte . . . . . 90 II 421
Phyllerium priscum . . 94 I 530
Phyllit, Altenberg . . . 93 I 92
— Argentinien . . . BB VII *357*
— Bacher Gebirge . . 94 I 462
— Bingen. . . . . 94 II 305
— Centralplateau Frankreich . . . . . 93 I 299
— Gailthal, Ost-Alpen . 94 II 60
— Hegyes-Drócsa . . . 93 I 95
— Hohes Gesenke . . . 93 II 124
— in Contact mit Granit 91 II 271
— Kleinasien . . . . 94 II 86
— Mähren . . . . . 92 II 272
— magnetitführend, Tubize. . . . . 90 I 72
— Maryland. . . . . 92 II 283
— Murau und Neumarkt 93 I 337
— Omeo-District, Gippsland . . . . . 90 I 433
— Sachsen, Berggiesshübel . . . . . 91 II 270
— — Nassau . . . . . 91 II 274
— — Oschatz-Wellerswalde . . . . . 91 II 266
— schwarz, Stavelot . . 90 I 72
— Skandinavien . . . 94 I 100
— Süd-Georgien . . . 91 II 104
— Ungarn . . . . . 91 I 127
— Vanoise . . . . . 93 I 300
— Vogtland . . . . . 92 II 79
Phyllites . . . . . 91 I 444
— acuto-serratus . . . 93 II 434
— alsodaiaeoides . . . 93 II 434
— aspidospermaeoides . 93 II 434
— banistaeriaeoides . . 93 II 434
— bumelioides . . . . 93 II 433
— coccolobaefolia . . . 93 II 434
— dipterocarpoides . . 91 II 208
— rhusoides . . . . . 93 II 433
— sauraujaeoides . . . 93 II 434
— sinuatus . . . . . 94 II 194
— Spireae . . . . . 93 II 433
— ternstroemiaeoides. . 93 II 434
— triplarioides . . . . 93 II 434
— wascoensis . . . . 90 I 374
Phyllitformation, Sachsen, Pirna . . . . . 94 II 284
— — Rosswein. . . . . 91 I 73

Phyllitformation, Sachsen, Tanneberg . . . 1891 I 76
Phyllitgneiss, Süd-Georgien . . . . . 91 II 104
Phyllocarida, palaeozoische, Grossbritannien. . . 90 II 329
Phyllocariden 1890 I 152. 92 I 422
— Cambrium, Canada . 93 II 548
Phylloceras . . 1893 II 197, 382
— Abichi . . . . . 93 II 382
— antecedens . . . . 94 I 385
— bajociense. . . . . 94 I 385
— Elteni . . . . . 94 I 385
— ezoënse . . . . . 91 II 174
— Friderici Augusti . . 94 I 385
— Goreti . . . . . 93 II 551
— heterophyllum . . . 90 I *2*
— homophyllum . . . 93 I 126
— Imereticum . . . . 93 II 382
— mediterraneum . . . 92 II 460
— ovale . . . . . 94 I 385
— paucicostatum . . . 94 I 385
— protortisulcatum . . 94 I 385
— retroplicatum . . . 94 II 356
— schwäbischer Jura . . 94 I 385
— subtortisulcatum . . 94 I 385
— supraliasicum . . . 94 I 385
— transiens . . . . . 94 I 385
Phyllocladites crenatus . 91 I 443
Phyllocladus laciniosa . 91 I 444
Phyllocoenia grandissima 93 I 194
— incrassata. . . . . 93 I 194
— Kokeni. . . . . 93 I 194
— Pomeli. . . . . 94 I 174
Phyllofrancia grandis . . 90 I 166
Phyllograptus . . . . . 92 I 188
Phyllolepidae. . . . . 92 II 358
Phyllopoda, palaeozoische 1890 II 329. 94 II 163
Phyllopora fenestrata . . 94 I 171
Phyllostomata . . . . 90 II 429
Phymatolithes algaeformis 94 I 172
Physa norica. . . . . 91 II 445
Physeteridae . . . . . 92 II 145
Physocaris vesica, Grossbritannien . . . . 90 II 329
Physopoden, Braunkohlengebirge von Rott am Siebengebirge . . . 91 II 356
Phytocatix antiquus . . 91 II *103*
Picea Englesi . . . . . 92 II 183
— Omorica . . . . . 93 I 577
Pickeringit . 1890 I *52*. 91 II 22
— Tarapacá in Chile . 90 II 276
Picotit im Basalt, Marburg 1891 II *173*, *187*, *199*
Picroalaunogen . . . 1890 I *52*
Piemontit-Sericitschiefer, Chichibu . . . . . 92 I 314
Pierwürmer . . . . . 92 II 266
Pietre verdi, Chialamberto 94 II 437
Piëzoelektricität, allgemeine Theorie . . 92 I 215
Piëzoelektrische Krystalle 94 II *241*
Piëzoelektrisches und elektrooptisches Verhalten des Quarz . . . . 91 I 368
Pigment der schwarzen Kalke . . . . . 93 II 245
— des blauen Steinsalzes 93 II 246
Pikermi-Fauna, Ambérien 94 II 325
Pikrit, Garabal Hill . . 93 I 286
— Port du Moulin . . 91 I 89
Pikritporphyrit . . . . 93 II 346
— I. of Man. . . . . 92 II 264
— Pike Co., Arkansas . 93 I 501
Pikromerit . . . . . 93 II 389
— Kalusz. 1892 II 71. 94 I 472
Pikropharmakolith . . . 93 II 463
Pileolus, Jura, Campanien 90 I *96*
— sphaerulitum. . . . 91 II 129
— Valfinensis . . . . 91 II 176
Pilocarpus Saavedrai . . 93 II 434
Pilumnus spinosus . . . 93 I 178
Pilze, Tertiär . . . . 93 II 431
Pinacophyllum parallelum 93 I 199
Pinakiolith . . . 1892 I 21, 23
Pinit, Analyse, Entstehung 94 I 37
— Japan . . . . . 92 I 235
— Puy-de-Dôme . . . 94 II 226
Pinites cavernosus . . . 91 II 384
— Conwentzianus . . . 90 II 347
— latiporus . . . . . 91 II 384
— lepidodendroides . . 90 I 173
— pauciporus . . . . 91 II 385
Pinitgranit . . . . . 93 II 102
Pink-Grossularit . . . 93 II 479
Pinna Raibliana . . . 90 I 114
— Tiltonensis . . . . 91 II 321
— Tommasi . . . . . 94 II 141
Pinnipedia. . . . . 90 II 430
Pinus arctica. . . . . 93 II 568
— baltica . . . . . 92 II 183
— banksianoides . . . 92 II 183
— cembrifolia . . . . 92 II 183
— Felekiensis . . . . 93 I 432
— goniosperma . . . . 94 I 530
— Kleinii . . . . . 92 II 184
— Palaeo-Pinea . . . 94 I 530
— Picea . . . . . 93 II 430
— Reichiana. . . . . 92 II 184
— Schenkii . . . . . 92 II 184

Pinus schoeneggensis . 1894 I 530
— silvatica . . . . . 92 II 183
— stenosperma . . . . 94 I 530
Piper Heerii . . . . . 90 I 373
Piperno, Campanien . . 91 II *326*
— Entstehung . . . . 93 II 51
Pirenopsis . . . . . 90 II 151
Pisodus Oweni . . . . 94 I 186
Pisolith-Structur, Jura . 91 I 89
Pistacia vera. . . . . 93 II *100*
Pithodella articulata . . 90 I 167
— cincta . . . . . 90 I 167
Pitoxylon Pachytanum . 93 II 430
Pitticit . . . . . 93 II 463
Pittosporaceen . . . . 91 I 337
Pityoxylon . . . . . 92 I 607
— Nordenskiöldi 1891 I 351. 93 II 430
Placenticeras glabrum . 91 I 158
— placenta . . . . . 91 I 158
Placentula inornata . . 92 II 458
— marginata . . . . 92 II 458
Placodermen 1890 II 348. 92 II 357. 93 II 178
— Ruderorgane. . . . 94 II 163
— Silur . . . . . 91 I *285*
Placodin . . . . . 94 I *19*
Placoidei . . . . . 92 II 151
Placospongia melobesioïdes 91 II 370
Placunanomia . . . . 92 I 181
Placunopsis Rothpletzi . 90 I 107
Pläner, Böhla . . . . 93 I 94
Plaesiacomia . . . . . 91 II 459
Plaesiomys . . . . . 93 II 205
Plagiaulacidae . . . . 92 II 341
Plagiaulax . . . . . 92 II 341
— Zahn, Wealden. . . . 94 I 182
Plagiobrissus. . . . . 90 I 361
Plagioklas, Chondrit von Misshof . . . . . 92 I *95*
— des Anorthitfels, Canada . . . . BB VIII *439*
— des Lenneporphyrs BB VIII *557*, *565*, *576*, *588*, *600*
— in Andesit, Japan. BB VII *135*
— in Diabas, Virginia . 92 II 427
— in Gabbro, Transvaal BB VII *93*
— in Granit, Ortasee . 94 I 446
— in Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *392*
— Nord-Argentinien BB VIII *302*, *379*
— optische Constanten der isomorphen Reihe BB VIII *172*
— Synthese . . . . . 93 II *45*
— Vesuvlava . .BB VII *421*, *422*
Plagioklas, Zonarstructur 1894 I 69, 261
Plagioklasbasalt . 93 II 330, 492
— Breitfirst . . . . . 92 I 279
— Cassel . . . . . 92 I 277
— Eifel . . . . . 92 II 415
— Frankfurt a. M. . . 94 II 418
— Gough's Island . . . 94 II 263
— im Veronesischen . . 92 I 286
— Mexico . . . . . 90 II 275
— Roveredo, Südtirol . 90 I *82*
— Stromboli . . . . . 93 I 492
Plagioklasite, Sinnithal, Basilicata . . . . 93 I 279
Plagioklasporphyr, Pellegrinthal . . . . . 90 I *81*
Plagioklas-Skapolith-Amphibolit, Canada . . 90 I 432
Plagioklasskelette, Lava des Vesuv . . . . 91 II *280*
Plagiolepis labilis . . . 94 II 469
Plagioptychus Aguilloni . 91 I 160
— Arnaudi . . . . . 91 I 160
— cordatus . . . . . 90 I 360
— paradoxus. . . . . 91 I 160
Plagiotheutis, russischer Jura . . . . . 93 I 400
Plaisancien, Montpellier . 90 II 308
— Nadorthal. . . . . 92 I 373
— Umgebung von Bra . 90 II 124
Planaria, Pliocänkalk, Insel Pianosa . . . 90 II 421
Planctoceras . . . . . 92 I 433
Planilimbata-Kalk, Bottnisches Meer. . . . 94 II 98
Planispirina auriculata . 94 II 367
Plankton . . . . . 93 II 303
Planorbis Blažkai . . . 93 I 554
— dubius . . . . . 91 II 131
— goniophorus . . . . 91 II 463
— Leymerici. . . . . 94 I 364
— Nord-Patagonien . . 93 I *24*
— praepontica . . . . 91 II 131
Plasticität. . . . . 93 II 2
Platacodon 1890 II 143. 93 I 391
Platanaceen . . . . . 91 I 339
Platanen, Abstammung . 92 II 374
Platanistidae. . . . . 92 II 145
Platanoiden, Ursprung . 91 II 379
Platanus aceroides . . . 92 II 375
— basilobata . . . . 90 I 180
— borealis . . . . . 93 II 429
— Guillelmae . . . . 92 II 376
— Haydeni . . . . . 92 II 376
— Heeri . . . . . 93 II 220
— Klebsii. . . . . 93 II 428

Platanus marginata . 1892 II 376
— Newberryana . . . 92 II 376
— orientalis . . . . . 92 II 374
— primaeva . . . . . 92 II 376
— Raynoldsii . . . . 92 II 376
— rhomboidea . . . . 92 II 376
Plateosaurus . . . . . 93 II 193
Platin . . . . . 92 I 83
— British Columbia . . 90 II 384
— Canada . . . . . 93 II 15
— in Dunit, Ural . . . 94 I 432
— Sudbury . . . . . 92 II 410
— Ural . . . . . 94 II 218
Platinakrystalle . . . . 93 II 40
Platopis, Kreide, Syrien 94 I 190
— obruta . . . . . 93 I 538
— plicata . . . . . 93 I 538
— triangularis . . . . 93 I 538
— undata . . . . . 93 I 538
Plattensandstein, Neckarthal . . . . . 94 I 341
Plattnerit . 1891 I 377. 94 I *19*
— Idaho . 1893 I 237. 94 II 22
— Synthese . . . . . 92 I 19
Platyacanthus ventricosus 91 II 168
Platyceras . . . . . 91 II 182
— subquadratum . . . 91 II 172
— Symbiose mit Crinoiden 91 II 182
Platychilina . . . . . 92 II *26*
— Wöhrmanni . . . . 94 II 142
Platychilus . . . . . 90 II 151
Platycnemis Icarus. . . 93 II 549
Platycrinus hieroglyphicus 94 I 171
Platyglena affinis . . . 90 I 168
— clava . . . . . 90 I 168
— ocellata . . . . . 90 I 168
Platynus dilapidatus . . 93 II 549
Plectorthis . . . . . 93 II 204
Plectospongidae . . . . 94 I 522
Pleiona, Foraminifere, Ofener Mergel . . . 90 II 343
— princeps . . . . . 91 I 165
Pleistocän, Canada. . . 93 I 434
— Freiburg . . . . . 92 I 540
— Insel Barbados . . . 93 I 102
— Raunheim, Hessen . . 90 I *82*
— Sussex . . . . . 93 I 136
— Texas . . . . . 94 I 114
— Trunkey-District . . 94 I 111
— Velay . . . . . 93 II 104
Pleochroismus, Beobachtungsmethode bei mikroskopischen Krystallkörnern . . . . . 94 I 4
— der geglühten Hornblende . . . . . 91 I *291*
Pleochroismus in Gesteinsschliffen . . . . 1891 I 59
Pleochroitische Höfe, Doppelbrechung . . 91 I 7
Pleonast, Monzoni, Tirol 91 I 216
Pleonektit, Sjögrubenfeld, Örebro . . . . . 90 II 54
Plesiadapis 1892 II *238*. 93 I 149
Plesiarctomys . . . . 93 I 152
— Schlosseri . . . . . 93 I 149
— sciuroides . . . . . 90 I 338
Plesiaster Cotteaui. . . 93 I 559
— Peini . . . . . 93 I 559
Plesiochelys . . . . . 91 I 151
— Brodiei. . . . . 91 I 151
Plesiomeryx . . . . . 93 I 148
Plesiosaurus indicus . . 91 II 347
— Kreide, Brasilien . . 93 I 163
— — Kansas . . . . 92 I 415
— mesozoisches Gestein, Queensland . . . . 90 II 326
— recentior . . . . . 92 II 355
Plesiospatangidae . . . 92 II 164
Plessiocerithium . . . . 90 II 152
Plessit . . . . . 92 I 269
— Meteorit von Kiowa . 94 I 448
Pleuracanthus . . . . 91 II 167
— Gaudryi . . . . . 91 II 161
Pleurasit, Gouv. Örebro 1890 I *253*. II 222
Pleuraspidotherium . . 92 II *238*
Pleurocoelus . . . . . 92 I 162
— altus . . . . . 91 II 155
— nanus . . . . . 91 II 155
Pleurodiadema, Pereirae. 91 II 192
Pleurodictyum . . . . 93 I 415
— giganteum . . . . 91 II 172
— problematicum, Devon 1891 I 404; II 172. 92 I 346
Pleurodus . . . . . 93 I 397
Pleuromya carinata . . 90 I 115
— Henselli . . . . . 94 I 371
— lata . . . . . 90 I 115
— lineatopunctata . . . 94 II 314
Pleuronautilus . . . . 90 II 150
— auriculatus . . . . 94 II 169
— striatus . . . . . 94 II 169
Pleuronectites . . . . 93 I 403
Pleuroplax. . . . . 93 I 397
Pleurosaurus Goldfussi . 94 I 378
Pleurosternum portlandicum . . . . . 92 II 455
Pleurostomella jurassica . 93 II 561
— peregrina . . . . . 91 II 175
Pleurotoma . . . . . 92 I 586
— Austro-Gallica . . . 92 II 462

Pleurotoma Buffoni . 1892 II 462
— colon . . . . . 90 I 156
— Dautzenbergi . . . 91 II 464
— evoluta. . . . . 92 II 462
— haeringensis . . . . 92 II 462
— pseudeburnea . . . 90 II 332
— Torcapeli . . . . . 92 II 462
— turbida. . . . . 90 I 156
Pleurotomaria . . . BB VIII *662*
— Charpyi . . . . . 91 II 176
— Denckmanni . . . . 91 I 406
— Duponti . . . . . 91 I 406
— exsul . . . . . 94 II 142
— Gilliéroni . . . . . 93 I 381
— Guirandi . . . . . 91 II 176
— Kayseri . . . . BB VII *40*
— lodanensis . . . . 91 I 406
— Lorioli . . . . . 94 I 488
— valfinensis . . . . 91 II 176
Pleurotomen, Miocän . . 91 II 464
— Tertiär . . . . . 93 II 198
Pleurotrema . . . . . 94 I 514
Plicatocriniden, Posen . 94 II 360
Plicatula . . . . . 92 II 361
— Dentonensis . . . . 94 I 372
— Macphersoni . . . . 93 II 162
Pliocän, Algier
1891 II 445. 93 I 190
— Anvers . . . . . 93 II 534
— Arnothal . . . . . 93 I 133
— Basilicata. . . . BB VII *580*
— Bresse . . . . . 93 I 302
— Calabrien . . . 1892 II 116, 117
— England . . . . . 92 II 113
— Eruptionen, Almeria . 90 II 269
— Florida . . . . . 93 I 134
— Freiburg i. Br. . . . 92 II 123
— Gard . . . . . 91 II 445
— Granada . . . . . 91 I 126
— — und Malaga. . . 93 I 326
— Java, Pflanzen . . . 91 II 208
— Lampedusa . . . . 92 II 314
— Lassen Peak-Bezirk . 91 I 108
— Michelstadt, Odenwald 94 I 358
— Montpellier . . . . 90 II 307
— Mte. Diablo . . . . 93 I 100
— Mugello . . . . . 92 II 117
— Nador-Thal . . . . 92 I 372
— Nordamerika. . . . 92 I 554
— oberes, Timangebiet . 94 I 324
— Osimo . . . . . 92 II 314
— Rhodus . . . . . 94 II 128
— Sciacca . . . . . 92 I 144
— See, Rhein- und Mainthal. . . . . 90 I 448
— Süden Russlands . . 90 I 125
Pliocän, Südspanien . 1893 I 423
— Syrien . . . . . 92 II 120
— Thal des Sabato, Unteritalien . . . . . 91 II *41*
— Tremiti-Inseln . . . 93 I 529
— Tunis 1890 II 96. 93 I 318, II 513
— Umgebung von Issoire 90 II 300
— — von Puy . . . . 90 II 309
— Unterelsass . . . . 93 I 528
— Unteritalien . . . . 91 II *59*
— Val Sesia . . . . . 92 I 143
— Velay . . . . . 93 II 104
— Vendée. . . . . 91 I 120
— Vögel, Roussillon . . 94 II 345
— Yucatan . . . . . 92 II 121
Pliocän-Conchylien, Bari 90 II 123
Pliocänflora, Mongardino, Oberitalien . . . . 91 I 445
Pliocänkalk, Insel Pianosa 90 II 420
Pliocänsand, Anvers . . 90 II 113
Pliolampas . . . . . 90 I 361
— tunetana . . . . . 93 I 560
Pliosaurus. . . . . 92 II 355
Plocoscyphia arborescens 93 I 566
— reticulata . . . . . 93 I 566
Plocostoma . . . . . 90 II 151
Plumaster ophiuroides . 90 II 334
Plumbocalcit, Schottland 91 II 18
Plumbocuprit, Semipalatinsk . . . . . 94 II 234
Plumboferrit, Jakobsberg 93 I 236
Plumbonakrit . . . . 91 I 377
Plumbostannit . . . . 93 II *123*
Plumeria austriaca 1893 I 431, 432
Plutonische u. vulcanische Gesteine . . . . . 91 I 272
Plutono-Metamorphismus. 90 II 388
Poacites arundinacea . . 91 II 208
— cyperoides . . . . 91 II 208
— petiolatus. . . . . 94 I 531
— pusillus . . . . . 94 I 531
— schoeneggensis . . . 94 I 531
— semipellucides . . . 94 I 531
— subrigidus . . . . 94 I 531
Poacordaites expansus . 93 I 206
— palmaeformis . . . 93 I 206
— praelongatus. . . . 93 I 206
Pockets . . . . . 91 I 35
Podobursa Dunikowskii, Krakau . . . . . 90 II 343
Podocapsa trigonia, Krakau . . . . . 90 II 343
Podogonium . . . . . 91 II 382
Podolen-Marmor. . . . 93 II 519
Podomyrma Mayri . . . 94 II 469
Podostemaceen . . . . 91 I 339

Podozamites latipennis 1891 I 443
Poecilomorphus macer . . 90 I 470
Poederlien . . . . . 92 II 309
Poikilitische Structur . . 94 II 51
Polacanthus Foxi 1894 I 508. II 158
Polarform . . . . . 94 I 432
Polianit . . . . . 94 I *21*
— Zusammensetzung . . 94 II 405
Polites interminata . . 91 II 332
Pollia . . . . . 91 II 181
— Badensis . . . . . 91 II 181
— Barrandei . . . . . 91 II 181
— Bellardii . . . . . 91 II 181
— cheilotoma . . . . 91 II 181
— Lapugyensis . . . . 90 II 181
— Mariae . . . . . 91 II 181
— moravica . . . . . 91 II 181
— ranellaeformis . . . 91 II 181
— subpusilla . . . . . 91 II 181
— Weinsteigensis . . . 91 II 181
— Wimmeri . . . . . 91 II 181
Polliceps validus . . . 93 II 196
Pollux, Constitution . . 94 I 262
— Hebron, Maine . . . 94 I 39
Polvorilla . . . . . 93 II *118*
Polyacrodus . . . . . 92 I 418
Polyarsenit, Sjögrufvan . 90 I 410
Polybasit . . . . . 91 I 377
— Colorado . . . . . 94 II 219
— Mexico . . . . . 91 II 417
Polycirsus . . . . . 90 II 151
Polycoelia angusta . . . 94 II 103
Polyconites Verneuili . . 93 I 407
Polycope sublenticularis . 91 II 461
Polydymit . . . . . 93 II 259
— Kirchen . . . . . 92 II 408
Polyëder . . . . . 94 I *197*
Polyëderkaleidoskope . . 90 I *234*
Polygonosphaerites tesselatus . . . . . 93 I *43*
Polyjerea indistincta . . 94 I 210
Polykras, Carolina . . . 94 I 25
Polymastodon . . . . 92 II 342
Polymastodontidae . . . 92 II 341
Polymignyt, Südnorwegen 92 I 252
Polymorphie 1892 I 16. 93 I 459
Polymorphina compressa . 94 II 368
— formosa . . . . . 94 II 368
— liasica . . . . . 93 II 212
— Orbignyi var. cervicornis . . . . . 94 I 525
— seminulina . . . . . 91 II 175
Polymorphismus 1894 I 8, 425. II 216
Polypora rhomboidea . . 94 I 171
Polyporus officinalis . . 94 I 53
Polypterus . . . . . 93 I 172
Polyptychites Beani . 1893 I 355
— gravesiformis . . . 93 I 355
— Lamplughi . . . . 93 I 355
— ramulicosta . . . . 93 I 355
— triplodiptychus . . . 93 I 355
Polyptychodon Archiaci . 92 II 355
Polysteganinae . . 1891 I *278*, *281*
Polysterocarpus cornutus 94 I 220
— radians . . . . . 94 I 220
Polytremacis Chalmasi . 94 I 174
— stomatoporoides . . . 94 I 174
Polyzoa, Manitoba . . . 90 II 334
Pomaceen . . . . . 91 I 342
Pomatograptus . . . . 92 I 453
Pomatospirella . . . . 93 II 420
Ponera leptocephala . . 94 II 469
Pontische Stufe . . . . 94 I 492
— Caspisches Meer . . 90 II 118
— Comitat Tolna . . . 91 II 330
— Don . . . . . 94 I 156
— Mähren . . . . . 94 I 154
— Melitopol . . . . . 91 I 284
— Ungarn . . . . . 91 I 127
Pontocypris acuminata . 92 II 459
— illinoisensis . . . . 92 II 458
— trigonalis . . . . . 94 II 165
Pontosaurus . . . . . 94 I 511
Popanoceras . . . . . 90 II 149
— Connelli . . . . . 91 II 170
Populus tenuinervata . . 90 I 373
Poranthin, Wärmeleitung 94 I 5
Porcellanerde, Nagy-Michály . . . . . 94 I 291
Porina bioculata . . . 94 I 519
— gastropora . . . . 90 I 168
— pachyderma . . . . 90 I 168
— pustulosa . . . . . 90 I 168
— salebrosa . . . . . 90 I 168
— seriata . . . . . 90 I 168
— spathulata . . . . 90 I 168
Porites limosa . . . . 90 I 369
Porocidaris lingualis . . 93 II 422
Porocypellia, Malm, Krakau . . . . . 90 II 342
Porocystis pruniformis . 94 I 372
Porodiscus glauconitarum 93 II 423
Porodit, Minnesota 1893 I 292. II 516
Porolepis . . . . . 93 I 177
Porona Bendirei . . . 90 I 374
Poros . . . . . 93 II 171
Porosit, Wärmeleitung . 94 I 5
Porosphaera globosa . . 94 I 174
Poroxylon stephanense . 90 II 350
Porphyr . . . 1893 II 333, 362
— anscheinend eruptiv, Melrose . . . . . 93 II 498

Porphyr, Auerberg im Harz 1891 II 64
— Berra, Schweiz . . BB VIII *196*
— Contact mit Kohlenkalk, Krzeszowice, Krakauer Gebiet . . . 90 II 260
— Dobritz, Sachsen . . 91 I 81
— Eisackthal . . . . 90 I *80*
— Elba, Alter . . . . 94 I *99*
— Mairus . . . . . 90 I 69
— Orta-See . . . . . 91 II 427
— Saalthal . . . . . 91 I 291
— Salzbrunn . . . . . 94 II 78
— schiefriger, der Windgälle . . . . . BB VIII *569*
— Siebenbürgen . . . 91 II 72
— sphärolithischer, Samos 93 II 495
— Thüringen . . . . 91 II 277
— Tirol . . . . . 90 I *72*
— Tonkin . . . . . 94 I 303
— untere Lahn . . . BB VIII *710*
Porphyrbreccie, Dossenheim . . . . 1892 II 87, 433
— Lago d'Orta . . . . 93 II 57
Porphyrellit, Minnesota . 93 II 516
Porphyrische Gesteine der französischen Alpen . 94 II 424
Porphyrit . . . . . 1892 I 68, 71
— Allier . 1891 II 284. 93 II 102
— Cavenac . . . . . 90 II 80
— Chablais . . . . . 93 II 59
— Cumberland . . . . 92 II 265
— Hérault 1890 II 81. 91 II 286
— Homertshausen . . . 90 II 249
— Lago d'Orta . . . . 93 II 57
— Lausitz . . . 1892 II 81, 84
— Montagne Noire . . 91 II 286
— Montana . . . . . 94 II 262
— New Jersey . . . . 91 II 302
— östl. Balkan . . . . 90 I *280*
— Peloponnes . . . . 93 I 316
— quarzführend, Sachsen, Stolpen . . . . . 93 II 89
— Rabbi . . . . . 92 I 521
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Sachsen, Meissen . . 91 I 82
— — Kötzschenbroda . 93 II 91
— — Pillnitz . . . . 93 II 93
— Tirol . . . . . 90 I *73*
— Val Sabbia . . . . 93 II 494
— variolithischer, Chablais . . . . . 93 I 495
— Westmoreland . . . 92 II 263
— West-Pyrenäen . . . 91 I 265
— Yellowstone-Park . . 91 I 104
Porphyrittuff, argentinische Cordillere . . . . . 93 I 105
Porphyrittuff, centraler Balkan . . . . . 1890 I *269*
— Sachsen, Pillnitz . . 93 II 93
— Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
Porphyrkugeln, Jersey . 91 II 287
Porphyroid, Harz . . BB VIII *711*
— Oberwesel . . . . . 94 II 305
— Thüringen . . . BB VIII *713*
— Westfalen . . . . BB VIII *543*
Portage-Gruppe 1891 I *161*. 1892 II 99. 94 I 334
Portheus, Kreide, Kansas 94 I 380
Portland, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 474
Portlockia . . . . . 90 II 151
Posidonia . . . . . 93 I 403
— Becheri, Carbon, Belgien . . . . . 94 I 479
— Steinmanni . . . . 93 I 127
Posidonienschiefer, Herford 90 I 116
— Karpathen . . . . 93 II 149
— Leinethal . . . . BB VII *269*
— Süd-Frankreich . . . 91 II 322
Posidonomya 1892 I 422. 93 II 382
— alpina-Schichten . . 94 I 486
— daghestanica . . . . 93 II 382
— pergamena . . . . 93 II 137
— Wengensis . . 1890 I 114, 176
Postelia Meunieri . . . 91 II 374
Potamides distortus 1893 I 538. 94 I 190
— Gierlii . . . . . 90 II 153
Potamocypris affinis . . 94 I 383
— Brodiei . . . . . 91 I 335
Potentilleen . . . . . 91 I 342
Potercoceras . . . . . 90 II 147
— gracile . . . . . 93 I 180
Poterioceratidae . . . . 90 I 354
Poteriocrinus maschatensis 94 I 171
Potomac-Formation 1891 II 155. 92 I 383
— mesozoische . . . . 90 II 124
Pouechi gracilis . . . . 92 II 558
Pourtalesiidae . . . . 92 I 165
Powellit, Calcium-Molybdat, Idaho . . . . 94 I 49
Pozzolano . . . . . 93 II 492
Praecambrium, Finnland . 93 II 96
— Lappland . . . . . 93 II 107
Praepontische Stufe, Agram 91 II 131
Prairien, Texas, Entstehung . . . . . 94 I 112
Prehnit . . . . . 90 I *137*
— Floitenthal . . . . 90 II 379
— in Diabas . . . . . 92 II *1*
— Tirol . . . . . 91 I 216

Prestwichia-Arten . . 1892 II 359
Priabona-Stufe, venetianische Alpen . . . . 94 I 493
Priceit, Oregon . . . . 91 I 43
Priconodon crassus . . . 91 II 155
Priesener Schichten . . 93 I 129
— Böhmen . . . . . 92 II 306
Primitia aequalis . . . 91 I 154
— Billingsi . . . . . 91 II 461
— bursa . . . . . 91 I 430
— centralis . . . . . 92 II 458
— cestriensis . . . . . 92 II 459
— cincta . . . . . 91 I 430
— Clarkei . . . . . 91 II 460
— corrugata . . . . . 94 II 467
— distans . 1891 I 430. 94 II 467
— elongata 1893 II 411. 94 II 467
— excavata . . . . . 94 II 467
— glabra . . . . . 92 II 458
— globifera . . . . . 94 II 467
— granimarginata . . . 92 II 459
— impressa . . . . . 92 II 458
— intermedia . . . . 91 I 430
— Jonesii . . . . . 91 I 430
— labrosa . . . . . 94 II 467
— medialis . . . . . 92 II 458
— Milleri . . . . . 92 II 458
— Morgani . . . . . 91 I 334
— mundula . . . 1891 I 154, 335
— nitida . . . . . 92 II 458
— obliquipunctata . . . 94 II 467
— papillata . . . . . 94 II 467
— pennsylvanica . . . 91 I 335
— perminima . . . . 92 II 458
— plana . 1891 I 430. 94 II 467
— plicata . . . . . 94 II 467
— rudis . . . . . 92 II 458
— scaphoides . . . . 91 I 154
— Schmidti . . . . . 91 I 430
— seminulum . . . . 94 II 467
— simulans . . . . . 92 II 459
— striata . . . . . 93 II 411
— subaequata . . . . 92 II 459
— sulcata . . . . . 91 I 430
— Ulrichi . . . . . 91 I 334
— umbonata . . . . . 94 II 467
— Whitfieldi . . . . . 91 I 334
Primitiopsis punctulifera . 91 I 334
Primordialfauna, Frankreich . . . . . 90 I 96
— Hérault, Montagne Noire . . . . . 90 I 284
Primulinae . . . . . 91 I 345
Pringle-Andesit, Rosita Hills . . . . . 93 I 294
Prisciturben . . . . . 92 II 370
Prismatin . . . . . 1890 II 220
Prismenmethode, Kundt'sche . . . . . 94 I 247
Pristiograptus . . . . 92 I 453
Pristiophorus . . . . . 91 II 457
Pristisomus crassus . . 94 II 162
— gracilis . . . . . 94 II 162
— latus . . . . . 94 II 162
Proballostomus longulus . 93 II 546
Problematicum, Bolivien BB VIII *88*
Probolium, Kalkfauna von St. Malo . . . . . 90 II 292
Proboscidea 1890 II 431. 1891 II 150. 92 I 410
— Arnothal . . . . . 92 II 333
Proboscina ampliata . . 91 II 369
— gracilis . . . . . 91 II 369
— Hunstantonensis . . 91 II 369
— irregularis . . . . 91 II 369
— Jessoni . . . . . 91 II 369
— Reussii . . . . . 91 II 369
— uberrima . . . . . 91 II 369
Prochlorit . . . . . 92 II 226
— Einwirkung von HCl 94 I 28
Procladiscites connectens 94 II 171
— macilentus . . . . 94 II 171
Procolophon trigoniceps . 91 II 344
Procolophonia . . . . 91 II 344
Procoptodon . . . . . 93 II 544
Procyclolites triadicus . 93 I 197
Procynictis . . . . . 90 I 340
Productus curvirostris. . 94 II 145
— intermedius . . . . 91 I 277
— pusillus . . . . . 94 II 145
— Waageni . . . . . 94 II 103
Productus-Kalk 1893 II 111, 120. 94 I 136
Prodytiscus . . . . . 90 II *26*
Proetus crassimargo . . 90 II *211*
— sibiricus . . . . . 93 II 374
Profil, gemauertes geologisches, in Halle . . . 92 II 247
Profilometer . . . . . 94 I 488
Proganochelys Quenstedti 91 I 151
Proganosauria 1890 I 144. 93 I 171
Progenetta . . . . . 94 II 344
Prognathodus . . . . . 92 II 150
— Guentheri . . . . . 91 I 430
Prognathosaurus Solvayi . 91 II 157
Progonolampas Novae-Hollandiae . . . . 94 II 391
Prographularia triadica . 93 I 199
Projection der Krystalle . 93 I 227
— orthogonale, krystallograph. Axensysteme . 94 I 431
— — von Einzelkrystallen 94 I 431

Projection, orthogonale, von Zwillingen . . 1894 I 431
— stereographische 1893 II 239. 94 I 431
Prolecanitidae . 1890 II 150, 441
Prolystra lithographica . 90 II *18*
Pronorites . . . 1890 II 149, 441
Propalaehoplophorus . . 92 II 338
Propalaeotherium isselanum 93 I 148
— minutum . . . . . 93 I 148
Propappus . . . . . 94 II 156
Propelargus Edwardsi . . 94 I 376
Propinacoceras . . . . 90 II 149
Proplecotrema . . . . 94 II 356
Propylit, Hebriden, hervorgegangen aus Andesit 91 II 429
Prorastoma veronense . . 94 I 181
Prorastomidae . . . . 91 I 331
Prorhyzaena Egerkingiae 93 I 149
Prosopon . . . . . 92 II 457
Prosoporella . . . . . 90 I 169
Prosthenodon . . . . . 90 II 151
Protaster . . . . . 92 I 449
Protaxis des nordamerikanischen Continentes BB VIII *486*
Proteaceen . . . . . 91 I 341
Protegulum . . . . . 92 I *179*
Proterobas, Darmstadt . 93 I 89
— Elsässer Belchen . . 93 I 489
— Leogang . . . . . 90 II 259
Proterosaurus 1890 I 342. II 437. 93 I 547. 94 I 184
Proteus batillus . . . . 90 I 152
— Champernowni . . . 90 I 152
— subfrontalis . . . . 90 I 152
Proteusites angustus . . 94 II 170
— multiplicatus . . . 94 II 170
— pusillus . . . . . 94 II 170
— retrorsoplicatus . . . 94 II 170
— robustus . . . . . 94 II 170
Prothyracodon intermedium 90 I 339
Protoadapis . . . . . 92 II *238*
Protocardia . . . . . 93 II 158
Protocardium bellum . . 94 I 191
— moabiticum . . . . 93 I 538
Protoceras celer . . . 92 II 331
Protocimex siluricus 1893 I 551. II 551
Protodiceras . . . . . 93 I 556
Protodonta . . . . . 92 II 342
Protodus . . . . . 93 II 547
Protoficus Zeilleri . . . 90 I 373
Protogin, Aar-Massiv . . 94 I 294
— Chablais . . . . . 93 I 495
— Mt. Blanc 1893 I 496. 94 I 463
Protogingranit, Chablais 93 II 59
Protogonia . . . . . 1891 II 146
— Cartieri . . . . . 94 II *101*
Protoholothuria . . . . 92 II 368
Protolenus . . . . . 94 I 475
Protomya oblonga . . BB VIII *42*
Protopharetra . . . . 91 II 197
Protopteris cebennensis . 94 I 220
— fibrosa . . . . . 90 II 168
Protoreodon . . 1893 I 153. II 396
— parvus . . . . . 90 I 338
Protorhea, Argentinien . 93 I 545
Protorthis . . . . . 93 II 205
Protoryx . . . . . 92 II 135
Protosphyraena . . . . 93 II 193
Protostega anglica . . . 92 II 455
Protovermiculit, Magnet Cove . . . . . 94 I 33
Protractor, Anwendung in der Geologie . . . . 94 I 452
Protremata 1892 I *194*. 94 I 200
Proustit, Südnorwegen . 92 I 238
Provipera Boettgeri . . 93 I 549
Proviverra typica 1891 II 144. 93 I 149
Protoxodon americanus . 93 I 387
— clemens . . . . . 93 I 387
— decrepitus . . . . . 93 I 387
— evidens . . . . . 93 I 387
— Henseli . . . . . 93 I 387
— speciosus . . . . . 93 I 387
— Trouessarti . . . . 93 I 387
Protoxodontidae, Eocän, Patagonien . . . . 93 I 386
Prunulum calococcus . . 94 I 395
Psammechinus cingulatus 93 II 209
— Dewalquei . . . . 91 I 434
— fasciger . . . . . 94 I 391
— quadrituberculatus . . 91 I 434
Psammobia Fischeri . . 90 II 332
— Planei . . . . . 90 II 153
— protracta . . . . . 94 I 388
Psammochelys Keuperina 91 I 150
Psammodus . . . . . 93 I 177
Psaronius Alesiensis . . 94 I 220
— Brongniarti . . . . 93 II 216
— Bureaui . . . . . 93 II 216
— coalescens . . . . . 93 II 216
— Faivrei . . . . . 93 II 216
— Huttonianus . . . . 94 I 533
— Landrioti . . . . . 93 II 216
— Levyi . . . . . 93 II 216
— rhomboidalis . . . . 93 II 216
Psecadium oblongum . . 94 II 476
Pselaphiden aus baltischem Bernstein . . . . . 93 I 550
Psephophorus . . . . . 91 I 151

Pseudaelurus . . . . 1893 II 184
— transitorius . . . . 94 II 344
Pseudamnicola balizensis . 94 II 356
Pseudobrookit, Ardnyer Berg . . . . . 93 I 238
— Havredal . . . . . 92 I 42
— Norwegen . . . . . 90 II 54
— Sublimationsproduct . 93 II 263
— Vesuv . . . . . 90 I 218
Pseudo-Cannelkohle, Westfalen . . . . . 90 I 256
Pseudocidaris . . . . . 91 II 191
— Alhadasensis . . . . 91 II 191
— Choffati . . . . . 91 II 191
— Gaivensis . . . . . 91 II 191
— lusitanica . . . . . 91 II 191
— Peroni . . . . . 91 II 191
— spinosa . . . . . 91 II 191
— spissa . . . . . 91 II 191
— Thurmanni . . . . 91 II 181
Pseudocythere Bristovii . 91 I 335
— simplex . . . . . 94 II 165
Pseudodiadema, Hilli . . 93 II 209
— Muelense . . . . . 91 II 191
— Römeri . . . . . 93 II 209
Pseudodiloma . . . . . 90 II 151
Pseudofossarus . . . . 92 II *27*
Pseudoglyphea arietina . 92 II 457
Pseudohydrophilus . . . 92 II *26*
Pseudoisomorphismus . . 94 I 9
Pseudoleucit . . . . . 93 II 343
Pseudolioceras compactile 90 I 470
Pseudoliva rudis . . . . 91 II 181
Pseudomalachit, Pseudomorphose . . . . . 94 II 229
Pseudomelania valfinensis 91 II 176
Pseudomonotis Bjona . . 91 II 122
Pseudomonotis-Schiefer, Spitzbergen . . . . . 91 II 121
Pseudomorphosen, Descloizit nach Vanadinit . 93 II 255
— Rosenegg . . . . . 90 II 50
— Eisenglanz nach Biotit, Schluckenau . . . . 93 II 17
— Glimmer nach Feldspathknollen . . . . . 93 II 256
— Granat nach Sphen . 93 II 257
— Magneteisen nach Ceylanit, Ural . . . . 93 II 256
— nach Aschentheilchen in den Tuffen des Lennegebietes . . . . BB VIII *698*
— nach Glauberit . . . 90 II 51
— nach Gyps . . . . 90 II 50
— Nesquehonit nach Lansfordit . . . . . 93 II 19
Pseudomorphosen, Roth-eisen nach Pyrit . . 1893 II 257
— Tremolit nach Sahlit 93 II 256
— Vesuvian nach Diopsid 93 II 257
— von Chlorkalium nach dem Doppelsalze von Manganchlorür und Chlorkalium . . . . 92 II *92*
— von Kalkspath nach Aragonit . . . . . 90 II 51
— von Manganoxyd nach Aragonit . . . . . 91 II 43
— von Quarz nach Spodumen . . . . . 91 II 43
Pseudonerinea . . . . . 92 II 138
Pseudoneuroptera im Bernstein . . . . . 92 II 459
Pseudophillipsia elegans . 94 I 513
Pseudophit . . . . . 92 II 231
— Hrubschitz . . . . . 94 II 420
Pseudopygaulus . . . . . 90 I 362
Pseudosirex 1890 II *27*. 91 I *53*
Pseudosymmetrie 1892 I 16. II 207. 94 I 8
Pseudotaphrus . . . . . 90 II 151
Pseudothecosmilia . . . 90 II 339
Pseudotoma . . . . . 92 I 588
— Miocän. . . . . 93 II 199
— speciosa . . . . . 91 II 464
Pseudotridymit, Euganeen 92 I 233
Pseudotrionyx Delheidi . 94 I 509
Psidium membranaceum . 93 II 434
Psiloceras brevicellatum . 94 I 386
— calliphylloides . 1894 I 386, 484
— capra-ibex . . . 1894 I 386, 484
— distinctum . . . . . 94 I 386
— pseudalpinum . 1894 I 386, 484
— schwäbischer Jura . . 94 I 385
Psilodon, Slanikfluss, Rumänien . . . . . 94 I *140*
Psilodontenschichten, Rumänien . . . . 1894 I *164*, *168*
Psilomelan . . . . . 91 I 7
— Elba . . . . . 90 II 18
— Puy de Dôme . . . 93 II 214
— Val di Susa . . . . 91 II 407
Psilonotusschichten, Herford . . . . . 90 I 116
Psilophyton robustius . . 93 II 218
Psilopterus, Argentinien . 93 I 545
Psilotiphyllum . . . . 93 I 573
Psittacanthus crassifolius 93 II 434
Psychotria grandifolia . 93 II 434
Pteraspis . . . . . 92 II 358
Pterichthys . . . . . 92 II 358
— rhenanus . . . . . 93 I 398

Pteridophyllum fastigiatum . . . . . 1891 I 443
Pterinaea . 1890 I 437. 93 I 404
— Kerfornei . . . . . 91 II 364
— Paillettei . . . . . 91 II 364
Pterinopecten . . . . 93 I 403
Pterinoperna syriaca . . 93 I 537
Pteris Cousiniona . . . 93 II 434
— haagiana . . . . . 94 I 530
— Radimskyi . . . . 94 I 530
— undulata . . . . . 90 I 373
Pterocarya retusa . . . 90 I 373
Pterodactylus . . . . . 92 II 355
Pterodon dasyuroides . . 93 I 149
— magnus . . . . . 93 I 149
Pteronites . . . . . 93 I 403
Pteropelyx . . . . . 94 I 183
Pteroperna oolithica . . 93 I 381
— subquadrata . . . . 93 I 381
Pterophyllum . . . . . 94 II 482
— Braunsii . . . . . 90 I 372
— Fayoli . . . . . 93 I 207
— propinquum . . . . 90 I 372
— Reichianum . . . . 93 I 575
Pteropoden . . . . . 92 I 181
— Hercyn, Nordamerika 93 I 118
— Stammbaum . . . . 91 II 361
Pteropodenerde . . . . 93 II 296
Pteropodenschlamm 1893 II 286, 305
Pterosauria . . . . . 92 II 350
— Kreide, Brasilien . . 93 I 163
Pterospermites . . . . 93 II 221
— grandidentatus . . . 90 I 373
Pterygotheca . . . . . 94 I 196
Ptilodus . . . . . 92 II 341
Ptilolith, Colorado . . . 94 II 223
Ptomaphagus Germari . 91 II 356
Ptomascopus Aveyronensis 92 I 176
Ptychacanthus sublaevis . 91 I 429
Ptychites gymnitiformis . 94 II 172
— intermedius . . . . 94 II 172
— multiplicatus . . . 94 II 171
— patens . . . . . 94 II 171
— pusillus . . . . . 94 II 171
— seroplicatus . . . . 94 II 171
Ptychitidae . . . . . 90 II 149
Ptychocarpus oblongus . 91 I 440
Ptychoceras pseudo-gaultinum . . . . . 91 II 174
Ptychodontidae . . . . 92 II 357
Ptychodus mammillaris, Kohlenkalk . . . . 91 II 457
— polygyrus, Kreide . . 91 II 457
Ptychogaster cayluxiensis 92 II 455
— Pomeli . . . . . 92 II 455
— rotundiformis . . . 92 I 163
Ptycholepis Barrati . 1894 II 348
Ptychomya, Kreide von Martapoera (Borneo) . 90 II 416
Ptychopteris Grand'Euryi 93 II 216
Ptychosiagum . . . . 91 II 346
— orientale . . . . . 91 II 346
Puddinggranit . . . . 94 I 76
Puddingsteine, Algier. . 94 I 489
Puella . . . . . 93 I 184
Puerco-Fauna in Europa 91 II 143
Puget group . . . . . 92 II 155
Pulaskit . . . . . 93 II 339
Pulchellia coronatoides . 93 II 197
— Dauremonti . . . . 93 II 197
— hoplitiformis . . . . 93 II 197
— Sellei . . . . . 90 II 286
— subcaicedi . . . . . 93 II 197
Pulmonaten, Eocän, England . . . . . 94 II 358
— paleocäne Schichten von Mons . . . . . 90 I 357
Pulvinulina eximia. . . 90 II 344
— japonica . . . . . 91 II 175
— singularis. . . . . 91 II 175
Puniceen . . . . . 91 I 341
Punktgleichung . . . . 90 I 394
Punktsysteme, regelmässige . . . . . 91 I *115*
Pupa . . . . . 91 II 328
— columella . . . . . 93 II *129*
— Genesii . . . . . 93 II *129*
— Schweinfurthi . . . 91 I 128
— tongriana. . . . . 91 I 128
Purbeck, Savoyen . . . 94 I 348
Purple sandstone group, Saltrange. . . . . 93 II 116
Purpuridae, oberes Miocän 91 II 464
Purpuroidea . . . . . 93 II 382
Pustularia. . . . . 92 II *32*
— alpina . . . . . 94 II 143
Pycnaster . . . . . 94 I 205
Pycnodont, mesozoischer, Texas . . . . . 93 I 378
Pycnodus cretaceus . . 91 I 153
Pygopistes excentricus . 93 I 559
— Heinzi . . . . . 93 I 559
Pyramidella amoena . . 91 II 129
Pyrargyrit. . 1890 II 1. 91 II 405
— Kajánel, Siebenbürgen 90 I *286*
— Mexico . . . . . 93 II 261
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Pyrenäen, geologischer Aufbau . . . . . 93 I 303
Pyrenäit . 1892 I *217*. 93 II 245
Pyrgula pagodaeformis . 90 II 121
— purpurina. . . . . 90 II 121

Pyrgula Sinzowii . . 1890 II 121
— striata . . . . . 90 II 121
Pyrgulifera . . . . . 92 I 140
— hungarica . . . . . 93 I 182
Pyrina Bleicheri . . . 93 I 560
— flava . . . . . 92 I 184
— meghilensis . . . . 93 I 560
Pyrit . . . . . 93 II 246
— Analyse . . . . . 91 II 405
— chemisches Verhalten. 94 II *273*
— Delaware . . . . . 91 II 53
— Gorno . . . . . 91 I 22
— Ikositetraëder . . . 90 I 17
— in Anorthosit, Canada BB VIII *446*
— Kleiner Schwabenberg 93 I 254
— Kötzgraben bei Trofaiach . . . . . 90 II 18
— Leogang . . . . . 93 I 14
— Mont Cenis . . . . 90 II 95
— Monzoni, Tirol . . . 91 I 216
— Neubildung . . . . 94 II *275*
— Porkura . . . . . 93 I 253
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Trofaiach, Steiermark 1890 II 17. 91 II 234
— Val di Susa . . . . 91 II 407
Pyritgruppe, Isomorphismus . . . . . 91 I *152*
Pyrochlor, Südnorwegen . 92 I 258
Pyrochroit . . . . . 94 I *37*
— Synthese . . . . . 90 I 231
Pyroelektricität, allgemeine Theorie . . . 92 I 215
— Kaliumlithiumsulfat . 92 II *59*
— Lithiumsulfat . . . 92 II *67*
— Natriumlithiumsulfat . 92 II *65*
— Turmalin . . . . . 92 I 213
Pyrolusit, Zusammensetzung . . . . . 94 II 405
Pyromorphit, Mies . . . 93 I 13
— Schottland . . . . 91 II 17
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Pyrop, Chromgehalt . . 90 I 393
— Krendorf bei Laun . 94 I 437
Pyropensand, Nordböhmen 93 I 129
Pyrophanit, Harstigen . 92 II 235
Pyrophysalith, Finbo . . 90 I *87*
Pyrosklerit . . . . . 92 II 232
Pyrosmalit, Dannemora . 90 II 54
— optische Eigenschaften 90 II 52
Pyroxen . . . . . 93 II 469
— azurblau, Neu-Mexico 94 I 78
— Bestandtheil des Kryokonit . . . . . BB VII *169*
— Beziehungen zwischen der chemischen Zusammensetzung und den opt. Eigenschaften 1892 II 23
Pyroxen, Chondrit, Misshof 92 I *89*
— Hemiëdrie . . . . . 93 I 238
— in Eklogit . . . . 93 I 273
— in Kalkstein, Texas, Baltimore Co. . . . 90 II 228
— Isomorphismus . . . 91 I *149*
— opt. Eigenschaften BB VIII *167*
— Orange-County . . . 91 I 42
— Pinzgau . . . . . 91 I 374
— rhombischer, in Anorthitfels, Canada . . BB VIII *442*
— Salzburg . . . . . 91 I 375
— secundär . . . . . 93 II 22
— See von Vico . . . 91 I 12
— Südwest-Afrika . . . 90 I *113*
— Synthese 1891 II *90*. 93 II 44
— Umbildung in Chlorit 92 II 231
— Vigezzothal . . . . 91 I 14
Pyroxen-Amphibol-Dacite, Colombia . . . . . 93 I 77
Pyroxenamphibolit, Bacher Gebirge. . . 94 I 462
Pyroxenandesit, Berg Pilis 93 I 72
— Colombia . . . . . 93 I 77
— Ecuador . . . . . 93 I 78
— Hegyes-Drócsa . . . 93 I 95
— hornblendefrei, Anden 90 I 91
Pyroxendacite, Colombia. 93 I 77
Pyroxen-Gesteine, Maryland. . . . . 91 II 92
Pyroxengneiss . . . . . 92 I 66
— Loire-Inférieure. . . 93 I 275
Pyroxengranulit, Madagascar . . . . . 90 II 96
Pyroxen-Hornblende-Andesit, Anden. . . . 90 I 91
— biotitführend, Anden . 90 I 91
Pyroxenit . . . . . 92 I 66
— Connecticut . . . . 94 II 264
— Cortlandt Series . . . 90 I 87
— Jesso . . . . . 94 I 303
— Mt. Diablo . . . . 93 I 100
Pyroxenolivin-Gesteine, Maryland . . . . . 91 II 92
Pyroxenschiefer, Ligurien 91 II 429
Pyroxensyenit, Sachsen Riesa-Strehla . . . 91 II 268
Pyroxen-Wernerit-Gneiss, Loire-Inférieure. . . 93 I 274
Pyrrhosiderit, Georgenberg . . . . . 94 II 413
Pyrula . . . . . 91 II 181
— concinna . . . . . 91 II 180

Pythonomorphen, Frankreich . . . . . 1894 II 347
Pyxis Cavanae Foresti . 90 II 152

Q.

Quadersandstein, Cenoman, Pillnitz . . . . . 93 II 94
Quadersandsteinformation, Sachsen . . . . . 91 II 273
Quartär, Belgien . . . . 92 I *147*
— Central-Russland . . 92 I 555
— England . . . . . 93 I 136
— Finnland . . . . 1892 I 376, 378
— Freiburg i. Br. . . . . 92 II 123
— Gouv. Nishny-Nowgorod . . . . . 92 I 379
— Granada und Malaga 93 I 328
— Hendon . . . . . 93 II 536
— Hiddensoe. . . . . 92 II 122
— Holland . . . . . 93 I 135
— Jesso . . . . . 94 I 304
— Lake Lahontan, Nevada 90 I 280
— Macon County, Missouri 90 I 437
— Mainthal bei Hanau . 94 I 497
— Mono Lake, California 93 I 137
— Nord-Frankreich . . . 94 II 457
— östlicher Balkan . . 90 I *277*
— Olekma-Witim . . . 92 II 279
— Piemont . . . . . 93 I 532
— Provinz Kai . . . . 90 I 137
— Schonen . . . . . 90 II 124
— Schottland . . . . 93 I 136
— subalpine Ketten . . 94 I 315
— Südwesten von Arkansas 90 II 302
— Texas . . . . . 94 I 115
— Tiefebene von Verona 94 I 498
— Tremiti-Inseln . . . 93 I 529
— Tunis . . . 1893 I 318; II 513
Quarz, Aetzfiguren. . BB VII *532*
— Algier . . . . . 90 II 96
— Arizona . . . . . 91 I 234
— Basisfläche . . . . 93 II *74*
— Bestimmung des mittleren Brechungsexponenten . . . . . 90 I 206
— Blaubeuren . . . . 90 I 396
— Brechungsexponenten. 91 I 211
— Chile . . . . . 90 I *68*
— Cornwall . . . . . 91 I 378
— Deformationen, Pitourles-en-Lordat, Ariège 93 II 247
— Doppelbrechung, Abhängigkeit von der Temperatur . . . . . 91 I 208
Quarz, Drehung der Polarisationsebene, Abhängigkeit von der Temperatur . . . 1891 I 207
— Einschlüsse in Lamprophyr, Spessart . . 91 II 71
— Einsprenglinge in Lenneporphyr BB VIII *556, 571, 593, 595*
— elastische Deformation, optisches Verhalten . 90 I 199
— Elba, Carrara, Striegau 91 II 35
— elektrische Eigenschaften . . . . . 92 I 214
— elektrooptisches Verhalten BB VII *211.* 94 II *248*
— elliptische Polarisation 91 I 2
— geschmolzener, als Isolator . . . . . 92 I 502
— Härte und Sprödigkeit 93 II 3
— Helena . . . . . 93 I 255
— in Basalt, Marburg . 91 II *233*
— in carbonischem Kalkstein . . . . . 90 I 80
— in Glimmerschiefer, Argentinien . . . . BB VII *354*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *303*
— in Granit, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *294*
— — Ortasee . . . . . 94 I 446
— in Kalk, Biarritz . . 91 I 380
— in Mikrogranit, Osaka 90 I 214
— in Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *393*
— in Rhyolith . . . . 94 I 79
— in Sphärolithen, Yellowstone-Park . . . . 94 I 56
— in Tonalit, Adamellogruppe. . . . . BB VII *477*
— Klausenburg. . . . . 92 I 39
— lamellare Structur. . 94 II 21
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Llano Co. . . . . 93 I 257
— Mies . . . . . 93 I 11
— mit der Basis, Alexander Co., Nord-Carolina 90 I 220
— Mont Cenis . . . . 90 II 95
— Neubildungsproduct von Grauwacken . . 90 II *187*
— Nord-Amerika . . . 92 I 500
— Nyons . . . . . 93 II 265
— Ottawa . . . . . 93 I 255
— Petrowitz. . . . . 93 II 265
— primärer, in Basalt . 91 I 275
— pseudomorph, Ardèche 93 II 264
— — nach Antimonglanz 93 II 460

Quarz, pseudomorph nach Apophyllit . . . . 1891 I 217
— — nach Epidot. . . . 94 I 438
— — nach Kalkspath, Nikolajewsk . . . . 93 I 26
— — nach Orthoklas vom Strehlenberge . . . 92 II *41*
— Pyroelektricität. . BB VII *544*
— pyrogen, Krystallbau. 92 I *1*
— Quelle bei Cauterets . 91 I 212
— secundärer, in Anorthitfels, Canada . BB VIII *444*
— Sharpe's town ship . 90 II 49
— Siebenbürgen . . . 90 I 397
— Spaltflächen . . . . . 91 I 211
— Südnorwegen . . . . 92 I 238
— Südwest-Afrika . . . 90 I *105*
— Synthese . . . . . 91 II *90*
— Umwandlung in Speckstein . . . . . 90 II 43
— undulöse Auslöschung 94 II 222
— Val di Susa . . . . 91 II 406
— Val Malenco 1893 I 25; II 18
— Veränderung durch Gebirgsdruck . BB VIII *373*, *374*
— Verwitterung . . BB VII *343*
— Vigezzothal . . . . 91 I 14
— Wärmeleitung . . . . 94 I 5
— Waldshut, Baden . . 90 II 378
— Weisser Jura ε oder ζ 90 I 396
— Westfalen. . . . BB VII *516*
— Zillerthal . . . . . 91 I 217
— Zwilling mit geneigten Axen, Madagascar. . 91 II 243
— Zwillinge, in Liparit, Cabo de Gata . . . 91 I *108*
Quarzaugitdiorit, Jesso . 94 I 304
— Minas-Geraës . . . 90 I 93
— östl. Balkan . . . . 90 I *283*
Quarz-Augit-Porphyrite, Süd-Borneo . . . . 93 I *42*
Quarzbasalt . . . . . 93 II 338
Quarz-Biotitfels, Lausitz. 90 II *189*
Quarz-Biotitschiefer 1890 II *189* 93 II 349
— Sachsen, Kloster St. Marienstern. . . . 94 II 286
Quarz-Bronzitdiorit, Tirol 93 II 487
Quarzdiabas, Pusterthal . 90 I *78*
— Transvaal . . . . BB VII *106*
Quarzdiorit, Congo . . 94 I 303
— Dargothal . . . . 93 II 349
— Siebenbürgen . . . 94 I 292
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *42*
— Tirol . . . . . 90 I *77*
— West-Cordilleren . . 94 I 465
Quarzdioritporphyrit, centraler Balkan . . 1890 I *268*
Quarzfelsit, Tormore . . 94 II 423
Quarzgabbro, Tirol . . 93 II 487
Quarzgänge, Lausitz . . 92 II 251
Quarzgestein, Essex . . 90 II 423
Quarz-Glimmer-Diorit, centraler Balkan . . 90 I *266*
— Cortlandt Series . . 90 I 88
— Tirol . . . . . 93 II 487
— Unteritalien . . . . 91 II *55*
Quarz-Glimmer-Diorit-Porphyrit, östl. Kärnten 90 II 258
Quarzglimmerfels, Lausitz 90 II *187*
Quarz-Granat-Chlorit-Schiefer, Abukuma-Plateau . . . . . 93 II 514
Quarz-Hornblende-Porphyrit . . . . . 93 II 494
Quarzin . . . . . 91 I 207
— faserige Structur . . 94 I 254
— Herman Mestec. . . 94 I 253
— Modification der Kieselsäure . . . . . 90 II 306
Quarzit. . 1892 I 292; II 291, 294
— Argentinien . . . BB VII *357*
— biegsamer. . . . . 93 I 288
— Böhmen . . . . . 93 II 518
— Essex . . . . . 90 II 423
— grün, Monthermé . . 90 I 71
— Klingenhain, Sachsen. 91 II 266
— Lappland . . . . . 91 II 311
— Lurleyfels. . . . . 94 II 305
— New York. . . . . 93 I 332
— palaeozoisch, Skandinavien . . . . . 92 I 336
— Piemont . . . . . 92 II 422
— Röhrsdorf, Pirna . . 91 II *33*
— Rosaliengebirge. . . 93 I 113
— Russland . . . . . 94 I 319
— Saalekinnen . . . . 93 I 114
— S. Carlo, Schweiz . . 94 I 295
— Semmering . . . . . 90 I 270
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *41*
— Süd-Georgien . . . . 91 II 105
— Unteritalien . . . . . 91 II *55*
— Vanoise . . . . . 93 I 301
Quarzit-Sandstein, Böhmen 93 II 518
— Hegyes-Drócsa . . . . 93 I 95
— Ungarn . . . . . 91 I 127
Quarzitschiefer . . . . 94 I 300
— Contact mit Granit . 91 II 273
— Mittagshorn . . . . . 94 II 426
— Quarzit-Sparagmit-Gebiet, Skandinavien . 92 I 336
— Spessart . . . . . 93 I 85

Quarzkeilcomparator von Michel-Lévy . . BB VII *77*
Quarzkeratophyr, geschieferter . . . . . BB VIII *563*
— massiger . . . . . BB VIII *555*
— Westfalen . . . BB VIII *554*
Quarzkuchenlager, Norwegen . . . . . 1891 I 95
Quarzmelaphyr, Rheinpfalz 94 I 288
Quarzmuscovitfels, Lausitz 90 II *189*
Quarznorit . . . . . 93 II 336
Quarzphyllit . . . . . 92 II 290
— centraler Balkan . . 90 I *272*
— Murau . . . . . 93 I 112
— Murthal . . . . . 93 II 512
— Niedere Tauern. . . 93 I 338
— Rosaliengebirge . . 93. I 113
— Semmering . . . . 90 I 270
Quarzplatte zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung . 91 II *22*
Quarzporphyr 1893 II 328, 333, 337, 349, 501
— Alaska . . . . . 93 I 506
— Altenberg. . . . . 93 I 92
— argentinische Cordillere 93 I 104
— Breuschthal . . . . . 92 II 102
— Caernarvonshire . . . 90 II 262
— Cape Ann. . . . . 92 II 287
— centraler Balkan . . 90 I *267*
— Colombia . . . . . 91 II 97
— Corsica. . . . . 91 II 289
— Cross Fell Julier . . 93 I 96
— Finnland . . . . . 92 I 309
— Forez . . . . . 90 II 80
— Grossenhain . . . . . 93 I 94
— Grossumstadt . . . . . 92 I 280
— Insel Hochland . . . 92 I 76
— korundführend, Teplitz 90 I 61
— Krakau . . . . . 91 II 71
— Lago d'Orta. . . . . 93 II 57
— Magdeburger Uferrand 93 II 98
— Meissen . . . . . 91 I 84
— Michigan . . . . . 92 I 324
— Montblanc . . . . 91 II 281
— Nahe . . . . . 92 II 412
— Oberengadin . . . . . 94 I 99
— östlicher Balkan . . 90 I *280*
— Paraguay. . . . . 93 I 506
— Peloponnes . . . . . 93 I 316
— Saar-Nahe-Gebiet . . 93 I 271
— Sachsen, Dippoldiswalde . . . . . 91 I 68
— — Glashütte . . . 91 I 70
— — Kötzschenbroda . 93 II 91
— — Nassau . . . . 91 II 276
Quarzporphyr, Sachsen, Pillnitz . . . . . 1893 II 93
— — Stolpen . . . . . 93 II 89
— South Mountain . . 94 I 77
— Thal, Thüringen . . 91 II 281
— Transvaal. . . . BB VII *108*
Quarzporphyrit, centraler Balkan. . . . . 90 I *268*
— Essex . . . . . 90 II 423
— Lake Superior . . . 94 II 266
— West-Cordilleren . . 94 I 467
Quarzsyenit, Arkansas . 93 II 340
Quarztrachyt, Campiglia marittima. . . . . 94 I *89*
— Essex . . . . . 90 II 423
— Maros . . . . . 93 II 362
— östlicher Balkan . . 90 I *280*
— Zersetzung. Golderzgänge von Nagyag . 90 I 60
Quarzturmalin-Gestein, Essex . . . . . 90 II 423
Quebec Citadel Series. . 93 I 334
Quebec-Gruppe 1892 II 97. 94 II 302
— Stratigraphie . . . 93 I 333
Quecksilber 1892 I 83, 85. 93 II 76
— Bildung . . . . . 93 I 465
— Californien 1891 I 33. 92 I 85, 86
— Leogang . . . . . 93 I 14
— Mance . . . . . 92 I 510
— Nikitowka . . . . 94 II 414
— Siebenbürgen . . . . 92 II 72
— Thermalabsätze. . . . 93 II 76
Quecksilberchlorür . . . 94 I *43*
Quecksilberoxyd. . . . 94 I *20*
Quecksilbersulfat . . . 91 I 237
Quellen. . . . . 93 I 45
— Gaisberg . . . . . 92 II 252
— Latronico. . . . . 93 II 50
— östlich von Neapel . 93 I 98
— schwefelhaltige . . . 93 I 281
— zinkhaltige, Missouri . 93 I 290
Quellwasser, Fichtelgebirge 94 II 271
Quenstedticeras carinatum, brauner Jura, Lithauen 90 I *170*
Quenstedtit, Copiapo in Chile . . . . . 90 II 217
Quercinium . . . . . 92 I 613
Quercus angustifolia 1893 II 567. 94 I 229
— celastrifolia . . . . . 90 I 373
— coloradensis . . . . 90 I 373
— Corneliana . . . . . 91 I 445
— Horniana . . . . . 90 I 374
— Radimskyi . . . . . 94 I 531
— subgarryana . . . . . 93 II 429
— Whitei. . . . . 90 I 373

Quercytherium tenebrosum 1893 I 149
Querthäler, Ost-Caucasus 93 I 58
Quetenit, Caracoles . . . 91 II 19
Quetschzone, Melibocus . 94 I 289
Quinqueloculina Engelii . 93 I *110*

R.

Rachiopteris aspera . . 94 I 369
— Grayii . . . . . 1891 I 170, 171
— hirsuta . . . . . 91 I 172
— inaequalis . . . . . 94 II 189
— ramosa . . . . . 94 II 373
Radialgebirge, Kaiserstuhl 93 II 504
Radimskya trinervia . . 94 I 531
Radiolarien . . . . . 92 I 600
— Böhmen . . . . . 93 II 423
— Kreide, Manitoba . . . 92 II 175
— London Clay. . . . 92 I 463
— Mullion Island . . . 94 II 186
— Olonos-Kalk, Peloponnes . . . . . 93 I 317
— Pariser Becken . . . 93 II 437
Radiolarienerde, Insel Barbados . . . 1893 I 101; II 174
— Tiefsee . . . . 93 II 292, 306
Radiolarienjaspis, Schweiz 92 II *162*
Radiolarienschlamm, Fanny Bay . . . . 94 I 525
Radioli cancellati . . . 91 I *289*
— corticati . . . . . 91 I *289*
— radiati . . . . . 91 I *289*
Radiolites . 1890 I 160. 93 II 158
— cantabricus . . . . . 93 I 408
— suecicus var. costatus 90 II 410
Radiolitidae . . . . . 93 II 159
Radiopora tuberculata . 94 I 173
Radula . . . . . 92 II 378
— Barreti. . . . . 91 II 463
Rafinesquina . . . . . 93 II 206
Raibler Schichten 1892 I 126. 93 II 524. 94 I 134; II *38*
— — Alpen . . . 1890 I 102, 113
— — Schlern . . . . . 94 II 141
Raipassystem, Tromsö . 93 II 110
Ralstonit, Synthese . . 90 I 226
Ramulina Grimaldi . . 93 II 559
— parasitica . . . . . 92 I 190
Randmoränen, Finnland . 94 II 458
Ranina propinqua . . . 91 II 458
Rannachconglomerat . . 92 II 291
Rapakiwi . . . . . 1892 I 76, 308
— Geschiebe . . . . . 93 I 142
— Massive, Finnland . . 93 I 289
Rapakiwigranit, Åland 1893 II 96
— Pitkäranta . . . . . 93 II 61
Raphiosaurus . . . . . 91 I 429
Raphitoma . . . 1892 I 588; II 361
Raseneisenerz, Entstehung 90 I 134
— Finnland . . . . . 94 I 470
Rastrites phleoides . . . 91 II 116
Rastrites-Schiefer, Dalarne 94 I 476
— Thüringen . . . . . 91 II 116
Rauhwacke, Nufenenpass 94 II 425
— Vanoise . . . . . 93 I 301
— Vierwaldstätter See . 90 II *107*
Rauracien . . . . . 92 II 136
— Savoyen . . . . . 94 I 348
Reactionen, mikrochemische . . . . . BB VII *441*
Realgar, Bosnien . . . 91 I 26
— Casa Testi . . 1892 II 10, 11
— Macedonien . . . . . 94 II 33
— Yellowstone Park . . . 94 I 59
Rectorit, Garland Co, Arkansas . . . . . 94 I 39
Reddingit . . . . . 93 II 30
Redingtonit . . . . . 92 I 50
— Californien . . . . 91 I 34
Redruthit, Joachimsthal . 90 II 57
Reflexion des Lichtes an einer Zwillingsfläche . 91 II 2
— — an Quarzplatten . . 91 I 199
— und Brechung des Lichtes an absorbirenden Krystallen . . . 90 I 2
Reflexionsgoniometer . . . 91 II 401
Refraction, conische, Beobachtung derselben BB VII 85
Refractometer für Flüssigkeiten . . . . . 90 I 33
Regentropfen, in Brauneisenerz . . . . . 91 I 21
Regionalmetamorphose . 91 I 97
Reibung in Krystallen . 92 I 9
— von Luft und Wasserstoff bei hohen Temperaturen . . . . . 91 I 250
Reibungsbreccien . . . 92 II 433
Reiflinger Kalk. . . . . 92 II 300
Reinheit der Krystalle, Einfluss von Beimischungen 94 I 250
Relaisbeben . . . . . 94 I 456
Reniera, Malm, Krakau . 90 II 342
Rensselaeria carinata . . 90 II *225*
Reophax suprajurassica . 93 II 560
Reptilien . . . . . 90 I 140
— Eintheilung . . . . . 91 I 424
— fossile, Katalog des Britischen Museums . 90 II 143

Reptilien, Laramie-Formation . . . . . 1893 II 191
— mesozoische . . . . . 90 II 144
— Nomenclatur . . . . 90 I 466
— Portlandablagerungen Boulogne . . . . . 91 II 154
— Rhonebecken . . . . 94 I 377
Reptilienschädel . . . . 93 I 392
Reptoflustrina involvens . 94 I 174
Requienia patagiata . . 90 I 360
Requienienkalk, Balkan . 92 II *76*
Retecava areolata . . . 90 I 165
Retepora cellulosa . . . 94 I 519
Reticulipora complanata . 90 I 165
Retinit, Canada . . . . 94 I 53
Retiolites . . . . 1892 I 188, 454
— macilentus . . . . 91 II 117
Retiolites-Schiefer, Dalarne 94 I 476
— Thüringen . . . . . 91 II 116
Retzia . . . . . 91 II 186
— fastosa, Salzburgischer Hochkorallenkalk . . 90 I 101
— Jamesiana . . . BB VIII *68*
— Nathorsti . . . . . 91 II 121
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Retzia-Kalk, Spitzbergen 91 II 121
Rhabdammina . . . . 90 II 165
Rhabdocarpum decemcostatum . . . . . 93 II 131
— dyadicum . . . . . 91 I 168
Rhabdocarpus ovoideus . 93 I 207
Rhabdoceras-Bett, Californien . . . . . 94 II 111
— Russeli . . . . . 94 II 111
Rhabdocidaris . . . . 91 II 190
— Arrudaensis . . . . 91 II 190
— Boccagei . . . . . 91 II 190
— Caprimontana . . . 91 II 190
— crassissima . . . . 91 II 190
— Delgadoi . . . . . 91 II 190
— deserta . . . . . 91 I 434
— guttata . . . . . 91 II 190
— horrida . . . . . 91 II 190
— major . . . . . 91 II 190
— mira . . . . . 91 II 190
— Orbignyana . . . . 91 II 190
— Pereirae . . . . . 91 II 190
— Sagresensis . . . . 91 II 190
— Salvae . . . . . 93 II 162
— triangularis . . . . 93 II 421
Rhabdoderma . . . . 91 II 353
— Tingleyense . . . . 91 II 353
Rhabdophyllia delicatula . 93 I 194
Rhabdoporella bacillum . 93 II *139*
Rhachiopteris Ludwigi . 90 I 172
Rhacophyllites . . . . 92 I 426
Rhacopteris subpetiolata 1891 I 440
Rhadinacanthus . . . . 90 II 327
Rhät . . . . . 93 I 191
— argentinische Cordillere 93 I 104
— polnisches Mittelgebirge 93 I 348
— Semmeringgebiet . . 90 I 271
— Unterfranken . . . 92 I *141*
— Wendelsteingebiet . . 92 II 92
Rhätizit . . . . . 93 II 17
Rhagodon gracilis . . . 93 I 388
Rhamnaceen . . . . . 91 I 337
Rhamnus crenata . . . . 90 I 373
— ventigaloides . . . 91 II 208
Rhamphorhynchus . . . . 92 I 162
Rhamphostomella Brendolensis . . . . . 94 I 519
Rhaxella . . . . . 91 II 370
Rheingletscher, Nordgrenze . . . . . 90 II 425
Rheophax histryx . . . 94 II 367
Rhinobatus Bugesiacus, Solenhofen . . . . . 91 II 457
Rhinocerontidae . . . . . 90 II 319
— Russland . . . . . 93 II 540
Rhinoceros . . . . . 93 I 183
— leptorhinus . . . . 93 II 541
— Mercki 1893 II 541. 94 I 178
— occidentalis, Nebraska 94 I 507
— Schleiermacheri . . . 93 II 541
— tichorhinus 1893 II 541. 94 II *288*
Rhinoceros-Horn, Glogau 90 I 461
Rhinocerotina . . . . 90 II 431
Rhinochelys brachyrhina . 91 I 151
— cantabrigiensis . . . 91 I 151
— elegans . . . . . 91 I 151
— macrorhina . . . . . 91 I 151
— pulchriceps . . . . 91 I 151
— Tessoni . . . . . 91 I 151
Rhinoptera . . . . . 94 I 187
— Gebiss . . . . . 90 II 145
— Jussieui . . . . . 90 II 145
Rhipidistia . . . . . 92 II 358
Rhipidocyclina . . . . 92 II 374
Rhipidophyllen-Schiefer, Nassau . . . . . 90 I 293
Rhipidopora flabellum . . 90 I 164
Rhipidorhabdus . . . . 91 I *53*
Rhizocorallium Hohendahli 94 II 113
Rhizodendron Oppeliense . 90 II 167
Rhizodontidae . . . . 92 II 358
Rhizonium lacunosum . . 91 I 172
— reticulatum . . . . . 91 I 172
— verticillatum . . . . . 91 I 172
Rhizoporaceen . . . . 91 I 340
Rhodiocrinus tuberculatus 94 I 171

Rhodizit . . . . . 1894 II *66*
— optische u. thermische Eigenschaften, Ural . 91 I *77*
Rhodochrom Tampadel . 93 II 27
Rhodochrosit . . . . . 91 I 376
— New Jersey . . . . . 94 I 23
Rhodonit 1892 I 90. II 236. 93 II 475
— Harstigen . . . . . 94 I 262
Rhodoreen . . . . . 91 I 344
Rhodotilit, Paisberg . . 90 I 22
Rhodusit, Rhodus . . . 94 I 74
Rhoidium . . . . . 92 I 614
Rhombenporphyr, Südnorwegen . . . . . 92 I 297
Rhombus ligusticus . . 90 I 468
Rhotomagien, Portugal . 94 I 353
Rhus Bendirei . . . . 90 I 374
Rhynchocephalia 1890 I 342. 92 I 575
Rhynchodus . . . . . 92 II 357
Rhynchonella 1890 II 333. 91 II 184
— Abichi . . . . . 93 II 382
— alagirica . . . . . 93 II 382
— anatolica . . . . . 93 II 136
— angusta . . . . . 91 II 172
— antisiensis . . . BB VIII *57*
— areolata . . . . . 94 II 314
— argotinensis . . . . 90 I 441
— Barrandei . . . . . 92 II 364
— Bösei . . . . . 94 I 506
— bulga . . . . . 94 II 460
— cannabina . . . . 93 II 419
— caucasica . . . . . 93 II 382
— confinensis . . . . 94 II 146
— discites . . . . . 90 II 154
— Dollfusi . . . . . 90 II 286
— Douvillei . . . . . 91 II 364
— fringilla . . . . . 93 II 419
— furcillata . . . . . 91 I 161
— grandirostris . . . . 94 II 146
— Haasi . . . . . 94 I 488
— Kellneri . . . . . 93 II 419
— Kloosi . . . . . 94 II 341
— laevicosta . . . . . 91 I 162
— lamellaris, Java . . 90 I 313
— latifrons . . . . . 91 I 162
— Laurinea . . . . . 93 II 419
— levantina . . . . . 93 II 136
— livonica . . . . . 90 II *238*
— lycodon . . . . . 93 II 420
— Moutoni . . . . . 90 I 356
— Nauniae . . . . . 91 II 322
— n. sp., Südtirol . . . 94 I 486
— papilio . . . . . 92 II 364
— parvula . . . . . 93 I 408
— Pengelliana . . . . 92 I 182
Rhynchonella Petitclerci 1891 II 366
— pumilis . . . . . 93 II 420
— raxana . . . . . 93 II 420
— restituta . . . . . 94 II 460
— Rossii . . . . . 94 I 506
— Rothpletzi . . . . 91 II 364
— Sancti Michaelis . . 91 I 286
— Serajevana . . . . . 93 II 419
— serinus . . . . . 93 II 419
— Seydelii . . . . . 93 II 420
— solitaria . . . . . 94 II 111
— tasulica . . . . . 91 II 322
— tetraëdra . . . . . 90 I *3*
— trunca . . . . . 94 I 506
— Turcica . . . . . 93 II 418
— variabilis . . . . . 91 I 161
— vulnerata . . . . . 93 II 420
Rhynchonellen . . . . 92 I 443
— Rimosagruppe . . . 91 I 162
— spinose . . . . . 91 I 162
Rhynchonellina Arturii . 94 I 506
Rhynchophoren, Nordamerika . . . . . 94 II 167
Rhynchopygus . . . . 92 II 366
Rhynchota . . . . . 93 II 412
Rhynchotreta cuneata . . 91 II 186
Rhyolith, Berkeley . . . 94 II 267
— Bolivia . . . . . 92 II 77
— Colorado . . . . . 90 I 83
— Jesso . . . . . 94 I 304
— Milianah . . . . . 90 II 404
— Mono Lake . . 1892 I 387, 388
— Mt. Ingalls, Californien 94 I 79
— Pusztafalu . . . . 91 II 72
— Ramsö . . . . . 91 II 86
— Rosita Hills . . . . 93 I 294
— Schweden . . . . . 91 I 397
— Wyoming . . . . . 94 I 79
— Yellowstone-Park . . 91 I 102
Rhyolith-Laven . . . . 90 II 261
Rhyolith-Trachyt, Nagy-Mihály, Verwitterung 94 I 291
Rhyolith-Tuff, Comitat Hout . . . . . 91 II 78
Rhytidolepis 1891 II 384. 94 I 403
Rhytisma Corni . . . . 93 II 432
Ridgeway Beach, Nordamerika . . . . . 94 I 65
Riebeckit, Corsica . . . . 91 I 266
— El Paso Co., Colorado 90 II 189
— England . . . . . 92 II 216
— in Granulit . . . . 90 II 189
— in Mikrogranit, Ailsa Craig . . . . . 92 II 216
— Michigan . . . . . 94 I 59
Riesenaugengneiss, Meissen 91 I 79

Riesenhirsch, Bruchstücke des Schädels . . . . 1891 II 340
— Thiede . . . . . 90 I 459
Riesensteingranit, Meissen . . . . . 91 I 80
Riesentopf, am Mokelumnefluss, Californien . . 94 I 499
— Perim . . . . . 94 I 283
Riffkorallen . . . . . 90 I 369
Rillmarks . . . . . 92 I 602
Rimosa-Gruppe der Rhynchonellen . . . . . 91 I 162
Rimula basiliensis . . . 93 I 381
Rind, europäisches, Abstammung . . . . . 90 I 140
Ringgebirge des Mondes, Entstehung . . . . . 91 II 54
Ripidolith, Einwirkung von HCl . . . . . 94 I 28
Ripplemarks . . . . . 92 I 602
Rissoa parvula . . . . 93 I 381
Rissoina Barreti . . . 91 II 463
— Cloezi . . . . . 91 II 463
— hieroglyphicula . . . 90 I 157
— obsoleta . . . . . 90 I 357
Roccamonfina . . . . . 92 II 50
Rochen, Abstammung . . 91 I *191*
Rocky Mountains, postglaciales Alter . . . 93 I 320
Roc-Tourné-Gesetz der Zwillingsbildung am Mikroklin . . . . BB VIII *299*
Römerella . . . . . 93 II 204
Roemeria . . . . . 90 II 162
Roemerit . . . . . 91 II 20
— Copiapó in Chile . . 90 II 217
Röth, Alpen . . . . . 94 II *7*
— Leinethal . . . . . BB VII *256*
— Neckarthal . . . . 94 I 341
— Thüringen . . . . 93 II 377
Röthelschiefer . . . . 92 I *160*
Rofna-Gneiss . . . . BB VIII *569*
— Thalgebiet von Schams 94 I 297
Rogai-Gruppe, geologischer Bau . . . . . 93 I 121
Rohlfsia . . . . . 92 I 615
Rollsteine mit Eindrücken, Montbéliard . . . . 91 I 262
Romingeria . . . . . 93 I 420
Ronca-Stufe, venetianische Alpen . . . . . 94 I 493
— Vicentin . . . . . 94 I 364
Ropiankaschicht . . . . 93 II 140
Rosacilla Allaudi . . . 91 II 369
— boloniensis . . . . 91 II 369
— corallina . . . . . 91 II 369
Rosaliengebirge, geologischer Bau . . . . 1893 I 112
Rosenbuschit, Südnorwegen 92 I *252*
Rosiflorae . . . . . 91 I 342
Rostellaria Haueri . . . 92 II 462
— integra . . . . . 91 II 178
— monopleurophila . . 90 I 360
— mutabilis . . . . . 90 I 157
— Tallavignesi . . . . 90 I 157
Rostrocaris . . . . . 90 II 329
Rotalia abstrusa . . . 91 I 165
— lithothamnica . . . 90 II 166
— Lymani . . . . . 91 II 175
Rotationsdispersion . . 92 I 211
Rothe Erde . . 1893 II 498, 499
Rothkupfer, Süd-Carolina 90 I 230
Rothkupfererz . . . . 91 I 378
Rothliegendes, Brive . . 94 I 341
— Bohrloch von Sulz . 93 II 133
— Breuschthal . . . . 92 II 102
— Csiklovabánia, Comitat Krasso-Szörény, Pflanzen . . . . . 91 I 166
— Devonshire . . . . 94 I 131
— Döhlener Becken . . 93 I 339
— französisches Centralplateau . . . . . 94 I 130
— Haardtgebirge . . . 90 II 293
— Heidelberg . . 1892 II 86, 433
— Karnowice . . . . . 94 II 377
— Magdeburger Uferrand 93 II 98
— Plauenscher Grund . 93 I 339
— Rohrbach, Odenwald . 90 II 63
— Sachsen 1891 II 267. 93 II 501
— — Pillnitz . . . . 93 II 92
— — Tharandt . . . . 94 II 282
— Schlesien . . . . . 91 I 64
— Schwarzwald . . . . 93 II 131
— — Flora . . . . . 91 I 166
— Spessart . . . . . 94 I 309
— Tambach . . . . . 94 II 442
— Vogesen . . . . . 92 I 118
— Wetterau . . . . . 94 I 129
— Wettin, Saale . . . 91 I 288
— zwischen Battenberg und Lollar . . . . 92 I *156*
Rothpletzia . . . . . 93 II 554
— rudista . . . . . 93 I 401
Rouaultia, Miocän . . . . 93 II 199
Roudaireia . . . . . 93 II 158
— Kreide von Martapoera 90 II 416
Routivarit . . . . . 94 I 89
Rouvillograptus Richardsoni . . . . . 94 I 392
Rubeen . . . . . 91 I 342
Rubellit, Süd-Californien 94 I 43

Rubidiumlithiumsulfat, Circularpolarisation 1894 I *179*
Rubin, Birma . . 1894 II 32, 404
— Synthese . . . . . 94 I 11
Rubrit . . . . . 90 I *65*
Ruderorgane v. Coccosteus 90 II *198*
Rudisten, Portugal . . 94 I 354
— Tertiär, Agram. . . 90 I 158
Rudistenkalk, Venetianer Alpen . . . . . 94 I 148
Rüsselkäfer, Tertiär, Nordamerika . . . . . 93 II 550
Rumpfit . . . 1892 I 31; II 229
Rundhöcker, Canada . . 92 II 293
— Dollerthal . . . . 90 II 128
Rupelon . . . . . 94 II 328
Rupelthon, Offenbach . . 93 I 363
Russ. . . . . 93 II 244
Rutil 1893 II 344, 469. 94 I *23*
— Binnen . . . . . 90 II 40
— Colorado . . . . . 94 II 239
— in Fleckschiefer . . 92 II 263
— in Glimmerschiefer, Argentinien . . . BB VII *355*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *307*
— in Granit, Nordargentinien . . . BB VII *348*, *384*
— in Kalkstein, Texas, Baltimore Co. . . . 90 II 228
— in Lenneporphyr . BB VIII *559*
— in Thon . . . . . 92 I 272
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— mit Muscovit und Feldspath, Harney Park . 94 I 19
— Montgomery County, Maryland . . . . . 90 I 409
— optische Anomalien . BB VII *2*
— paramorph nach Brookit 91 I *217*
— pseudomorph nach Anatas . . . . . 91 I *235*
— Rauris . . . . . 91 I 375
— specifische Wärme . . 94 I 249
— sublimirt, Laacher See 92 II 408
— Südwest-Afrika . . . 90 I *108*
— Synthese . . . 1894 II 13, *147*
— Tampadel . . . . . 94 II 412
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Zwillinge . . . . . 94 II *173*
Rutschflächen im Buntsandstein, Marburg 1890 I *97*, *289*. II *190*

S.

Sabal Ochseniusi . . . 93 II 434
— praecursoria . . . . 91 I 174
Sabatia utriculoides . 1890 II 153
Sabicea elliptica . . . 93 II 434
Sables de Cuisse, Discordanz zwischen denselben und dem unteren Grobkalk . . . . . 90 II 306
Saccocoma. . . . . 94 II 362
Saccoia, Tertiär, Italien und Frankreich. . . 94 I 387
Sactoceras canadense . . 93 I 180
Saddle-reefs . . . . . 93 II 351
Säugethiere . . .1892 II 140, 449
— altmiocäne, Thal der Saône . . . . . 93 I 539
— amerikanische. Kreideformation . . . . . 90 II 141
— Argentinien 1892 I 564. 93 II 185
— Balkan. 1892 II 77. 94 II 462
— Braunkohle des Labitschberges . . . 92 I 158
— British Museum . .92 I 410, 411
— Carnay bei Rheims . 91 I 139
— Classification . . . 92 I 403
— diluviale . . . . . 91 II 339
— — Ixelles. . . . . 90 I 138
— — Todesursache . . 91 II 142
— — Vöklingshofen . . 92 I 152
— Entwickelung 1894 II 146, 342
— eocäne, Egerkingen . 93 I 147
— europäisch-nordasiatische, Diluvium . 90 II 428
— Fratescht . . . . . 90 I 459
— Hannover . . . . . 93 II 393
— in neolithischer Zeit, Algier . . . . . 93 I 544
— Kreide . . . . . 92 I 569
— Laramieformation, Wyoming . . . . . 93 I 390
— Magdeburg . . . . 93 II 393
— Maragha, Persien . . 90 I 340
— mesozoische . . . . 92 II 339
— Mongolei . . . . . 93 II 539
— Neu-Mexico . . . . 93 II 403
— Nishnij-Udinsk . . . 90 I 123
— quartärer Sand des Casentino . . . . . 91 II 142
— Rheims. . . . . 93 II 394
— Roussillon . . . . 92 I 562
— Sansan . . . . . 93 II 183
— Stammbaum . . . . 92 I 401
— Tertiär, Gamlitz . . 90 I 460
— Tschernosemgebiete . 92 II 327
— zeitliche Folge einiger Eigenschaften . . . 92 I 402
Säugethiergebiss . . . 92 I 155

Säulenbildung in vulcanischen Gesteinen . 1892 II 414
Safflorit . . . . . 91 I *152*
Sagdellina . . . . . 90 II 152
Sagrina clavata . . . . 91 I 165
— virgula . . . . . 91 I 165
Sagvandit . . . . . 93 II 110
Saharien, Umgebung von Bra . . . . . 90 II 124
Sahélien, Algier . . . . 94 I 494
Saiga . . 1892 II 450. 94 I 178
— Diluvium von Bourg . 92 I *142*
— prisca . . . . . 91 II *131*
— tatarica . . . . . 91 II *131*
Salagranit, Geschiebe . . 93 I 143
Salenia areolata . . . . 90 I 170
— driesensis . . . . . 93 I 560
— Gehrdenensis . . . 93 II 422
— Lovéni . . . . . 90 I 170
— Lundgreni . . . . 90 I 170
— obnupta . . . . . 93 II 422
— radians . . . . . 92 I 185
— scutigera . . . . . 93 I 560
— sigillata . . . . . 93 II 422
— tunetana . . . . . 93 I 560
— Vilanovae . . . . . 93 I 561
Saleniidae . . . . . 92 II 160
Salicinium . . . . . 92 I 614
Salicornaria mutinensis 1894 I 518, 519
Salinen, Donetzgebiet . . 94 I 469
Salisburia antarctica . . 90 II 448
— palmata . . . . . 90 II 448
Salit, Sala in Schweden . 94 I 81
— Südnorwegen . . . 92 I 248
Salitrales, Nord-Patagonien . . . . . 93 I *26*
Salix Engelhardti . . . 90 I 374
— paucidentata . . . . 94 I 531
— Schimperi . . . . . 90 I 374
— Schoenae . . . . . 93 I 576
Salmiak, Mischkrystalle mit Eisenchlorid 1894 II 395—397
Salpausselkä, Finnland 1893 II 96. 94 II 135
Salsengebiet, Rumänien . 94 I *146*
Salze, basische . . . . 92 II 4
Salzformation, alpine . . 90 I 59
— Ostgalizien . . . . 93 II 388
— persische . . . . . 90 II 288
— Rumänien . . . . . 94 I *160*
— Tertiär, Persien . . 94 I 92
— von Kalusz und Aussee 1894 I 434, 471
— v. Wieliczka 1890 II 114. 93 II 82, 166. 94 I 472
Salzlösungen, Compressibilität . . . . . 1891 I 1
Salzseen, Sibirien . . . 94 I 92
Salzsublimationen vom Vesuv, chem. Zusammensetzung . . . . . 90 II 374
Salzsümpfe . . . . . 92 II 278
Salzthon . . . . . 93 II 389
— Kalusz . . . . . 94 I 471
Salzwassersümpfe, Seeküste von Neuseeland 90 I 278
Samaropsis carnosa . . . 93 I 207
— elliptica . . . . . 93 I 207
— elongata . . . . . 93 I 207
— mesembrina . . . . 94 I 221
— tunicata . . . . . 93 I 207
Samarskit, Colorado . . 91 II 39
Samen . . . . . 93 I 207
Samotherium Boissieri 1892 II 135. 93 I 543
— Samos . . . . . 93 I 542
Sande . . . . . 92 II 278
— Bazas . . . . . 94 II 452
— Becken von Apt . . 91 I 416
— des Tessinflusses . . 92 I 515
— mariner, Montpellier . 90 II 307
— Sansego, Istrien . . 90 I 62
— Transport durch Flüsse 92 II 67
Sandebenen, glaciale, Neu-England . . . . . 91 I 136
Sandria attava . . . . 90 II 121
Sandstein . . . . . 92 I 293
— Afrika . . . . . 92 II 426
— Belleu bei Soissons . 94 I 357
— Bourbon . . . . . 91 II 316
— cambrischer, Småland 94 II 438
— Ciezkowicer . . . . 93 II 141
— devonischer, Aehnlichkeit mit Quarzitschiefer 94 I 300
— dunkler, Birkenberger Schichten . . . . . 90 II 70
— Essex . . . . . 90 II 423
— Gänge, Thal des Sacramento . . . . . 91 I 110
— gefritteter . . . . . 92 I 93
— glaukonitischer, Sachsen . . . . . 94 II 286
— — Zilly . . . . . 90 II *193*
— in Basalt, Marburg . 91 II *236*
— Insel Barbados . . . 93 I 101
— Jarabuco . . . BB VIII *92, 98*
— lichter, Bohutiner Schichten . . . . . 90 II 70
— Maryland . . . . . 92 II 283
— mit Inoceramus Brongniarti, Pillnitz . . . 93 II 94

Sandstein, Mt. Diablo 1893 I 100
— nubischer, Sinai . . 93 I *102*
— palaeozoischer, Skandinavien . . . . . 92 I 336
— Paraguay . . . . . 93 I 506
— Pillnitz . . . . . 93 II 93
— Pirna . . . . . 94 II 286
— pliocäner . . . . . 93 II 493
— Poretta . . . . . 93 II 56
— Přibram, Böhmen . . 90 II 70
— rother, Schottland . . 93 I 511
— Siebigeröder . . . . 91 I 290
— silurischer, Kielce . . 90 II 290
— tertiärer, Basilicata BB VII *576*
— — Frankreich . . . 92 II 308
— Torres, Portugal . . 94 I 352
— Transvaal . . BB VII *117*, *124*
— Umgebung von Puy . 90 II 309
— weicher, Sub-Himalaya 94 II 434
Sandwüste . . . . . 92 I 59
Sanguinit, Chañarcillo . 92 I 43
Sanguinolaria . . . . . 91 II 184
Sanidin, Einfluss der Temperatur auf die optischen Eigenschaften . 92 II 397
— in Basalt, Euganeen 1892 II 254, 420
— in Tuff, Campanien . 91 II *305*
— Japan . . . . . BB VII *146*
— Lava des Mt. Vulture BB VII *597*
— Rogat . . . . . 92 II 22
— Yellowstone Park . . 94 I 56
Sanidinbomben, Laacher See 92 II 416
Sanidinit, Eifel . . . . 92 II 415
— Laacher See . . . . 92 II 416
— Plateau Central . . 93 II 265
— Sant'Elmo . . . . 92 I 72
Santalaceen . . . . . 91 I 343
Santalum andromedaefolium . . . . . 94 I 532
— styriacum . . . . . 94 I 532
Santonien . . . . . 93 I 362
Sanukit, Japan BB VII *150*. 92 I 312
Sapindiphyllum dubium 93 II 565. 94 I 227
Sapindus acuminatus . . 93 II 434
— saxonicus . . . . . 93 I 576
Sapotacites Delprati . . 91 II 208
— Radimskyi . . . . 93 I 431
— Stelzneri . . . . . 93 I 576
Sapphir . . . . . 93 II 471
— Montana . . . . . 93 I 255
— Schottland . . . . 94 I 18
— Spokane Bar. . . . 93 I 254
Sapphirin, Grönland 1890 I 213. 91 II 24
Sarcoramphus, Argentinien . . . . . 1893 I 545
Sardinius Blackburnii . . 93 II 546
Sarkinit, Harstigsgrube, Pajsberg . . . . . 90 I 410
Sarmatische Stufe 1892 II 114, 115
— Caspisches Meer . . 90 II 117
— Don. . . . . 94 I 156
— Eupatorisches Plateau, Halbinsel Kertsch . . 90 II 122
— Mähren . . . . . 94 I 154
— Melitopol . . . . . 91 I 283
— Rumänien . . . . . 94 I *161*
— Transkaspien . . . 90 II 287
— Ungarn . . . . . 91 I 127
Sarsella anteroalta . . . 94 II 179
— Duncani . . . . . 94 II 179
Sarseua Mauritanica . . 93 I 557
Sassiniano, Piemont . . 90 II 312
Sattel, Rothenburger . . 91 I 288
Sattelbildung, Leinethal BB VII *279*
— Montagne de Lure . 91 I *213*
Sauranodon, Rhonebecken 94 I 377
Saurichthys, Maxille . . 90 I 149
— Rhät, Bristol . . . 91 II 457
Saurier, Rothliegendes, Plauen'scher Grund bei Dresden 1890 I 144; II 436. 91 II 454
Saurierfährten, Perm, Friedrichsroda . . . 94 I 372
Sauripteris . . . . . 93 I 177
Saurodesmus Robertsoni . 94 I 509
Sauropsiden . . . . . 92 I 572
Sauropterygia, des britischen Museums . . . 90 I 342
— Oxford- und Kimmeridge-Clay . . . . 90 I 141
Saussurit, Entstehung in gequetschten Gesteinen BB VIII *460*
Sauvagesia . . . . . 93 II 158
Saxicava . . . . . 92 II 360
Saxifragaceen . . . . 91 I 339
Scabrookia . . . . . 93 I 203
Scaglia, Südtirol . . . 94 I 486
— Vierwaldstätter See BB VIII *213*
Scagliaster concavus . . 94 I 157
— Italicus . . . . . 94 I 157
Scalaria annulata . . . 94 I 514
— Bewertensis . . . . 93 I 538
— fenestrata . . . . . 90 I 108
— Hosiusi . . . . . 91 II 444
— limbata . . . . . 91 I 157
— novem-varicosa . . . 93 I 538
— Rodleri . . . . . 92 II 462

Scalaria subulata . . 1892 II 462
Scaldisien, Merxplas . . . 92 I 368
Scalidae . . . . . 92 I 181
— Pariser Becken . . . 94 I 194
Scalpellum 1892 I 423. 93 II 196
Scambula secunda . . . 93 I 538
Scaniornis Lundgreni . . 91 I 332
Scapanorhynchus gracilis 94 II 349
— latus . . . . . 94 II 349
— tenuis . . . . . 94 II 349
Scaphander . . . . . 92 II 361
Scaphiocrinites . . . . 92 II 168
Scaphiten, Rückenlippe . 94 II 470
Scaphitenstufe, Pillnitz . 93 II 94
Scaphites Conradi . . . 94 I 194
Scaphoden, England . . 94 II 358
— Mittel-Oligocän. . . 93 II 554
Seaphodiadema Matheyi . 93 II 208
Scelidosaurus . . . . . 93 I 547
Sceparnodon . . . . . 94 I 181
— Ramsayi . . . . . 93 I 540
Schalen- und Kalkstein-
bildung . . . . . 91 II 338
Schallphänomene bei der
Eruption des Krakatoa 94 I 279
— bei Meteoritenfällen 1892 I *71, 107*
Schalstein, Grasmere . . 93 I 288
— Kentmere . . . . . 93 I 288
— Mosedale bei Shap . 93 I 288
Schaumkalk, Jena . . . 91 II 65
— Odenwald . . . . 90 I *102*
Schaumkalkbank, Bunt-
sandstein, Neckarthal 94 I 342
Scheelit, Axenverhältniss BB VII *242*
— Molybdängehalt. . BB VII *232*
— Pennsylvania . . . 94 II 262
— Südwest-Afrika . . . 90 I *109*
— Wärmeleitung . . . 94 I 6
Scheuerspuren, Lyngenfjord 90 II 265
Schichtenfaltung, Versuche 93 I *137*
Schiebungen an triklinen
Doppelsalzen. . . . 94 I *106*
Schiefer . . . . . 92 I 77
— Abessinien . . . . 93 II 55
— Abukuma-Plateau . . 93 II 514
— archäisch, argentinische
Cordillere . . . . . 93 I 104
— Becken von Brive . . 94 I 339
— Bündener . . . . . 94 I 295
— Culm, Hartgebirge. . 93 II 328
— devonischer, Verwandt-
schaft mit Diabaspor-
phyrit . . . . . 94 I 300
— Donau . . . . . 93 II 363
— feldspatharm, Amariner
Thal . . . . . 93 II 355
Schiefer, Geschiebe, Born-
holm . . . . . 1893 I 143
— Gold-führend, Lassen
Peak-Bezirk . . . . 91 I 107
— grüner, Saasthal . . 94 II 425
— Kreide, Peloponnes . 93 I 312
— krystallinische . . . 93 I 46
— — Basilicata . . . 93 II 519
— — Chichibu . . . . 92 I 314
— — Essex . . . . . 90 II 423
— — Finnland . . 1892 I 309, 310
— — Grazer Becken . . 93 I 336
— — Heidelberg . . . 92 II 87
— — Mähren . . . . 92 II 272
— — Malvern Hills
1890 II 91. 94 II 257
— — Maryland. . . . 92 II 283
— — Minnesota . . . 93 II 516
— — Murau. . . . . 93 I 112
— — Niedere Tauern . 93 I 337
— — Peloponnes . . . 93 I 312
— — Piemont . . . . 92 I 520
— — Pitkäranta . . . 93 II 61
— — Polička Neustadl . 93 I 114
— — Provinz Kai . . 90 I 136
— — Rosaliengebirge . 93 I 113
— — Schlesien . . . . 93 II 355
— — Skandinavien 1892 I 339, 340
— — Spieglitzer Schnee-
berg . . . . . 93 I 113
— — Süd-Borneo . . . 93 I *39*
— — Umwandlungspro-
duct mesozoischer Se-
dimente, Lepontinische
Alpen . . . . . 90 II 391
— — Vanoise . . . . 93 I *299*
— — Zusammensetzung. 92 I 275
— mit Paradoxidenfauna,
Montagne-Noire . . 90 I 96
— Mt. Pisano . . . . 91 II 314
— Newcastle. . . . . 91 I 92
— nichtkrystalline, halb-
krystalline, Minnesota 93 II 516
— Odenwald 1890 I *102*. 94 I 306
— palaeozoischer . . . 93 II 349
— phyllitischer, contact-
metamorphische Um-
wandlung durch Ker-
santit . . . . . 90 II 246
— praecambrische, Black
Hills . . . . . 93 I 332
— Russland . . . . . 94 I 319
— Sauerland BB VIII *613, 620, 626*
— silurisch, Shap-Massif 94 II 257
— Stufe 2a, Prag . . . 93 II 374
— Theissgegend . . . 93 II 362

Schiefer, Umwandlungserscheinungen, Umgebung von Ričan. 1890 I 267
— Verrucano, Monte Pisano . . . . . 94 II 444
Schieferconglomerat, Zitecer Schichten . . . 90 II 70
Schieferformation, West-Borneo . . . . . 90 II 416
Schiefergneissgewölbe, Hohes Gesenke . . . 93 II 125
Schieferhornfels, New Jersey . . . . . 93 I 505
Schieferthon in den Steinkohlen Böhmens . . 91 II 296
Schieferung im Anorthosit, Canada. . . . . BB VIII *457*
— am Steep Rock Lake 94 I 329
— des Gneiss . . . BB VII *316*
Schieferzone zwischen den Bergsträsser Gneissen 90 II 62
Schildkröten, Langhien von Lausanne . . . . . 92 I 163
— Voralpen Venetiens . 91 II 156
Schildkrötenreste, Unteroligocän . . . . . 93 II 545
Schilfsandstein . . 1892 I 352, 355
Schillerisation von Feldspath . . . . . 90 II 389
Schinus primaevum . . 93 II 428
Schiosia carinata . . . 93 II 556
— schiosiensis . . . 93 II 556
Schismotherium . . . . 92 II 337
Schistes calcareo-talqueux, Briançonnais, Westalpen 94 II 83
— gris lustrés, Briançonnais, Westalpen . . 94 II 83
Schizaeaceen, Juraformation . . . . . 94 II 193
Schizaster africanus . . 93 I 560
— Dumasi . . . . . 93 I 414
— gibberulus . . . . 90 I 360
— Mac Carthyi . . . . 93 I 557
— sp. . . . . 94 I 519
Schizodus Negrii . . . 93 II 137
— peregrinus . . . . 91 II 184
— transversus . . . . 91 II 184
Schizoporella magnoaperta 94 I 202
— magnoincisa . . . . 94 I 202
— Schizosmilia . . . . 90 II 339
Schizostachys sphenopteroides . . . . . 91 I 440
Schizothyriata . . . . 94 I 201
Schlacke . 1891 I 62. 92 I 74, 88
— krystallisirte, von Raibl 93 II 41
Schlackenkegel . . . . 90 I 417
Schlagwetter . . . . . 1892 II *70*
— in Zeche Schamrock . 91 II 291
Schlagwettertheorie Falb's 91 II 291
Schlamm, blauer . . . 93 II 298
— rother . . . . . 93 II 300
— vulcanischer . . . . 93 II 301
Schlammstrom, St. Gervais 94 I 285
Schlammvulcane. . . . 93 I 45
— Halbinsel Apscheron . 94 I 326
— Rumänien . . 1894 I *146*, *148*
Schleifmaschine . . . . 94 II 256
Schleifsandstein, Silur, Dalarne . . . . . 94 I 476
Schlerndolomit . . . . 94 I 134
Schlier . . 1892 II 309. 94 I 357
— Bosnien . . . . . 94 II 126
— Hunyader Comitat . 90 II 115
— Stellung desselben. . 94 II *291*
— Wels . . . . . 93 II 352
Schlönbachia inflata, Albien, Westafrika . . 90 II 416
— Senequieri . . . . 90 I 356
— tricarinata . . . . 90 I 356
Schlotheimia densilobata. 94 I 387
— intermedia . . . . 94 I 387
— schwäbischer Jura. . 94 I 386
Schmetterlinge . . . . 90 II *26*
— im Jura . . . . 1891 I *47*, *52*
Schmidtella crassimarginata . . . . . 94 II 164
Schmidtia . . . . . 91 II 115
Schnecken, Vicentiner Eocän . . 1892 I 436. 93 I 181
Schneegrenze . . . . . 93 I 67
— am Finsteraarhorn . 94 II 48
Schneekrystalle, mikrophotographische Untersuchung . . . . . 94 II 21
Schöckelkalk . . . 1893 I 335, 336
Schotter bei Lyon . . . 91 II 140
— bei Prag . . . . . 94 II 133
Schotterterrassen, Alter derselben . . . . . 91 I *107*
Schrammen, Dollerthal . 90 II 128
Schreibersit . . . . . 92 II 245
— in Meteoreisen, Cañon Diablo . . . . . 94 I 448
Schreibkreide, Skandinavien 94 II 332
Schütterzonen, Peloponnes 93 I 317
Schungit . . . . . 93 II 243
Schwämme, fossile, Grossbritannien . . . . 90 II 163
Schwarzerde (Tschernosem) 90 I 328
— Südrussland . . . . 94 I 368
Schwefel . . . . . 94 I *28*
— Allchar 1892 I 510. 93 I 460

Schwefel als Tl_2S . . 1894 I 7
— Altavilla Irpina, Unteritalien . . . . . 91 II *39*
— Ausscheidung als Ag_2S 94 I 7
— Bassick 1892 I 228. 93 II 262
— Bonn . . . . . 93 II 262
— Cadiz . . . . . 93 II 262
— Grube Victoria bei Müsen . . . . . 90 II 385
— in Eisenglanz . . . 94 I 251
— Italien . . . . . 92 II 74
— Krystallisation aus dem Schmelzfluss . . . . 94 I 14
— Kugel zur Demonstration der Doppelbrechung . . . . . 91 I 4
— Louisiana . . . . . 90 I 211
— Macedonien . . . . 93 II 240
— Melos . . . . . 92 I 84
— Milo . . . . . 93 II 262
— mit Bleiglanz, Truskawice . . . . . 94 II 32
— 4 Modificationen . . 91 II 38
— Mte. Poni . . . . 90 II 385
— neue Methode zur Bestimmung desselben . 91 II 405
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 376
— optische Constanten bei verschiedenen Temperaturen . . . . . 93 I 229
— Polymorphie . . . . 92 II 9
— Rabbit Hollow, Nevada 90 I 409
— Russland . . . . . 93 II 61
— Sicilien . . . . . 93 I 281
— Stassfurter Salzlager . 90 II 375
— Tarnowitz . . . . 94 II 413
— Union Bridge . . . 92 I 48
— von Bleierzgängen . 90 II 385
— vulcanisch, Westindien 90 I 37
— Walfischbai, Südwest-Afrika . . . . . 90 I *104*
— Wheatley Mine. . . 90 II 385
— Yellowstone Park . . 94 I 59
Schwefelantimon, Colorado 91 II 50
Schwefelsilber in Liparit 93 II 79
Schwefelwasserstoff im Stassfurter Salzlager . 90 II 375
Schwefelwasserstoff-Exhalationen, Unteritalien . . . . . 91 II *47*
Schwefelzink, hexagonal . 90 I 210
Schwellenwerth der Einwirkung elektrolytischer Leiter auf die Klärung von Suspensionen . . . . . 93 II *156*
Schwemmgold, finnisches Lappland . . . . 1894 I 470
Schwemmland . . . . 93 II 361
— Main . . . . . 94 I 496
Schwerkraft, Alpen . . 93 I 481
— Böhmen . . . . . 92 I 53
— Einfluss von Sonne und Mond . . . . . 91 II 54
— im Hochgebirge . . . 92 I 53
— Wien . . . . . 93 I 481
Schwetzit, Algier . . . 94 I 275
Schwingungsrichtung des polarisirten Lichtes . 91 I 367
Scintilla bipartita . . . 90 II 153
Sciurina . . . . . 90 II 430
Sciuroides Fraasii . . . 93 I 149
— siderolithicus . . . 93 I 149
Sciurus spectabilis . . . 93 I 149
Sclerocarpus obliquus . . 91 II *79*
Sclerocrinus . . . . . 94 II 182
Scleropteris callosa . . 91 I 443
Sclerorhynchus atavus . 91 II 457
Sclerosmilia . . . . . 90 II 339
Scolecit, Umänderung durch Erwärmen . . 92 II 238
Scolithus-Sandstein, Holland . . . . . 93 I 376
Scomberiden-Rest . . . 90 I 467
Scorodit, Californien . . 92 I 51
Scorpione . . 90 II 147. 92 I 177
Scotland Serie, Insel Barbados . . . . . 93 I 101
Scrupocellaria angulata . 90 I 167
— Brendolensis . . . . 94 I 519
— cretae . . . . . 90 I 167
— Montecchiensis . . . 94 I 519
Scutella Bleicheri . . . 93 I 560
— geometrica . . . . 94 I 370
Scutellidae . . . . . 92 II 163
Scutellina concava . . . 93 I 560
— Dufouri . . . . . 93 I 415
— Morgani . . . . . 93 I 561
Scutocordaites Grand'Euryi 93 I 206
Scyllium planum . . . 94 II 349
Scymnus lichia, Oberes Tertiär, Neu-Seeland . 90 I 147
Scyphienkalk, Krakau. . 94 I 487
Scytalecrinites . . . . . 92 II 168
Secretionen in Granit, Bergstrasse . . . . 90 II 61
Sedimentation, Geschwindigkeit derselben 1891 II 262. 93 II *148*, *167*
Sedimentbildung, Dauer . 94 II 241
Sedimente, äolische, Fernando de Noronha . 92 I 320

Sedimente, Alpen . . 1893 II 371
— Amariner Thal . . . 93 II 356
— Griechenland . . . 93 I 306
— marine, Mittelländisches Meer . . . . . 93 I 66
— pelagische . . . . 93 II 290
— terrigene u. pelagische 1893 II 283, 297
— Unterschied von Meer- und Süsswasser . . . 93 II *167*
— Vermehrung . . . . 93 II 320
Seebeben . . 1893 I 44. 94 I 453
Seebecken, Nordamerika . 92 II 320
Seeeisenerz, Finnland . . 94 I 470
Seeen des baltischen Höhenrückens, Eintheilung . 91 I 314
— Entstehung . . . . 93 I 46
— in modificirter Drift . 92 I 391
— Mecklenburg, Entstehung . . . . . 93 I 135
Seekreide, Genfer See . . 91 I 134
Seespiegelschwankungen, Statistik derselben . 90 II 390
Seewasser, Mono Lake . 92 I 385
Seewerkalk, Vierwaldstätter See . . . BB VIII *213*
Seifen, Bosnien . . . . 93 II 349
Seignette-Salz, elektrooptisches Verhalten . 94 II *252*
Seismicität . . . 1893 I 57; II 322
Seismometer . . . . . 93 II 46
Seitendruck bei Gebirgsbildung . . . . . 94 II 242
Selachier . . . . 1892 I 167, 579
— Eintheilung . . . . 91 II 166
— Muschelkalk Lothringens . . . . . 92 I 417
Sele-Quelle, Caposele . . 93 I 98
Selen . . . . . 94 I *28*
— Entdeckung und quant. Bestimmung desselben in Meteoreisen . . . 90 II 229
— 3 Modificationen . . 91 II 38
Selenacodon . . . . . 90 II 142
Selenbromür, specifisches Gewicht . . . . . 94 II 3
Selen-Tellur . . . . . 93 II 467
Sellait, Montiers . . . 90 I 34
Semiactaeon . . . . . 90 II 152
Semiauricula . . . . . 90 II 152
Semielea Reussi . . . . . 94 I 203
Semieschara cochlearis . 90 I 168
— impressipora . . . . 90 I 168
— labiata . . . . . 90 I 168
— subclavata . . . . . 90 I 168
— torosa . . . . . 90 I 168
Semionotensandstein . . 1892 I 353
Semionotus australis . . 94 II 162
Semiterebellum . . . . 90 II 152
Semitzer Mergel, Böhmen 93 I 521
Semivertagus . . . . . 90 II 152
Semmeringkalk, Rosaliengebirge . . . . . 93 I 113
Semnopithecus, Heppenloch . . . . . 91 I *169*
— Monspessulanus . . . 91 II 149
Semriacher Schiefer 1893 I 335, 336
Semseya lamellata . . . 94 II 475
Senarmontit . . . . . 90 II 373
— Algier . . . . . 93 I 25
— künstlicher . . . . 92 I 225
— optische Anomalien . 92 I *200*
Senkung, Cape Ann . . 92 II 287
Senon . . 1893 II 162. 94 I 150
— Algier . . . . 1893 I 187, 523
— Blattabdrücke . . . 92 II 376
— Braunschweig . . . . 91 I 154
— Corbières . . . . . 94 I 490
— Kieslingswalde . . . 93 II 157
— oberes, Irnich, Eifel . 93 I 128
— Pyrenäen 1890 II 413. 94 I 316; II 121
— Sinai . . . . . 93 I *103*
— Spanien . . . . . 90 I 311
— Umgegend von Doullens 94 I 352
Sepia Bertii . . . . . 91 II 360
— caralitana . . . . . 94 II 357
— Lovisatoi . . . . . 94 II 357
Septarien-Rupel-Thon, Hanau . . . . . 90 I 449
Sequanien, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 474
— Savoyen . . . . . 94 I 348
Sequoia chilensis . . . 93 II 434
Sericit . . . . 1893 II 350, 360
— Aar-Massiv . . . . . 94 I 294
— Bildung in Porphyr . 94 I 77
— im Tuff des Lennegebietes . . . . . BB VIII *571*
— schiefrig porphyrisch, les Buttes . . . . 90 I 71
Sericitgneiss, Sachsen, Tanneberg . . . . 91 I 76
Sericithäute im Lenneschiefer . . . . BB VIII *548*
Sericitschiefer, Centralplateau Frankreich . 93 I 299
— Chichibu . . . . . 92 I 314
— Gard . . . . . 94 I 214
— Timangebiet . . . . 94 I 323
Sernfit . . . . . 94 I 99
Sernfsandstein . . . . 94 I 99

Sernfschiefer . . . . 1894 I 99
Serpentin
1892 I 78; II 227. 93 II 355, 365
— Allier-Thal . . . . 93 II 102
— Baldissero . . . . 92 II 253
— Borzanasca . . . . 92 I 288
— Brewster N. Y. . . . 92 II 217
— Californien . . . . 94 II 90
— Canada . . . . . 91 I 241
— Castelpoggio . . . . 93 II 56
— Chablais . . 1893 I 495; II 59
— Constitutionsformel . 94 I 438
— Cornwall . . . . . 91 II 288
— Einwirkung von H Cl 94 I 27
— Garabal Hill . . . 93 I 286
— Gundagai . . . . . 93 II 498
— Halbinsel Lleyn . . 94 I 302
— Kynanee Cove . . . 94 I 37
— Ligurien . . . . . 91 II 428
— Lizard-District . . . 92 II 264
— Mähren . . . . . 94 II 420
— Minnesota . . . . 93 I 292
— Mt. Blanc . . . . 94 I 463
— Mt. Diablo . . . . 93 I 99
— M. Viso . . . . . 93 II 55
— Neu-Seeland . . . . 92 I 318
— New Jersey . . . . . 91 I 103
— New York . . . . 91 II 303
— östliche Centralalpen . 92 I 105
— Olivin-Augit-Phonolith, Wyoming . . . . . 91 I 104
— Ortosee . . . . . 93 II 488
— Peloponnes . . . . 93 I 316
— Piemont . . . . . 92 I 519
— Rhodus . . . . . 94 I 73
— Riviera di Levante . 93 I 277
— Rossena . . . . . 92 I 287
— Sestri Levante . . . 93 I 277
— Sinnithal, Basilicata . 93 I 279
— St. Lorenzen, Steiermark . . . . . 94 I 438
— Structurformel . . . 94 II 10
— Süd-Borneo . . . . . 93 I *43*
— Tonkin . . . . . 94 I 303
— Zdiarberg . . . . . 92 II 274
Serpentine und Serpentin-ähnliche Gesteine aus der Fruška-gora . . 90 II 260
Serpentinsandstein, Rhodus 94 I 74
Serpentintuff, Italien . . 92 II 254
— Muttergestein der Diamanten . . . . . 90 II 97
Serpula paluxiensis . . . 94 I 370
— varicosa . . . . . 93 I 125
Serpula-Kalk, Rumänien . 94 I *115*
Serpulit, Linden . . . . 93 I 123
Serpulitensandstein, Schottland . . . 1893 I 115
Serpulorbis Deshayesi . . 90 II 332
— planorbiformis . . . 90 II 332
Sesquimagnesiaalaun . . 90 I *52*
Sestien, Moncalvo, Hügelland des Montferrats. 90 II 420
Sevegruppe . . . . . 92 II 295
Shear-zones, Mineralneubildung in denselben . 90 II 91
Shenandoahkalkstein, Blue Ridge . . . . 93 I 98
Sicanites . . . 1890 II 149, 441
— Mojsisovicsi . . . . 90 II 149
Sicyocrinus cucurbitaceus 93 II 558
Siderit, Heraletz . . . 93 II 266
— Malenowitz, Schlesien 94 II 32
— Mies, Böhmen . . . 94 II 32
Sidérolitique-Formation, erste Kette des Jura . 94 I 473
Sideronatrit . . . . . 93 II 462
— Caracoles . . . . . 91 II 19
Siderotil, Idria . . . . 93 I 464
Sierra Bava, Nord-Patagonien . . . . . 93 I *28*
Sigillaria 1893 I 206, 572. 94 I 221, 396
— Brardi . 1891 II 383. 92 I 465. 93 II 213
— Camptotaenia lepidodendroides . . . . . 94 I *219*
— discophora . . . . . 91 II 204
— formosa . . . . . 94 I 219
— Mauricii . . . . . 94 I 219
— Menardi . 91 II 383. 94 I 396
— minutissima . . . . 94 I 219
— neurosensis . . . . 94 I 219
— protracta . . . . . 93 II 424
— spinulosa . . . . . 91 II 383
— Wettin und Umgegend 91 II 383
— Wisniowskii . . . . 94 II 375
— xylina . . . . . 94 I 402
Sigillariocladus . . . . . 90 I 173
Sigillariostrobus spectabilis 94 I 401
Sigillodendron frondosum 90 I 173
Sigterit . . . . . 91 II *206*
— neuer Feldspath . . . 90 II *71*
Silber, Altai . . . . . 90 II 20
— die Zukunft des . . 94 II 1
— Kongsberg, Analyse . 93 II 77
— Leogang . . . . . 93 I 14
— Mexico . . . . . 91 I 235
— Mies . . . . . 93 I 10
— Production . . . . . 91 II 293
— quantitative Bestimmung mit Hülfe des Mikroskopes . . . . . 90 I 278

Silbererze, Cerro de Potosi, Bolivia . . . . . 1892 II 76
— Melos . . . . . 92 I 84
— Russland . . . . . 93 II 61
— Siebenbürgen . . . . 92 II 72
— Texas . . . . . 94 I 111
— Vorkommen im böhmischen Mittelgebirge . 90 II 257
Silberkupferglanz . . . 94 I *32*
Silberwismuthglanz, künstliche Darstellung . . 92 II 400
Silicate, Aufschliessung . 92 I 504
— Bildung der die Erze begleitenden . . . . . 93 II 277
— — und Umwandlung. 91 I 228
— chemisch-mineralogische Untersuchungen 90 I 212
— Formeln . . . . . 90 II 372
— Löslichkeit . . . . . 92 I 504
— Synthesen. . . . . 90 II 34
Silicathornfels, New Jersey 93 I 505
Siliceous limestone group, Saltrange . . . . . 93 II 119
Silicium . . . . . 94 I *25*
Siliciumjodoform, specifisches Gewicht . . . 94 II 3
Sillimanit, Barcellona . . 94 I 121
— Bestandtheil des Kryokonit . . . . . BB VII *170*
— Cortlandt Series . . 90 I 88
— in Glimmerschiefer, Argentinien . . . . BB VII *355*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *307*
— in Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *339*, *383*
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— Synthese . . . . 1894 I 12, 44
— Verwachsung mit Andalusit . . . . . 90 II 38
Sillimanitgneiss, Klingenhain, Sachsen . . . 91 II 266
— Leckwitz, Sachsen. . 91 II 268
— Schottland . . . . 94 II 256
Silur. . . . . 93 II 501
— Alpen . . . . . 93 II 507
— Apuaner Alpen . . . 91 II 306
— Argentinien . . . . BB VII *296*
— argentinische Cordillere 93 I 104
— Ariège . . . . . 93 I 510
— Belgien . . . . . 92 I 113
— Böhmen 1890 I 269. 93 II 517
— Bornholm . . . . . 93 I 143
— Bottnisches Meer . . 94 II 98
— Bretagne . . . . . 92 I 114
— Californien . . . . 94 I 110
— Calvados . . . . . 90 II 289
Silur, Canada . . . . 1891 II 310
— Central-Pyrenäen 1890 II 290. 91 I 260
— Cerro de Cacheuta . 93 I 103
— Cross Fell Julier . . 93 I 96
— Cumberland . . . . 93 I 116
— Dalarne . . . . . 94 I 477
— Departement de La Mayenne . . . . . 90 I 285
— Eaux Bonnes . . . . 93 I 510
— Eruptionen, Omeo . . 91 II 101
— Eruptivgesteine. . . 92 I 272
— Fischreste, Colorado . 91 I *284*
— Frankreich . . . . . 94 I 206
— Galizisch-Podolien . . 90 I 98
— Gotland . . . . . 92 I 344
— — Schichtenfolge . . 90 II *248*
— Inseln bei Christiania 90 I 75
— jüngstes, Schonen . . 91 II 311
— Kentucky . . . . . 91 II 461
— Languedoc . . . . . 92 I 344
— Lappland . . . . . 92 I 341
— Macon County, Missouri 90 I 437
— Mächtigkeit, New York 93 I 510
— Neusibirische Insel Kotelny . . . . . 90 II 291
— New York . . . . 91 II 312
— nördliches Norwegen . 93 II 109
— Nordamerika. . . . . 93 I 117
— oberes, Galizien . . 94 I 335
— — Gotland . . . . 94 I 334
— Olekma-Witim . . . 92 II 279
— Ost-Thüringen . . . 91 II 115
— polnisches Mittelgebirge . . . . . 92 I 115
— Sachsen . . 1891 II 268, 271
— — Rosswein. . . . 91 I 73
— — Tanneberg . . . 91 I 76
— Texas . 1893 II 111. 94 I 153
— Timan . . . . 1894 I 122, 323
— Trondhjem 92 II 295. 93 I 96
— Trunkey District . . 94 I 111
— Umgebung von Ričan 90 I 262
— unteres, Cumberlandgolf. . . . . 91 II 105
— — Gouv. Minsk . . 92 II 95
— — Südappalachen . . 94 I 333
— Vergleich des englischen und böhmischen . . 94 I 118
— Vergleich zwischen thüringischem und schottischem . . . . . 91 II 118
— Versteinerungen, Bolivien . . . . . BB VIII *6*, *89*
— Virginia . . . . . 94 I 123
— Vogtland . . . . . 92 II 79

Silur, Wales . . . . 1893 I 115
— West-Europa . . . 92 I 109
Silurgeschiebe, Westpreussen . . . . . 92 II 359
Simbirskites . . . . . 93 I 354
Simetit, Sicilien . . . . 94 I 52
Simoceras . . . . . 94 II 448
Sinter der heissen Quellen, Yellowstone Park . . 91 I 102
Sintfluth . . . . . 94 I 456
Sinusfunction einer Ecke 94 II *87*
Siphoneen, Silur . . . . 93 II *135*
Siphonia coronata . . . 91 I 156
— ficus . . . . . 91 I 156
— incrassata . . . . . 91 I 156
— ovalis . . . . . 91 I 156
— piriformis . . . . . 94 I 210
Siphonotreta Vern. . BB VIII *6*
Sirenen, Boom . . . . 91 I 330
— Californien . . . . 91 II 341
Sirenia . . . . . 92 I 411
Sirenoidea . . . . . 92 II 358
Sirmur Series, Himalaya 94 II 434
Sismondia Vasseuri . . 93 I 415
Sivatheriiden 1890 II 432. 1892 I 405. 93 I 543
Siwalik Series, Himalaya 94 II 434
Sjögrufvit, Gouvernement Oerebro . . . . . 94 I 271
Skapolith . . . 1893 II 460, 469
— Finnland . . . . . 91 II 258
— Hirschberg a. Saale . 90 II *270*
— in Granit von Nord-Argentinien . . . BB VIII *361*
— in Kalkstein, Texas, Baltimore Co. . . . 90 II 228
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Skandinavien . . . 93 II 65
— Südwest-Afrika . . . 90 I *112*
Skapolithaugit-Gestein . 92 I 523
Skapolith-Diorit, L'Arbah 90 II 404
Skapolith-Gesteine, Canada . . . . . 90 I 430
Skapolith-Glimmerschiefer, Joachimsthal, uranhaltig . . . . . 91 II 295
Skarn . . . . . 93 II 65
Skarn-Gesteine . . . . 93 II 272
Skarn-Lager . . . . . 93 II 62
Skiddaw-Schiefer, nördliches England 1894 I 333. II 301
Skolecit in Basalt, Bachd More . . . . . 90 II 219
— Island . . . . . 94 II 226
— Lunga . . . . . 90 II 219
Skolecit, monoklin-hemiëdrisch . . . . . 1894 II *51*
— Synthese . . . . . 90 I *136*
— Zersetzbarkeit . . . 90 I *136*
Skorodit, Elba . . . . 90 II 18
— Lölling . . . . . 93 II 261
— Mine bei Frisco, Utah 90 II 46
Skorpionen in Bernstein . 92 II 460
Smaragd, Alexandrien . 93 II 249
Smaragdgruben, Aegypten 94 I 328
Smaragdit, Süd-Borneo . 93 I *40*
Smaragdit-Schiefer, Süd-Borneo . . . . . 93 I *39*
Smilax . . . . . 92 II 377
— Wardii . . . . . 90 I 374
Smithia tubularis . . . 94 I 202
Smithsonit, Brixlegg . . 90 I 412
Sodagranit, Cortlandt Series 90 I 88
Sodalith . . . . . 92 I 27
— British Columbia . . 90 II 384
— Constitution . . . . 94 I 262
— in Trachyt . . . . 92 II 255
— Südnorwegen . . . 92 I 244
Sodalith-Gruppe . . . . 93 II 10
Sodalithsyenit, Montana . 94 II 262
Solarium Cortazari . . . 93 II 162
— costatum . . . . . 91 I 159
— Gaudryi . . . . . 91 II 463
— Goossensi . . . . . 91 II 463
— Langlassei . . . . 91 II 463
Solaster Murchisoni, Yorkshire, Lias . . . . 90 II 333
Solecurtus strigillatus . 90 I 357
Solen simplex . . . . 90 II *225*
Solenocheilus latiseptatus 91 I 336
Solenophragma . . . . . 90 I 167
Solenoporina . . . . . 90 I 162
Solfataren . . . . . 90 II 401
— argentin. Cordillere . 93 I 105
— Beziehungen zur Structur der sauren Eruptivgesteine . . . 1890 II 79, 271
— Pozzuoli . . . . . 92 II 47
Sonden zur Tiefseeforschung . . . . . 93 II 284
Sonne, Entwickelungsgeschichte . . . . 94 II 49
Sonnensystem, Alter . . 91 II 263
Sonneratia, Cleon . . . 90 I 356
— Dutemplei . . . . 90 I 356
Sonninia Buckmani . . 94 I 192
— Schlumbergeri . . . 94 I 192
Sonomait . . . . . 90 I *53*
Soole, Berlin . . . . . 94 II 125
Soolquelle, Lautenthal im Harz . . . . . 91 I 248

Sophora . . . . . 1891 II 382
Sorex, Montousé . . . 93 I 539
— styriacus . . . . . 94 II 343
Soricina . . . . . 90 II 430
Sotzkaschichten, Wresie . 93 I 133
Sowerbyi-Gruppe . . . . 94 I 191
Spalacotherium . . . . 92 II 340
Spalaeoides . . . . . 90 II 430
Spaltbarkeit bei Metallen und ihren Oxyden . . 94 I *51*
Spalten in Granit, Sierra Nevada . . . . . 93 I 100
— in Italien . . . . . 92 I 287
Spaltenbildung bei Erdbeben . . . . . 94 II 280
Spaltennetz, Montagne de Lure . . . . . 91 I *213*
Spaltrisse in Quarz, Granit von Nord-Argentinien BB VIII *364*
Spaltungshypothese Roth's 91 II 58
Spangolit . . . . . 93 II 35
Sparagmit . . . . . 1892 I 336, 339
— Saalekinnen . . . . . 93 I 114
Sparagmitformation, cambrisch, silurisch . . . 93 II 110
Spatangidae . . . . . 92 II 164
Spatangoida . . . . . 92 II 163
Spatangoidea . . . . . 92 II 164
Spatangus . . . . . 91 I 437
— bündensis . . . 1891 I 436, 437
— cruciatus . . . . . 93 I 557
— Damesi . . . . 1891 I 436, 437
— Hoffmanni . . . . . 91 I 436
— inflatus . . . . 1891 I 436, 437
— Koeneni . . . . . 91 I 436
— macraulax, Pliocänkalk, Insel Pianosa . 90 II 421
— ocellatus . . . . . 91 I 436
— pyriformis . . . . . 90 I 472
Spathobatis Bugesiacus . 91 II 457
Specialkarte, Preussen . . 93 I 84
Species, Festlegung des Begriffes . . . . . 90 II 331
Specifische Wärme des Boracits . . . . . 92 II *125*
— des Wassers . . . . . 92 II *130*
Specifisches Gewicht in isomorphen Reihen . . 91 I *133*
— in Wasser löslicher Salze . . . . . 1890 I 202, 205
— von Flüssigkeiten, Apparat zur Bestimmung desselben . . . 91 II *214*
Speckled sandstone group 93 II 117
Speckstein, pseud. nach Kalkspath . . . . . 92 II *160*
Spectropolarisator, Abbe'scher . . . . BB VII *70*
Speeton-Clay . . . . . 1892 I 364
— Fauna . . . . . 93 I 351
Speiskobalt, Leogang . . . 93 I 15
Spermophilus . . . . . 94 I 178
— Diluvium von Bourg . 92 I *142*
— rufescens 1891 I 324. 94 II *278*
Spermophilus-Reste, Curve bei Wiesbaden . . . . 90 I 139
Sperrylith, Canada . . . . 91 II 246
— Sudbury . . . . . 92 II 410
Spessartin, Ottawa Co. . 92 II 26
— Vigezzothal . . . . 91 I 14
Spessartit, Virginien . . . 91 II 415
Sphärenerze, Miess, Kärnten . . . . . 90 I 216
Sphaerexochus . . . . . 92 I 175
Sphaeria acerina . . . 93 II 431
— Callistemophylli . . . 93 II 431
— Myricae . . . . . 93 II 431
— Palaeo-Juglandis . . 94 I 530
— Palaeo-Santali . . . 94 I 530
— Palaeo-Typhae . . . 94 I 530
— Schoeneggensis . . . 94 I 530
Sphaerium pseudocorneum 94 II *90*
Sphaerocalpis Haeckelii, Krakau . . . . . 90 II 343
Sphaerococcites deperditus 94 I 530
Sphaerocodium Bornemanni . 1893 I 577. 94 I 231
Sphaerocrinus . . . . . 90 I 171
Sphärolithe, Deformation durch Schieferung BB VIII *604*
— hohle . . . . . 93 I 295
— in Eruptivgesteinen 1893 I 294, 297
— in Felsokeratophyr, Sauerland . . . . BB VIII *601*
— in gebändertem Rhyolith, Rosita Hills . . 93 I 294
— in Lenneporphyr BB VIII *556*, *589*
— mikropegmatitische . . 93 I 296
— trichitische . . . . . 93 I 295
— zusammengesetzte . . 93 I 295
Sphärolith-Fasern (Feldspath) . . . . . 1893 I 296, 298
Sphärolithische Gesteine, Mourne Mountains . 91 I 399
Sphärolithtachylit, Sichota, Alin im Ussuri-Gebiet 90 I 54
Sphärosiderite, Donetzgebiet . . . . . 1894 I 469
— Wollin . . . . . 94 II 315
Sphaerospongia cornucopiae . . . . . 93 I *46*

Sphaerospongia Gerolsteinensis . . . . . 1893 I *48*
— megaraphis . . . . . 93 I *48*
— Rathi . . . . . 93 I *47*
— sculpta . . . . . 93 I *47*
— Vichtensis . . . . . 93 I *47*
Sphaerozoum hexaspiculum, Krakau . . . . . 90 II 343
Sphaerucaprina forojuliensis . . . . . 93 II 556
Sphaerulites . . . . . 90 I 158
Sphalerit, Heraletz. . . . 93 II 266
Sphen . . . . . 93 II 265
— in Kalkstein, Texas, Baltimore . . . . . 90 II 228
— Rothenkopf . . . . 93 I 239
Sphenacanthus . . . . 91 II 166
Sphenia lamellosa . . . 90 II 153
Sphenodiscus Dumblei . 94 I 372
Sphenodon. 1893 I 166. 94 I 184
— punctatum . . . . . 93 II 404
Sphenophorus . . . . 93 I 176
Sphenophyllum . . . . 94 II 371
— alatifolium . . . . 93 I 206
— cuneifolium . . . . 93 I 573
— emarginatum . . . 94 II 376
— Nageli . . . . . 94 I 219
— papilionaceum . . . 94 I 219
— pedicellatum . . . . 93 I 206
— trichomatosum . . . 94 II 481
Sphenoptera . . . . . 90 II *26*
Sphenopteris . . . . . 93 II 215
— fasciculata . . . . 91 I 440
— germanica . . . . 91 I 440
— Hoeninghausi . . . 93 I 570
— Mantelli . . . . . 93 II 563
— refracta . . . . . 90 I 172
Sphenozamites grandis . 90 I 372
— robustus . . . . . 90 I 372
Sphiraxis bivalvis . . . 93 II 219
Sphodrus Capellinii . . 94 II 469
Spiegel in Buntsandstein, Marburg . . . 1891 I *103*, *268*
Spiegeleisen . . . . . 94 II 279
Spilecco-Stufe, venetianische Alpen. . . . 94 I 492
Spilit, Jersey. . . . . 94 II 258
Spinell . . . . . 94 I *81*
— Bildung aus Schmelzmassen. . . . . 94 I 95
— in Anorthitfels, Canada . . . . . BB VIII *448*
— in Erz des Routivare 94 I 89
— in Jacupirangit. . . 92 II *145*
— Neu-Süd-Wales. . . 90 II 207
— Nordamerika. . . . 92 I 499
Spinell, See von Vico. 1891 I 11
— Südwest-Afrika . . . 90 I *108*
Spinosa-Gruppe der Rhynchonellen . . . . . 91 I 162
Spiractinella . . . . . 90 II 163
Spiraeeen . . . . . 91 I 342
Spirale der Nummuliten, Condensation derselben 91 II 372
Spirangium ventricosum . 94 I 223
Spirifer. . . . . 91 II 186
— arrectus . . . . . 92 II 364
— Chuquisaca . . . BB VIII *65*
— crispus. . . . . 91 II 186
— cultrijugatus. . . BB VIII *662*
— duodecimcostatus . . 90 I 437
— macropterus in Tuff des Lennegebietes . BB VIII *645*
— macrorhynchus . . BB VIII *662*
— mosquensis . . . . 92 II 99
— primaevus 1892 II 364. 93 I *13*
— sibiricus . . . . . 93 II 374
Spiriferina . . . . . 91 I 161
— acuta . . . . . 91 I 162
— borealis . . . . . 91 II 170
— Calabra . . . . . 94 II 314
— elegantissima . . . 93 II 419
— Hörnesi . . . . . 93 II 419
— iniquiplecta . . . . 93 II 419
— interplicatus. . . . 94 II 103
— Lipoldi hemicycla . . 93 II 526
— megathyridiformis . . 93 II 419
— Mitzopuli . . . . . 93 II 524
— Moscai . . . . . 93 II 136
— Myrina. . . . . 93 II 420
— oligoptycha . . . . 93 II 419
— orthorhyncha . . . 93 II 420
— rostrata . . . . . 94 II 341
— Santoroi . . . . . 94 II 314
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Spiriferinenbank, Odenwald . . . . . 90 I *102*
Spiriferinidae. . . . . 92 I 439
Spirigera dyactis . . . . 93 II 420
— Manzavinii . . . . 93 II 136
— St. Cassian . . . . 90 II 333
— Strohmayri, Salzburg 90 I 101
— timorensis . . . . 94 II 103
— Tricupii . . . . . 93 II 136
— Uhligi . . . 1893 II 419, 420
Spirigeriden . . . . . 92 I 440
Spirina brilonensis . . . 91 II 172
Spirocyathus . . 1891 II 197, 199
Spirodentalium . . . . 94 I 374
Spiroloculina complanata 94 II 367
— foveolata . . . . . 94 II 367
— involuta . . . . . 94 II 367

Spiroloculina lamella . 1894 II 367
— papyracea . . . . . 93 II 562
Spirophyton . . . . . 91 II *103*
Spirulirostra Bellardi . . 92 II 361
Spirulirostrina Lovisatoi . 92 II 361
Spleniale der Coelacanthinen . . . . . 91 II 349
Spodumen, Nord-Carolina 90 I 219
Spondylus . . . . . 92 I 181
— Hilli . . . . . 94 I 372
Spondylus-Thon, Russland 94 I 359
Spongien . . . . . 90 II 135
— Archaicum . . . . 93 II *57*
— Calciferous-Gruppe der Mingan-Inseln, Canada 91 II 199
— Cuvieri-Pläner, Paderborn . . . . . 93 I 565
— Dogger des Fünfkirchner-Gebirge . . . . 91 II 196
— Grojec . . . . . 92 I 596
— im Landénien . . . 92 II 307
— Little Metis . . . . 92 I 458
— obere Kreide, Frankreich . . . . . 94 I 209
— Tiefsee . . . . . 93 II 306
Spongiennadeln in Hornstein . . . . . 92 I 189
— — Adelaide . . . . 93 I 422
— in Thon, Philadelphia 93 I 422
— Nomenclatur . . . . 91 I 163
— Tertiär . . . . . 93 II 210
Spongillopsis dyadica . . 91 I 166
Spongiomorpha acyclica . 93 I 197
— gibbosa . . . . . 93 I 197
— minor . . . . . 93 I 197
Spongiomorphidae . . . 93 I 197
Spongodiscus expansus . 94 I 525
— tuber . . . . . 94 I 211
Spongolena symmetrica . 94 I 526
Spongophyllum . . . . 94 II 184
Sporules . . . . . 93 II *93*
Springquellen, intermittirende . . . . . 93 II *19*
Sprödigkeit . . . . . 93 II 2
Sprudelstein, Korond (Udvarhelyer Com.) . . 90 I 397
Spyridiocrinus Cheuxi . . 93 I 563
— Kalkfauna von St. Malo . . . . . 90 II 293
Squalodonditae . . . . 92 II 145
Squalorajidae . . . . 92 II 357
Squamata . 1890 I 342. 93 I 166
Squatina crassidens . . 91 II 457
$Sr(SbO)_2(C_4H_4O_6)_2 + NaCl + 9H_2O$, Krystallform BB VIII *503*
$Sr(SbO)_2(C_4H_4O_6)_2 + NaNO_3 + H_2O$, Krystallform . . . BB VIII *508*
Stachella striata . . 1893 II 521
Stacheoceras . . . . . 90 II 149
Stagodon . . . . . 90 II 143
— validus . . . . . 93 I 390
Stahlerz, Kongsberg . . 93 II 78
Starrheit der Erde . . . 91 I 386
Statistik der Mineralien . 93 II 278
Staub, kosmischer, Grönland . . . . . BB VII *153*
— — Schlesien . . . . 91 II 61
— — Tiefsee . . . . 93 II 310
— — Ungarn . . . BB VII *154*
Staubniederfall mit Schnee, Schlesien . . . . . 90 I 66
Staurocephalus Murchisoni . . . . . 90 II 328
Staurolith . 1891 II 29. 93 II 16
— Contact-Mineral . . 94 II 256
— Cortlandt Series . . 90 I 88
— Loire . . . . . 91 I 379
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— Südwest-Afrika . . . 90 I *110*
Steeg'sche Combination . 92 II *202*
Stefanit, Sarrabus . . . 92 II 13
Stegaster . . . . . 91 II 366
— altus . . . . . 91 II 367
— Heberti . . . . . 91 II 367
— St. Cotteaui . . . . 91 II 367
Stegocephalen 1893 I 171; II 179
— Rothliegendes, Plauen'scher Grund b. Dresden 1890 I 144; II 436. 91 II 454
Stegodon . . . . . 92 II 335
— Airâwana . . . . . 92 II 451
— bombifrons . . . . 92 II 451
— Mindanaensis 1890 II 140. 92 II 143
— trigonocephalus 1890 II 139. 92 II 451
Stegosaurus 1890 II 433. 91 II 452
— stenops . . . . . 93 I 548
— undulatus, Reconstruction . . . . . 93 I 548
Steingeräthe, Wady Halfa 91 I 400
Steinkohle . . . . . 93 II 245
— Bedingungen der Ablagerung des Materials 93 I 208
— Dep. Allier . . . . 91 II 316
— Donetzgebiet . . . 94 II 414
— oberes Oderthal . . 94 II 307
— Sachsen, Tharandt . 94 II 282
— schwarze Farbe . . 93 II 241

Steinkohle, Volumreduction bei der Bildung 1894 II 430
Steinkohlenablagerung, Bas Boulonnais . . 93 II 83
— Heraklea . . . . . 93 II 83
— Holland . . . . . 93 II 82
— Pas de Calais . . . 93 II 83
Steinkohlenbassin, Commentry . . . . . 91 II 285
Steinkohlenbecken, Pleasley . . . . . 91 II 430
— St. Etienne . . . . . 90 II 393
Steinkohlenflora, Commentry . . . . . 92 I 464
Steinkohlenformation, Altenberg . . . . 93 I 92
— Bassin von Desna . . 94 I 325
— Donetzgebiet . . . 94 I 469
— England . . . . . 90 I 296
— Fauna, Oberschlesien . 91 II 462
— Kaukasus . . . . . 94 I 94
— Ottweiler, Leipzig . . 93 II 95
— Plauen'scher Grund . . 93 I 339
— Saarbrücken . . . . 90 I 295
— Saarbrücken und Pfalz 94 I 93
— Sachsen, Nassau . . 91 II 275
— Schlesien . . . . . 94 I 93
— Schwarzwald, Flora . 91 I 166
— Wettin . . . . . 91 I 289
Steinkohlenproduction . . 94 I 468
Steinregen, Dép. de l'Aube 92 II 262
Steinsalz, Arizona . . . 93 II 36
— Bachmut . . . . . 94 II 414
— Chañaral . . . . . 90 I *69*
— Donetzgebiet . . . 94 I 469
— Doppelbrechung durch einseitigen Druck . . 90 II 367
— Härte und Plasticität 93 II 3
— Härtecurve . . . . . 91 II 9
— optische Anomalien . BB VII *3*
— Reflexion des Lichtes 90 I 12
— Siebenbürgen . . . 92 II 73
— Starunia . . . . . 93 I 461
— Vizakna . . . . . 91 I 240
— Vorkommen mit organischen Substanzen . 93 I 269
Steliella . . . . . 92 I 460
Stelletta . 1890 II 341. 94 I 395
Stenarthron . . . . . 92 I 177
Steneosaurus . . . . . 92 I 414
— Parmilien . . . . . 91 II 346
— recurvirostris . . . . 92 II 356
Stenocephalus . . . . . 92 II 338
Stenogomphus Carletoni . 93 II 549
Stenopora crinita . . BB VIII *85*
— Steinmanni . . . . BB VIII *84*
Stenotheca . . . . . 1893 I 554
Stenothyra aquensis . . 94 II 356
Stenzelia . . . . . 90 I 172
Stephanella sancta . . . 92 II 465
Stephanit . . . . . 91 II 417
— Hemimorphie . . . 92 II 14
Stephanoceras coronatum, brauner Jura, Lithauen 90 I *170*
— Maya, Jura . . . . 90 I *150*
— Nepalense, Jura . . 90 I *150*
— zigzag . . . . . 93 I 552
Stephanocoenia . . . . . 90 II 337
— Doumeti . . . . . 94 I 174
— juvavica . . . . . 93 I 195
Steppen . . . . . 92 II 125
— Transkaspien . . . 91 II 336
Stercula Drakei . . . . 94 I 117
Sterculia Geinitzii . . . 93 I 576
Stereocidaris Darupensis . 93 II 422
— Hannoverana . . . 93 II 422
— silesiaca . . . . . 93 II 422
— subhercynica . . . . 93 II 422
Stereognathus . . . . 92 II 342
Stereornithes, Argentinien 93 I 545
Sternschnuppen u. Meteoriten . . . . . 90 I 43
Stibiatil, Sjögrubenfeld, Oerebro 1890 I *254*. II 222. 94 I 270
Stichocados verruculosus . 90 I 170
Stichocapsa chrysalis . . 94 I 526
— Dawsoni . . . . . 94 I 395
— pinguis . . . . . 94 I 526
— Tyrrelli . . . . . 94 I 395
Stichopora crassa . . . 90 I 167
Stigmarhizes . . . . . 94 I 397
Stigmarhizomes . . . . 94 I 398
Stigmaria ficoides . . . 91 I 442
— flexuosa . . . . . 94 I 402
Stigmarien . . . . . 94 I 396
Stigmarienthon, Bildung 94 I 480
Stigmatoechus punctatus 90 I 165
Stilbit . . . . . 94 I 4
— Bachd Beg . . . . 90 II 219
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
Stilyna norica . . . . 93 I 195
Stinkgas, Llano Co. . . 93 I 259
Stipitopteris peltigeriformis 93 II 217
— reflexa . . . . . 93 II 217
— Renaulti . . . . . 93 II 216
Stirpulina bacillum . . 90 II 153
St. John Group . . . . 92 I 112
Stockgranit, glimmerarmer 93 II 89
Stockholmgranit, Geschiebe 93 I 142
Störungen, postglaciale, tektonische . . . . 93 II 390

Stoliczkiella Theobaldi, Karakoram-Pass . 1890 II 340
Stolonota . . . . . 94 I 201
Stomatopora morinica . 91 II 369
— St. Rigauxi . . . . 91 II 369
Stomechinus Cesaredensis 91 II 192
— Choffati . . . . . 91 II 192
Stosskraft der Ströme . 91 I 54
Strahlkies, pseudomorph nach dunkelm Rothgültigerz . . . . . 91 I *199*
Strahlstein, Neu-Süd-Wales 90 II 207
Strahlsteinschiefer, Eulengebirge . . . . . 93 II 325
— Minnesota. . . . . 93 I 292
— Sachsen, Riesa-Strehla 91 II 268
Strandbildung, Cambrium, Sardinien . . . . . 93 II 127
Stranddünen, Algier . . 91 II 298
Strandlinien . . . 1893 I 61, 62
— grosser Salzsee . . . 94 I 167
— Ponza-Inseln. . . . . 94 I 281
— Skandinavien 1894 I 167; II 43, 135, 244
— Weisses Meer, Verschiebung der . . . 94 I 64
Straparollus Roeseri . . 91 I 159
Strengit . . . . . 92 I 231
Streptochetus. . . . . 90 II 152
Streptorhynchus Beyrichi 94 II 103
— gigas . . . . . 93 I *2, 4*
— subplanatus . . . . 91 II 184
Streptospondylus Cuvieri 92 II 355
Strepula limbata . . . 93 II 411
— lineata. . . . . 91 I 430
— Linnarssoni . . . . 91 I 430
— plantaris . . . . . 91 II 460
— sigmoidalis . . . . 91 I 334
— simplex . . . . . 93 II 411
Strictechinus Pouechi . . 94 I 521
Strigovit . . . . . 92 II 232
Stringocephalus Burtini . 92 I 561
Strobilodus purbeckensis . 93 I 174
Strobilospongia aurita . 92 II 372
— tuberosa . . . . . 92 II 372
Strömungen aus dem aquitanischen in das Pariser Becken während der Kreide . . . . . 94 I 489
Stroganowit Baikalsee . 90 I 15
Stromatomorpha stylifera 93 I 198
Stromatopora polymorpha, Nord-Patagonien . . 93 I *28*
Stromatoporella . . . . 93 I 422
Stromatoporen . . . . 93 I 420
Strombidae 1890 II 152. 91 II 177
Stromboli, Thätigkeit 1888, 1889, 1891 1892 II 260. 93 I 492
Strombus crassiliratus . . 93 I 538
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
Stromeyerit, Californien . 92 I 50
Strontianit, Altahlen . . 91 I 24
— Kaiserstuhl 1890 II 41. 91 I 370
— Leogang . . . . . 93 I 16
— Schottland . . . . . 91 II 18
— Westfalen 1890 I 258. 91 II 297
Strontiumnitrat, sanduhrförmig . . . . . 94 II 24
Strophalosia . . . . . 91 II 465
Strophomena . . . . . 92 II *140*
— gigas . . . . . 92 II 364
— protaeniolata . . . 93 I *2, 4*
— Rafinesque . . . BB VIII *69*
— rhomboidalis . . . . 91 II 184
— Saskatchewan . . . 93 I 380
Strophonella . . . . . 91 II 184
Strophostoma. . . . . 92 II 462
Strotocrinus regalis . . . 91 II 182
Structur der Eruptivgesteine 1891 I 389, 390. 1892 I 273, 276
— der Gesteine . . . 94 II 52
Structuränderungen von Gesteinen durch Pressung . . . . . 93 I 495
Structurtheorie . . . . 94 II 217
Strünke, subfossile, auf dem Boden von Seen 94 I 529
Struthiones, Argentinien . 93 I 545
Struvit . . . . . 91 I 233
— aus Fleischpepton . . 92 I 226
Strychnin, schwefelsaures 92 I *205*
Strychninsulfat . . . . BB VII *41*
— Aetzerscheinungen. . . 92 II 3
— Drehungsvermögen u. Krystallform. . . BB VIII *270*
Strychnos grandifolia . . 93 II 432
Stubensandstein bei Erlangen . . . . . 91 II 305
Stylacodontidae . . . . 92 II 345
Stylina bullosa . . . . . 91 II 127
— punica . . . . . 91 II 127
Stylodon . . . . . 92 II 340
Stylolithen, Natur und Entstehungsweise . . 90 I 55
Stylophyllinae . . . . 93 I 195
Stylophyllopsis caespitosa 93 I 196
— Lindströmi . . . . 93 I 196
— Mojsvari . . . . . 93 I 196

Stylophyllopsis multiradiata . . . . 1893 I 196
— polyactis . . . . . 93 I 196
— rudis . . . . . 93 I 196
— Zitteli . . . . . 93 I 196
Stylophyllum paradoxum . 93 I 196
— pygmaeum . . . . 93 I 196
— tenuispinum . . . . 93 I 196
Stypolophus 1891 II 144. 93 I 149
Stypticit, Tierra amarilla bei Copiapó in Chile . 90 II 217
Styracaceen . . . . . 91 I 346
Styrax coriacea . . . . 93 II 434
— glabratoides . . . . 93 II 434
— Joannis . . . . . 93 I 431
— laramiense . . . . 90 I 373
Subhercynische Kreide, Flora . . . . . 91 I 442
Subsigillarien . . . . 91 II 384
Subulina nitidula . . . 93 I 554
Subursi . . . . . 91 II 147
Succinit, Verbreitung . . 94 II 195
Sudetenausläufer, Mähren 94 II 79
Südamerika, Geologie . . 93 I 48
Suessionia . . . . . 90 II 152
Suessonien, Piemont . . 90 II 311
Süsswasserablagerungen, Montpellier . . . . 90 II 307
— posttertiäre, Südrussland . . . . . 92 I 150
— Sahara, Pliocän . . 90 II 99
— Turon, Spanien . . . . 90 II 414
Süsswasserconchylien, diluviale, auf primärer Lagerstätte, Ostpreussen . . . . . 90 II 126
Süsswasserkalk, Agenais . 94 II 452
— Castillon, Gironde . . 94 II 453
— Reuen . . . . . 92 I 435
Süsswassermergel, Russland . . . . . 94 II 338
Süsswassermolasse, Heggbach . . . . . 90 I 450
Suina . . . 90 II 431. 93 I 148
Sulcoclava costulata . . 90 I 164
Suldenit, Rabbithal . . 90 I *79*
Sulfate, basische . . . 93 II 12
Sulfide . . . . . 92 II 210
— Entstehung . . . . 93 II 275
— Löslichkeit . . . . 92 I 503
— specifische Wärme . . 94 I 248
— Synthese . . . . . 92 I 20
Sulfoferrite . . . . . 93 II 12
Sulphobalit, Californien . 91 II 241
Sumgait-Serie . . . . . 93 II 86
Sumpfwasser . . . . . 93 I 290
Sundtit, Bolivia 1894 I 271; II 20
Surcula . . . . . 92 I 586
— Miocän . . . . . 93 II 198
Sus . . . . . 93 I 539
Suspensionen, Versuche . 93 II *147*
Sussexit, Franklin, N. J. . 91 II 243
Svabit, Harstigen . . . . 93 II 39
— Nordmarken . . . . 94 II 237
Sveltella . . . . . 90 II 152
Sychnodymit . . . . . 92 II 407
Syconen . . . . . 91 I *282*
Sycophyllum dentatum . 91 I 444
Syenit, Abukuma-Plateau 93 II 514
— Bradgate Park . . . . 92 I 295
— Caernarvonshire . . 90 II 262
— Cape Ann . . . . . 92 II 286
— Colorado . . . . . 90 I 84
— Essex . . . . . 90 II 423
— Glatz und Reichenstein 90 I *195*
— Habkern, Schweiz BB VIII *208*
— Sachsen, Elbthalgebirge 94 I 70
— — Glashütte . . . . 91 I 69
— — Kötzschenbroda . 93 II 90
— — Meissen . . 1891 I 77, 80
— — Riesa-Strehla . . 91 II 268
— Saganaga, Ontario . 94 II 94
— Tirol . . . . . 90 I *72*
— West-Pyrenäen . . . . 91 I 265
Syenitaplit, Odenwald . 94 I 290
Syenitpegmatitgänge, Südnorwegen . . . . . 92 I 296
Syenitporphyr, Berra, Schweiz . . . . BB VIII *196*
— centraler Balkan . . 90 I *268*
— Transvaal. . . . BB VII *129*
Sylvanit, Krystallform . 92 I 33
Sylvin . . . . . 93 II 389
— Aetzfiguren . . . . 93 I 24
— Doppelbrechung durch einseitigen Druck . . 90 II 367
— Kalusz . . . . . 94 I 472
— optische Anomalien . BB VII *3*
Symmetrie der Polyëder . 94 I 244
Symmetrieaxen . . . . 94 I *199*
— dreizählige . . . . 94 I *278*
Symmetriebegriff . . . 91 I *114*
Sympetalae . . . . . 91 I 344
Symplesit, Pisek . . . 90 II 56
Synadelphit, Krystallsystem . . . . . 90 II 226
Synaptosaurier . . . . 90 I 345
Syndosmya sufficiens . . 91 I 128
Synechodus dubrisiensis . 90 I 148
— Illingworthi . . . . 94 I 188
Synedra . . . . . 93 II 437
Synklinalen des Mt. Pilat 90 II 395

Syringodendron . . . 1894 I 400
— approximatum . . . 93 I 206
— bioculatum . . . . 94 I 219
— defluens . . . . . 94 I 219
— gracile . . . . . 93 I 206
Syringolites . . . . . 90 II 162
Syringopora . . . . . 93 I 420
— labyrinthica . . . . 94 I 171
— radiata . . . . . 94 I 171
Syringosphaeridae . . . 92 I 598
Syringostroma . . . . 93 I 422
Syrnola Barreti . . . . . 91 II 463
Systenope . . . . . 90 II 152
— asperulum . . . . . 90 I 168
Szajbélyit, Rezbanya . . 90 I 396

T.

Tabaschir,Brechungsindex 91 II *337*
Tabellen, petrographische 93 I 69
Tabergit . . . . 1892 II 227 232
Tabulaten . . . . . 90 II 135
— Skeletentwickelung . 93 I 418
Tachhydrit . . . . . 94 I 12
Tachylyt, Gebiet von Olot 90 I 80
— Irland . . . . . 90 I 74
— Madagascar . . . . . 90 II 96
— mit Gabbro, Carrock-Fell Lake District . 90 II 92
Tacon . . 1891 II 113 92 I 343
— Lappland . . . . . 93 II 108
Taenioporina crucifera . 90 I 168
Taenioptéris . . . . . 93 II 216
— ardesica . . . . . 94 I 220
— undulata . . . . . 94 II 375
Taenit . . 1892 I 269 92 II 245
— Meteor von Kiowa . 94 I 448
Tainoceras cavatum . . 93 I 180
Takanuki-Schichten . . 93 II 514
Takyre . . . . . 92 II 278
Talchir-beds, Gondwana . 94 I 126
Talk . . . . . 91 I 23
— Amity . . . . . 94 I 273
— Einwirkung von gasiger und wässeriger HCl 94 I 27
— Madagascar . . . . . 92 II 403
— Val di Susa . . . . . 91 II 407
Talkknebelit, Gouv. Dalekarlien . . . . . 90 I *248*
Talkschiefer, Ligurien . . 91 II 428
— Minnesota . . . . 93 I 292
— Provinz Kai . . . . 90 I 136
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
Talpa, Montousé . . . 93 I 539
Talpina . . . . . 90 II 430
Tamarugit . . . . 1891 II 22
— Tarapacá in Chile . . 90 II 276
Tantalit . . . . . 93 II 480
— Pisek . . . . . 90 II 56
Taonurus boloniensis . . 91 II 374
— ultimus . . . . . 94 II 378
Taorcian, Centralappenin 94 I 347
Tapes Baldassavrii . . 90 II 153
— ezoënsis . . . . . 91 II 175
— fabaginus . . . . . 94 I 388
— litterata . . . . . 93 I 538
Taphrolith, Finnland . . 92 I 309
Tapinocephalus . . . . . 92 II 356
Tapinoma minutissimum . 94 II 469
Tapinotherium . . . . 92 II 338
Tapiridae . . . . . 90 II 320
Tapirus Helveticus . . 90 I 140
Taraspit, Tarasp, Analyse 94 I 257
Tarnowitzit . . . . . 94 II 413
Tarrasiidae . . . . . 92 II 358
Taspinit, Thalgebiet von Schams . . . . . 94 I 297
Tatarische Stufe, Kasan . 94 I 321
— Ssamara . . . . . 94 I 325
Taunusquarzit, Nassau . 90 I 292
Tausendfüsser im Bernstein 92 II 460
Taxites Siemiradzkii . . 93 I 430
— tenuifolius . . . . . 93 II 568
Taxoxylon . . . . . 92 I 608
Technomyrmex deletus . 94 II 469
Tecoma serrata . . . . . 93 II 434
Tectura binistriata . . 90 I 157
— zibinica . . . . . 90 I 157
Tegel, Brünn . . . . . 93 I 525
— Romhány . . . . . 93 I 527
Teichopora clavata . . 94 I 202
Teinostoma valfinense . 91 II 176
Tektonik, Apscheron . . 93 II 88
— Basin region . . . 93 I 482
— Elsass . . . . . 92 II 89
— Leinethal . . . . . BB VII *279*
— Mexico . . . . . 93 II 348
— Montagne de Lure . 91 I *213*
— Mt. Vulture . . . . BB VII *610*
— Mte. Maggiore . . . 93 I *66*
— Odenwald . . . . . 94 I 306
— Saltrange . . . . . 93 II 114
— Sudeten . . . . . 90 II 257
— Südtyrol . . . . . 94 I 487
— Wendelsteingebiet . . 92 II 90
— West-Alpen . . . . . 93 II 366
— Zaghouangebirge . . 93 II *33*
Telacodon laevis . . . 93 I 390
— praestans . . . . . 93 I 390
Teleosaurus Deslongchampsianus . . . . 92 II 355

Tellina 1892 II 360, 361. 94 II 329
— Bellardii . . . . . 90 I 158
— Fridolini . . . . . 91 I 128
— Mülleri . . . . . 93 I 182
— Perrandoi . . . . . 94 I 388
— platensis . . . . . 94 I 370
— reducta . . . . . 94 I 388
Tellinomya obliqua . . 92 II 372
Tellur, Nagyág . . . . . 92 I 39
— Siebenbürgen . . . . 92 II 72
— Stellung im periodischen System 1894 II 396, 397
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Tellurate . . . . . 92 I *61*
Tellurdioxyd, Krystallform . . . . . 93 I 264
Tellurit, Facebaja . . . 90 I 398
Tellurium-Minerale . . 93 II 467
Tellursulfat, basisches, Krystallform . . . . 93 I 264
Tellurwismuth, Oberflächenschicht . . . . 90 I 13
Telmatotherium . . . . 92 II 142
Telotremata 1892 I *195*. 94 I 200
Temnocheilus conchiferus 93 I 180
— crassus . . . . . 93 I 180
— depressus . . . . . 93 I 180
— quadrangulus . . . . 94 II 169
Temnocidaris danica . . 93 II 422
Temnopleuridae . . . . 92 II 162
Temnotropis . . . . . 90 II 151
Temperatur-Beobachtungen in tiefen Bohrlöchern . . . . . 90 II 234
Tenebrio calculensis . . 93 II 548
Tengerit, Llano Co. . . 93 I 259
Tennantit, Colorado . . 94 II 219
Tentaculit in westfälischem Schiefer . . BB VIII *543*
Tentaculites bellulus . BB VIII *82*
— scalaris . . . . . 92 II 363
— Schlotheimi . . . . . 92 II 363
Tenuilobaten-Horizont, Argentinien . . . . . 93 I 126
Tephrit, Kaiserstuhl 1890 II 64. 92 I 540. 93 II 504, 506
— Kilimandscharo . . . 91 II 88
— Mt. Vulture . BB VII *587*, *600*
Teplitzer Schichten 1891 I 301. 93 I 129
Terataspis grandis . . . 92 I 580
Terebellum striatum . . 91 II 178
Terebra plicosa . . . . . 91 II 181
Terebratula bathonica . 91 I 159
— Bittneri . . . . . 91 I 162
Terebratula Bittneri, Cardita-Schichten . . 1890 I 107
— Bolivien . . . . BB VIII *56*
— Brossardi . . . . . 94 I 173
— Carryensis . . . . . 91 I 418
— concentrica . . . BB VIII *673*
— cracoviensis . . . . 94 I 488
— diphya . . . . . 94 I 142
— furciliensis . . . . 91 II 366
— grandis, Leitform für das untere Pliocän, Belgien . . . . . 90 II 114
— Haasi . . . . . 94 I 486
— hilum . . . . . 93 II 419
— im Tuff des Lennegebietes . . . . BB VIII *662*
— intervallata . . . . 93 II 419
— janitor . . . . . 93 I 184
— juvavica . . . . . 91 I 162
— lakatnikensis . . . 94 II 448
— loxogonia . . . . . 93 I 408
— macrescens . . . . . 90 II 154
— praepunctata, Salzburg 90 I 101
— Ristorii . . . . . 94 II 314
— roxana . . . . . 93 II 420
— sphaeroidalis . . . 91 I 159
— St. Cassian . . . . . 90 II 333
— styriaca . . . . . 90 II 154
— turcica . . . . . 93 II 136
— Uhligi . . . . . 91 I 162
— valfinensis . . . . 91 II 177
— Vespertilio . . . . 94 I 486
Terebratuliden . . . . 92 I 444
Terebratulina exarata, Java . . . . . 90 I 313
— gracilis . . . . . 92 I 366
— Karreri . . . . . 90 II 154
— nux, Java . . . . 90 I 313
— substriata . . . . 93 I 556
— substricta . . . . . 93 II 557
Teredo grandis . . . . . 93 I 182
Termes affinis . . . . 91 II 356
— Girardi . . . . . 91 II 356
— heros . . . 1890 II *11* 91 I *50*
— lithophilus 1890 II *2* 91 I *49*
Terra rossa-Absätze, Dalmatien . . . . . 93 I 531
— Rumänien . . . . 94 I *115*
Terrassen . . . . . 1893 I 61, 62
— der norwegischen Fjorde . . . . . 93 II 108
— Grand River, Labrador 94 II 436
— Hoch- und Nieder-, Mainthal bei Hanau . 94 I 497
— Montagne de Lure . 90 II 286
— Pennsylvanien . . . . 94 II 459

Terrassien, Umgebung von Bra . . . . . 1890 II 124
Tertiär, Adonara . . . 91 II *222*
— älteres, östl. Balkan . 90 I *277*
— Alabama . . . . . 92 I 373
— Algier . . . . . 1893 I 189, 366
— Alpenvorland . . . . 94 I 313
— Andalusien . . . . 92 II 430
— angebliches, Ins. Adonara . . . . . 92 I *61*
— Apscheron . . . . . 92 I 370
— Balkanländer . . . 94 I 318
— Basse-Provence . . . 91 I 417
— Beaumont . . . . 94 II 452
— Beauvais . . . . . 93 II 165
— Belgien 1892 I 551; II 111, 112
— Berner Jura . . . . 93 I 365
— Bingen . . . . . 94 II 125
— Böhmen . . . . . 93 I 553
— Boulogne . . . . . 94 I 357
— Brasilien . . . . . 92 I 134
— Calabrien 1892 I 368; II 116, 117
— Cap Fear . . . . . 91 I 129
— Carry-le-Rouet und Sausset . . . . . 90 I 122
— Cassel . . . . . 92 II *161*
— Colorado . . . . . 94 I 495
— Conchylien, Wiener Becken . . . . . 90 II 330
— Düsseldorf . . . . 91 II 130
— Elbingeröder Mulde . 93 I 362
— Elsass . 1891 I 119. 93 II 387. 94 II 125
— erste Kette des Jura 94 I 473
— Fläming . . . . . 90 II 126
— Flora, Australien . . 94 I 231
— Frankreich . . . . 92 II 113
— Gironde . . . . . 94 II 453
— Gran Canaria . . . 92 II 315
— Grand Cañon . . . 90 I 276
— Grosssachsen . . . . 91 I 118
— Hemmoor in Hannover 92 II 111
— Ins. Martha's Vineyard 92 I 100
— Japan . . . . . 94 I 224
— Java . . . . . 90 I 313
— Jesso . . . . . 94 I 304
— jüngeres; östl. Balkan 90 I *277*
— Karpathen . . . . 93 II 140
— Kreideberg bei Lüneburg . . . . . 90 II 418
— Kremsicz . . . . . 93 I 95
— Krim . . . . . 90 I 125
— Maas . . . . . 94 I 146
— Madagascar . . . . 90 I *4*
— Mächtigkeit, Alabama 93 II 387
— Magdeburger Uferrand 93 II 101
Tertiär, Mainzer Becken 1890 II 418
— Majella . . . . . 92 II 312
— Malta . 1891 II 131. 94 II 325
— Mantes . . . . . 93 I 525
— Maryland . . . . . 93 II 534
— Mecklenburg 1890 I 311. 93 I 131
— mittleres, Basilicata BB VII *573*
— Moncalvo, Hügelland des Montferrats 1890 II 310, 420
— Montagne de Lure . 90 II 285
— Mülhausen i. E. . . 93 I 364
— Neuhaus bei Cilli, Südsteyermark . . . . 90 I 454
— nördl. Appennin . . 93 I 110
— Nordrand des Spessarts 90 II 407
— Normandie . . . . 93 I 523
— oberes, Nordamerika . 94 I 358
— Panama . . . . . 92 II 122
— Pariser Becken . . . 92 I 552
— Pézenas . . . . . 90 I 123
— Piemont 1890 II 310. 92 I 142. 93 II 170
— Pindan-Serie, Neu-Süd-Wales . . . . . 93 II 129
— Provinz Kai . . . . 90 I 136
— Reit im Winkel . . 91 I 123
— Roquefort . . . . . 92 I 551
— Rosaliengebirge . . 93 I 113
— Sabiner Land . . . 92 I 553
— Samos . . . . . 94 II 432
— Schweiz . . . . . 92 II 438
— Siebenbürgen . . . 90 II 115
— Sinai . . . . . 93 I *103*
— Spa . . . . . 91 II 130
— Spessart 1893 I 86. 94 I 310
— Steiermark . . . . 92 II 114
— subalpine Ketten . . 94 I 315
— südmährische Braunkohlenbecken . . . 94 I 153
— Süd-Ost-Frankreich . 94 II 324
— Südwesten v. Arkansas 90 II 302
— Süd-West-Frankreich . 91 II 329
— Texas 1893 I 378. 94 I 113, 117
— Thézier . . . . . 91 I 120
— Timor . . . . . 90 I 313
— transkaspische Niederung . . . . . 92 II 277
— Tremiti-Inseln . . . 93 I 529
— Tumbarumba . . . 94 I 162
— Turin . . . . . 92 I 552
— Umgegend von Beaumont . . . . . 90 II 306
— unteres, Russland . . 94 I 359
— vallée du Cher . . . 93 II 106
— Varzi S. Sebastiano . 90 II 123

Tertiär, Vicentin . . 1894 I 156
— Wanderung der Säugethiere von Europa nach Amerika . . . . . 91 II 148
— Zaghouan . . . . . 93 II *32*
— Znaim . . . . . 94 I 155
Tertiärbecken, Marseille . 91 I 416
— Rumänien . . . . 94 I *157*
Tertiär-Fauna, Madeira . 94 II 461
Tertiärpflanzen, Chile . . 93 II 433
— Grünberg i. Schl. . . 92 II 376
Tertiärversteinerungen, Argentinien 1893 II 538. 94 I 370
Teschenit, Capverden . . 91 I 401
Tesseralkies aus den Alpen 93 II 15
— Krystallform . . . . 90 I 234
Testudinata . . . . . 93 I 166
— Becken . . . . . 93 II 404
Testudo antiqua . . . 90 I 141
— brontops . . . . . 92 II 150
— Cautleyi . . . . . 92 II 445
— Escheri . . . . . 90 I 141
— Laurae 1890 I 141. 93 II 545
— microtympanum . . 92 II 149
— perpiniana . . . . 90 I 347
— punjabiensis . . . . 92 II 455
— Riedli . . . . . 94 II 159
— Sloanei . . . . . 92 II 455
Tetanocrinus . . . . . 94 II 182
Tetartoëdrie, hemimorphe, des tetragonalen Systems . . . BB VIII *272*, *274*
— trapezoëdrische, des hexagonalen Systems BB VIII *515*
Tethya . . . . . 90 II 341
Tethys, ein verschwundenes Meer . . . . . 94 I 64
Tetrabelodon . . . . . 91 II 150
— angustidens . . . . 91 II 154
— brevidens . . . . . 91 II 151
— serridens . . . . . 91 II 154
Tetracera elliptica . . . 93 II 434
— rhamnoides . . . . 93 II 434
Tetractinellidae . . 1890 II 163, 341
— Zittel . . . . . 93 II 211
Tetradella . 1892 II 458. 94 I 383
— subquadrata . . . . 92 II 458
Tetradymit . . . . . 93 II 459
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Tetraëdra-Gruppe der Rhynchonellen . . . . 91 I 162
Tetragraptus . . . . . 92 I 188
— Thüringen . . . . . 91 II 116
Tetraplanda longifolia . 93 II 434
Tetraxon im Skelet der Lithistiden . . . . 91 I *278*
Textularia . . . . . 1893 I 203
— decurrens 1893 II 560. 94 I 393
— horrida . . . . . 94 II 367
— serrata 1893 II 560. 94 I 393
Thäler, Pennsylvanien . 90 II 241
Thagastea . . . . . 92 II 365
— Wetterlei . . . . . 93 I 560
Thalassemys Rütimeyeri . 92 II 455
Thalassoceras . . . . . 90 II 150
Thalbildung . . . . . 93 I 45
Thallehm, Königswartha . 93 II 95
Thalliumalaun, spec. Gewicht . . . . . 90 I 203
Thalliumsilbernitrat zu Mineraltrennungen . 93 I *90*
Thalsand, Königswartha . 93 II 95
Thalungleichseitigkeit, Entstehung derselben 90 II 240
Thamnaraea . . . . . 90 II 338
Thamnastraea . . . . 90 II 337
— norica . . . . . 93 I 197
— Zitteli, Cardita-Schichten . . . . . 90 I 107
Thamnastraeidae . . . 93 I 196
Thamnastraeinae . . . 93 I 196
Thamnoseris . . . . . 90 II 337
Thaumasit, Formel . . . 93 II 8
Thaumatosaurus . . . . 91 II 347
— indicus . . . . . 91 II 347
Theca parviuscula . . . 92 II 372
Thecidea ornata . . . 93 II 557
Thecididen . . . . . 92 I 442
Thecidiosmilia . . . . 90 II 339
Thecidium Moreana . . 93 I 556
— ornatum, Yorkshire . 93 I 556
— St. Cassian . . . . 90 II 333
Thecocyrtella . . . . . 93 II 419
Thecoseris . . . . . 90 II 337
Thecosiphonia grandis . 93 I 566
Thecosmilia . . . . . 93 I 193
— bavarica . . . . . 93 I 193
— Charlyana . . . . . 93 I 193
— cyathophylloides . . 93 I 193
— norica . . . . . 93 I 193
— rofanica . . . . . 93 I 193
Thecosphaera spongianum 93 II 423
Thecospira, alpine Trias . 90 II 333
— Haidingeri . . . . 94 I *276*
Thecospiridae . . . . . 92 I 442
Thenardit . . . . . 90 II 50
— Arizona . . . . . 93 II 36
— Atakama . . . . . 90 I *66*
— Borax-See . . . . 92 II 33
— Entstehung . . . . 91 I *276*
— Lagerstätten in Russland . . . . . 90 I 16

Thenardit, Pseudom. nach Glaubersalz . . . 1893 I 460
Thenarocrinus callipygus 92 II 169
— gracilis . . . . . 92 II 169
Theocampe sphaerocephala 94 I 395
Theocyathus Lorioli . . 94 I 174
Theosodon debilis . . . 93 II 403
— Frenzeli . . . . . 93 II 403
— gracilis . . . . . 93 II 403
— Lallemanti . . . . . 93 II 403
— patagonensis. . . . 93 II 403
Theralit . . . . . 90 I *192*
— Halbinsel Kola . . . 94 I 464
— Vereinigte Staaten . 90 I 283
Theriodesmus philarchus . 90 I 140
Theriodictis gelatensis . 93 I 389
Thermalquellen, borsäurehaltig, Toscana . . . 94 I 84
Thermen, argentinische Cordillere . . . . . 93 I 105
— bei Rom . . . . . 92 II 51
— Lago di Garda . . . 92 II 260
— Lipari . . . . . 92 II 50
— Mono Valley. . . . 92 I 385
— Sanita . . . . . 91 I 99
Thermoelektricität der Krystalle . . . . . 92 I 501
Thermoelemente zur Messung hoher Temperaturen . . . . . 91 I 250
Thermo-Metamorphismus. 90 II 388
Thermophyllit, Vergleich mit Iddingsit . . . 94 I 267
Theropoda. . . . . 90 II 434
Thevatia angustifolia . . 93 II 434
Thierfährten . . . . . 92 I 601
— Tambach . . . . . 94 II 442
Thierwelt, Entwickelung der Verbreitungsverhältnisse 92 II 324
Thimerit . . . . . 1892 I 21, 24
Thinocyon velox . . . 91 II 148
Thisbe . . . . . 91 II 177
Thlaeodon padanicus . . 94 I 375
Thlipsura personata . . 93 II 411
— simplex . . . . . 93 II 411
— tetragona . . . . . 93 II 411
Thoatherium periculorum 93 I 388
Tholiasterella . . . . . 90 II 164
Thomasinella . . . . . 94 I 173
Thompson-Kalkstein, Californien . . . . . 94 II 112
Thomsonit . 1890 I *133*. 94 I 13
— Mettweiler . . . . . 93 I 247
— Südnorwegen . . . . 92 I 265
— Umänderung durch Erwärmen . . . . . 92 II 238
Thon . . . . . 1892 I 272
— Basilicata. . . . . BB VII *569*
— chromhaltig, Cametá . 94 I 38
— Contact mit Phonolith, Saint-Pierre-Eynac . 93 I 272
— eisenschüssiger, Souk-Arras, Algier . . . . 90 II 96
— Eupatorisches Plateau, Halbinsel Krim . . . 90 II 122
— feuersteinführender, Normandie . . . . 93 I 523
— Insel Barbados . . . 93 I 101
— Jersey . . . . . 92 I 375
— Mies . . . . . 93 I 13
— Miocän, Zeltberg bei Lüneburg . . . . . 90 II 418
— Persien. . . . . 92 I 310
— Pillnitz . . . . . 93 II 94
— rother . . . . . 93 II 290
— Russland . . . . . 93 II 61
— Tiefsee . . . . . 93 II 311
Thoneisenerz, New York . 92 II 75
Thonerde in den Silicaten 94 I 44
Thonerdehydrophosphat, pseudomorphe Nachbildung eines Gewebes . 90 I 209
Thongallen des Buntsandstein . . . . . 91 I 293
Thonschiefer . . . . . 93 II 357
— Centralplateau Frankreich . . . . . 93 I 299
— conchoidale Bruchform 90 II 242
— grüner, Ormonds, Schweiz . . . . BB VIII *189*
— Jesso . . . . . 94 I 303
— Skandinavien . . . 94 I 100
— Süd-Georgien . . . 91 II 105
— Verwandtschaft mit Glimmerschiefer . . 94 I 300
Thoracosaurus macrorhynchus, Tuffkreide von Mastricht . . . . . 90 II 324
— neocaesariensis . . . 90 II 325
Thoracotherium . . . . 92 II 339
Thorit, Südnorwegen . . 92 I 242
Thoro-Gummit, Llano Co. 93 I 258
Thouinia Philippii . . . 93 II 434
Thracia pubescens . . . 90 I 357
Thrips . . . . . 91 II 356
Thulitgestein, Hinderheim 93 I 97
Thuringit . . . . . 92 II 229
Thursius . . . . . 91 I 152
Thyestes verrucosus . . 94 I 381
Thyestidae, Obersilur, Oesel . . . . . 94 I 381
Thylacodictis exilis . . 93 I 389

Thylacoleo . . . . . 1892 II 342
Thylechinus . . . . . 93 I 560
Thymelinae . . . . . 91 I 341
Thynnus saldisiensis . . 93 I 173
— Scaldisii . . . . . 92 I 165
Thyrsopteris kagensis . . 91 I 177
Tiarella . . . . . 90 II 152
Ticorea foetidoides . . . 93 II 434
Tiefbohrung, Ermittelung der Wärme im Inneren des Erdkörpers . . . 90 II 234
— Java . . . . . 90 I 313
— Wieliczka . . . . . 93 II 82
Tiefe des Meeres . . . 93 II 282
— Chiemsee . . . . . 90 II 312
— Genfer See . . . 1892 II 60, 65
— Schwarzes Meer . . 91 II 448
Tiefebene, Oberrheinische 93 I 108
Tiefengesteine, Mineralisatoren bei sauren Gesteinen . . . . . 91 I 389
— verschiedene Erstarrungsperioden . . . 91 I 389
Tiefseeablagerungen, Magnesiagehalt . . . . 94 I *267*
Tiefseefauna . . . . . 93 II 283
Tiefseeproben, Charakteristica . . . . . 93 II 285
Tiefseeschlamm . . . . 93 I 46
Tiefseethon . . . . . 90 II *56*
Tiemannit, Argentinien . 93 I 22
Tigersandstein, Spessart . 94 I 309
Til, Canada . . . . . 93 I 434
Tilia sylvestris . . . . 94 I 232
Till, englacial und superglacial . . . 1894 I 170, 498
— subglacial . . . . . 94 I 499
Tillodontia . . . . . 92 I 411
Tinguáit 1892 II *146*. 93 II 340, 343
— Serra de Tingua, Brasilien . . . . . 90 I *166*
— Südnorwegen . . . 92 I 298
Tinnyea Vásárhelyi, Congerienschichten von Tinnye bei Ofen . . 90 II 331
Tirolit, Utah . . . . . 91 II 47
Tissotia Tissoti . . . . 93 II 415
Titan . . . . . 94 I *23*
Titaneisen 1892 II 235. 93 II 69
— Constitution . . . . 93 I 471
— Grube Nicolas-Maximilian, Ural . . . . 90 II 21
— in Anorthitfels, Canada BB VIII *437*
— in Lenneporphyr . BB VIII *559*
— Röslau . . . . . 92 II *37*
Titaneisen, Südnorwegen 1892 I 238
Titaneisenglimmer in Anorthitfels, Canada . BB VIII *437*
Titanichthys . . . . . 93 I 177
Titanit . . . 1893 II 464, 469, 493
— in Einschlüssen des Tonalit . . . . BB VII *477*
— in Fleckschiefer . . 92 II 264
— in Glimmerschiefer, Argentinien . . . . BB VII *355*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *307*
— in Granit von Nord-Argentinien . BB VIII *347, 383*
— optische Beobachtungen 91 II *19*
— Port Henry . . . . 91 II 245
— See von Vico . . . 91 I 13
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— Südnorwegen . . . 92 I 258
— Südwest-Afrika . . . 90 I *116*
— Taberg . . . . . 93 I 21
— Zöptau . . . . . 93 I 29
Titanmagnetit, Routivare 94 I 88
Titannatriumphosphat . . 94 II *152*
Titanocarcinus sculptus . 91 II 458
Titanolivin, optische Eigenschaften . . . . . 91 I 6
Titanophyllum Grand'-Euryi . . . . . 93 I 207
Titanops medius . . . 94 I 182
Titanosuchus ferox . . . 91 II 344
Titanoxyd . . . . . 94 I *23*
— rhomboëdrisches, künstl. Darstellung . 92 II *238*
Titansäure, Verhalten gegen Phosphorsalz vor dem Löthrohre . . . 92 II *237*
— Zersetzungsproduct von Perowskit . . 1894 II *299, 300*
Titansäuremineralien, Skandinavien . . . 93 II 65
Tithon, Algier . . . . 93 I 184
— Andalusien . 1892 II 428, 429
— Ardèche . . . . . 92 I 361
— Argentinien . . . . 93 I 125
— argentinische Cordillere . . . . . 93 I 104
— Bakony . . . . . 92 II 275
— Capri . . . . . 91 II 122
— Granada und Malaga 93 I 324
— Isère . . . . . 93 II 529
— Karpathen . . 1893 II 147, 148
— Krim . 1891 I 300. 93 I 351
— Mte. Primo . . . . 93 I 346
— Seealpen . . . . . 92 II 302
— Tunis . . . . . 91 II 298
Tithon-Kalk, Cheli . . . 93 I 313

Töllit, Badhaus in der Töll 1890 I *78*
Tomanowa-Schicht, Tatra 94 II 193
Tomasina . . . . . 93 II 202
Tomistoma calaritanus . 91 II 452
Tonalit, Adamellogruppe BB VII *471.* 93 II 51
— Contactmetamorphosen 92 I *69*
— Loch Lomond . . . 93 I 286
— Tirol . . . . . 90 I *73*
Tonga-Inseln, vulcanischer Ursprung . . . . . 93 I 319
Tongrien, Aegypten . . 94 II 327
— Cairo . . . . . 91 I 128
— Vicentin . . . . . 94 I 159
Topas . . . . . 91 II 43
— Colorado . . . . . 91 I 35
— Durango, Mexico . . 90 II 49
— Ilmengebirge 1890 II 21. 93 I 246
— Japan . . . . 1894 I 44, 443
— Krystallform . . . . 92 I 36
— Neu-Süd-Wales . . . 94 I 444
— Nordamerika . . . . 92 I 499
— Sachsen . . . . . 91 II 28
— San Luis Potosi . . 92 I 509
— Structur . . . . . 91 II 14
— Südwest-Afrika 1890 I *109.* 91 I 27
— Ural . . . . . 94 I 55
— Utah . . . . . 91 I 36
Topfstein, Piemont . . . 92 II 422
Torf, interglacialer 1892 I *114, 151*
— Lauenburg 1892 I *151.* 93 I *33*
— Nord-Ostsee-Canal . . 91 II *62*
— Siebenbürgen 1893 II 175. 94 II 136
— westliches Holstein . 93 I *94*
Torfbildung im Federsee-Ried . . . . . 90 I 256
Torfmoor . . . . . 93 II 537
— Romeriks . . . . . 93 II 392
— Sarpsborg . . . . . 93 I 534
Torfrind . 1890 I 140. 92 I 409
Torfschwein 1890 I 140. 92 I 409
Toriscodermia, Malm, Krakau . . . . . 90 II 342
Tornatella abeihensis . . 93 I 538
Tornatina compacta . . 94 II 472
— truncata . . . . . 90 I 357
Torosaurus gladius . . . 94 I 182
— latus . . . . . 94 I 182
Torosaurus-Schädel . . . 94 II 157
Torridonsandstein, Schottland. . . . . 93 I 115
Tortisipho . . . . . 90 II 152
Tortonien . . . . . 94 I 492
— Algier . . . . . 94 I 364
Tortonien, Umgebung von Bra . . . . . 1890 II 124
Totalreflectometer . . BB VII *175*
Toucasia santanderensis . 93 I 407
— Seunesi. . . . . 93 I 407
Tournaisien, Kohlenkalk, Belgien . . . . . 94 I 478
Tourtia von Tournay . . 92 I 365
Toxodon paranensis . . . 93 II 186
Trachodon longiceps . . 91 II 451
Trachosteus . . . . . 93 I 177
Trachyaster . . . . . 90 I 362
— Gourdoni . . . . . 91 II 368
— Trutati . . . . . 91 II 368
Trachyceras affine . . . . 90 I 114
— Canadense . . . . 91 II 170
Trachyceraten-Schiefer, Alpen . . . . . 94 II *33*
Trachyschoenium . . . 90 II 152
Trachyspira . . . . . 90 II 151
Trachyt, Afrika . . . . 92 II 425
— argentinische Cordillere . . . . . 93 I 105
— Colorado . . . . . 90 I 84
— Cypern . . . . . 93 II 59
— Essex . . . . . 90 II 423
— hauynführend, Hegau 93 II 487
— Hohe Eifel . . . . 91 II 65
— Insel Habibas . . . 90 II 405
— Japan . . . . . BB VII *146*
— Klein-Asien . . . . 93 II 365
— Laacher See . . . . 92 II 416
— Lago di Bolsena . . 93 II 490
— leucitführend. . . . 93 II 491
— Massiv von Djebel Mzaita . . . . . 90 II 405
— — — La Tafna . . 90 II 405
— Meygal. . . . . 93 I 272
— Peloponnes . . . . . 93 I 316
— phonolithisch, östlicher Balkan . . . . . 90 I *282*
— Roccastrada 1892 I 73. 93 I 279
— Schemnitz . . . . . 92 II 71
— schlackig-blasig, östlicher Balkan . 1890 I *280, 289*
— Siebenbürgen . . . 91 II 72
— Siebengebirge . . . 93 II 486
— Taimyrland . . . . 94 II 261
— tyrrhenischer Vulcane 91 I 270
— Umgegend von Beni-Saf 90 II 405
— Ungarn . . . . . 91 II 74
— Vélay . . . . . 91 I 264
— Vicentin . . . . . 94 I 160
Trachytgänge, Neapel . 92 II 254
— Rosita Hills . . . . 93 I 294
Trachytpechstein, Cypern 93 II 59

Trachyttuff, Afrika . 1892 II 425
— Gough's Island . . . 94 II 263
Tragelaphus Houtum-Schindleri . . . . . 93 II 398
Tragulida . . . . . 93 I 148
Transgressionen, Briançonnais, West-Alpen . . 94 II 83
— Catena Metallifera von Toscana . . . . . 90 II 109
— Rocky Mountains . . 93 II 483
— während des Miocän . 94 I 491
Transversarius-Stufe, Karpathen . . . . . 93 II 149
— Polen . . . . . 94 I 487
— Schweiz . . . . . 93 II 560
Trap, Gondwána-Bassin . 94 I 126
Trapa conocarpa . . . 91 I 352
— natans . . . . . 91 I 352
Trapezium Naamanense . 93 I 538
Trapplager, Lake Superior 94 II 266
— New Jersey . . . . 91 II 302
Trapprücken . . . . . 93 II 336
Trapps, effusiv und intrusiv 93 II 337
Trass, Brohl-Thal . . . 92 II 416
Traubenzucker, Drehungsvermögen und Krystallform . . . . . BB VIII *270*
— Krystallform . . . . 91 I 236
Traubenzucker-Bromnatrium . . . . BB VIII *517*
Traubenzucker-Chlornatrium . . . . BB VIII *512*
— optische Anomalien BB VII *5*
Traubenzucker-Jodnatrium BB VIII *515*
Travertin bei Rom. 1892 II 51, 73
— Bildung . . . . . 92 I 523
— Elsathal . . . . . 94 II 417
— Kleinasien . . . . 94 II 87
Treibeis, Einfluss auf die Bodengestalt der Polargebiete . . . . . 93 I 62
Treibeisbildung, Flysch, Schweiz . . . . BB VIII *190*
Tremadictyon Böckhi . . 91 II 190
— Malm, Krakau . . . 90 II 342
Trematospiden . . . . 92 II 358
— Obersilur, Oesel . . 94 I 381
Trematodiscus . . . . 90 II 150
— strangulatus . . . . 94 II 169
Tremiti-Inseln . . . . 93 I 529
Tremolit . . . . . 93 II 247
— Südnorwegen . . . 92 I 253
— Südwest-Afrika . . . 90 I *114*
Trenton-Limestone . . . 92 II 75
Tretospira . . . . . 92 II *32*
Triacanthodon . . . 1892 II 339
Trias, Aflenz . . . . . 90 I 101
— Alpen . 1892 II 275. 93 II 369, 508. 94 II 309
— Andalusien . . . . 92 II 429
— Apuaner Alpen . . . 91 II 306
— Australien und Neu-Seeland . . . . . 91 I 444
— Balearen . . . . . 90 I 115
— Basilicata . . . . 94 II 446
— Beausset . . . . . 90 II 82
— Briançonnais . . . . 93 I 97
— British Columbia . . 91 II 170
— Californien . . . . 94 I 110
— Connecticut 1890 II 240. 91 I 295
— Dep. Aude . . . . 93 II 527
— Elsass . . . . . 92 II 88
— England . . . . . 91 II 317
— Franken . . . . . 90 I 262
— franz. Alpen . . . . 92 I 545
— Granada und Malaga. 93 I 321
— Gresten . . . . . 93 I 517
— Hallstatt . . . . . 93 II 378
— Ibbsitz . . . . . 93 I 517
— Ibbsthal . . . . . 93 I 517
— Kärnthen . . . . . 91 II 319
— karpathische Klippen. 93 II 148
— Karwendelgebirge . . 92 I 97
— Klein-Asien . . 1893 II 134, 366
— Korallenfauna . . . 93 I 191
— Magdeburger Uferrand 93 II 101
— Massachusetts . . . 93 II 527
— Massiv d'Allaugh . . 94 II 290
— Miesenbachthal . . . 92 II 434
— Montagne de Lure . 90 II 278
— Neckarthal . . . . 94 I 341
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 107
— östlicher Balkan . . 90 I *279*
— Opponitz . . . . . 93 I 517
— Pariser Becken . . . 93 I 122
— Piestingthal . . . . 93 I 517
— Polen . . . . . 92 I 116
— Rotti . . . . . 94 II 104
— Saltrange . . . . . 94 I 137
— Schwaben . . . . . 91 II 159
— Sougraigne . . . . 93 I 343
— subalpine Ketten . . 94 I 314
— — zwischen Gap und Digne . . . . . 90 II 106
— Süd-Tirol . . . . . 94 I 132
— Szaskabanya . . . . 91 II 440
— Texas . . . . 1894 I 116, 139
— Thüringen . . . . 93 II 377
— Timor und Rotti 1894 I 144, 331
— — und ausseralpine 1894 II *1*

Trias, Val di Susa. . 1892 I 350
— Varbuche . . . . . 92 I 546
— West-Somerset . . . 91 I 404
Trias-Beds, Texas . . . 93 I 379
Triasmeer, Balkanländer. 94 I 317
Tribrachiocrinus corrugatus, Australien . . . 90 II 327
Triceratium . . . . . 93 II 437
Triceratops . . . . . 93 I 547
— elatus . . . . . 94 I 182
— flabellatus 1890 II 435. 92 II *71*
— galeus . . . . . 90 II 435
— horridus 1890 II 435. 91 I 149
— prorsus 1891 I 149. 93 I 397
— serratus . . . . . 91 I 149
— sulcatus . . . . . 91 II 451
Trichite des Keratophyrs, Lennegebiet . . . BB VIII *633*
Trichites . . . . . 93 II 200
Trichocnemis aliena . . 93 II 549
Trichomanites gryphophyllus. . . . . 91 II *331*
Trichotropis Abichi . . 93 II 382
— Shumardi . . . . . 94 I 372
Tricoccae . . . . . 91 I 337
Tricolocapsa deformis, Krakau . . . . . 90 II 343
— Dowlingi . . . . . 94 I 395
— salva . . . . . 94 I 395
— Selwyni . . . . . 94 I 395
— thoracica . . . . . 94 I 395
Triconodon . . . . . 92 II 339
Triconodonten-Typus . . 92 I 155
Triconodontidae. . . . 92 II 343
Tricuspodon . . . . . 90 I 340
Tridymit . 1891 I 205. 94 I *26*
— Dimorphismus . . BB VII *2*
— in Basalt, Marburg . 91 II *238*
— in Rhyolith . . . . 94 I 79
— in Trachyt, Japan. BB VII *147*
— Synthese . . . . . 94 I 12
— Yellowstone Park . . 94 I 56
— zwischen Sphärolithen 93 I 298
Trienbacher Schichten . 92 I 119
Triforis terebrata . . . 90 II 332
Triglyphus . . . . . 92 II 342
Trigonarca Palestina . . 93 I 537
Trigonia angustecostata . 93 I 127
— clavigera . . . . . 94 I 372
— concentrica . . . . 94 I 372
— darwaseana . . . . 94 I 171
— Kikuchiana . . . . 93 I 555
— Lewisi . . . . . 91 II 129
— limbata, Kreide, Martapoera (Borneo) . . . 90 II 416
— obliqua . . . . . 94 II 112
Trigonia pocilliformis. 1893 I 554
— regularicostata . . . 91 II 129
— rhombifera . . . . 94 I 171
— rotundata. . . . . 93 I 555
— securiformis . . . . 94 I 372
— Stolleyi . . . . . 94 I 370
— syriaca. . . . . 93 I 537
— transatlantica . . . 93 I 127
— undulato-costata . . 93 I 537
— valfinensis . . . . 91 II 176
Trigonien . . . . . 91 II 183
Trigonocrinus liratus . . 91 I 439
— Weisser Jura, Bayern 91 I 439
Trigonodus Balsamoi . . 90 I 114
— costatus . . . . . 94 II 141
— minutus . . . . . 94 II 141
— productus. . . . . 91 II 170
— Serianus . . . . . 90 I 114
Trigonograptus ensiformis 92 I 594
Trigonostoma Bellardi . 90 II 153
Trihydro-Fergusonit, Llano Co. . . . . 93 I 259
Triisodon biculminatus . 90 I 335
Trikline Krystalle, Berechnung . . . . BB VII *488*
Trilobiten . 1890 I 352. 92 I 169
— Australien . . . . 90 II 328
— Devon, Bolivien . BB VIII *9*
— Einrollungsvermögen 1892 I 170. 93 I 178
— Ereré und Maecurú . 92 I 171
— Familie Calymenella . 91 II 459
— Fusulinenkalk, Sicilien 94 I 513
— Hercyn. . . . . 92 I 172
— — Nord-Amerika . . 93 I 117
— Iglesias . . . . . 92 I 172
— in ost- und westpreussischen Diluvialgeschieben . . . . . 92 I 170
— Insel Man . . . . . 94 II 99
— silurisches Geschiebe, Mecklenburg. . . . 90 I 150
— Südengland . . . . 90 I 151
Triloculina Moravica . . 93 I *109*
— Olomucensis . . . . 93 I *109*
Trimesinsäureäthylester . 91 II 401
Trimethyl - Allyl - Ammoniumplatinchlorid . . 94 II *140*
Trimethyl - Monochloroxypropyl-Ammoniumgoldchlorid. . . . . 94 II *142*
Trimethyl-Trimethindibromid - Ammoniumplatinchlorid . . . . . 94 II *141*
Trinity-Schichten . . . 92 II 107
— Rocky Mountains . . 93 II 156

Trinity-Schichten, Texas 1893 II 163
Trinucleus-Kalk . . . . 90 I 76
Trinucleus-Sandstein, Glauzy . . . . . 90 I 285
Trinucleus-Schiefer . . . 90 I 76
Trionyx aff. planus . . 92 II 149
— Bambolii . . . . . 92 II 148
— Bowerbanki . . . . 92 II 455
— gangeticus . . . . 94 I 509
— Hilberi . . . . . 94 II 159
— marginatus . . . . 91 II 157
— melitensis . . . . . 94 I 509
— Portisi . . . . . 92 II 149
— propinquus . . . . 92 II 149
— senensis . . . . . 92 II 148
Triplaris cenomanica . . 93 I 576
Triplit, S. Dakota . . . 91 II 415
Triplograptus . . . . 92 I 188
Triplopodidae . . . . 90 II 318
Triploporella Capriotica . 91 II 123
Triplopus . . . . . 93 I 555
Tripoli . . . . . 92 II 116
Tripolitza-Kalk, Mittel-Griechenland . . . 93 I 306
Tripriodon . . . . . 90 II 142
Triprionodontidae . . . 90 II 142
Tripterocarpus arcuatus . 94 I 220
Tripterospermum rostratum . . . . . 93 I 207
Triptycha abbreviata . . 94 I 190
Tripylus . . . . . 94 I 204
Tristichopterus . . . . 90 II 439
Tristomanthus, Echiniden-Gattung . . . . . 94 I 391
Tristychius arcuatus . . 91 I 429
Tritochorit, Mexico . . 90 II 40
Tritomit, Südnorwegen . 92 I 257
Triton . . . . . 92 II 361
— abbreviatus . . . . 91 II 179
— detritus . . . . . 91 II 179
— expansus . . . . . 91 II 179
— flandricus . . . . . 91 II 179
— foveolatus . . . . 91 II 179
— multigranus . . . . 91 II 179
— postera . . . . . 91 II 179
— semilaevis . . . . 91 II 179
— solitarius . . . . . 91 II 179
— substriatulus . . . . 91 II 179
Tritonidae, oberes Miocän 91 II 464
Tritonium haeringense . 92 II 462
Tritubercular-Typus . . 92 I 155
Tritylodon . . . . . 92 II 342
Tritylodontidae . . . . 92 II 341
Triumfetta irregulariter-serrata . . . . . 93 II 434
Trivia . . . . . 92 II 361
Trivia avellana . . . . 1890 I 357
Trizygia . . . . . 94 II 480
— pteroides . . . . . 93 I 574
Trochammina . . . . 90 II 165
— elegans . . . . . 94 II 367
— plana . . . . . 94 II 367
Trochanterpendant der Dinosaurier . . . . . 90 I 345
Trochitenkalk, agronomische Untersuchung . 94 I 482
— Leinethal . . . . BB VII *257*
— Mosbach, Neckarthal . 94 I 342
Trochoceras . . . . . 90 II 147
Trocholites . . . . . 92 I 432
Trocholitidae . . . . . 92 I 432
Trochotoma . . . . . 90 II 151
Trochus . . . . . 90 II 151
— crispus . . . . . 91 II 129
— demersus . . . . . 92 II 462
— lepidus . . . . . 94 I 370
— Lotharii . . . . . 91 I 157
— pseudonis . . . . . 94 II 142
— quadricostatus . . . 94 I 150
— Raffaelei . . . . . 90 I 157
— Stephanensis . . . . 90 I 158
— striatofundus . . . 93 I 538
— Vilaplanae . . . . 93 II 162
Troilit . . . . . 91 I 385
Trona . . . . . 92 I 508
Troostit, Wärmeleitung . 94 I 5
Tropidoceras . . . . . 94 I 193
Tropidocoryphe . . . . . 92 I 173
Tropidoleptus carinatus BB VIII *73*
Tropidurus . . . . . 93 I 165
Tropites subbullatus-Zone bei Hallein . . . . 91 II 320
Tropitidae . . . . . 90 II 150
Truncatella Besançoni . 93 II 554
Truncatulina granosa . . 90 II 166
— obtenebrata . . . . 91 I 165
Trygoniden, Tertiär . . 93 II 195
Trypanaxis . . . . . 90 II 152
Tryplasma . . . . . 92 I 186
Tscheffkinit, Bedford Co. 94 I 56
Tubercularsectorial-Typus 92 I 156
Tubicaulis Ludwigi . . . 90 I 172
Tubulacanthus sulcatus . 91 II 168
Tubulifera . . . . . 91 II 356
Tubuliporidae . . . . . 91 II 369
Tubulostium rugosum . . 93 I 538
Tüfferer Mergel . . . . 92 II 114
Türkis . . . . . 91 II 28
— Neu-Mexico 1890 I 222. 94 I 48
— Nord-Amerika 1892 I 499. 93 I 255, 256
Tuesit, Idria . . . . . 93 I 463

Tuff, basaltisch, Dauner Maare . . . . . 1894 II 59
— campanischer, Caserta 1893 I 280, 281
— Ciply . . . . . 90 I 310
— des Lennekeratophyr BB VIII *698*, *703*
— grauer, Campanien . 91 II *286*
— Hegau . . . . . 93 II 487
— Laacher See, Verhältniss zu den dort auftretenden Gesteinen . 90 II 247
— Lennegebiet . . . BB VIII *570*
— Meissen . . . . . 91 I 81
— Minnesota . . . . 93 I 292
— Mons Albanus . . . 93 II 492
— Mt. Vulture . . . BB VII *606*
— palagonitähnlich, Bergmassiv, Menez-Hom . . . . . 90 II 399
— phonolithisch oder tephritisch, Roccamonfina 93 I *65*
— sericitisch, Edergebiet BB VIII *643*
— silurischer, Mosedale bei Shap . . . . . 93 I 288
— subaërischer, Bergmassiv Menez-Hom . 90 II 399
— Tonga-Inseln . . . 92 II 281
— vulcanischer, bei Rom 93 I 281
— — Mte. Maggiore . . 93 I *62*
Tuffgänge, vulcanische, schwäbische Alb . . 93 I 71
Tuffite und Tuffoide . BB VIII *703*
Tully-Kalk . . . . . 92 II 98
— Nord-Amerika . . . 91 I 115
Tundren . . . . . 92 II 125
Turbinella . . . . . 91 II 181
— Badensis . . . . . 91 II 182
— columbelloides . . . 91 II 182
— Cossmanni . . . . . 91 II 182
— fusiformis . . . . . 91 II 182
— Leymeriei . . . . . 90 I 157
Turbinilopsis . . . . . 90 II 151
Turbinopsis septariana . 94 I 372
Turbo, Bodenbenderi . . 93 I 126
— Boimstorfensis . . . 91 I 157
— Bourgeati . . . . . 91 II 176
— Jura, Campanien . . 90 I *96*
— monilifera . . . . . 91 I 159
— Plachetkoi . . . . . 91 I 157
— puerilis . . . . . 91 I 157
— Richenzae . . . . . 91 I 157
— scalariformis . . . . 91 I 157
— schmelmensis . . . 91 II 172
— tuberculosus . . . . 92 II 462
Turbonellina . . . . . 90 II 151
Turbonilla columnaris 1890 II 153
— Mercati . . . . . 90 II 153
— senensis . . . . . 90 II 153
— Strozzii . . . . . 90 II 153
Turmalin, Analyse . . . 93 II 27
— Anordnung der Individuen . . . . . 93 II 470
— Birma . . . . . 94 II 409
— Böhmen, Analyse . . 93 II 266
— Bosnien . . . . . 93 II 350
— chemische Zusammensetzung 1890 II *149*, 190, 193, 195, 199, 203. 92 I 23. II *44*. 93 II *71*
— Elasticität . . . . 92 I 8
— elektro-optisches Verhalten . . . . . 94 II *250*
— Fürtschlagl, Tirol . . 91 I 215
— in Gangbildungen, Nord-Argentinien . BB VIII *291*
— in Glimmerschiefer, Argentinien . . . . BB VII *354*
— in Gneiss, Argentinien BB VII *306*
— in Granit . . BB VIII *336*, *383*
— in Kalkstein, Texas, Baltimore Co. . . . 90 II 228
— in Kupfererz, Lüderitzland . . . . . 90 I 211
— in Nevadit, Torniella 93 I 280
— in Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *398*
— — Comersee . . . . 91 II 31
— künstliche Darstellung 91 II *87*
— mikrochemische Untersuchung . . . . . 94 I 7
— morphologische und paragenetische Eigenthümlichkeiten . . . 90 II 195
— Neubildungsproduct, Grauwacken . . . . 90 II *187*
— Nordamerika . . . . 92 I 499
— optische Anomalien . 94 I 44
— pleochroitische Höfe . 90 I *186*
— Pyroelektricität . . 92 I 213
— Schüttenhofen . . . 90 II 195
— schwarz, Nord-Carolina 90 I 219
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— Südnorwegen . . . 92 I 265
— Südwest-Afrika . . . 90 I *110*
— Trichroismus . . . 94 I 44
— Val di Susa . . . . . 91 II 407
— Vigezzothal . . . . . 91 I 14
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Zwilling . . . . . 90 I *10*
Turmalingneiss, Val di Susa . . . . . 90 II 94

Turmalingranit, Gottleuba, Sachsen 1891 II 271. 94 I 71
— Nord-Argentinien . BB VIII *287*
— Unteritalien . . . . 91 II *54*
Turmalin-Granulit-Massiv, Djebel Filfila . . . 90 II 404
Turnerit . . . . . 91 I 378
Turon . . . . . 94 I 150
— Algier . . . . 1893 I 187, 522
— Cudowa . . . . . 94 II 115
— Nordrand des Harzes. 90 I *178*
— Sachsen . . . . . 91 II 272
— — Pirna . . . . . 94 II 285
— Stufe Inoceramus Brongniarti, Kötzschenbroda 93 II 91
— — labiatus, Kötzschenbroda . . . . . 93 II 91
— Syrien . 1891 II 127. 94 I 191
— Tunis . . . . . 91 II 298
Turrilepas 1890 I 152. 92 I 176, 423
Turrilites varians, Emscher Mergel . . . . . 90 I *180*
Turritella . . . . . 92 II 361
— Barthelmaica . . . 94 II 342
— betmerensis . . . . 91 II 129
— cisalpina . . . . . 90 I 157
— Damesi . . . . . 91 II 129
— firmata . . . . . 90 II 332
— Kokeni . . . . . 91 II 129
— Lessepsi . . . . . 90 I 158
— limata . . . . . 91 I 157
— Martini . . . . . 91 I 159
— Mortoni . . . . . 94 II 455
— Parisiana . . . . . 90 I 158
— peralveata . . . . 93 I 538
— Telleri . . . . . 94 II 342
— Variscoi . . . . . 90 I 114
— Wadana . . . . . 91 II 175
Tychus avus . . . . . 93 I 551
— radians . . . . . 93 I 551
Tylochilus . . . . . 90 II 152
Tylocidaris Gosae . . . 93 II 421
— vexilifera . . . . . 93 II 421
Tylodendron . . . . . 93 I 572
Tylostoma Martini . . . 93 I 538
— syriaca . . . . . 93 I 538
Tympanotus orientalis . 94 I 190
Tyonschichten, Mt. Diablo 93 I 100
Typhlechinus . . . . . 90 I *84*
Typus, regulärer, der Metalle . . . . . 94 I 4
Tyrit . . . . . 92 I 40
Tyrolit, Utah 1891 II 416. 93 II 31
Tyrrhenidis, Spezzia . . 90 II 297
Tyrus electricus. . . . 93 I 551
Tysonit. . . . . 93 II 470

U.

Ueberkippung, Grenoulx 1894 I 283
— von Falten, Provence 90 II 82
Ueberreste, menschliche . 90 II 427
Ueberschiebung, Appalachen . . . . . 94 I 328
— Sainte-Beaume-Kette . 94 I 314
— Saltrange . . . . . 93 II 113
Uferlinien, Mono Valley . 92 I 385
— postglaciale des Bodensees . . . . . 94 II 44
Uferterrassen an Hope's Nose . . . . . 91 II 333
— Nordamerika 1892 II 64, 68. 94 I 65
Uinta-Formation . . . 93 I 151
Uitenhaageformation, Südafrika . . . . . 90 I *6*
Ulexinhydrobromid . . . 94 II *116*
Ulexinnitrat . . . . . 94 II *108*
Ulexit, Nevada . . . . 91 I 43
Ullmannia selaginoides . 91 I 166
Ullmannit . . . . . 91 I *154*
— Siegen . . . . . 92 II 409
— Tetartoëdrie . . . . 92 II 402
Ulminium . . . . . 92 I 613
Ulmus antecedens . . . 90 I 373
— elegantior 1893 II 565. 94 I 227
— Ursprung . . . . . 91 II 381
Ulodendron . . . . . 92 I 197
— majus . . . . . 91 II 204
— minus . . . . . 91 II 204
— scythicum . . . . . 94 I 172
Ulrichia confluens . . . 92 II 459
— Conradi . . . . . 91 II 460
— emarginata . . . . 92 II 459
— Marrii . . . . . 94 II 468
— Nicholsoni . . . . 94 II 468
— nodosa . . . . . 92 II 458
Ultramarin . . . . . 92 I 29
Umangit, Argentinien . 93 I 22
Umbelliferen . . . . . 91 I 338
Umbelliflorae . . . . . 91 I 338
Umbonula bartonense . . 94 I 202
— calcariformis . . . . 94 I 202
Umwandlungspseudomorphosen . . . . . 91 I *217*
Undina . . . . . 92 II 456
— acutidens . . . . . 91 II 348
— minuta . . . . . 91 II 347
— penicillata . . . . 91 II 350
Undularia . . . . . 92 II *31*
— carinata . . . . . 94 II 142
Ungulata zygodonta . . 93 I 148
Ungulaten, Geschichte . 93 II 540

Ungulatenfuss, Entwickelung . . . . . 1893 I 151
Unicardium . . . . . 93 II 158
— Josephense . . . . 91 II 176
Unio procumbens, Rumänien . . . . . 94 I *118*
Unionen, Perm . . . . 94 I 197
Unionenschichten, Rumänien . . . . . 1894 I *166, 169*
Unioniden, Herkunft . . 91 II 183
Universalgoniometer . . 93 II *69*
Untergrund, Berlin . . 94 II 73
Unterhelderberg-Fauna, Nordamerika . . . . 93 I 119
Unteroolith . . . . . 93 II 384
— Yorkshire . . . . . 94 II 109
Unteroolith-Fauna, Argentinien . . . . . 93 I 126
Upperhelderberggroup, Bolivien . . . . . BB VIII *108*
Upsalagranit, Geschiebe . 93 I 142
Ural, Hebung . . 1892 I 151, 381
Uralichas . . . . . 94 I 188
Uralit in Eklogit . . . 93 I 273
— Tirol . . . . . 90 I *76*
Uralitdiabas, centraler Balkan . . . . . 90 I *267*
— Cypern . . . . . 93 II 59
— Tetschen . . . . . 93 II 358
Uralitdiorit, Predazzo . 90 I *77*
Uralitporphyr, Viezena . 90 I *81*
Uralitporphyrit, Finnland 92 I 310
Uraninit . . . . . 93 I 478
— Canada . . . . . 91 I 38
— Middletown . . . . 91 II 44
Uranothallit, Joachimsthal 93 I 474
Uranotil . . . . . 93 II 253
Uranpecherz, Freiberg . 91 II 292
— Přibram . . . . . 94 I 91
Urao . . . . . 1892 I 507, 508
Urformation, nördliches Norwegen . . . . 93 II 109
Urgebirge, Böhmen . . 90 II 72
Urgo-Aptien, Algier . . 93 I 185
Urgon, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 473
— Nola . . . . . 90 I *262*
— Savoyen . . . . . 94 I 348
— über Senon geschoben, Pyrenäen . . . . . 91 II 281
Uriconian . . . . . 92 II 293
— Eruptivgesteine . . . 92 I 271
Urmiatherium Polaki, Sivatheride, Knochenfeld von Maragha . . . 90 II 432
Uromitra cognatella . . 91 II 464
Uromitra gentilis . . 1891 II 464
Ursida . . . . . 90 II 430
Ursus arctos, Schädel . . 91 I 325
— spelaeus . . . . . 93 I 539
— — Arnsteinhöhle . . 93 II 182
— — Herrmannshöhle . 90 I 138
— — Irpfelhöhle, Württemberg . . . . 94 I 504
Urvierfüssler, Rothliegendes, Sachsen . . . . 93 I 171
Utahit . . . . . 93 II 462
Uticaschiefer . . . . . 93 I 334
Utriculus circinatus . . 90 I 157
— radians . . . . . 90 I 157
Uvigerina aculeata . . 94 I 523
— crassa . . . . . 94 II 368
— globulosa . . . . . 94 II 368
— tuberosa . . . . . 94 II 368
— uncinata . . . . . 90 II 447
— venusta . . . . . 94 II 476
Uwarowit, Californien . 92 I 51

V.

Vaalconglomerat . . . 91 I 136
Vacciniaceen . . . . . 91 I 344
Vaginulina sigmoidea . . 94 II 368
Valangien, erste Kette des Jura . . . . . 94 I 474
Valentinit . 1893 I 25. 94 I *30*
— künstlicher . . . . 92 I 225
Valissnerites jurassicus . 91 I 177
Valorsineconglomerat . . 93 I 271
Valvata levantica . . . 90 I 453
— Vrabceana . . . . 91 II 131
Valvatidae . . . . . 93 II 417
Vanadinate, Mexico . . 90 II 40
Vanadinit . . . . . 91 I 376
— Arizona u. Neu-Mexico 90 I 227
— Schottland . . . . 91 II 17
Vanikoro neritopsoides . 91 II 129
Varanoidea . . . . . 92 I 576
Varians-Gruppe der Rhynchonellen . . . . . 91 I 162
Variolit als randliche Ausbildungsform zweier übereinander geflossener Diabasströme, Homertshausen . . . . 90 II 248
— der Durance . . . . 90 II 391
— Lleyn . . . . . 94 II 259
Variolitstructur . . . . 92 I 284
Vasculum . . . . . 92 II 155
Vasseuria . . . . . 92 II 361
Vectian, Vardour . . . 94 I 146

Velates circumvallata. 1893 I 554
— Schmideliana . . . . 93 I 554
Veleda elliptica . . . . 93 I 538
Vemdalsquarzit . . . . . 92 I 337
Venericardia compressa . 91 II 175
Veneropis Abichi . . . 90 II 121
Ventriculites spissorugatus 93 I 566
Venus . . . . . 93 II 158
— Bravardi . . . . . 94 I 370
— Justiniensis . . . . 94 I 388
— Koeneni . . . . . 91 II 444
— Kreide von Martapoera (Borneo) . . . . . 90 II 416
— Malonensis . . . . . 94 I 372
— pacheira . . . . . 94 I 370
— Philippii . . . . . 90 I 158
— pliocenica. . . . . 90 II 153
Verespatak, Bergbau . . 93 I 79
Vergletscherung, Alpenvorland . . . . . 94 I 313
— Centralalpen. . . . 91 II 138
— der Alpen . . . . 92 I 149
— der Balkanhalbinsel . 92 I 150
— Ostsibirien . . . . 91 II 335
— Quartär . . . . . 93 I 57
— Rheinthal. . . . . 94 I 366
— Riesengebirge . . . 94 II 132
— Schottland . . . . 93 I 135
— Vertheilung derselben in den Ostalpen . . 90 II 425
Verit, Cabo de Gata . . 92 II 424
Vermetus glaber . . . . 94 I 172
Vermiculit. . . . . 94 I 32
Vermilion . . . 1893 II 516, 517
Vermiporella 1893 II 140. 94 I *109*
— fragilis . . . . . 93 II 142
Verrucano 1893 II 332. 94 I 99
— Glarner Gebirge . . 94 I 313
— Monte Pisano 1893 I 574. 94 II 443
— Tirol . . . . . 91 II 440
Versandung der adriatischen Küste . . . . 93 II 49
Verschiebungen, säculare, von Meer und Festland 93 II 321
Versenkungen, postglaciale, Rügen. . . . 91 I 310
Vertagus coloratus. . . 93 I 538
Vertebraten, fossile, Uinta-Formation . . . . 90 I 337
Vertebraten-Fauna, Puerco-Schichten . . . 90 I 333
Vervollkommnungsprinzip von Nägeli . . . . 90 II 134
Verwachsung, Chlorit und Biotit . . . . . 92 II 227
Verwachsung, Pennin und Phlogopit. . . . 1892 II 227
— Quarz und Feldspath in Granit, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *305*
Verwerfung, Arve-Thal . 94 I 283
— Central-Japan . . . 94 I 282
— in Driftsand, Cumberland . . . . . 94 I 284
— Leinethal . . . . BB VII *246*
— Salzbrunn. . . . . 94 II 76
— Spessart . . . . . 94 I 309
— südl. Appalachen . . 93 I 57
— Wales . . . . . 92 I 342
— Westalpen . . . . 93 I 98
Verwerfungsspalten des Döhlener Rothliegenden 93 I 341
— Lausitz . . . . . 92 II 251
Verwitterung der Gesteine 1891 II 305, 433
— — — befördert durch kleine Lebewesen . . 94 I 458
— der klastischen Gesteine 94 II 52
— Gneiss, Argentinien BB VII *343*
— Granit, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *310*
— säculare . . . . . 93 I 45
— Skandinavien . . . 94 II 332
Vespertiliavus . . . . 93 I 149
Vespertilio grivensis . . 94 II 344
Vespertiliones . . . . 90 II 429
Vesuv . 1892 II 44, 45, 47, 48, 49
— Ausbruch am 7. Juni 1891 . . . . . 93 I 490
— — vom Jahre 1631 . 92 II 256
— Bohrung am Fusse bei Ponticelli . . . . . 92 I 289
— Thätigkeit im Juni 1891 92 II 258
Vesuvian . . . . . 93 II 345
— Arendal . . . . . 90 II 32
— Becco della Corbassera 90 II 31
— Canzacoli . . . . . 90 II 31
— chem. Constitution 1890 II 31. 91 I *200*. 93 II 9
— Cziklowa . . . . . 90 II 31
— Egg . . . . . 90 II 31
— Eker . . . . . 90 II 32
— Genua . . . . . 94 I 443
— Haslau. . . . . 90 II 32
— Land der orenburgischen Kosaken . . . 93 I 33
— Monzoni . . . . . 94 I 443
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— optische Anomalien . 92 I *201*
— pseudomorph nach Epidot . . . . . 94 II 232

Vesuvian, Sandford . . 1890 II 32
— Südwest-Afrika . . . . 90 I *112*
— Umbildung in Chlorit 92 II 231
— Ural . . . . . 93 II 251
— Zermatt . . . . . 90 II 31
Vesuvian-Pyroxen-Fels, Piz Longhin . . . . 91 II 236
Vesuvlaven, Umwandlung 92 II 258
Vibracella . . . . . 94 I 519
Viburnum . . . . . 93 II 222
— alnoides . . . . . 93 I 431
Vicarya Branneri . . . 94 I 371
Victoria regia . . . . 92 I *127*
Viertelundulations-glimmerblatt . . . 91 II *21*
Villafranchiano, Gardasee 91 I 136
Villafranchien, Umgebung von Bra . . . . . 90 II 124
Vincularia abscondita . . 90 I 167
— auriculata . . . . 90 I 167
— chilostoma . . . . 90 I 167
— exsculpta . . . . . 90 I 167
— indistincta . . . . 90 I 167
— microstoma . . . . 90 I 167
— rugica . . . . . 90 I 167
— speculum . . . . . 90 I 167
— strumulosa . . . . 90 I 167
— ventricosa . . . . 90 I 167
Vintlit, Terrenten b. Obervintl, Pusterthal . . 90 I *78*
Violan . . . . . 90 II *270*
— St. Marcel, Piemont . 90 I 213
Virgaten, russisches Tithon 90 II *86*
Virgatenfauna . . . . 93 I 357
Virgationen der Cordillere 93 I *31*
Virgatites . . . . . 93 I 354
Virgilia . . . . . 91 II 382
Viséen, Kohlenkalk, Belgien . . . . . 94 I 478
Vishnutherium . . . . 90 II 432
Vitaceen . . . . . 91 I 337
Vitiphyllum Naumanni . 94 I 227
Vitis vinifera, Rom . . 92 I 469
Vitriwebbina laevis . . 94 I 525
— Sollasi . . . . . 94 I 525
Vitulina pustulosa 1891 I *274*. BB VIII *71*
Viverra Hastingsiae . . 93 II 540
— simplicidens . . . . 91 II 147
Viverravus gracilis . . 91 II 148
Viverriden . . . . . 91 II 146
Vivianit, Cornwall . . . 91 I 384
— Cumberland-Fluss . . 94 I 48
— Giessen . . . . . 91 I 18
— Szentes . . . . . 91 II 83
Vivipara artesica . . . 90 I 453
Vivipara Rumänien 1894 I *124, 167*
— Zsigmondyi . . . . . 90 I 453
Vletavicrinus . . . . . 93 II 518
Vochysia dura . . . . 93 II 434
— europaea . . . . . 91 I 336
Vögel, Argentinien . . . 93 I 544
— englische . . . . . 93 II 544
— Indien . . . . . 93 II 545
— Malta . . . . . 93 I 391
— Pleistocän, Sardinien und Corsica . . . . 93 II 545
— Queensland . . . . 94 I 182
— Saltholmskalk b. Malmö 91 I 331
Vogesit, Melibocus . . . 94 I 290
— Odenwald . . . . . 92 II 252
Vola propinqua . . . . 93 I 182
— quadricostata . . . 90 I 359
— quinquecostata, Kreide von Martapoera (Borneo) 92 II 416
— subatava . . . . . 91 II 129
Voltzia heterophylla . . 93 I 572
— Liebeana . . . . . 91 I 166
Volumen der Gebirge, Genauigkeit der Bestimmung . . . . . 91 I 56
Volumenometer zur Bestimmung des spec. Gewichts . . . 1893 I 228, 229
Voluta . . . . . 92 I 588
— Coroni . . . . . 91 II 464
Volutilithes . . . . . 91 I 432
— lativittata . . . . 91 I 158
— magnifica . . . . . 91 I 158
Volutomorpha orientalis . 93 I 538
Volutopsis norvegica . . 92 II 362
Volvula Bruguierei . . 94 II 472
Vorschubbeben . . . . 94 I 455
Vulcane, argentinische Cordillere . . . . . 93 I 105
— australische Alpen . . 94 II 297
— Hawaii-Inseln . . . 90 I 423
— Island . 1890 I 422. 93 I 44
— Mexico . . . . . 90 II 273
— Mono Valley . . . . 92 I 385
— Nord-Californien . . 90 I 430
— Stuttgart . . . . . 93 I 70
— Süditalien . . . 1892 II 48, 51
Vulcanische Auswurfsproducte . . . . . 93 I 44
Vulcanische Gesteine, Dartmoor . . . . . 90 II 91
Vulcanische Inseln . . . 92 II 281
Vulcanische Producte der Tiefsee . . . . . 93 II 307
Vulcanische Thätigkeit auf den britischen Inseln . 93 I 52

Vulcanische Thätigkeit, Vesuv . . . . . 1892 I 56
— — Vulcano und Stromboli . . . . . 92 I 57
Vulcano, Thätigkeit 1888, 1889 . 1892 II 259. 93 I 493
Vulpavus palustris . . . 91 II 148
Vulpes, Montousé . . . 93 I 539

W.

Waagen, hydrostatische . 94 II *237*
Waagenella . . . . . 90 II 151
Waagenia harpepora . . 90 I 156
— Kamicensis . . . . 90 I 156
Waagenoceras . . . . 90 II 149
Wachs, mineralisches, Kaluga . . . . . 94 II 231
Wachsthumsverhältnisse v. Krystallfragmenten in feurigflüssigen Magmen 90 II 89
Wad . . . . . 91 I 7
Wälder, Abhängigkeit von den petrographischen Verhältnissen, Norwegen . . . . . 94 I 61
— Zusammensetzung, in Europa . . . . . 91 II 375
Wälderthon, Westfalen . 94 II 113
Wärme, specifische, des Basalt . . . . . 92 II 43
Wärmeleitung einiger Gesteine in absolutem Maasse . . . . . 90 I 52
— in tetragonalen und hexagonalen Krystallen 94 I 5
— innere . . . . . 91 I 200
— Marmor . . . . . 92 II 43
— verschiedener Mineralien . . . . . 94 I 247
Walchia longifolia . . . 90 I 173
Waldheimia Bukowskii . 93 II 136
— canaliculata . . . . 93 II 420
— cinctella . . . . . 93 II 420
— compressa . . . . . 93 II 420
— Di Stefanoi . . . . 94 I 506
— Ernestinae . . . . 94 II 314
— Fucinii . . . . . 94 II 314
— integrella . . . . . 93 II 420
— jonica . . . . . 94 II 314
— Laboniae . . . . . 94 II 314
— Mazeii . . . . . 94 II 314
— n. sp., Südtyrol . . 94 I 486
— Nerei . . . . . 94 II 314
— Oenotria . . . . . 94 II 314
Waldheimia pedemontana 1894 II 460
— perforata . . . . . 90 I *3*
— reascendens . . . . 91 II 319
— Rüdtki . . . . . 93 II 419
— rupicola . . . . . 93 II 420
— St. Cassian . . . . 90 II 333
— subimpressula . . . 93 II 382
— sundaica, Java . . . 90 I 313
— Telleri . . . . . 93 II 419
— tesinensis . . . . . 94 I 486
— thurina . . . . . 94 II 314
— tumida . . . . . 94 II 314
— unciformis . . . . 94 II 314
— Vinassai . . . . . 94 II 314
— Waageni . . . . . 93 II 418
— Zugmayri . . . . . 93 II 420
Wale . . . . . 92 I *161*
Walkerde, Rosswein . . 93 II 503
Wallalaschichten, Mt. Diablo . . . . . 93 I 100
Wallberge, Mecklenburg . 94 I 164
Wanzen im Bernstein . 92 II 460
Warren Water, ein verschwundener See, Nordamerika . . . . . 94 I 65
Warrenit . . . . . 93 II 16
Warwickit, New York . 91 II 416
Washita Division . . . 94 I 152
Wasser, Ausdehnung . . 93 II 16
— Brechungsexponent . 93 II 16
— Compressibilität 1891 I 1. 94 I 97
— des Genfer Sees und des Sees von Annecy 93 I 484
Wasseranalyse, Bodensee 94 II 273
— Bosnien . . . . . 91 II 75
— Preblau . . . . . 91 II 74
— Willebroeck . . . . 91 II 69
— Yellowstone Park . . 91 I 249
Wassercapacität des Bodens 90 I 133
Wasserdampf bei vulcanischen Eruptionen . . 91 II 420
Wasserläufe, unterirdische, Languedoc . . . . 91 I 263
Wasserleitung, Brüssel . 91 I 422
— des Bodens . . . . 90 I 132
Wassernuss . . . . . 91 I 352
Wasserscheide zwischen Meira und Inn . . . 94 II 244
Wasserspalten bei Farnarten . . . . . 94 I 527
Wasserversorgung der Stadt Freiberg . . . 91 I 247
Wateletia . . . . . 90 II 152
Waulsortien, Kohlenkalk, Belgien . . . . . 94 I 478

Waverly-Problem, Ohio 1894 II 441
Wealden, Bernissart . . 94 II 449
— Linden . . . . . 93 I 124
— Sehnde bei Lehrte 1891 I *119*. 91 II *105*
Websterit, Maryland . . 91 II 93
Wehrlit, Garaball Hill . 93 I 286
Weibyit, Südnorwegen . 92 I 265
Weichselia erratica . . 91 I 315
Weinsaures Antimonoxyd-Kali + Chlornatrium BB VIII *502*
Weisserz, Bräunsdorf . . 93 II 78
Weissnickelerz . . . . . 91 I *152*
Weissstein . . . . . 92 II 292
Wellendolomit, Mosbach, Neckarthal . . . . 94 I 341
— Odenwald . . . . . 90 I *102*
Wellenkalk, agronomische Untersuchung . . . 94 I 482
— Alpen . . . . . 94 II *7*
— Deutsch-Lothringen . 91 I 411
— Gliederung . . . . . 91 I 116
— Jena . . . . . 91 I 296
— Leinethal . . . . BB VII *258*
— Odenwald . . . . . 90 I *102*
Werfener Schichten 1892 I 125. 93 II 525
— Schiefer . . . . . 92 II 300
— — Kärnthen. . . . . 91 II 319
— — Konjica und Jablanica a. d. Narenta . 90 I 63
Wernerit, Ariège . . . 91 I 263
— Chile . . . . . 91 II 28
— in Gneiss . . . . . 93 I 274
Westalpen, Bau. . . . 93 I 98
Wettersteinkalk. . . . 93 II 524
Wetzschiefer, Vogtland . 92 II 79
Whewellit, Zwickau . . 90 II 221
Wichita Beds, Texas . . 92 II 283
Widdringtonia keuperina, Keupergyps bei Windsheim . . . . . 93 I *50*
Widmannstätt'sche Figuren. Photographische Aufnahme derselben . 90 I 42
Wiederkäuer . . . . . 93 II 398
— aus dem Pliocän von Maragha . . . . . 92 I 405
— Metatarsus . . . . 93 I 541
Wildbachverheerungen . 93 II 323
— Mittel dagegen . . . 94 I 457
Willemit, in Schlacke gebildet . . . . . 91 I 17
— Moresnet . . . . . 94 II 415
— N. Jersey . . . . . 91 II 415
Williamsonia angustifolia 91 I 350
Wiluit . . . . . 1890 II 19
Winde . . . . . 90 II 240
Windwirkung . . . . 93 I 46
— Aegypten . . . . . 90 II 95
Winkel der optischen Axen von Mischkrystallen BB VIII *128*
Wirbel, Ein- und Ausschaltung . . . . . 93 II 189
— Entwickelungsgeschichte . . . . 94 I 501
Wirbelsäule, Morphologie 94 I 374
Wirbelthiere, Cypress Hills 92 I 394
— Entwickelung . . . 92 I 398
— in Bernstein . . . . 92 II 460
— Java . . . . . 93 I 377
— Leicestershire und Rutland . . . . . 90 II 427
— Locle . . . . . 92 I 153
— mesozoische . . . . 93 I 391
— Nagpur-District. . . 91 II 342
— Texas . . . . . 93 I 378
Wischnitzgesteine, Odenwald . . . . . 94 I 290
Wisingsö-Formation . . 92 I 172
Wismuth . . . . . 94 I *29*
— Gladhammar . . . 90 II 53
— Südwest-Afrika . . . 90 I *104*
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Wismuthantimonnickelglanz . . . . . 92 II 406
Wismuthglanz, selenhaltig 93 II 465
Wismuthoxyd . . . . 94 I *30*
Witchellia crassicarinata 94 I 193
— punctatissima . . . 94 I 193
— regrediens . . . . 94 I 193
— Romani . . . . . 94 I 193
— Sayni . . . . . 94 I 193
Witherit, mikrochemische Untersuchung . . . 94 I 7
Wittichenit, künstliche Darstellung . . . . 92 II 399
Wöhlerit, Südnorwegen . 92 I 251
Wörterbuch der Berg- und Hüttenkunde . . . 94 II 393
Wolfachit . . . . . 91 I *152*
Wolframate, Isomorphie . 92 I *56*
Wolframit, Südwest-Afrika . . . . . 90 I *109*
Wolframsäure, als agent minéralisateur . . . 93 II 48
— Krystallformen ihrer Salze . . . . . 94 I 10
Wolfsbergit, Wolfsberg . 92 II 409
Wolga-Stufe, Polen . . 93 I 520
— Vergleich mit englischen Profilen . . . 91 I 304

Wollastonit . . . . 1890 I *230*
— Bildung in Glasfluss . 90 II 384
— Formel . . . . . 93 II 8
— Humpoletz . . . 1893 II 266, 345
— in Glasschlacke . . 94 II 223
— Stellung in der Pyroxenreihe . . . . . 91 I *150*
— Südwest-Afrika . . . 90 I *113*
— Synthese . . . . . 92 I 89
— Vesuv . . . . . 93 II 22
Würmer, palaeozoische, Bolivien . . . . BB VIII *82*
Wüsten . . . . . 92 I 58
— Bildung . . . . . 93 I 46
— Nordamerika . . . . 94 I 66
— Sahara . . . . . 92 II 279
— transkaspische . . . 92 II 277
Wulfenit . . 1891 II 20. 94 I 6
— Sing-Sing . . . . . 93 II 33
Wurmspuren . . . . . 92 I 602
— in Meeresschlamm . . 90 II 440
Wurtzit, chemisches Verhalten . . . . . 94 II *274*
— Mies . . . . . 93 I 11
— Neubildung . . . . 94 II *275*

X.

Xanthilites Bowerbankii . 91 II 458
Xantho . . . . . 93 I 178
Xantitan, Carolina . . . 91 II 416
Xenocrinus . . . . . 93 II 518
Xenophora . . . . . 92 II 361
Xenotim in Muscovitgranit . . . . . 94 I 79
— New York . . . . 91 II 50
— Nord-Carolina . . . 90 I 219
— Pisek . . . . . 90 II 56
— Südnorwegen . . . 92 I 240
Xestoleberis . . . . . 92 II 458
— Wrightii . . . . . 91 I 335
Xiphodon . . . . . 93 I 148
— platyceps . . . . . 94 I 179
Xiphodontherium obliquum 93 I 148
— pygmaeum . . . . . 93 I 148
— Schlosseri . . . . . 93 I 148
Xylomites exiguus . . . 93 II 431
— Sandali . . . . . 94 I 530

Y.

Yeovil-Sand . . . . . 90 I 118
Yoldia Beyrichi . . . . 92 II 362
Yoldia-Thonkerne, angebliche, Schlesien . . . 91 I *290*
Yoldia-Thonkerne, Diluvium, Schlesien . 1891 II *332*
Yoldienthone, geol. Alter 90 II 126
Yonkers Gneiss, New York 93 I 331
Ypresien, Belgien . . . 93 I 523
— Nordfrankreich . . . 94 I 356
Yttrialith, Llano Co. . . 93 I 257
Yttrium Calciumfluorid . 94 II 240
Yucca Roberti . . . . 91 I 174

Z.

Zaghouankette . . . . 93 II *30*
Zahnentwickelung . . . . 93 II 187
Zahnleiste, erste Anlage, beim Menschen . . . 94 II 149
Zahnrudimente, schmelzlose, des Menschen . 94 II 148
Zahntypen . . . . . 93 II 394
Zamia tertiaria . . . . . 93 II 434
Zamiophyllum Naumanni 93 II 562
Zamites acicularis . . . 93 I 207
— alaskana . . . . . 90 I 374
— carbonarius . . . . . 93 I 207
— Leggetti . . . . . 90 I 372
— Mineri . . . . . 93 I 207
— Planchardi . . . . 93 I 207
— Powelli . . . . . 93 II 218
— Rolkeri . . . . . 90 I 372
— Saportanus . . . . 93 I 207
Zanclean-Stufe . . . . 93 I 424
Zanclodon im oberen Keuper, Unterfranken 94 I *203*
— laevis . . . . . 92 I 354
Zanthoxylon inaequabile 93 II 434
— tenuifolium . . . . . 93 II 434
Zaphrentis . . . . . 90 II 158
— Beyrichi . . . . . 94 II 103
— Kazy-Kurti . . . . 94 I 171
Zechstein . . . . 1893 II 98, 100
— Leinethal . . . . BB VII *254*
— Oberrhein . . . . . 91 II 108
— Sachsen . . . . . 93 II 501
— Spessart 1893 I 85. 94 I 309
— Thüringer Wald 1891 II 265. 92 II 297
— Waldeck . . . . . 93 I 342
Zechsteinkalk, verkieselt, Schwarzburg . . . . . 93 II 130
Zeilleria Sorlinensis . . 91 II 365
Zeolithe, Ariège und Pyrenäen . . . . . 94 I 48
— Bildung in Nephelinsyenit, Julianehaab . 93 I 500
— Haute-Ariège . . . 91 I 263
— Haute-Loire . . . . 93 II 264

Zeolithe in Gneiss, Ariège 1892 II 190
— — — Cambo . . . 91 II 414
— künstliche Darstellung und chem. Constitution 90 I *118*
— Loire . . . . . 91 I 379
— Rye Water, Ayrshire 90 II 219
— Umänderungen durch Erwärmen . . . . 92 II 237
— zersetzte aus den Somma-Conglomeraten 90 II 208
Zerklüftung des Sandsteins, Fontainebleau 90 II 113
Zermalmungserscheinungen, Stolpen . . . . 93 II 89
Zersetzungsthon, Analyse 91 II 433
Zerstreuung, durch Sonnenlicht bewirkte elektrische, an Flussspath . 93 II 6
Zeuglodon . . . . . 92 I 160
— caucasicus . . . . 94 I 507
Zeuglodonreste aus Holland 93 II *68*
Zeuglodontidae . . . . 92 II 145
Zeuglopleurus costatus . 90 II 155
Ziegelerz, Südwest-Afrika 90 I *108*
Zink . . . . . 94 I *11*
— Gesammtproduction . 91 II 293
Zinkblende, Belgien . . 94 II 398
— chemisches Verhalten 94 II *274*
— Doppelbrechung durch Druck . . . . . 94 I 5
— Mies . . . . . 93 I 11
— Neubildung . . . . 94 II *275*
— optische Anomalien 1892 I *200, 203*
— phosphorescirend, Linares . . . . 94 I 60
— Sardinien . . . . . 94 I 82
— Schweden . . . . . 90 I 217
— Serbien . . . . . 90 II 75
— Silberberg . . . . 92 II 70
— Südnorwegen . . . 92 I 238
— Tyndrum . . . . . 90 II 220
Zinkcalciumlegirung . . 94 I *18*
Zinkcalciumtypus der Metalle . . . . . 94 I *5*
Zinkcarbonat . . . . . 92 II 211
Zinkenit, Cinque valle, Südtirol . . . . . 94 I *196*
— Stewart Mine, Arkansas 90 II 45
Zinkerze, Oberschlesien . 94 I 87
— Russland . . . . . 93 II 61
— tunisischer Atlas . . 93 II *32*
Zinkerzlager, Iserlohn . 90 I 257
Zinkhydroxyd . . . . 94 I *38*
Zinkit . . . . . 94 I *12*
— Franklin . . . . . 93 I 235
Zinkit, Stirling Hill, N. J. 1890 I 408
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Zinkoxyd, aus einem Hochofen . . . . . 91 II 416
— künstliches, Mislowitz, Schlesien . . . . . 90 II 386
Zinkspath, Semipalatinsk 94 II 234
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Zinkspinell, Bildung . . 94 I 95
Zinksulfat, Varietät . . 94 I 51
Zinksulfathaltige Quelle, Missouri . . . . . 94 II 11
Zinksulfid . . . . . 91 II 416
— Kansas . . . . . 94 I 16
Zinn . . . . 1892 I 83. 94 I *21*
— gediegen, Bolivia . . 91 II 15
Zinnerz . . 1893 II 62. 94 I *22*
— Bolivia. . . . . 93 II 81
— Cornwall 1890 II 386. 92 II 15
— Jenissei . . . . . 90 I 16
— Malacca . . . . . 91 I 100
— Mexico . . . . . 94 I 57
— Mount Wills-Kette . 91 II 100
— Portugal . . . . . 94 II 430
— Tasmania . . . . . 91 II 295
— Villeder . . . . . 90 II 88
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
— Wyoming . . . . . 91 II 237
— Zinnwald . . . . . 90 II 386
Zinnjodid, Lösung in Bromarsen, hohes specifisches Gewicht . . . . . 94 II 3
Zinnober . . . . . 94 I *34*
— Avala . . . . . 91 I 25
— Berg Avala bei Belgrad, Serbien . . . . . 90 I 25
— Bildung . . . . . 93 I 465
— Californien . . . . 92 I 48
— Donetzgebiet. . . . 94 I 469
— Leogang . . . . . 93 I 15
— Ungarn . . . . . 94 II 32
Zinnobersandstein, Istrien 93 II 75
Zinnoxydul . . . . . 94 I *22*
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Zinntypus α und β . . 94 I *5*
Ziphusschichten, Herford 90 I 116
Zirkon . . . 1893 II 265, 460, 469
— Australien . . . . 93 I 252
— Binnen . . . . . 90 I 34
— Colorado . . . . . 91 II 39
— in Anorthitfels, Canada BB VIII *447*
— in chilenischen Eruptivgesteinen . . . . . 94 I 59
— in Glimmerschiefer, Argentinien . . . BB VII *355*

Zirkon in Gneiss, Argentinien . . . . . BB VII *306*
— in Granit, Nord-Argentinien . . . . BB VIII *351*, *385*
— — Puy de Montaudau 1894 II 424
— in Kryokonit . . . BB VII *170*
— in Lenneporphyr . BB VIII *559*
— in Pegmatit, Argentinien . . . . . BB VII *400*
— Jagersfontein . . . 90 II 97
— künstliche Darstellung 92 II *232*
— Neu-Süd-Wales . . . 90 II 207
— Nordamerika . . . . 92 I 500
— Object des Bergbaus . 90 II 22
— Südamerika . . . . . 92 I 36
— Süd-Borneo . . . . 93 I *41*
— Südnorwegen . . . 92 I 242
— Wärmeleitung . . . 94 I 5
Zirkonerde . . . . . 94 I *23*
Zirkonsyenit, Colorado . 91 I 268
Zittelia striata . . . . 94 I 150
Zizyphinus . . . . . 92 II 361
— Lawleyi . . . . . 90 II 153
— simulans . . . . . 90 II 153
Zlambachschichten 1892 I 125. 93 I 191
Zobtenit mit Smaragdit, M. Viso. . . . . 93 II 54
Zoisit, chemisches Verhalten 94 II *269*
Zoisit in Eklogit . . 1893 I 273
— in Granit, Nord-Argentinien . . . . . BB VIII *361*
— Val di Susa . . . . . 91 II 407
Zoisit-Amphibolit, Bacher Gebirge . . . . . 94 I 462
Zoisit-Granat-Amphibolit 94 I 461
Zoisit-Granat-Phyllit, Schweiz . . . . . 94 I 295
Zonen, klimatische . . . 93 II 385
Zonencoordinaten . . . 93 I 456
Zonenlehre . . . . . 93 I 456
Zuflussverhältnisse des Chiemsees. . . . . 90 II 312
Zurcheria . . . . . 94 I 192
Zusammensetzung, chemische, u. Krystallform 93 II 459
Zweischaler, Stammesgeschichte . . . . . 93 I 407
Zwillingsaxe, optische. . 92 II *68*
Zwillingsbildung . . . 94 I *106*
Zygobatis, Tüffer, Steiermark . . . . . 94 I 187
Zygopleura . . . . . 92 II *30*
— coronata . . . . . 94 II 143
— spinosa. . . . . 94 II 143
Zygopteris. . . . . 91 I 170
Zygospira modesta . . . 92 II 372
— Schleife . . . . . 94 II 175

Nachträge und Berichtigungen.

I. Personen-Verzeichniss.

	Jahrg.	Bd.	Seite
S. 28. Le Chatelier fällt fort. Vergl. S. 102.			
S. 28. Chelius, E. siehe Sauer, A.			
S. 36. *Darapsky, L.: Castanit. B.*	*1890*	*II*	*267*
S. 40. *Denckmann, A.: Ueber Aufschlüsse im Jura und in der Kreide bei Hannover. B.*	*90*	*II*	*97*
S. 44. *Drygalsky, E. v.: Zur Frage der Bewegung von Gletschern und Inlandeis. (Mit 1 Holzschnitt.) A.* .	*90*	*II*	*163*
S. 49 Z. 28 v. o. lies sphéroide statt sphériode.			
S. 66. *Haase, E.: Bemerkungen zur Palaeontologie der Insecten. (Mit Taf. I.) A.*	*90*	*II*	*1*
S. 68. *Hasse, C.: Fossile Alcyonarien. (Mit Taf. III.) A.*	*90*	*II*	*59*
S. 70. *Herrmann, O. und E. Weber: Contactmetamorphische Gesteine der westlichen Lausitz. B.*	*90*	*II*	*187*
S. 79. *Igelström, L. J.: Violan und Antochroit identisch? B.*	*90*	*II*	*270*
S. 86. *Karsten, H.: Die Juraformation in Südamerika. B.*	*90*	*II*	*191*
S. 87 Z. 20 v. o. lies 93 statt 83.			
S. 93. *Koenen, A. v.: Hat Coccosteus vordere Ruderorgane? B.*	*90*	*II*	*198*
S. 103. *Leppla, A.: Zur Lössfrage. (Eine Entgegnung an Herrn A. Sauer.) B.*	*90*	*II*	*194*

		Jahrg.	Bd.	Seite
S. 108.	*Lundgren, Bernhard: Ein Gavial aus dem Senon von Annetrop bei Malmö. B.*	*1890*	*II*	*275*
S. 113.	*Maurer, Fr.: Palaeontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon. 8. Mittheilungen über Fauna und Gliederung des rechtsrheinischen Unterdevon. A.*	*90*	*II*	*201*
S. 121.	*Mügge, O.: Ein neuer Orthoklaszwilling aus dem Fichtelgebirge. B.*	*90*	*II*	*88*
S. 121.	*— Ueber Zwillingsbildung am Chlorbaryum. A.*	*90*	*II*	*141*
S. 122.	*Müller, G.: Das Alter der glaukonitischen Sandsteine und Conglomerate von Zilly. B.*	*90*	*II*	*193*
S. 122.	*Müller, Wilhelm: Pseudomorphose von Limonit nach Pyrit von Rockbridge Co. in Virginia mit vorherrschendem Ikositetraëder. (Mit 1 Holzschnitt.) B.*	*90*	*II*	*199*
S. 124.	*Nehring, A.: Ueber Cuon alpinus fossilis Nehring, nebst Bemerkungen über einige andere fossile Caniden. (Mit Taf. II.) A.*	*90*	*II*	*34*
S. 127.	*Nikitin, S.: Einiges über den Jura in Mexico und Centralasien. B.*	*90*	*II*	*273*
S. 128.	*Ochsenius, Carl: Die Bildung mächtiger mariner Kalkabsätze. A.*	*90*	*II*	*53*
S. 140.	*Rammelsberg, C.: Sigterit, ein neuer Feldspath. A.*	*90*	*II*	*71*
S. 140.	*— Die chemische Natur der Turmaline. A.*	*90*	*II*	*149*
S. 144.	*Rinne, F.: Ueber Mikroklinstructur. (Mit Taf. IV.) A.*	*90*	*II*	*66*
S. 151.	*Sandberger, F. v.: Zinnhaltiges Magneteisen vom Büchig bei Hirschberg a. Saale (Oberfranken). B.*	*90*	*II*	*269*
S. 152.	*Sauer, A.: „Zur Lössfrage.“ B.*	*90*	*II*	*92*
S. 152.	*— und C. Chelius: Die ersten Kantengeschiebe im Gebiete der Rheinebene. B.*	*90*	*II*	*89*
S. 156.	*Schmidt, Fr.: Bemerkungen über die Schichtenfolge des Silur auf Gotland. A.*	*90*	*II*	*249*
S. 162.	*Siemiradzki, Joseph v.: Zur Stammesgeschichte oberjurassischer Ammoniten. B.*	*90*	*II*	*75*
S. 170.	*Stutz, U.: Das Keuperbecken am Vierwaldstätter See. (Mit 12 Holzschnitten.) A.*	*90*	*II*	*99*
S. 176.	*Toula, Franz: Ueber die von Linienschiffslieutenant L. v. Höhnel aus Ostafrika mitgebrachten Gesteine. B.*	*90*	*II*	*185*
S. 185.	Weber, E. siehe Herrmann, O.			
S. 186.	Z. 22 v. o. lies Brush statt Brust.			
S. 188.	*Wichmann, A.: Ueber angebliche Beziehungen zwischen Solfataren und der granitisch-körnigen Structur saurer Eruptivgesteine. B.*	*90*	*II*	*271*

Verschiedenes.

S. 197.	Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. R. 1892 I 93, 533.	92	II	79
S. 197.	Geologische Specialkarte von Elsass-Lothringen. R.	92	I	532

IV. Sachverzeichniss.

S. 207. Aenderung des optischen Verhaltens dielektrischer Krystalle im elektrischen Felde BB VII *201*

S. 226. Brachiopoden, Schweizer Jura . . 1891 II 36

S. 246. Devon, unteres, metamorphes, Hohes Gesenke . 93 II 125

— — Olmütz . . 93 I 120

Diluvium, unteres, Hessen . . . . 93 I 90

S. 254. Eisenkies, ged. Silber begleitend, Altai . . . 1890 II 20
— nickel- und kobalthaltig, Freiberg . . . . 91 II 292
— Toscana . . 94 I 85
Eisenkiesbergbau, Meggen . . . 90 I 258
S. 255. Eisenspath . . . 94 I 90
— British Columbia . . . . . 90 II 384
— Erzberg, Steiermark . . . . 94 II 61
S. 262. Falciferen, Bau des Kieles . . . . 91 II 360
S. 281. Holaster completus 94 I 372
— nanus . . . 94 I 372
Holectypus Charltoni . . . . . 94 I 372
Holocraspedum . 94 I 371
Holopea ampullacea . . . . . 94 I 172
Holothyriata . . 94 I 202
Homoeosaurus Jourdani . . . 94 I 377
— Rhodani . . 94 I 377
S. 282. Hoplites Roemeri 94 I 372
— texanus . . . 94 I 372
Hornblende, in Andesit . . . 94 I 466
— Puy-de-Dôme . 94 I 41
Hornblendegestein, Aar-Massiv . . 94 I 294
Hornblendegranit, Jesso . . . . 94 I 304
Hornblendekersantit, Rheinpfalz . 94 I 288
Hornblendepikrit, Little Knott . . 94 I 301
Hornblendeporphyrit, West-Cordilleren . . . . 94 I 467
Hornera Hippolytus 94 I 519
— farehamensis . 94 I 202
Hornstein, Val di Tanaro . . . 94 I 102
S. 283. Hoveniphyllum Thunbergi . . 94 I 229
S. 284. Hyopotamus Renevieri . . . . 93 I 148
S. 295. $K_2(SbO)_2C_4H_4O_6 + Na_2SO_4$, Krystallform . . BB VIII *510*
S. 300. Lias, unterer, Fauna v. Spezzia 90 II 295
S. 300. Oligocän, unteres, Mollusken-Fauna 1892 I 586
S. 321. Olivin-Augit-Phonolith, Wyoming 91 I 104
S. 330. Phylechinus Joudi 93 I 560
— simplex . . . 93 I 560
S. 345. Rachiosoma Peroni 93 I 560
Radiolarien, Biancone-Fauna . . 93 I 379
— der Trias u. der palaeozoischen Schichten . . . 93 I 567
Radiolites, Marmorkalk, Brandenberg . . . 93 I 522
Radula Naamanensis . . . . . 93 I 537
Rastrites . . . 93 I 564
— hybridus . . 93 I 564
— peregrinus . . 93 I 564
Realgar, Leogang 93 I 14
Receptaculites crassiparies . . 93 I *44*
— eifeliensis . . 93 I *47*
— Neptuni . . . 93 I *47*
S. 346. Rhabdocidaris angulata . . . . 93 I 560
Rhagatherium valdense . . . . 93 I 148
Rhamphorhynchus Manseli . . . 93 I 163
Rhea, Argentinien 93 I 545
Rhinoceros Mercki 93 I 539
— tichorhinus . 93 I 539
S. 347. Rhynchodus . . 93 I 175
Rhynchonella crassicosta . . 93 I *13*
— papilio . . . 93 I 11
S. 348. Rind, Metacarpale 93 I 542
Roemerit, Chile . 93 I 252
Rothliegendes, Spessart . . . 93 I 85
— Thüringen, Pflanzenreste . 93 I 573
Rothnickelkies, Leogang . . . 93 I 14
Rothspiessglanz . 93 I 233
S. 349. Rutil, Süd-Borneo 93 I *41*
S. 357. Silur, unteres, Coëvrons . . . . 93 I 116
— — Minnesota . 93 I 116
S. 382. Xanthopsis minor 91 II 355
Xenacanthus . . 91 II 167
— Decheni 1891 II 163, 165, 169
Xenophora . . . 91 II 172

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch) in Stuttgart.

Soeben erschien:

Mikroskopische

PHYSIOGRAPHIE

der

Mineralien und Gesteine.

Ein Hülfsbuch

bei mikroskopischen Gesteinsstudien.

II. Band.

Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine

von

H. Rosenbusch.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 6 Tafeln in Photographiedruck.

Preis Mk. 32.—.

Geognostischer Wegweiser

durch

WÜRTTEMBERG.

Anleitung zum Erkennen der Schichten und zum Sammeln der Petrefacten

von

Dr. **Theodor Engel,**
Pfarrer in Eislingen.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit VI Tafeln, 95 Figuren, 7 geologischen Landschaftsbildern und einer geognostischen Uebersichtskarte.

Preis Mk. 8.—, gebunden Mk. 9.25.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch) in Stuttgart.

Mikroskopische

Structurbilder der Massengesteine

in farbigen Lithographien

herausgegeben von

Dr. **Fritz Berwerth,**

a. ö. Professor der Petrographie an der Universität in Wien.

32 lithographirte Tafeln in vier Lieferungen.

Lieferung I mit 8 Tafeln.

Enthaltend: Granitit (Biotitgranit). — Quarzdiorit. — Kersantit. — Mikrogranitischer Quarzporphyr. — Diabas. — Augitporphyrit (Intersertalstructur). — Augitporphyrit (Hyalopilitische Structur). — Trachyt.

Preis pro Lieferung Mk. 20.—.

Lieferung II erscheint noch dieses Jahr.

Allgemeine

Krystallbeschreibung

auf Grund einer vereinfachten

Methode des Krystallzeichnens

bearbeitet

und mit einer Anleitung zur Anfertigung

der Krystallnetze und Krystallmodelle

herausgegeben von

Dr. **Aug. Nies,** Professor.

Mit 182 Originalzeichnungen im Texte.

Preis Mk. 4.—.

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie

Geologie und Palaeontologie

für die

Jahrgänge 1890—1894 und die Beilage-Bände VII—VIII.

Ein Personen-, Sach- und Orts-Verzeichniss

für die darin enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

STUTTGART.
E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).
1896.

In der **E. Schweizerbart**'schen Verlagshandlung (**E. Koch**) in **Stuttgart** ist erschienen:

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.

Ein Personen-, Sach- und Ortsverzeichniss

für die darin enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

Für die Jahrgänge	1830—1839 . . .	Mk. 6.—.
„ „ „	1840—1849 . . .	„ 4.50.
„ „ „	1850—1859 . . .	„ 10.—.
„ „ „	1860—1869 . . .	„ 3.—.
„ „ „	1870—1879 . . .	„ 5.—.
„ „ „	1880—1884 . . .	„ 6.—.
„ „ „	1885—1889 . . .	„ 8.—.

PALAEONTOGRAPHICA

Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit

Herausgegeben von

Professor Dr. **Karl A. v. Zittel** in München.

43. Band. Erstes und zweites Heft.

Jährlich erscheinen 6 Hefte zum Preis von Mk. 60.—.

K. HOFBUCHDRUCKEREI ZU GUTTENBERG. CARL GRÜNINGER. STUTTGART.

891

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01369 0318